سيساله ماليك موسوت موسو



المعُتُجَم الستسابع

٣١٣ نَبِشَة - ١٤ صُورَة مُلوَّلة ٣ مُلاحِق - ٨ مسَنادِد

المكتبة لهنكنات تكاشرون



ميشاه جايات

عَرَبِي - إنجليزي - فركني - ألماني - لاتيني

٣١٣ نَبتَة - ٤٤ صُورَة مُّلوَّنة ٣ مَـلاحِق - ٨ مسَـارِد

مُدُم مكتبة لبناث كاشِرُون

فهرس المواو

<i>I</i>	- المُعْجَم
YV0	– ملاحق Appendices/ Appendices
V ********************************	١- الفصائل النَّباتيَّة (عربيّ - فرنسيّ - لاتينيّ - إنجليزيّ) .
۲۸۰	٢- المُركّبات الكيميائيَّة في النّباتات (فرنسيّ - عربيّ)
٣٠٤	٣- الوَصْفات الطُّبيَّة (فرنسيّ - إنجليزيّ - عربيّ)
٣٣٢	- مُسارد Glossaires/ Glossaries
۳۳۵	١- مُسرد عربيّ
۳٥٤	٢- مَسرد إنجليزيّ
۳۰۹	٣- مَسرد فرنسيّ
***	٤- مَسرد ألمانتي
۳۷۸	٥- مَسرد لاتينيّ
۳۸۰	- مَسارد المَلاحق
۳۸۷	١- مُسرد عربتي
۳۹٦	٢- مَسرد فرنسيّ
٤٠٣	٣- مَسرد إنجليزيّ
٤•٧	٤- مُسرد لاتينيّ
٤٠٩	- مَسرد عربيّ عام
o • Y – 39	- مَسرد إنجليزيّ عام General English Index
٥٤٠-1	- مُسرد لاتين عام General Scientific Index

۳- أَثْرُوبِيْن وقَلْوِيدات الباذِنْجانِيّات Atropine et Alcaloïdes des Solanées (F)

إنّ قلويدات الباذِنْجانيَّات مِثال نيكوتين البَّبْغ، أَتْروپين البلّادُون، هيوسيامين البَنْج، أَيُّوأَتْروپين أو أَتْرُوپامِين البَنْج، البلّادون، هيوسين وسقُوپُولامين البَنْج، وكذلك الأَكْغُونِين وكوكايين الكوكا (من فصيلة الكُوكِيَّات)، يَجب أن يُنظر إليها، تبعًا لتركيبها، كمشتقّات على بعض التَباعد من البيريول ومن البيريديل.

إن البيرول الذي اكتشفه رُونج Runge في نتاج التَّقطير الجافّ للمواد الحيوانية (مثال زيت دِيْتًل الحيواني) حيث يُوجد موادّ بيريديكيّة، إن البيرول هو قاعدة خفيفة تجعلها العناصر المُهَدْرِجة تنقلب إلى حالة ديهيدْرُوبيرول أي بيرولين ولين حالة ترترا ومن ثم إلى حالة ترترا هيدرو بيرُول أي بيرولين هيدرو بيرُول أي بيروليدين CaH₈NH، ومن ثم إلى حالة ترترا البيرُول تركيه CaH₈NH.

أما الپیریدین الموجود کذلك في زیت دِیْپَّل Dippel فهو قاعِدة قویّة ترکیبُها دِیْپَّل C₅H₅N هو ترکیب البَنْزین الذي تُستبدَل منه مَجموعة Ch ثُلاثِیّة التَّکافئو به واحدة تکون بدورها ثُلاثیّة التَّکافؤ . Trivalent

عَلاقات مُشْتَرَكَة بَيْن قَلْوِيْدات البلادُون والبَنْج والدّاتُورة، إلخ.

 $C_6H_{15}ON$ عندما نُؤَسْتِر التروپِین $C_9H_{10}O_3$ بواسِطة حامض ترُوپِیك

۱ - أَبُّوزام مُضادّ للإسهال Apozème antidiarrhéique (F)

 أوسفات كلسي قاعدي
 ١٠

 أبّ خُبز قمح
 ٢٠

 تَحت نيترات البيثموث
 ١٠

 شَراب الرّاتانيا
 ١٠

 صِبغة القِرْفَة
 ٥

 لُوْدَانُم سِيدِنْهام
 ١

 نَمزُج. يُؤخَذ بمقادير مُتساوية على

نمزُج. يُؤخَذ بمقادير مُتساوِية على ثلاث دُفعات خلال ٢٤ ساعة، لكي يَحلّ النَّقيع الأبيض.

Apozème لَيُوزام مُضادٌ لليَرقان -۲ anticitérique (F)

٦.	جَذر شَيْلَك
٥٤	جَذْر فُوَّة
٥٤	جَذْر سَرْخَس
٣٨	جَذر راسَن
۸.	دُرْدِيَّات حامِض البوتاسيوم
٤٠	

نَغلي الجذور في الماء لمدَّة ٤٥ دقيقة، نُمرِّر ونُضيف الدُردِيّات. يُشرَب لهذا المُستحضر خلال النّهار.

أثر

نحصل على أثرُوبينات يمين ويسار وخامِلَة أي مُرازَمَة C₁₇H₂₃O₃N₆ وذلك تبعًا لما نَستعمل الحامض التروبيك الحَدَقَة، جَفاف الفَمّ). اليمين أو اليسار أو المُرازَم. إن الأُثّروپينَيْن، اليمين واليسار، ينصهران عند ١٠٨,٥° سغ؛ الأتروبين اليسار هو مُماثل للهيو-سيامِين في نبات البَنْج وفي مياه تَحضير الْأَثْرُوبِين. نَبات البلّادون؛ بَينما الأتروبين الخامِل فهو مُماثِل للأتروبين الطَّبيعيّ.

> إن الهيُوسين C₁₇H₂₁O₄N الَّذي نَجدُه في مياه تحضير الهيوسيامين (في نَبات البَنْج) والذي يُطلَق عليه كذلك اسم سقُويُولامين يَسار، ليس ترويايين، ذلك أنه ينشطر بواسطة الحامض الكلورهيدريك المخَفَّف والسَّاخن إلى حامض تروپيك وإلى سقُوپُولين C₈H₁₃O₂N قاعدة تَنصهر عند ۱۱۲° سغ وتَغلي عند ۲٤۲° سغ.

> السقوپولامين المُستخرَج من سُكُرّان الــِـابـان (۱) Scopolia japonica هــو مُتَجازئ الهيوسين؛ كما أن هاتين المادَّتين بالذَّات هما مُماثلتين بالنسبة لمعظم العُلماء.

> إن الأيُّوأَتْرويين C₁₇H₂₁O₂N أي الأنروبامِين الذي وُجد في جذر البلادون قد لا يوجد مُسبقًا في هذا النَّبات؛ ولكن من المرجِّح أنه يَتشكّل على حساب الأثرويين أثناء تحضيره. وهو بالتالى يَعمل باتجاه الأثّرُوبين ذاته

من دون أن يكون أكثر سُمِّيّة منه؛ وقد يَخلو من بعض التأثيرات الثَّانويَّة (تَمدُّد

البَلّادُونين C₁₇H₂₁O₂N قد يَحصل من جرّاء تَحوُّل الأَبُّوأَتْروبين بواسطة الحرارة ويكون مُتَجازِنًا له. المادَّتان وُجِدتا في

الدُوبُوَازِين (راجع المعجم الرابع ص ٩٣ رقم ٢١٤) C₁₇H₂₃O₃N الموجود في نَبات الدُوبُوازيا Duboisiamyoporoides ۸٦ ص الثالث ص ٨٦) R. Br. رقم ١١٩) يُعتبر مُماثلًا للهيوسيامين (أَتْروبِين يسار). الدّاتُورين C₁₇H₂₃O₃N الموجود في الداتورة الشائكة Datura stramonium کان یُعتبر فی کودکس ١٩٠٨ على أنَّه مُرادف الأَثْرُويين.

٤- أثيل هيدروكُويْراييْن Éthylhydrocupréine (F)

المواصفات - مسحوق أبيض، طعمه مُرّ، قليل الذُّوبان جدًّا في الماء، يَذوب في الكحول، والأثير، والكلوروفورم، والزّيوت؛ مُعطيًا ما يُسمّى بتَفَاعُل «الكينين النَالْيُوبِمِيّ»(٢): . Thalléioquinine

الخصائص - طارد للحُمّى، ولكنّه استُعمِل بنوع خاص كدواء واقي وشاف

⁽٢) التَّسمية للمؤلِّف وهي من تاليوم: Thallium

لرَبو الحساسية، عن الطَّريق الدَمْعِيّة والأنفيّة. وأُعطي كذلك كدواء نَوعيّ (مُتخصِّص) للإصابات المُتسبِّبة عن المُكوَّرة الرِّنويّة.

طريقة الاستعمال - يُعطى في بيلولات أو كبسولات بمقدار غرام واحد وغرام ونصف بأجزاء من ٢٥٠ غرام، وفي زُرْقات في غِشاء الجَنْب أي غشاء الرَّثة المَصْلِق بعد البَضْع أو البَزْل (محلول بنسبة ٥٪، ٢٥٠ ملل لكل سنة من العيون، في محلول أو مرهم بنسبة ١٪. العيون، في محلول أو مرهم بنسبة ١٪.

٥- أخِيليا بَقْلَةُ العُطَاس، بَقْلَة العُطَاس، روماتيزم، فقد اللّعاب.
 سَعُوط
 مَا وَقَدُ اللّهِ عَمَالًا لِهُ العُطَاس، وَعَالًا اللّهِ عَمَالًا لِهِ اللّهُ عَمَالًا لِهِ اللّهُ عَمَالًا لِهُ اللّهُ عَمَالًا لَهُ عَمَالًا لِهُ اللّهُ عَمَالًا لَهُ اللّهُ عَمَالًا لَهُ عَمَالًا لَهُ عَمَالًا لَهُ عَمَالًا لِهُ عَمَالًا لِهُ عَمَالًا لَهُ عَمَالِهُ عَمَالًا لَهُ عَمَالِهُ عَمَالًا لَهُ عَمَالًا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَمَالًا لَهُ عَمَالِهُ عَلَيْهُ لِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّا عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

Sneezewort, Bastard pellitory (E)
Ptarmique, Achillée Sternutatoire,
Herbe à éternuer, Bouton d'argent,
Herbe Sarrazine, Lin Sauvage (F)
Betramgarbe, Niesgarbe (D)
Achillea ptarmica, Achillea macrocephala, Ptarmica vulgaris (S)

نَبات جذموري مُعمَّر، أرومته مَدّادة، من فَصِيلة المُركَّبات، يَعلو من ٣٠ إلى ٩٠ سم. ساقه فَرعاء. صُلبة، فروعُها مُنتَصِبة، كثيفة الكساء بأوراق لاطئة، مُتعاقبة، خَطِّية الشَّكل السِّنانيّ، غير مُنقَطة، مِنْشاريّة التَّسنين. رؤيساته الزَّهريّة عِنقِيَّة التَّجميع المُرتَخي. أزهاره بيضاء. ثماره أكنات. كل أقسام النَّبات

مُستحبَّة العطر الذَّكيِّ. نَبات واسع الانتشار الأوروبي حتى القُوقاز وسيبيريا. زُرع كنوع طِبِّيِّ وتَزيينيِّ منذ القرن السادس عَشَر.

المُركِّبات - زيت دُهنيّ. الجذور تحتوي على إينُولين.

الخصائص - مُكعِّبة، طاردة للرِّيح، مُنظِّمة للتَّغيُّط، مُهدِّئة ألم الأسنان، مُهدِّئة آلام الرُّوماتيزم، مُقويَّة، مُنشَطة، مُشَهِّية، مُطَهِّرة، مُبَوِّلة.

الاستعمال - الرِّيزوم، وأحيانًا الأزهار والسّوق المُورِقة. فَقْد الشَّهيّة، وَهن، إصابات بَوليّة، أسنان، مَعِدة، روماتيزم، فَقد اللُّعاب.

طريقة الاستعمال - نُقاعة مِلعقة صغيرة من الرِّيزوم المُجفَّف المُقطَّع في مقدار فنجان ماء غال، يُغطَّى ربع ساعة ويُصفِّى. يُمكِن لَوْك الرِّيزوم ومضغه كالعلكة بهدف إثارة اللُّعاب.

ملاحظة - كان الصِّينيُّون في الماضي يأخذون خمسين عُودًا مُجفَّفًا من فروع النَّبات ويَستعملونها في طقوس التَّنجيم والعَرافَة والكَهانَة التي كانت مُتَّبعة في الصين منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة. وقد جاء ذلك في كتاب التَّحوُّلات والتَّغييرات، الذي يُطلقون عليه اسم -Yi وكانت هذه الأخيليا قديمًا شائعة الاستعمال الطبيِّ الذي أصبح اليوم أقل بكثير مما كان عليه.

أخ ي ٦- أخِيْلِيا دُوْلابِيَّة (١)

Achillée herbe roue (F) Achillea Herba-rota (S)

نَبات بَرِّتِي، رِئْدِي، قَزِم، عَدُو الكلس Calcifuge من فَصِيلَة المُركَّبات يَعلو من ١٠ إلى ٢٠ سم. أوراقُه السُّفلي مُتطاوِلة، مُعنَّقة، العُليا لاطئة ومُفَرَّطة. النَّصل مُنقَّط بغدد عِطْرية. الرُّؤيسات مُسوَّقة، في أعذاق مُرتخِية؛ ٤ إلى ٧ لُسَيْنات بَيضاء اللَّون. مَهده جبال الأنب الغَربيّة. رائحته قوية جدًّا.

الخصائص - يَشتهر أنّه شافٍ للجُرح ويَدخل في ما يُسمّى Faltrank.

هُوْيُلِيا فَتِيَّة ، أخيليا أجِيراتُم (٢)
Sweet maudlin, Ageratum milfoil (E)
Achillée agérate, Achillée visqueuse,
Eupatoire de Mésué (F)
Balsamgarbe, Gewürzgarbe (D)
Achillea ageratum, Achillea viscosa
(S)

نَبات بَرِّيِّ من فَصِيلَة المُركَّبات يَعلو من ٢٥ إلى ٥٠ سم، قاعدته مُتَليَّفة. سامّة بَسيطة، مُنتصِبة، فَرعاء الرَّأس. أوراقه مُتطاوِلة جدًّا، بسيطة أو مُفصَّصة الأسفل؛ النَّصل مُسنَّن، مُنْفَرِج، مُنقَّط بالغدد. الرُّؤيسات صغيرة تَجتمع في

أعذاق مُتراصة. لُسَيْنات قصيرة صفراء اللَّون. مَنطِقة البحر المُتوسِّط.

الخصائص - كان يُستعمَل في الماضي كطارد للدّود ولكنّه أُهمِل اليوم تمامًا.

٨- أخِيْليا نانا(٣)

Achillée nain, Dwarf milfoil (F) Zwerggarbe (D)

Achillea nana (S)

نَبات مُعَمَّر من فَصيلَة المُركَّبات يَعلو من ٥ إلى ١٥ سم، قَزِم، عَدُوّ الكلس، مُوبر صُوفي، مُرمَدّ اللَّون، يَشتهر في جبال الألْب. أرومته مَدّادة. أوراقه السُّفلى مُعنَّقة، العُليا لاطئة، خَطِّبة مُتطاوِلة، رِيشيّة التَّشريح. قُلافة صُوفيّة ذات وُريقات مُطَرَّزة باللَّون البُنيّ. ذات وُريقات مُطَرَّزة باللَّون البُنيّ. أعذاق صغيرة بسيطة. لُسَيْنات مُبيَضَة اللَّون. مَهده جبال الألْب، حيث يَشتهر كنبات طبيّ.

(٤) أخِيليا صُوفِيَّة، أخِيليا نَانَا Génépi bâtard, Achillée laineuse (F) Achillea nana (S)

تَتَوزَّع أنواع الأخيليا إلى نَباتات كبيرة القَدِّ تَعلو حتى ١٥٠ سم، منها الأبيض والوَرديِّ والأصفر؛ وإلى نَباتات صغيرة القَدِّ تَعلو من ١٠ إلى ٥٠ سم، منها الأبيض والأصفر. الأخيليا الصُّوفيَّة من

⁽١) التَّسمية العربيَّة والفرنسيَّة للمؤلِّف.

 ⁽۲) التَّسميتان العربيَّتان والتَّسميتان الفرنسيَّتان الأولى والثانية والتَّسمية الإنكليزيَّة الثانية للمؤلف.

⁽٣) كلّ التَّسميات ما عدا اللّاتينيَّة للمؤلّف.

⁽٤) التَّسميتان للمؤلِّف.

أخ ي

الأنواع القَزِمة، وهو نَبات مُوبِر صُوفي المظهر، مُرمَد اللَّون، أرومته مَدّادة، يَعلو من ٥ إلى ١٥ سم. أوراقه السُّفلى مُعنَّقة، العُليا لاطئة، خَطِّية مُتطاوِلة، ريشيّة التَّفليق. قُلافته صوفيّة ذات وُريقات مُطرَّزة باللَّون البُنِّي. أغذاقه صغيرة، فَرديّة، لُسَيناتها مُبيضّة اللَّون. نَبات جَبليّ، عَدوّ الكلس.

المُركِّبات والأقسام - في النَّبتة المُزهِرة، زيت دُهني، جواهر مُرَّة.

الخصائص - مُشهِّية، مُسهِّلة للطَّمث، مُنشِّطة للمَعِدة، مُعَرِّقة، مُقَوِّية عامّة، مُنشِّطة للمَعِدة، مُعَرِّقة، مُقَوِّية عامّة، شافية للجرح من الدّاخل ومن الخارج، طاردة للحُمّى، نافعة في حالات «الحَرّ والبَرْد».

الاستعمال - فقدان الشَّهيَّة، وَهْن، ضَعْف الحيويَّة، نَهَك نَفسانيّ، طَمْث غير كاف، إصابات رِئويَّة مُتَسبِّبة عن البرد، إلتهاب المَعِدة، إلتهاب المعي.

طريقة الاستعمال - لزيادة الشّهيّة، فنجان قبل الوجبات من نقاعة ٣غ رؤوس مُزهِرة مُجفَّفة في فنجان ماء غال يغطّى ١٥ دقيقة؛ في الوَهْن، فنجان يومي من نقاعة ملعقة صغيرة نبات مزهر مجفّف في فنجان ماء غال؛ في شحّ الطّمث وآلامه، فنجانان في اليوم، من نقاعة و٢غ نبات في ليتر ماء غال يغطّى ١٠ دقائق، قبل الموعد المرتقب بأسبوع.

(١) أخِيليا مِنْجَلِيَّة ، أخِيليا دِمَشْق - ١٠ Falcate milfoil, Damascus milfoil (E) Achillée falquée, Achillée falciforme, Achillée de Damas (F) Damaszengarbe (D) Achillea falcata, Achillea damascena, Achillea sulphurea (S)

نَبات بَرِّى لُبنانيّ مُعَمَّر من فَصِيلَة المُركَّبات يَعلو من ١٥ إلى ٤٥ سم. سُوقه أسطوانيّة غير مُثَلَّمَة. أوراقُه مُبيَضَّة اللُّون، تَنحنى على شَكْل مِنْجَل، طول الأوراق الساقية ١,٥ إلى ٣ سم وعَرضها ١,١ إلى ١,١٥ سم، العُليا لا تَصل إلى الأعداق، ريشية التّشريح، سَكَماتُها مُتراكِبة، ثُلاثيّة الفُصوص المُستديرة الدَّقيقة الأسنان. الرّؤيسات من ٣ إلى ٤؛ عرض الأعذاق ١,٥ إلى ٤ سم. القُلافات بَيضيّة الشَّكْل أو نِصف دائريّة. القُنابات بَيضيّة مُثَلَّثة، مُزَوْرَقة، ليديّة. اللَّسَينات ٥ إلى ٧، فاتحة اللَّون الأصفر، طولها ١,٥ إلى ٢ مم. أزهار الأسطوانة من ٢٠ إلى ٣٠ زُهَيرة. الإزهرار من نَيسان إلى تموز في الجفاف والفّيافي.

الخصائص - مُضاد لوَسُواس المَرَض. الاستعمال - ذُكر عن هذا النوع أنّه يُستعمَل جدًّا في الهند، وعلى شكل صِبغة كُحوليّة ضِد وَسُواس المَرض ومُعالجة من كان سَوْداويّ الطَّبْع.

⁽١) كلِّ التَّسميات ما عدا اللَّاتينيَّة للمؤلِّف.

Sommeradonisblume (D)

Adonis æstivalis (S)

الأدنيتينُول هو دواء أساسه الهَلَنيان، أي أَسْتِيرِ اليَصْفُورِ المُزدوجِ النَّخلِيْكِ: Ester dipalmitique de la æanthophylle ou lutéine وهو مَسْحوق أحمر اللَّون يُستخرَج من أزهار مُختلف أنواع المُخْمَلِيّة Tagètes، وهي نَباتات تَزيينيّة من فَصِيلَة المُركّبات مَهدها المكسيك وتَنتشر في قُرى لُبنان وحدائقه.

الخصائص - يُخصَّص هذا الدّواء العاديّة أو غير الكافية وتَحسين ضَعْفها: سائقو السَّيَّارات، عُمَّال لَيليُّون، عُمَّال إلى خُزيران في المراعي. مَناجم، إلخ.

طريقة الاستعمال - خالِ من السُّمِّيَّة، يُعطى على شكل مُلَبَّسات مُعَيَّرة من ٥ ملغ الرَّبيعيّ هو الّذي يُعتبَر مَخْزَنيًّا. من الهَلَنيان Héléniène ، يُؤخَذ منها من ٢ إلى ٤ في اليوم، مُلَبَّسة أو اثنتين في ١٣- أدُونِيس الهيرينيه مُنتصَف كلّ وجبة، لمدَّة عشرة أيّام، نَتُوقُّف بَعدها لفترة عشرة أيَّام، ونُعاود العلاج لمدة عشرة أيام أخرى وبالمقادير ذاتها.

> ١٢ - أدُونِيس صَيْفِي، عَيْنُ الحَجَل، عَيْنُ التُّدْرُج

> Summer adonis, Summer pheasant's eye, Talladonis (E) Adonis d'été, Adonide estivale, Œil de

نبات حولي من فَصِيلَةِ الحَوْذانِيَّات، أمْرَط أو ذات أوبار مُتفرِّقة على بعض الأوراق وعلى الكأسيّات. ساقُه مُنتصِبة تَعْلُو مَن ١٥ إلى ٤٥ سم. أوراقه السُّفلي مُعنَّقة، مُقَطَّعة إلى سُيور حادّة مُتفاوتة الطّول. قُطْر الزَّهرة ١٥٥ إلى ٣ سم. الكأسيّات ٥، لاصقة بالتّاج، مُخضرّة أو مُحمرة اللُّون، مَرْطاء أو قليلة الوَبْر لمحاربة إضطرابات حِدَّة النَّظَر من الخارج. البَتَلات ٦ إلى ٨، قِرْمِزِيّة واضطرابات تَكَيُّف أو تَكييف العَيْن، اللَّون الأحمر، مُلطَّخة القاعدة عادة وعلى الأخصّ لتحسين الرّؤية اللَّيليّة غير بالأرجوانيّ الأسود. الأسدية بَيضانيّة، سوداء اللُّون البِّنَفسجيّ. يُزهر من آذار

الخصائص - ذُكِرَ أنَّ عَمَله هو مُتقارب من عَمل الدِّيجيتال، عِلمًا بأنَّ الأدونيس

Adonis des Pyrénées (F) Adonis Pyrenaica (S)

نَبات حَولتي من فَصِيلَة الحَوْذانِيَّات يَعلو نحو ٣٠ سم، بَتَلاته صفراء اللُّون، من ٨ إلى ١٠ تَتَفتَّح على صُخور المراعي الألبية الجَنوبيّة وفي جبال البيرينيه في تموز.

١٤ إِذْ خِر، طِيْب العَرَب، تِبْن مَكّة، تِبْن الجَمَل
 الجَمَل

Camel's hay, Scenanth (E)
Schænanthe, Jonc odorant, Foin de
chameau, Vétiver (F)
Cameleshov, Citronengras (D)

Andropogon Schænanthus (S)

مادَّة تصل إلى أوروبا من العَربيَّة السَّعوديّة؛ تكثر جدًّا في براري الهند وماليزيا. وهي أنواع من القَصَب القصير، الحُزْميّ الانتشاب. تنسب إلى النوع .Andropogon schænanthus L فصيلة النَّجيليّات. سوقه وأوراقه تعطي دهنا عِطريًا يُستعمل استعمال دهن .A دهنا عِطريًا يُستعمل استعمال دهن .A المناطق ضِد القُرحات والرّوماتيزمات. تدخل في تركيب الترياق.

الخصائص - مثيرة، مهيِّجة، عَصبيّة، لم تعد مستعملة.

هناك زيوت دهنية مختلفة تصنع في سيلان وسنغافورة بكميات كبيرة وتُنسب إلى أنواع مختلفة من جنس Andropogon (أي Cymbopogon). وهيي زيروت تستعمل في تزوير الزيوت الدهنية عامة، وزيت الورد الدهني خاصة، وتستعمل كذلك كعطور أساس. تحتوي على ٥٥ إلى ٧٥٪ من الجيرانيول ومن السيترونيلال.

إن الزيت الدهني المسمّى دهن الجيرانيوم الهندي هو زيت باهت اللون

الأصفر، رائحته تذكّر برائحة الورد؛ كثافته تختلف من ١,٨٩٨، إلى ١,٨٩٦، يعطي محلولًا صافيًا مع ٣ أجزاء وأكثر من كحول ٧٠ درجة. ذوَابيّته كاملة في ٤ أحجام من محلول سالسيلات (بالتساوي)، مضافًا إليها حجم واحد من الماء. يحتوي هذا الدهن على جيرانيول، منه ١,٩٤٨٪ بحالة حُرّة، وعلى سيترونيلُول وعلى بقايا مَتِيْل وَعلى بقايا مَتِيْل مَبْنَانُون.

دهن حشيشة اللَّيمون الذي ينتج من A. citratus D.C. (شائعة الـزراعة التَّزيينيّة في لبنان) له رائحة اللَّيمون البارزة جدًّا، لونه أصفر أو محمر اللون البُنْتي، كثافته ٩٠٨، إلى ٩٠٩، وهو مؤلِّف بنوع خاص من سيترال (حتى مؤلِّف بنوع خاص من سيترال (حتى أحجام من سالسيلات صودي مضافًا إليها نصف حجم ماء، فإنه يذوب بمعظمه نصف حجم ماء، فإنه يذوب بمعظمه (٩١٪).

(۱) أَرْطَمَاسِيَا سَوْدَاء، أَرْطَمَاسِيَا أَنْثَى (۱۰ وَهُمَاسِيَا أَنْثَى (۲۰ Génépi noir, Génépi femelle (F) Artemisia Spicata Jacq. (S)

عِدّة أنواع تُدعى Génépi، تَنبت على صخور الجبال العالية حتى ٣٤٠٠ مترًا. خصائصها الطبّيّة ذاتها. وهي أنواع معشوشبة مُعمَّرة من المُركَّبات، تَنمو في باقات صغيرة تعلو من ٤ إلى ١٥ سم.

أرط

⁽١) التَّسميتان للمؤلِّف.

سوقها مُزهِرة فَرديّة؛ أوراقها سَيريّة مُرمَدّة دقائق، قبل الموعد المرتقب بأسبوع.

١٦ - أرْقِطْيُون مُزَغْبَر، أرْقِطْيُون صَغِير مُزَغْبَر (١)
 مُزَغْبَر (١)

Downy bachelor's buttons, Pubescent bachelor's buttons (E)

Bardane pubérulente (F)

Weicherklette, Weicherkleinklette (D) Arctium minus pubescens, Lappa ninor pubescens (S)

المُركِّبات والأقسام - في النَّبتة المُزهِرة والجذور، زيت دُهنيّ، جواهر مُرّة.

اللُّون الأبيض، حَريريّة المظهر، عديدة

نحو القاعدة ومُعنَّقة؛ أزهارها أنبوبيّة

صفراء في رؤيسات كُرويّة صغيرة. رائحتها رائحة الأبنث القويّة؛ طعمها

مُرّ. الأرطماسيا السوداء تنمو في باقات

مُنعزلة ذات سُنْبُلة زَهْريّة أو سنبلتين

طويلتين، مُقَوَّستين، وَحيدتي الاتِّجاه،

رؤيساتها مُسودّة اللّون، صغيرة، لاطئة،

أوراقها شبه بسبطة.

الخصائص - مُشهِّية، مُسهِّلة للطَّمْث، مُنشِّطة لِلمَعِدَة، مُعرِّقة، مُقوِّية عامة، مُنشِّطة لِلمَعِدة، مُعرِّقة، مُقوِّية عامة، شافية للجرح من الدّاخل ومن الخارج، طاردة للحمّى، نافعة في حالات «الحَرّ والبَرْد».

الاستعمال - فقدان الشهية، وَهُن، ضَعْف الحيوية، نَهَك نَفسانيّ، طَمْث غير كاف، إصابات رِئويّة مُتَسبِّبة عن البرد، إلتهاب المعنى.

طريقة الاستعمال - لزيادة الشهية، فنجان قبل الوجبات من نقاعة ٣غ رؤوس مزهرة مجفّفة في فنجان ماء غال يغطّى ١٥ دقيقة؛ في الوهن، فنجان يومي من نقاعة ملعقة صغيرة نبات مزهر مجفّف في فنجان ماء غال؛ في شحّ الطمث وآلامه، فنجانان في اليوم، من نقاعة و٢٥غ نبات في ليتر ماء غال يغطّى ١٠

نبات لبناني نادر نسبيًّا معمَّر غير شَوك من فصيلة المُركّبات. ساقه متفرّعة تعلو من ٣٠ إلى ٨٠ سم وأكثر. أوراقه معنقة، ينضاوية قلبة القاعدة، طحلاء أو مرطاء الصفحة السفلي، القاعدية منها عريضة تطول نحو ۳۰ سم وأكثر وتعرض نحو ٢٠ سم وأكثر. رؤيساته الزهرية في عناقيد صغيرة، عرضها من ١٥ إلى ٣٥ ملم، مرطاء أو خفيفة الكساء العَنْكَبُوتي. قنابات القلافة ضيّقة جدًّا عرضها أقلّ من نصف ملم. رؤيساته الزهرية أقوى من رؤيسات الأرقطيون الصغير، يبلغ قطرها ٢٥ إلى ٣٥ ملم. زُهَيْراتها تصل إلى مستوى القنابات القُلافية كحدّ أقصى. مآبرها زائدية الرأس والقاعدة. الأكنات متطاولة، خشنة ومتدرِّنة. القنزعة من الحرائر المُشَبَّكة العابلة جدًّا. إزهراره من حزيران إلى تشرين الأول. يرغب الأماكن الرطبة.

⁽١) كلّ التَّسميات ما عدا اللّاتينيَّة للمؤلّف.

المُركِّبات - الجذر يفقد فعاليته بكاملها تقريبًا بالتجفيف، وهو يحتوى على إِيْنُولِيْن (٢٧ إلى ٤٥ بالمئة)، زيت دهني حتى ٢,٠ بالمئة، لُعاب، مواد عَفْصيّة، راتنج، كربونات البوتاسيوم، كربونات الكلسيوم، نيترات البوتاسيوم، مغنيزيا، هيتروسيد يدعى لَبَيْنِ أَو لَبُّوسِيْد، وعلى جوهر مُردٍ (أنْتي بيوتيك) متبلّر يشبه الهَنيسِلِين مبيد للبكتيريا والجراثيم وفعّال في القضاء على المُكوَّرة العُنْقُوديَّة. في البذور يوجد هيتروسيد يُدعى أرْقِطيين أو أرْقِطْيُوسيد تركيبه Arctiine C₂₇H₃₄O₁₁. كل أقسام الأرقطيون تحتوى على خميرة مُؤَكْسِدة فَعَالة جدًّا وهذا ما يؤكّد الفائدة الكبرى من تَثْبِيت هذا النبات ومستحضراته الطبية. في الجذور أيضًا يوجد أرْقطُوز تركيب Arctose

الخصائص - الأرقطيون قد يَحلّ غالبًا محل الفشاغ؛ وهو مُنقّ؛ مُعرِّق، مُبَوِّل يزيل الحامض البَوْليّ، مُفرِز للصّفراء، مسهل المعدة، مضاد للسِّفْلِس، مضاد للسُّكِّري، مضاد للسمّ، دواء موضعي. الجذر مبيد للجراثيم والبكتيريا، مبيد للمُكوَّرة العُنقُوديَّة، والمُكوَّرة العُنقُوديَّة المُذهَبّة، والمُكوَّرة العِقْدِيَّة، والمُكوَّرة العُنقُوديَّة الرِّنُويَّة، والمُكوَّرة العِقْدِيَّة الرُّنُويَّة. مضاد فعال للدمامل. الأوراق الرِّنُويَّة من الجذر، فهي مُهدِّئة بارزة أشد فعالية من الجذر، فهي مُهدِّئة بارزة جدًّا للحَكَّة القُوبائيَّة. الأرقطيون المُعالَج بواسطة الأثير كان يعطى دواءً أو أساسًا

 $(C_6H_{10}O_5)_n$

لدواء سِرِّي يستعمل ضد الصَّلَع والجَلح والمَرط وتساقط الشعر. البذور زَيْتيَّة، تشتهر على أنها مُبوِّلة أكثر من الجذور، وهي تستعمل مُسْتَحْلَبَة. يشتهر جذر الأرقطيون أنه شفى الملك هنري الثالث من السَّفْلِس.

الاستعمال الداخلي - داء الدمامل، داء الجَمْرَة، خراجات الحنجرة والأسنان، إنتان المُكَوَّرات العُنْقُوديَّة، الأمراض الجلدية النّازَّة والمُتَقَيِّحة، العُدّ أي حَبّ الشباب، قُوبات، أكزيمات، قروح، قرَع، حَصْبَة، نِقْرِس (خاصة في قرَع، حَصْبَة، نِقْرِس (خاصة في أرْضيّات تناسليّة جِنسيّة)، روماتيزمات، سِفْلِس، سُكّري، رُمال بَوْليّ، لَدْغ الأفاعي. المَرَط، تساقط الشعر. الأوراق المَغليّة لها فعالية بارزة في تهدئة الحكَّة القُوبائيّة الشديدة.

الاستعمال الخارجي - سَيَلان الوجه الزَّهَميّ، الأكزيمات، القرحات الواهِنة الغُدِّيّة، القروح الملوَّثة المُتَقَيِّحة.

طريقة الاستعمال الداخلي - يستعمل غضًا غير مُجَفّف. نقيع ٤٠ غرامًا من الجذور في ليتر ماء يُغلى ١٠ دَقائق ويؤخذ منه في الحَصْبة: ملعقة صغيرة كل ٥ دقائق. يكتمل الطَّفْح تمامًا خلال ساعتين. يتمّ الشفاء خلال ٣ أيام (تَوَقِّي مجاري الهواء)؛ في الرُّمال والإصابات الأخرى: ٢ إلى ٣ فناجين في اليوم؛ في النَّمْرس: نقيع ٢٠ غرام جذور في ليتر ماء يُغلى ٥ دقائق ويؤخذ مِقدار ليترين خلال

ا رق

أرق

النهار بين الوجبات. مسحوق الجذور يؤخذ منه ٢ إلى ٤ غرامات في سائل ما. البذور مُبوِّلة في نُقاعة ٤ إلى ٦ غرامات في ماء غالٍ يُغطّى ١٠ دقائق. المستخلص المائع في بيلولات: مستخلص أرقطيون المستخلص المائع المائي، كما يمكن مائع مُثَبَّت ٠,٢٠ غرام، مسحوق السُّوس كمية تكفى لبيلولة واحدة؛ من ٥ إلى ١٠ بيلولات في اليوم. صبغة أو مستخلص جذر الأرقطيون المُثبَّتَة، وهو مستحضر يُنصح به جدًّا، ١٠ إلى ٣٠ نقطة، ٢ إلى ٣ مرات في اليوم. في اليابان تُغلى الجذور في الماء والملح وتؤكل كخضار على غرار السَّلْسَفِيل.

> طريقة الاستعمال الخارجي - يستعمل غضًا غير مُجَفَّف. الأوراق الغَضّة المَمْعُوسة في لصوقات على لَدْغ الأفاعي (لُوجَانْدر، بلينو، برِيسَّمُورِيه)؛ الأوراق توضع على الصدر في الإصابات الرِّئويّة المزمنة، الزُّكامات السّابِغة، كما توضع على كافة الأوجاع كالروماتيزمات والنقْرس وسواها. الأوراق المسلوقة في لصوقات على النقرس. الأوراق الممروثة في زيت الزيتون قد تُسرِّع التئام قرحات الساق (محاولة معالجة السرطانات المتقرّحة). الجذور الغَضّة إذا أمكن، ٣ كمشات في ليتر ماء يُغلى ٢٠ دقيقة وتُغسل به مرارًا الإصابات الجلدية كالسّيلان الزّهميّ في الوجه، والأكزيمات الناشفة، والحصف، وحَبّ الشباب. لُوسيون للرأس وتمسيد الفروة ضدّ تساقط ﴿١) التَّسمية للمؤلُّف.

الشعر. كحولتور الأوراق الغُضّة يوضع على بعض الإصابات الفَمِّيَّة البَلْعُومِيَّة. فعالية ثابتة ومؤكَّدة في معالجة الدَّمامل، بمقدار ٢ إلى ٣ غرامات في اليوم من أيضًا أخذ ٠,٦٠ إلى ١,٨٠ غرام من مستخلص الأرقطيون المُثبَّت. إن اشتراك الأرقطيون مع القَصْدِير للهدف عينه، كان يُسْتَغَلُّ بأسماء مختلفة: كاسِّيتُول، كُولُّوبياز القَصْدير، إلخ.

١٧- أرُورُوت البرازيل^(١) Arrow-root du Brésil (F)

يُستخرج دقيق المَنيُوك أو المَنيْهُوت، والذي يُسمّى أيضًا مَنْديوكا، وأروروت بَاهِيا، البَرازيل، والرِّيو، أو الپّارَا، من الجذور المُتدرِّنة من جنس مَنيْهُوت؛ منها المَنيهوت المُرّ Manihot utilissima M. dulcis = والمنيهوت الحُلو M. aipi وهي نَباتات من فَصيلة الفَرْبِيُونيّات. ويَحتوي النَّوع الأوَّل على نِسبة بَارزة من حَمْض السّيانيدريك. ولكنّ هذا الجَوهر يَختفي بواسطة التَّخمير.

طريقة التحضير - تُبشر الدرنات على لُوحة مُزركَشة برؤوس صغيرة حادّة، ومن ثُمّ يُترك اللُّبّ لكي يَتَخمَّر طوال ٢٤ ساعة. يُوضع بعد ذلك في أكياس من الشُّعر عريضة الثَّقوب، ويُستخرَج منها

٦ بالمئة من هذا الغش.

يُخلَط جزء واحد من الأروروت المُراد فحصه مع ثلاثة أجزاء من سائل خاص للفَحص التَّجريبيّ، مُؤلَّف من جزأي حامض كلورهيدريكي بثقل نَوعيّ المُقطَّر؛ ومن جزء واحد من الماء المُقطَّر؛ فإذا كان الأروروت نقيًا، لا يطرأ عليه أيّ تَلَف أو إفساد؛ أمّا خِلافًا لذلك، فإن دقيق البطاطا، والنَّشاء، يَتَماسك على شكل مُجَمَّدة شَفّافة تُصبح مائِعة فيما بعد؛ يَترسَّب الأروروت بعد راحة بضعة ساعات، ويُعاد التِقاطُه وجَمعُه على ورق التَّصفية، وغسله، وتَجفيفه، ووزنه. أمّا المواد المَعدِنيّة فيمكن كَشفها بواسطة الحَرْق.

(اطلب دراسة مَنِيْهُوت في المعجم السادس ص ٢٣١ رقم ٢٧٩).

ارْيَل أَحْمَر، عِرْق إنجبار Sea lavender, Wild marsh beet (E)
Statice, Béhen astringent, Béhen rouge, Katran, Lavande triste, Lavande de mer, Romarin des marais, saladelle, statice maritime (F)
Echter widerstoss (D)
Statice limonium (S)

نَبات مُعمَّر من فصيلة الرَّصاصِيَّات ينبت على الشَّواطئ البَحريّة. أرومته ليفيّة القاعدة، مُخضوضرة. أوراقه كلُّها قِرصيّة الانتشاب الكثيف، كاملة، خطيّة إلى سِنانيّة أزهاره زرقاء اللَّون في سنابل

بالعَصْر الدَّقيق الذي يُطلَق عليه بعد غَسلِه وتَجفيفه إسم «نَشاء المَنبِبُوك» .moussache أمّا ما تبَقّى من الكتلة فيُجفّف ويُسحق، ومن ثم يُفرش على لوحات حديديَّة مُسخَّنة. عند ذلك يَتكتَّل على على شكل حُشَيْرات صُلْبَة جدًّا تُشكِّل ما يُسمّى تَبْيُوكا Tapioca.

المواصفات - إن حبوب دقيق المنيهوت، أي نشاء المنيهوك، تبدو عمومًا على شكل أرْصُوصَة، أي على شكل جَرَس مُزوَّد بتَوْجيهات بلوريّة؛ وتكون السُّرَّة في العادة بارزة جدًّا. وتكشف التبيوكا حُبوبًا مُتماثلة مُتشابهة وتكون مُشوَّهة الشَّكل نَوعًا ما بسبب التَّسخين وتكون دائمًا تقريبًا مُتكتِّلة.

إن أفضل طريقة لتفريق مُختلف أنواع الأروروت وتمييزها عن بعضها هي الفَحص المِجْهري، حيث يمكن بهذه الطَّريقة إيّاها أن نكشِف عن إمكان إضافة نشاءات أو دقيق البطاطا.

ونُورد بالتّالي الطُّرق التَّجريبيَّة التّالية: إذا دقَّقْنا الأروروت وهَرَسْناه في الهَاوَن، مع خَلطِه بكمِّية مُساوية من حامض الكلورهيدريكي، وفي حال وجود دقيق البطاطا، يَتكوَّن في الهاون لعاب سميك لدرجة تسمح معها بِرَفْع الهَاون بواسطة مِدقَّتِه المَغموسة في اللهاون بواسطة مِدقَّتِه المَغموسة في اللهاب المذكور؛ وتَفوح، إضافة إلى اللَّعاب المذكور؛ وتَفوح، إضافة إلى ذلك، رائحة الحامض النَّمْليك. إن هذه الطَّريقة تَسمح بالتَّعرُّف على حوالى ٤ إلى الطَّريقة تَسمح بالتَّعرُّف على حوالى ٤ إلى

أزى

الفصوص. ٥ بتلات حُرّة تقريبًا؛ ٥ أسدية؛ ٥ أقلام. الثَّمرة جافّة وحيدة الشّماليّة وجُزُر الأنْتِيل. الحُدْة.

> المُركّبات – قُدّر في جذور هذا النّبات ١٧ بالمئة من العفص.

> > الخصائص - قابض.

الاستعمال - أعيد تسجيله في الفرماكوبيا الفرنسية عام ١٩٧٤.

ملاحظة - في كاليدونيا الجديدة عُشبة تنبت على الشُّواطئ الكلسيّة الصَّخريّة من فصيلة الرَّصاصِيّات هي: أَرْيَل أَسْترالي (١) Static australis Spreng، جـنذورهـا عافِصَة وقابضة.

١٩ - أزيمينة مُفَصَّصة، بَابَاوْ(٢)

Papaw (E)

Asiminier, Anone trilobée (F)

Pappaw baum (D)

Asiminia triloba, Anona triloba (S)

الأزيمينة جنس أشجار أو شُجَيرات من فَصِيلة القشطيّات، أوراقُها مُتعاقبة، واسعة، غِشائية، شَبَكية العُروق، بسيطة، مُعبلة. أزهارُها إبطية الإرتكاز، فَرديّة أو قَليلة العَدد، قصيرة السُّويْقات، ٣ كأسِيّات مُعْبلة، ٦ بَتَلات، الخارجيّة

كثيفة هاميّة الارتكاز. شمراخ عار، مُنبسِطة وأكبر من الدّاخِليّة المُنتصِبة. بسيط، له غمد غشائى تحت الرّأس الأسدية عديدة، قصيرة الخُيوط. الثّمار الزَّهريّ. الكأس أنبوبيّة نصلها خُماسيّ عِنبيّة الشَّكل، لَحميّة، كثيرة البُزُور الكبيرة. حَوالى ١١ نوعًا في أمريكا

أمّا الياياو فَشَجرة صغيرة من جَنوب شرق الولايات المتّحدة الأمريكية تعلو من ١٠ إلى ١٢ مترًا، ولا تَبلغ في أوروبا أكثر من ٢ إلى ٣ أمتار. فُروعُها الفَتيَّة مَكسوّة بزغب أشقر، ومن ثم تُصبح مَرْطاء ويُنِّته اللُّونِ. أوراقُها مُعْبِلة، بَيضويّة مُتطاولة، قصيرة الرّأس المُستدِقّ ومُعَنَّقة، طولُها ١٥ إلى ٢٠ سم، مَرطاء. الزُّهرة أرجُوانيّة اللُّون القاتم الكامد. إزهرارُها على الخشب الفَتى. الثَّمرة مَأْكُولَة، طُولُها ٥ إلى ٨ سم، مُخضَرَّة اللُّون الأصفر ومن ثم بنُّيَّة، تَفوح منها رائحة مُستحبّة. البزرة من ٢ إلى ٣ سم.

الخصائص - يُستخرَج من عَصير ثمارها بعد تخميرها شرابٌ لذيذ الطُّعم والنَّكهة قلمل المادّة الكُحوليّة.

٢٠- أسْتر أمِيْل نَقْرُوني، أثير أمِيْل نَتْرُوني، نيتريت الأمِيْل

Ester amylnitreux, Ether amylnitreux, Ether amylazoteux, Nitrite d'amyle **(F)**

إكتشفه بالأرد.

المواصفات - نيتريت الأميل هو الأثير النَترونيّ في الكحول الإيزوأميليك. وهو

⁽١) السَّمة للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسمية العربيَّة الأولى لإدوار غالب.

سائل باهت اللّون الأصفر، طعمه لاذع ورائحته كرائحة النّمار. كثافته ١٩٨٠. يغلي بين ٩٦ و٩٩° سغ. لا يذوب بالماء ولكنّه مَزُوج بالكحول، والأثير، والكلوروفورم. عندما يكون حديث النّعضير فهو مُتَعادِل بشكل محسوس مع دُوّار المَحلول؛ ولكن بعد مضيّ فترة من الزّمن يَفسد بسبب تَشبّعه بالمواد النّترونيّة، والنّتريكيّة، وبالحامض النّاردينيّ، إلخ؛ فيُصبح حامضًا وغير مستحت الرّائحة.

النّتاج النّجاريّ ليس نَقيًّا: فهو يَحتوي دائمًا، وبنسب مختلفة، على أستيرات الكحولات الأميليّة المُختلِفة (الفَعّالة والهامِدة) التي تتألَّف منها كحول التَّخمّر الذي يُستخدم لفصله: يحتوي بالإضافة إلى ذلك على بقايا من تلك الكحولات غير المؤسّتَرة والمواد المُفْسِدَة المشار إليها أعلاه.

خطِر Dangereux خطِر Tableau C

الحفظ - في قارورات مسدودة بأحكام (أو أفضل من ذلك في أمبولات مختومة)، بمعزل عن الرّطوبة، وعن الضّوء، وعن الحرارة.

الخصائص والاستعمال - في استنشاقات (عِدّة نقاط)، يُحدِث نيتريت الأميل بسرعة احتقانًا حادًا في القسم العُلويّ من الجسم وخاصة على الوجه (احمرار حاد وشبه فَوْري في الوجه مع

إحساس بالحرارة والدّوخة، وإسراع النبض الواضح الجَلِيّ بالخفقات الصُدْغِيّة). فهو بالواقع مُوسِّع عُرُوقيّ نشيط وبالتّالي مُنقِص للتوتّر الشُريانيّ. وهو يقوم، بالإضافة إلى ذلك، بعمل مثير ومُكَزِّز على نسيج القلب العَضَليّ وعلى المراكز العَصبيّة ال إِنْتراقَلْبيّة (۱) أو الضُمْقَلْبِيّة (۱) العَصبيّة ال إِنْتراقَلْبيّة (۱) أو بحرعات مُرتفِعة، أن يُحدِث الزُّلَة، بجرعات مُرتفِعة، أن يُحدِث الزُّلّة، وفَقْد الوَعْي، والتَّخَلُّجات، وال ابَيْلة وفَقْد الوَعْي، والتَّخَلُّجات، وال ابَيْلة المحيث المُوعي والتَّخَلُجات، وال ابَيْلة معمور تأكّسَد فيه الحديد، فصار من يخمور تأكّسَد فيه الحديد، فصار من حال إلى حال آخر، مما يجعله غير صالح لنقل الأوكسجين).

طريقة الاستعمال - يُستعمل نيتريت الأمِيْل على الأكثر ضدّ نَوْبات ذَبحة الصَّدر، في استنشاقات، وبجرعات من إلى ١٠ نقاط (على منديل أو كمادة)؛ ولكن الإدمان يوجب بعد فترة وجيزة أخذ جرعات من ١٥ إلى ٢٠ وحتى إلى ٥٠ نقطة. إن نَوبات الرّبو الحادّة، والشقيقة المُبْهَمة، والإغماءات، وتخصيصًا الإغماء الكلوروفورميّ، قد تُقَاضى كلها بنتريت الأمِيْل.

نُصِح به ضِد حالات نَفْث الدَّم، وبجرعات مُرتفِعة، من ٥٠ إلى ١٠٠ نقطة مثلًا في اليوم، في حال التهاب الرُّئة.

ا س ت

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

اً س ت

ومن الملائم، لإجراء تلك الاستنشاقات، أن نَحوز على الدّواء في أمْبُولات تحتوي حوالى الغرام الواحد، نكسر أحد طرفيها لكي نعد النّقاط المطلوبة.

يمكن كذلك وصف إعطاء أمْبُولات، تحتوي الواحدة من ١٠ إلى ١٥ نقطة، مصنوعة من زجاج رقيق ومَكسُوّة بنسيج من القماش ينزعه المريض بأصابعه لحظة نَوْبة ذَبحة الصَّدر.

إن نيتريت الأمِيْل هو مُضادّ للاستطباب عند المُصابين بتَصَلَّب الشَّرايين وفي كافة الحالات الاحتقانيّة.

۱۲- أستر بَنْزيل سالِسيليك، سالِسيلات Ester benzylsalicylique, البَنْزيل Salicylate de benzyle (F)

 $OH^{(1)}-C_6H_4-CO_2^{(2)}-CH_2-C_6H_4 = 228,23.$

المواصفات - يحتوي على ١٠,٥ بالمئة حامض سالسيليك. وهو سائل عديم اللَّون، زَيتيّ القِوام، أثقل من الماء، رائحته وطعمه خفيفان وغير كريهان. يَتجمَّد في الحرارات الدُّنيا، حوالى ١٠ إلى ١٢° سغ، ويذوب (ينصهر) عند ٢٤° سغ؛ وهو يُبْدي ظاهرة المُيُوعَة تحت دَرَجة الدُّوبان surfusion إلى درجة مُرتفِعة جدًّا. وهو لا يذوب في الماء، يذوب على البارد في ١٠ أجزاء كحول، يذوب جدًّا في الكحول الغالى.

الخصائص والاستعمال - دواء مُضادّ للرّوماتيزم ومسكّن بديل لسالسيلات المنبل ولكنّه خالٍ من رائحتها الكريهة. وهو أقل تبخّرًا من هذه الأخيرة، وعمله يدوم أكثر. استعماله في مَرُوخات، وبلاسم، ومراهم بنسب من ٥-١٠ أو بلاسم، في آلام عرق النسا وفي التهابات الأعصاب، في حِقن في الموضع المؤلم بالاشتراك مع الكافور: أمبولات الـ Camphrosaly.

عَشْرِبُ مَشْطِراغَالُس الْعَقْرَبِ، حَشِيشَة Scorpion astragal (E) عَقْرَبِ (۱) Astragale mareotique, Herbe à scorpion (F) Skorpion astragel (D) Astragalus mareotieus (S)

الأسطراغالوس جنس نباتات حَوليّة أو مُعمَّرة أو ليفيّة القاعِدة من فَصِيلة القرييّات. أوراقُها فَردِيّة التَّرتيب الرِّيشيّ وخالِية من الشَّوك، أو ثُنائيَّة التَّرتيب الرِّيشيّ وتَنتهي برأس السُّويق الشَّائك. أزهارُها إبطيّة الارتكاز، مُزَنَّدة أو لاطِئة، في ضُمّات مُتراصّة. في لُبنان أكثر من ١٥٠ نوعًا من الأسطراغالس. أشطراغالس العَقْرَب يَحمل أوراقًا ريشيّة التَّرتيب، مُؤلَّفة من وُريقات ضيِّقة ريشيّة التَّرتيب، مُؤلَّفة من وُريقات ضيِّقة اللَّون الأزرق. قَرنُها يَتَقوَّس إلى نِصف اللَّون الأزرق. قَرنُها يَتَقوَّس إلى نِصف

⁽١) كل التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسمية العربيَّة الغانية والتَّسمية اللاتينيَّة.

دائرة، وهو منتظم السّماكة، أَمْرَط تقريبًا وقصير المِنْقار. حَشيشةُ عَقْرَب هو الاسم التُّونسيّ.

الخصائص - مضاد للسع العَقْرَب. الاستعمال - حَشيشة العَقْرب يَجب أن تُستعمَل بَعد لَسْع العَقْرب فورًا. تُسْحَقُ الأوراق المُجفَّفة سَحْقًا جيِّدًا وتُوضع على مكان اللَّسْعَة.

Astragal (E) أَسْطرَاغَالُوس نَجْمِي – ٢٣ Astragale à gousses velues (F) Astragal (D) Astragalus eæscapus (S)

الأسطراغالوس جنس نَباتات حَوليّة أو مُعَمَّرة أو جُنيبات صغيرة من فصيلة القَرْنِيّات الفَراشِيّة. أوراقُها ريشيّة مُفْرَدة وسَرْحَة، أو ريشيّة مُزدوِجة تَنتهي برأس العُنُق الشّائكة. أزهارُها إِبْطيّة، مُزنَّدة أو لاطِئة، حُزميّة التَّجميع المرصوص. الثَّمرة قَرْن لاطئ أو محمول على شويْقة، مُختلِف الأشكال، يكون دَرْزُه العُلويّ مُزَوْرَقًا غالبًا، ودَرْزُه السُّفليّ مُستطيلًا بثَنْيَةٍ تَجعلُ القرنَ مُزدوج الخُدُور تمامًا أو جزئيًا.

الأسطراغالوس النَّجميّ له جَذْرٌ بَسيط يَبلغ حَجم الإصبع، يُغطّيه لحاءٌ قاتم اللَّون البُنِّي، ومَدِيثُوليوم méditullium ليفيّ، مُصفر اللَّون، عَديم الرّائحة، عَقُول الطَّعم القَابِض المُرّ. وهو نَوعٌ مَبذول في مُختلف المناطق الأوروبيّة، وعلى الأخص في جبال الألْب.

الخصائص - مُضادّة للسَّفلِس، مُضادّة أ سلَّوماتيزم، مُنشَّطة، مُعَرَّقة.

الاستعمال - سفلس، روماتيزم، رهن.

طريقة الاستعمال - نصّح به كازان عام ١٧٨٦ لمعالجة السّفلس والرُّوماتيزم، وهو عِلاج أصبح اليوم طيَّ النِّسيان. إلا أنّه، وحسب جُوردان، قد يكون هذا النّوع مُنشِّطًا ومُعرِّقًا بشكل واضح جَلِيّ. وكان قد صَدَر في دستور ١٨١٨ للأدوية إلى جانب أسطراغالوس إكريت (١٨ A. Creticus) وأسطراغالوس كُثَيْراء A. tragacantha وهما نوعان مُنتجان لصَمْغ الكُثيراء.

مُلاحظة - عام ١٩٧٥، أعيد إدراج النَّوعين التّاليين، في دستور الأدوية الفَرنسيّ، وهما: .A. Creticus Lam. لأنه يُنتجُ صَمْغَ الكُثيراء، A. Cecapus لأنه يُنتجُ صَمْغَ الكُثيراء، وتَنتشِر عَشَراتُ لجذره الطبّيّ. لهذا، وتَنتشِر عَشَراتُ الأنواع الطّوعيّة في لبنان من الشَّواطئ البحريّة وحتى أعالي الجبال.

۲۱- أَسْقُولُوسِيد، بِيْكُولُورِيْن (۲۶ Esculoside, Bicolorine, Eccalochrome (F)

 $C_{15}H_{16}O_9$ 1,5 $H_2O=267,3$. غلوكوسيد يُستخرَج من أوراق وقشور القَسْطَل هِنْدِيّ من فصيلة القَنْدَليَّات Aesculus hippocastanum ويـمـكـن

أ س ق

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسميتان للمؤلِّف.

أس ق الحصول عليه كذلك اصطناعيًا.

المواصفات - مسحوق مُتيلًر، خفيف اللُّون الزِّبْدِيِّ، عديم الرّائحة، طعمه مُرّ، قليل الذُّوبان بالماء البارد، يَذُوب في ٦ أجزاء من الماء الغالي، في الكحول، في الدِّيُوكْسَانٌ، غير ذَوَّابِ في الأثير.

يكون للأشقولوسيد بحالته البلورية اسْتِشْعاع أزرق اللُّون تحت ضوء وُوْد Wood. ويَتمتَّع محلوله المائق المُخَفَّف بتَفَلْوُر خفيف جدًّا في ضوء النَّهار، فيكون باهت اللُّون الأزرق في ضوء النَّهار، ويُصبح شديدًا تحت ضوء وُوْد، يختفي في محيط حامض ليعود فيظهر في محيط قِلُو ي .

الخصائص والاستعمال - مُنَدِّل للنَّفُوذِيَّة الشُّعْرية يُستعمل في حالات النَّزيف الحَشَوي (فُرْفُريّات وعَائِيّة، تَجنّب النَّزيفات عند مُتوتِّريّ الأوعية الدّمويّة، وعند الرُّضَّع)، أوديمات، نَضْحَات أو رَشْحات مَصْلِيّة، أكزيما نازّة.

طريقة الاستعمال - أولًا: على شكل محلول قابل للحقن بنسبة ٠,٥٠ بالمئة في أُمْبُولات من ٢ مل مُعيَّرة بمقدار ٠,٠١ غرام من الأسقولوسيد في الأمْبُولة (عن طريق ضمْعَضلي): ۰,۰۱ إلى ۰,۰۲ غرام اليوم.

ثانيًا: على شكل مضغوطات مُعيَّرة من ١٠ ملغ، يؤخذ منها ٣ إلى ٨ مضغوطات في اليوم، بعيدًا عن الوجبات.

يستعمل المتيل أشقولوسيد (C₁₆H₁₈O₉OH=372,3) الذي يحصل

بالطريقة الاصطناعية، بالاشتراك مع حامض الأشقوربيك، أي القيتامين «ث»، ومع الڤيتامين «پ» (أسْقُولُورْبيْن) في معالجة داء الحَضَر الوقائية والحالات المناظرة، تناذرات نزيفيّة، مُعالجة الأمراض العَظمية، حالات فقر الدَّم، حالات قِلَّة الكُرَيْضات: Leucopénies، حالات عَدُوائيَّة (٢ إلى ٤ مضغوطات في اليوم).

٧٥- إِشْقِيْل بَحْرِي، عُنْصُل بَحْرِي، بَصَل الفار، قَضِيْب الرَّي

Medicinal Squill, Sea oignon (E) Scille, Squille, Charpentaire, Oignon marin (F)

Echte meerzwiebel, Mauszwiebel (D) Urginea Scilla Steinh, Urginea maritima (L),

Scilla maritima L. (S)

بصَلة مُعلَّفة كبيرة الحجم من فصيلة الزُّنْبَقِيَّات، طعمها حامز، طولها حتى ٢٠ سم وعرضها القاعدي نحو ١٥ سم، قد تزن عدّة كيلوغرامات؛ وهي مُغَشَّاة بعدد كبير من قواعد الأوراق التي تتراكب دائريًا وتُدعى أسفاطًا أو حراشف. مهدها مناطق المتوسط.

تصل هذه البصلة إلى الأسواق الفرنسية من الجزائر وإيطاليا وإسبانيا حيث يُميَّز منها ضربان: واحد حراشفه حمراء يُعرف بالإشقيل البَحري الذِّكر أو الإشقيل الإسباني، وهنو الأكثر شنهرة واستعمالًا، والثَّاني حراشفه بَيْضاء

ويُعرف بالإشقيل البَحريّ الأنثى أو الإشقيل الإيطاليّ. إن فارق الألوان ليس بالوحيد بين الضَّربين على الأرجع؛ ففي فرنسا تعطى الأفضليّة إلى الضَّرب الأحمر.

تُجمع البصلة في الخريف وهي في أوج قوتها، تُرمى قشورها الخارجيّة الكثيرة الجفاف، وقشورها الوسَطِيَّة الكثيرة اللَّعاب، ولا يُحْتَفظ سوى بالقشور اللِّعاب، ولكي نجفّفها نفصل القشور عن بعضها، نُقطعها إلى شرائح عَرَضيّة رقيقة أو إلى سيور نُنضّدها ونُجفّفها في المِحَمّ أو في الشَّمس.

شكل القشور مسطّح ومحدَّب، ومظهرها قليل الشَّفافية وهي جافّة؛ لونها إلى الأصفر الباهت أو المتورِّد حسب نوع النَّبات. يَحتوي النَّسيج الخَلويّ الكثير من أوكسالات الكلسيوم. رائحة معدومة، طعم مرَّ جدًّا. المسحوق ورديّ اللَّون البُنِّي.

غُرِف الإشقيل كمبوّل قبل الميلاد بستة عشر قرنًا، وهو جزء من المادّة الطبيّة منذ زمن طويل. استعمله أبقراط من الداخل ومن الخارج. عرفه ديوسقوريدس؛ طواه النسيان قرونًا عديدة وأعيد اعتباره عام ١٩١٥ وذُكِرت خصائصه المقوِّية للقلب عام ١٩١٢.

المُركِّبات - يحتوي الإشقيل، بالإضافة إلى سُكِّر يشتق من اللَّقُولوز، ومواد لُعابية، ودَكْستريْن، وأوقصالات

إش ق الكلسيوم Raphides، على جواهر فَعَالة مختلفة: ١° - هَيتروسيد يُدعى سِلَايين أو سِلُّوتُوكسين، فَعَال جدًّا عندما يستخرج من النبات الغَضَّ؛ ٣° - مادّة مُلوَّنة راتنجيَّة تدعى سِلْپِيكْرِيْن، تتحلى بخصائص مبوِّلة؛ ٣ - جوهر مُقَيِّئ ومسهِّل قوي يدعى سِلِّين، يذوب في الكحول والأثير الغالى؛ ٤° – هيتروسِيد من مجموعة الصابونيات يدعى صابُوسِلِين، يذوب في الأستير الأستيلى، ويتحلَّى وهو طازج بنوع خاص، بعمل ذَمَائِيّ nécrobiotique شديد على خلايا البشرة والأغشية المخاطية؛ إن هذا الذَّمَاء nécrobiose قد يحدث بالتالى بواسطة الإشقيل الطازج، ولا يحدث بالإشقيل المجفَّف؟ °° - مواد مختلفة غير محدّدة جيدًا وتتقارب من المواد السابقة: سِلْتِیْن، سِلْنِیْن، سِلّاماریْن؛ ۲° - مادة راتنجانية سامّة جدًّا، لا تذوب في الماء، تذوب في المحاليل البوتاسيّة المُشَعشَعة، وتقتل الثَّدْييّات خنقًا. وحدّد كل من ستُوْل وسُوتَر هيتروسيدات

جديدة، سِلارانات أو سِلاروسيدات،

أحدها يدعى سِيلاران A، يتبلّر في

شذرات بيضاء؛ يعمل كمقوِّ للقلب،

ومبوِّل مُزيل الأزوت. وهو مُياسِر،

تركيبه الكيميائي C₃₆H₅₂O₁₃، يعطى

بالتحليل المائي السلاريدَيْن A، وهو

تكتُون تركيبه الكيميائي C24H30O3

وسُكِّرًا يدعى سِلَّابِيوز C₁₂H₂₂O₁₀

إش ق ينشطر إلى رَمْنُوز وإلى غلوكوز.

السِّلّاران B عديم الشكل؛ وهو أقل كمية، ولكنه أكثر سمّية من السابق؟ ويتركَّب على الأرجح من مزيج طبيعتي من السّلارانات A وB. كما انكت عدد آخر من الكيميائيين على دراسة تركيب الإشقيل (١٨٧٩)، (١٨٩٣)، (١٩١٤)، إلخ.

هيدرات الكربون المُياسِر (لڤولوزان) دعاه ریش ورامُون سِکَیْن، ومن ثم دعاه شميدبَرْغ سِنِسْتريْن.

إن الإشقيل الأبيض لا يصلح كمبيد للجرذان، كما يقول وِنْتُون؛ المادّة الفعّالة لهذا الغرض ليست السّلاران الذي يقاومه الجرذ نسبيًّا. أطلق عليه Bijlsma عام ۱۹۳٦ إسم راتوڭسِيْن . C12H21O9

حَدُّد كل من سُتُول ورَنْز حديثًا السِّلْرُوسيد في الضَّرب الأحمر بتركيب كيميائي C32H44O12 وهو يتقارب من الهيتروسيدات المقوية للقلب، ولكنه فضلًا عنها، يَتحلَّى بخصائص مُبيدة للجرذان.

لا يوجد للإشقيل تقدير كيميائتي.

إن مُعايَرة الإشقيل البيولوجيّة ومستحضراته درست عام ۱۹۲۷، ١٩٣٣، ١٩٣٥، ١٩٣٦ من قبل عدّة علماء اقترحوا جميعًا بأخذ السِّلاران A كمِعْيار وإجراء التَّجارب على الهر، والكلب، أو الكُوباي بطريقة الحَقْن

المستمرّ البطيء. إن الجرعة المميتة الدنيا بالملغرام لكل كيلوغرام من الكلب هي ٠,٥٣ ملغ سِلّاران A (٢,٨٢ وحُدات - كُلْب)، ١٦٧، ملغ للمادّة B (٥,٩ وحُدات - كَلْب)، ٩،٣٥٣ للمادّة C (٣-٤ وحدات - كُلْب).

السّلاران A مَرّتان أقلّ سُمّيّة من الوَبائِيْن، بينما سمّيّة السّلّاران B مماثلة له وسمّيّة السّلاران C تتوسّطهما.

يَتخلَّى الإشقيل عن قسم من جواهره إلى الماء، ولكن حالّاته الفُضلي هي الكحول والخلّ. نقاعته المائيّة تُصبح قاتمة اللَّون الأرجوانيّ بسبب أملاح سَسْكى أوكسيد الحديد. أما للمحافظة على خصائص الإشقيل الفعالة تصور وانْزَل طريقة تثبيت أنجزها في مكان القطاف بالذَّات (Scille stablactivée).

٢٦- أُفْلُوس خَوْخِيّ الوَرَق، رَبَاطِيّة خَوْجِيَّة الوَرَق(١)

Black-Horn (E) Viorne à feuilles de prunier (F) Pflaumenblatt Schlinge (D) Viburnum prunifolium (S)

الأفلوس جنس جنبات من فصيلة الخَمَانِيَّاتِ. أوراقها متقابلة، وأحيانًا دَوَّارِيّة. أزهارها عدَقية التَّجميع، مِظلّية أو عُثكولية الشَّكل؛ الأزهار العقيمة تكون عمومًا كبيرة القدّ، والأزهار المُخصية

⁽١) التَّسميتان العربيَّتان والتَّسمية الفرنسيَّة للمؤلِّف

أصغر منها. أنواعه نحو ١٢٠ بين أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، منها واحد في لُبنان.

تُستعمل قشرة الأفلوس الخوخيّ للتداوي في الولايات المتّحدة حيث تُسمّى Black Hom وتقع في قطع صغيرة غير منتظمة، مسطّحة ومقَوَّسة بعض الشَّىء، لا تَتَخطّى سماكتها فقط الملم الواحد؛ وهي مغطّاة بفِلّين مُرمَدّ اللَّون، ثؤلولي الشكل، قليل الالتصاق بالطَّبقات المتاخمة التي يكون لونها كالصدأ، وجهها الداخلي باللُّون ذاته أو أبهت لونًا، شديد التَّثليم في القشور الكبيرة. مكسرها قصير ومُحبّب. على مقطعها العَرَضَى نسيج حَشَوي مصفر اللُّون البُّنِّي وممرَّكُ بحزوز شُعاعيَّة وملطَّخ بتنقيطات كبيرة بَيضاء اللَّون وخشبيَّة الرقعة. الطَّعمُ مُرّ وقابض خفيف. الرائحة تُذكِّر برائحة الناردين. مسحوق قشور الأفلوس بُنِّي اللُّون المُسودّ.

المُركِّبات - قشرة الساق تحتوي على راتنجات عِدّة مُرّة يُطلق عليها إسم فيبُرْنِين، عفص، حامض ماليك، حامض قاليريانيك، حامض قاليريانيك، زيت دهني ٠٣٠٠٪.

الخصائص - مقوي الجهاز العصبي، مسكِّن رحمي وعصبي، قابض، مبوّل، مضاد لعسر الطمث وتقطعه.

الاستعمال - قشور الأغصان: طمث مؤلم، حوادث عصبية أثناء الحَمْل،

التخوّف من احتمالات الإجهاض، أف ل تقلّصات عضلية.

طريقة الاستعمال – نقيع ٣٠ غرام في ليتر ماء غال، يؤخذ منه ٣ فناجين في اليوم. مستخلص مائي كحولي ٥٠,٠ إلى ١٠ نقطة في اليوم ١٩٣٧) من ١٠ إلى ٢٠ نقطة في اليوم (للفتيات من ١٢ إلى ١٥ سنة)، نصف ملعقة صغيرة كل ٣ ساعات للبالغين (في حال التخوف من الإجهاض). صبغة دستور ١٩٦٥ (أ):٢ إلى ١٥غ في اليوم.

٧٧- أَفْلُوسُ لانْتَانا^(١)

Wayfaring-tree (E) Viorne Mancienne (F) Schlinge (D) Viburnum lantana (S)

جَنْبَة من فصيلة الخَمَانِيَّات تعلو من ٢ إلى ٣ أمتار. أغصانها خَمليّة، رَماديّة الأوبار، منبسطة. أوراقها سميكة النَّصل، شبه بيضاء الصَّفحَة السُّفلى، بارزة العروق، معنَّقة، متقابلة، بيضيّة كاملة، مسنَّنة الهوامش. أزهارها بيضاء، صغيرة، نجميات كاذبة متراصة. النَّمرة عُنيبة مُسطّحة الشَّكل، خضراء، ومن ثم حمراء اللَّون، فسوداء عند النضج. رائحة قويّة (الأزهار) طعم حامز (الثمار).

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

أف ي

Viburnique

الخصائص - قابضة، منعشة.

الاستعمال – الأوراق. الثمار. ذبحة،

طرق الاستعمال - لمعالجة الذبحة لمصدرها) التّالية: يُصار إلى التغرغر بمقدار ليتر كامل يوميًّا مورفين، من ٣ إلى ٢٣٪ ،C17H19O3N من نقيع ٢٠ غرام أوراق مجفّفة في ليتر ماء يغلى ٥ دقائق ويغطّى عشرة، يصفّى ويُحلّى بالعسل. لتقوية اللثة والوقاية من تَعْرية الأسنان، يصار إلى غسل الفم عدّة مرّات تيبايين، من ٠,٢ إلى ٠,٥٠٪ في اليوم بنقيع ٣٠ غرام أوراق في ليتر ماء يغلى ٣ دقائق، يُصفّى؛ الانتباه إلى عدم ابتلاع السائل.

> ملاحظة - حصر الاستعمال الدّاخليّ بناءً لوصفة طبيَّة.

٢٨- أَفْيُون مَخْزَنَى (مَركَباته الكيميائية) Composition chimique de l'opium officinal (F)

تركيب الأفيون مُعقَّد جدًّا. عناصره المُركِّبة عديدة:

١° - من المواد العديمة الفائدة: ماء ١٥ إلى ٢٠٪، موادّ مَعدِنيّة، إلى ١٥٪، لُعاب، یکتین، سکاکر ۲۰ إلى ۲۰٪، شموع، مطَّاط ٦٪، مواد هَيُولينائيَّة.

 ٢° - حوامض ممزوجة مع القِلَويدات: حامض سولفوريك، أستيك، لبني أولَكتيك (١ إلى ٢٪) وحامض ميكونيك (٣ إلى ٥٪) إنّ وجود هذا الحامض كافّة قِلُويدات الأفيون؛ قِلُويدات

المُركِّبات - حامض أُفلوسي، الأخير يَسمح بالتَّعَرُّف إلى الأفيون ومستحضراته وتحديدها.

٣ - عدد كبير نسبيًّا من القِلُويدات (١٠) إلى ٢٠٪)، القِلَويدات الأساسيّة منها توجد بالنِّسب (التي تختلف جدًّا تبعًا

 OH_2

کودایین، من ۰٫۳ إلی ۳٪ C₁₈H₂₁O₃N, OH_2

 $C_{19}H_{21}O_3N$

يَيَّاڤُرين، أقل من ١٪ $C_{20}H_{21}O_4N$ لُودانَوُزين، بقايا $C_{21}H_{27}ON_4$ $C_{22}H_{23}O_7N$ / الى Λ الى من ۲ إلى من ۲ إلى من ۲ نَرْسَايِين، من ١,١ إلى ١,٤٪

C₂₃H₂₇ON₈, 3OH₂

بعض القِلَويدات، كالمورفين، الكودايين، النَّركوتين (نوسكايين)، البيَّاقُرين، والنَّرسايين، يمتلك خصائص فيزيولوجية مُحَدَّدة جدًّا؛ المورفين له عمل مزيل للألم ومُنوِّم؛ الكودايين. أقلّ سُمِّيَّة من المورفين، هو مُهْبط لمركز الشعال ومزيل خفيف للألم؛ النوسكايين هو سَمّ مُخَلِّج مُشَنِّج، وهو يُقوّى عمل المورفين؛ البيّاڤرين له عمل مُضادّ للتّشَنُّج، النرسايين عمله مزيل للألم ومنوم خفيف نسبيًا؛ التيبايين هو مُخدِّر ومخَلِّج، وهو الأكثر سُمِّيَّة من

أخرى، كاللُّودانين، واللُّودانوزين، والكودامين، والكريبين، واليروتوبين، ليست لها أيَّة فائدة طبَّيَّة.

إن الجسم الأكثر شهرة من هذه الأجسام هو المورفين الذي تستخدم مُعَايَرته لتقدير القيمة العِلاجيّة والتجاريّة للعقار. في أقربازين ١٩٦٥ يُستعمل مستخلص الأفيون، ومسحوق الأفيون.

مُخَيِّل

جدول

Stupéfiant

Tableau B

الاستعمال - يُستعمل العمل المُخدِّر للأفيون على الأكثر في حالات الأرق المُتسبِّبة عن الوجَع. استُعمل الأفيون كدواء مُهدّئ، في المغص الكلوي والكَبدي، وفي مغص الرصاص، آلام الأعصاب، محاربة عسر التَّنفُّس للمصابين بداء الربو أو المصابين بانتفاخ الى ٤ نقاط من اللُّودانُم. الرِّئة. وهو يُهدّئ السُّعال ويُخفّف الإفرازات في البرونشيت الحاد. وهو مُسكِّن جَيِّد للآلام المتعلَّقة ببعض حالات عُسر الهضم، وبالسّرطان وقُرْحة المعِدة. وهو مُضادّ رائع الفَعاليّة للإسهال.

> الأفيون لم يعد مُستعملًا تقريبًا في التداوي. ولكن القِلَويدات، وخاصة الكودايين، واليياڤرين والنوسكايين تحتفظ بمكانها الهام في التداوي. المورفين يُعطى أو يوصف بتناقص متسمرً.

> الأفيون غير صالح وغير مرغوب فيه في حال العَجْز الكلويّ، الأوديما الحادّة في الرِّئة، الإصابات الحالبِيّة، تَجمُّع الدمّ (Hyperhémic ou Hyperémic)

المراكز العَصبيّة مع احتمالات أو مَيْل للسَّكْتَة أو النُّقطة، وفي الأمراض المُعدِية الخطيرة. عند النساء العصبيّات، والشيوخ، وخصوصًا عند الأولاد، فهو لا يُستعمل سوى مع الكثير من الحيطات والحذر. «الأولاد هم حسّاسون إلى أقصى درجة على عمل الأفيون. وكان البعض يمنع استعماله للأولاد قطعيًا. وفى كل حال، يجب أن لا يُعطى للأولاد سوى وهو في محلول كبير وبمقادير مجزّأة جدًّا. ونجعله مقابلًا للآلام المِعويّة فقط (مغصات، آلام حشوية)، وللإسهال، والتهاب المعي، وبشكل استثنائي، وبعد عمر سنتين، للإصابات التَّنفُسية». سُجِّلت حالات موت عند الأولاد من جراء إعطائهم ٢

٧٦- أَقْراص عِلاجِيَّة، بُرْشَان عِلاجِيّ، بَرْشَام خُبْز فَطِير

Cachets médicamenteux, Capsules de painazyme (F)

اقترح غِيَّارْمُون الأقراص العِلاجيَّة عام ١٨٥٣، ومن ثم اقترحها لِيمُوزان ثانية عام ۱۸۷۲، وهي أقراص تتألُّف من وَرَقتين من الخُبز الفَطير (بلا خميرة) تُقَطّعان بشكل مستدير أو بَيفوي، وتكونان منبسطتى الأطراف ومُقَعَرتين في القسم المُخَصَّص لاحتواء الأدوية الصّلبة الذّرورة لتسهيل ابتلاعها وحُجْب

ا ق ر

أكس

مَذاقِتها. تُصنع الأقراص من ستّة أحجام أساسية. يوضع المسحوق في إحدى الالتهاب المَفْصِل، راتافيا الكاراييب. الورقتين، تُبَلِّل أطراف الورقة الثّانية جذر الغاياك ١ غ الخبز الفَطير المُخصَّص لصُنع الأقراص نمرث ومن ثمّ نصفّي. يجِب أن يُحضَّر من عجينة قوامها نشاء ملعقة كل صباح ضدّ النقرس. الذَّرة الصَّفراء يُضاف إليه ١٥ إلى ٢٠٪ من نشاء القمح مما يُعطى قرصًا أكثر لَيونة وأفضل حفظًا فيما لو كانت العجينة مؤلِّفة من نشاء القَمح فقط أو الذّرة الصَّفراء فقط (كودكس ١٩٤٩).

> تُحفظ الأقراص والبُرشان في معزل عن الرّطوية.

أَقْراص فَحْم، بلَّادُون:

يَذكُر مُلحق كتاب الوصفات الوَطَنيَ الفرنسي عام ١٩٧٦ التَّركيبة التَّالية:

فحم نباتی ۱٫۵۰ غ مسحوق بلادُون ۶ ۰, ۰ ۲

تُحْفظ في وعاء محكم القفل، بمعزل عن الرَّطوبة والضَّوء والحرارة. مُضادًّ للإسهال.

۳۰ إكسيرات Elixir (E) Elixirs (F) Heiltrank (D)

إكسير كلوروفورمي كلوروفورم۸ غ

شراب سکری بسیط ۲۲۵ غ

مُهدّئ ضدّ بعض العُصابات التشنجية الاختلاجية والعَقليّة.

إكسير مضاد للرَّثْيَة، إكسير مضاد

في تركيبة الأكسير المضاد لاعتلال المفصل في «إينل دو فرانس» يُضاف المُرّ والسَّوْلُع إلى راتنج الغاياك أي عود الأنبياء. مُرِّمُرِّمُرِّمُرِّمُرِّمُرِّم

راتنج غاياك <u> ۽ ۽</u> ۽ سَوْلَع

نحلّ كل مادة على حدة، في ليتر كحول ٥٢ درجة ونمزج الصبغات معًا. ملعقة إلى ملعقتين على الريق في معالجة النقرس.

٣١- أَلْبِيْزِيَة أَبُو سِنّ، أَلْبِيْزِيَة طارِدة للدُّود Vermifuge albizzia (E)⁽¹⁾

Albizzie anthelminthique, Acacia à musenna (F)

Wurmabführend albizzia (D)⁽¹⁾

Albizzia anthelminthica (S)

جَنْبَةَ بَرِّيَّةَ طَبِّيَّةَ زِرَاعِيَّة تَزيينيَّة من فَصِيلَة القَرْنِيَّاتِ الفَرَاشِيَّةِ. سِنْف ثمارها ولحاء شوقها وفروعها طاردة للديدان وتستعمل في بَعض العِلاجات المِعَويّة.

Algues marines (F) أَلْغ بَحْرِي -٣٢

الخصائص - مُنَشِّطة للتَّبادُلات، مُنشِّطة

(١) التَّسمية للمؤلِّف.

للغُدَد الصَّمّاء، مُضادّة للتَّشَيُّخ، مُوازِنة عامّة (مُصلِحة للأرضيّة العامّة)، داعمة للدِّفاعات الجَسديّة الطَّبيعيّة، مُمَعدِنة، مُنشَّطة للدّورة الدَّمويّة، مُضعِفَة (للبَدين بإعادة تَوازن الأرضيّة العامّة)، مُضادّة للداء الخَنازير، مُضادّة للسَّلعَة أي تَضَخُّم الغُدَّة الدَّرْقِيّة، مُضادّة للرّوماتيزم، مُضادّة للتوماتيزم، مُضادّة للتوماتيزم، مُضادّة للتوماتيزم، مُضادّة للتوماتيزم، مُضادّة للتوماتيزم، مُضادّة للتوماتيزم، مُضادّة المَدْوي.

الاستعمال الدّاخليّ والخارجيّ -

- للوَلَد: لَمْفاويّة، العُقْدَة أَيّ الغُدَد اللَّمْفاويَّة، إلتهابات الحَرْقَوة أي الأنْف والبُلْعوم المُزْمِنة، المُرشَّحُون أو المُهَيِّأُونَ لِلسِّلِّ، المُعرَّضُونَ للأمراض بشكل عام، خَسْف المعادِن من الجسم، التَّعب العام الجسدي والفِكري، فَقُر الدم، الكُساح، إضطرابات النّمو، الزُّور والجَنف (أي إلتواء العَمود الفَقْريّ)، التّأخيرات المُحرِّكة، عَقابيل النَّقاهة من مَرَض أو على أثر عَمليّة جراحيّة، فُقْدان الشّهيّة، إضطرابات عَصبيّة، نَرْفَزة، أرَق، البُلوغ والمُراهَقة، إضطرابات غُدِّيّة (في العَجْز الدَّرْقى)، عَقابيل حالات الشَّلَل، لا تَكَيُّف يَكثُر في المُدُن الكبري، حَساسِيّات مُختلِفةً ومُتكاثِرة يومًا بعد يوم.

للبالغ: التَّعب العامِّ الجَسديِّ والفِكريِّ، الإنحراف المِزاجيِّ التَّقليديِّ Patraquerie أضطرابات غُدِّية، التَّناذُر: تَعَب - نَرْفَزة، إضطرابات

عَصبية، إثارة، أرَق، خَسف المعادِن من الجسم، فَقر دمّ، نُقاهات سابِغَة أي بَطيئة، التَّشَنُّج وكافّة الاضطرابات الّتي تُرافقه، إضطرابات سِنّ القُعود، رُوماتيزمات مُزمِنة، رُوماتيزمات إنحطاطِيّة: مِثال إعتلالات المفاصِل، رُوماتيزمات إلتهابيّة مِثال إلتهاب المفصل المُزمِن التَّطَوُّريّ، وإلتهاب مفاصِل الفَقْرات: Spondylartrite بعيدًا عن النَّوبات الحادَّة وفي حَمَّامات؛ حَرَض أي داء المفاصل، أوجاع مُختلِفة، أوجاع أعصاب بَيْضِلْعِيَّة، أوجاع حَوْضِيّة، بَدانَة، إلتهاب النّسيج الخَلَوي، تَصلُّب الشَّرايين، إرتفاع التَّوتُّر، لَمْفاوِيّة، رَبُو، إصابات رِنويّة مُزمِنة فِتال البرونشيت وانتفاخ الرِّئة، إلتهابات الحَرْقَوة المُزمِنة، إصابات الجَيْب المُزْمِنة، إصابات نسائية غير إلتهابية حادة، إضطرابات الحَيْض التي تَتَرافق بآلام أم لا، عَقَابيل الكُسور العَضميّة، والإصابات العَظميّة المفصليّة وحالات الشَّلَل، إضطرابات هَضميّة مِثال فَرْط الحُموضة المِعويّة، إسهال، إلتهابات المِعَى، إلتهابات القُولُون، بَعض حالات الإمساك، حساسيّات مُختلِفة، شَقيقات، بَعض إضطرابات الدُّورة الدُّمويّة كالهَبْوات، والمَيْل للإصابة بالدُّوالي أي القاريس، والسُّيقان المُتعَبَّة، وانتفاخ العُرْقُوب أي الكاجل، بعض الإصابات الجلدية مثال السَّيَلان الزَّهَمِي، حَبِّ الشَّباب،

الحَصَف، التَّصَدُّف، الحَكَات الشَّديدة، الأَكزيمات الجافَّة، الشَّرَث، الخَصَر.

تَضَادًات الإستطباب - في الحمّامات - قد يُعطي الألغ بناء لوصفة يُحدُّدها الطَّبيب ويُؤخَذ من الدّاخل. الأمراض المُعدِية في طورها الحادّ، الالتهابات التَّطوُّرِيّة، بَعض الأمراض الجلديّة كالأكزيمات النّازَّة، حالات السِّلِ الرِّنويّ، الخُراجات الرِّنويّ، الخُراجات الرِّنويّة، عَدَم مُعاوَضَة القَلْب، إصابات قلبيّة كليويّة، رُوماتيزم مفصليّ حادّ، فرط التَّدرُق أي داء بازْدُو، أمراض عَقلية.

- الاستعمال الدّاخليّ:

" - في التَّغذية: إنّ للألْغ أهمِّية كُبرى منذ القِدم لدى شُعوب الشَّرقَين الأوسط والأقصى، وكذلك لدى بعض الشُّعوب الشَّماليّة. أمّا في أوروبًا فلقد بدأ الرّأي العامّ يُولي لهذا الأمر اهتمامًا أكثر من ذي قبل حيث يَبدو أنّ الألْغ يَتَبَوَّء حاليًّا مكانته الهامّة في مجال الحِمْية الغِذائيّة.

الصّينيُّون واليابانِيُّون والهاواييُّون يستهلكون كمِّيَّات كبيرة من الألغ بهدف مُوازَنَة وجباتهم اليَوميّة التي تَعتمد الأرزِّ والأسماك المُجفَّفة أساسًا لها. وتُستهلك الألغيات في تلك البُلْدان، وهي مُقوِّية عامّة، لخصائصها المُنشِّطة جِنسيًّا ولفعاليّتها في الصِّراع ضِدِّ التَّشنُّج. وتشتهِر اللّامينارِيّة السُّكَرِيّة بخصائصها النّاعِظة، وتُلقَّب بحزام نَبْتون أو حَمّالة النّاعِظة، وتُلقَب بحزام نَبْتون أو حَمّالة

سَيْف نَبْتون.

اليابانيُّون يَزرعون أَلْغة حمراء تُدى Porphyra tenera مَرْجَانَة طَرِيَّة (١)، مَرغوبة جدًّا وتُستَهلك مُجفَّفة باسم «نُورِي» Nori. تُمَد طبقة من الأرزّ المَسلوق واللَّحم أو السَّمَك على ورقة أرْجُوانَة، تُلَفّ الورقة وتُقطَّع إلى شرائح تُوكل في الشَّوارع على غِرار السّندويش في البلاد الأخرى. ويُستعمَل النُّورِي كذلك في عدد من الأطباق والأحسية والسَّرائد وشَوربات الخُفر

وتَدخُل أنواع الجاليديوم، تحت إسم كَنتُن Kanton، في تَحضير الأحسية على أنواعها والمربيات والسكاكر والحَلُويات. أوراق اللهمينارية اليابانيّة (۱) Japonica، والدّينيّة (۱) Religiosa تُؤكّل في الصّين واليابان، بإسم كُمْبُو Kombou، مَبروشة مع كلّ الوجبات وفي كلِّ الأطباق؛ كما يُحضَّر منها أيضًا شاي الكُمْبُو. الأَسْكَنْديُّون يَستهلكون ألْغَة حمراء تُدعى Rhodymenia palmata ولامينارية بُنيَّة تُدعى ألارية مأكولة (غالب) Alaria esculenta ضلعها سُكَّريّة الطَّعم. في إيرلَنْدة وسكَوتْلَنْدَة يُصنَع خُبز الألغ من أنواع المَضْرُوعَة (غالب) Himanthalia. في فرنسا يُستهلَك الألغ في المطاعم الصِّينيّة واليابانيّة والڤيتناميّة

⁽١) التَّسمية للمؤلُّف.

بنوع خاصّ. كما تُوجَد الألغيات أيضًا في الصِّناعة الغِذائيّة: بعض الكريمات، الفُرنِيّات الفَوريّة، مُختلَف مُستحضرات الترويقة، شَوربات الخضر والمُربَّيات. إنّ أهمِّيّة الألْغ سَوف تَتَصاعد في المُستقبَل كمصدر غذائيٌ هامٌ.

" - يُمكِن استعمال الألغ لأهداف على شكل مسحوق يُوضَع في علاجِية على شكل مسحوق يُوضَع في أقراص أو في مضغوطات، وهي تَدخل في تركيب عدد كبير من المُستحضرات الصَّيدليّة. وتُعتبر الأَلْغيات في أكثر الأحيان إسهامًا مَعدنيًّا بفضل عدد ضروريّاتها الكبير، وغذاءً مُرَكَّزًا غنيًّا بكافّة العَناصر الّتي تحتوي عليها.

وتَحتوي بعضُ ضروب الألغ، بالإضافة الى غِناها المَعدنيّ، على مَواد لُعابيّة يجعلها عَمَلها المُنظِّم للمَعِدة بنوع خاصّ، يَجعلها ثمينة في حال الإمساك أو الإسهالات، وكذلك في مُختلِف إصابات الأمعاء كإلتهابات القُولُون والمِعَى، عن طريق إواليّات مُعقَّدة. إنّ إعطاء الألغ في مَضغوطات يَبدو والحالة هذه أكثر مُلائمة من أكله في المطبخ.

" - إن إضافة خَميرة غِذائية إلى مساحيق مُختلِفة من الألْغ أدَّت إلى نَتائج جيِّدة جدًّا عند عدد كبيرٍ من الأفراد المُتْعَبين أو المُصابين بإحدى الإصابات الّتي ذُكِرت أعلاه تحت عُنوان "الاستعمال". إنّ لهذه الطُّرق في استعمال الألْغيات تَجعل نُقاعاتها ونقيعاتها غير المُستحبَّة عمومًا والّتي

كانت تُحَضَّر في الماضي تَجعل منها إذًا مُستحضرات بالية وباطلة.

- الاستعمال الخارجي:

يَعود استعمال حَمّامات الألْغ في فرنسا، عامّة كانت أم مَوضِعيّة، إلى آخر القرن التّاسع عشر. وهي حَمّامات بمتناول كلّ من كان يملك مَغْطسًا. يُقدِّم الأَلْغ بذلك طريقة عِلاجيّة بَسيطة وفَعّالة، ذلك أن تأثيرها الخارجي يَتم بفضل البَشَرة الَّتي يَعتبرها البَعض على أنّها أهمّ غُدَّة في الجسم وليست مُجرَّد كساء خارجي له. حَمّامات الألْغ تُمعدِن بفضل الحرارة وتُعتبر مجالاتها العلاجية عديدة جدًّا؛ فهي تُؤدّي إلى تَوَسُّع الشُّريِّنات والأوعية الشُّعْريَّة، بما فيها الشُّرايين الإكليلية، فتُحدِث بذلك تكثيف التَّحوُّل الغِذائق الخليوي، وامتصاص النُتُوحات أي العَرَق، والالتنام النَّسيجيّ، وإلى تكثيف الوظائف الغُدَديّة. . . وهي بذلك تُثير دِفاعات الجسم الطَّبيعيَّة وتُلَطِّف وَهْن الدِّفاع أو تُلغيه، مُؤدِّية في النِّهاية إلى تَجَدُّدُ الجسم وإحيائه.

٣٣- ألْوَة، صَبْر، مَقْر، سَوْلَع (عُصَارة

Aloes (E) (–JI

Aloès (F)

Aloe (D)

Aloe (S)

مُواصفات عُصارة الصَّبْر - أيًّا يَكن مَصدر الصَّبْر، يَجب أن لا يحتوي على أكثر من ٣٠ بالمئة من المَواد غير القابلة

أ ل و

ألو

للذُّوبان في محلول نُشادريّ نسبته واحد بسبب عمله الإحتقانيّ على أعضاء الحامِض الصَّبْريِّ Acide aloétique الَّذي يَتَحوَّل إلى حامِض كريزامِّيْك إذا عُولِج بالحامِض النِّيتريك السّاخن. وإذا صُهر وسُولفات الحديد. الصَّبْر مع البُوتاس، فإنَّه يُعطى أورْسِيْن الحامِض پ. أوڭسِي بَنْزَويك. إنّ هذه الحوامِض تكون مُرَكَّبة من الـ«أَلْوَارَاتِنْجُو عَفْصُولِ» Aloerésinotannol في القسم الرّاتِنجيّ الَّذي يُشَكِّل حَوالي ١٢ بالمئة من الصَّبْر أو الألْوَة.

> وعَزَل منه الألْويْن أي السَّوْلَعِيْن كلُّ من سميث وستَنْهَاوْس عام ١٨٥١، ومن ثمّ عَزَله غروڤز عام ١٨٥٦. وقام ليجيه Léger، بین ۱۹۰۰ و۱۹۲۰، بدراسة مُعَمَّقة لمشكلة الألْوِينات (سَوْلَعِيْنات)، وتَبَيَّن له أن الأجسام الّتي حُدِّدت كانت أمزجة تَحتوي على البَرْبالُويْن وعلى الإيزوبَرْبالُويْن بنسب مُختلِفة. وعزَل في سَوْلَع النَّاتَالُ النَّاتَالُويْن والهُومُونَاتَالُوينَ. الخصائص والاستعمال - الصَّبِّر مُسهِّل، ماسِط، مُقوِّ، حسب المقادير. إنَّ عَمله كدواء مُسهِّل يَتَّجه بشكل والحالة هذه كدواء سامّ. أساسيّ إلى المِعَى الغَليظ. وهو يُعطَى للأفراد المُهَدَّدين باحتقان الدِّماغ، وفي حالات الإمساك العَصِيَّة، ولتنشيط المجرى الهَضْميّ، ولإحداث الصَّفراء. وهو كذلك مُطمِث، ومُضادّ للدّود، ومُدِرّ ومُفرغ للصَّفراء.

> > إن استعمال الصَّبْر غير مَرغوب فيه في الحَبَل وعِند المُصابين بالبواسير، وذلك

من عشرة. عُزل، في الألْوة أو الصَّبْر، الحَوْض الصَّغير. ولكي نُلَطِّف عَمل الصَّبْر على الأمعاء ونُخفِّفه، نُضيف إليه مَواد أخرى، كالمُخدِّرات، والرَّاوَند،

إنَّ لبعض المَوادّ خاصِّيّة فريدة في تَنمية وتكبير عَمَل الصَّبْر المُسهِّل، بالرُّغم من أنَّها لا تُمتلِك هي بذاتها تلك الخاصِّيّة المُسهِّلة. وهُناك موادّ عديدة تَمتلِك لهذه الخاصّة، ومنها بنوع أخص سُولفات الكينين. كذلك، إنّ مقدار ٠٥٠٠غ. من الصَّبْر، بالإشتراك مع ٠,١٠غ أو ٠,١٠غ من سُولفات الحديد، يُؤدِّي إلى إحداث مَفْعول يُوازي مِقدار ١٠,٠٠ أو ١,١٥ من الصَّبْر لوحده؛ كما إنَّ مَيْل هٰذا الأخير لتهييج المَعْي المُستقيم أي الشَّرْج Rectum قد يَخَفّ كثيرًا. هناك عَمل فريد آخر يُقدِّمه الصَّبْر ويُعرَف بالتَّالى منذ زَمن طويل، ألا وهو أنَّ جُرعة قَويَّة جدًّا، مُبالغٌ فيها، لا تُعطى مَفعولًا أكثر ممّا نُعطى الجُرعة المُسهِّلة الملائمة، وإنَّه، وعلى عكس ما يحدث مع بَقيّة الأدوية الماسِطة، لا يعمل

طريقة الاستعمال - مُسحوق الصَّبْر. دستور ١٩٤٩، بمقدار ٠,٠٥ غرام إلى ٠,٢٥ غرام كدواء مُقوًّ؛ ومن ١٥,٠٠غ إلى ٠,٥٠غ كدواء مُسهِّل مُدِرّ ومُفرغ للصَّفراء، في جُرعة واحدة أو جُرعتين؛ المقدار الإعتيادي، حسب دستور الأدوية: ٠,١٠غ لجُرعة واحدة. مَقادير قُصوى: ٠٩،٣٠غ لجُرعة واحدة وغراء إصدارات دستور الأدوية عام ١٨١٨ إلى أم ت ١٩٣٧ ضمنًا.

الْوَة پارِّي، اَلْوَة البَحْر الأَحْمَر (۱) Perry's aloe, Red sea aloe (E)
Aloès de Perry (F)
Aloë perryi (S)

نَوْع من الألْوة من فَصِيلَة الزَّنْبَقِيَّات يَنبت على شواطئ البَحر الأحمر وفي جُزُر المُحيط الهندي، وهو من الأنواع الرَّئيسيّة التي تَهمّ العَطّار. عُصارة أوراقه تُركَّز وتُجَفَّف وتُحفَظ.

المُرَكِّبات - عُصارة تَحتوي على عددٍ كبيرٍ من الموادّ الأنْتراسانيكيّة Anthraceniques وعلى سَليت دُهنيّ، ومَوادّ راتنجيّة.

الخصائص والاستعمال - الألوة بمقادير خفيفة هي مُقوِّية مُرَّة، مُنشَّطة للشَّهيَّة، مُدرَّة للصَّفراء؛ بمقادير أقوى تُصبح مُسهِّلة. يَجب الحذر من إحتمال التَّعوُّد أو الإدمان عند الّذي يَتعاطاها.

الألوة من الخارج تُعالَج إلتهابات الأدَمة أو تَقرُّحات البَشَرة. وهي تَتميَّز بعمل مُثَبِّت للبَكتيريا والجراثيم Bactériostatique.

٣٥- أَمَتِيْن (كلورهيدرات اله)، إيهاسِيْن (كلورهيدرات اله)

Émétine (chlorhydrate d') (F)

 $C_{29}H_{40}O_4H_2$. 2HCl. 5,5 $H_2O = 653$

واحد لكلّ ٢٤ ساعة (بالغون)؛ صِبغَة الصَّبْر البسيطة، غرام إلى غرامين وأكثر؛

الصبغة المُركَّبة، من ٥ إلى ٢٠غ وأكثر. ويُشكِّل الصَّبْر أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، جزءًا من عدد كبير جدًّا من الأدوية المُركَّبة. الشَّكل البِيلُوليّ، هو الشَّكل البِيلُوليّ، هو الشَّكل البَيلُوليّ، هو الشَّكل البَيلُوليّ، هو للستعمال الذي يَبدو الأكثر مُلائمة للاستعمال الدّاخليّ.

مُستخلَص الصَّبْر المُنَقَّى، الَّذي يُشير البه بَعضُ الفَرْماكوبيات، هو من الصَّبْر المحلول في الماء البارد، عن طريق المَرْث، ومن ثمّ يَتقرَّب من شكل المُستخلَص؛ إنّ تلك المُمارسة تُعتَبَر سيِّئة، إذ إنّ الصَّبْر المُنْتَخَب ليس بحاجة إلى التَّنْقية، وإنّ تلك التَّنْقية المُقترَحة يَجعله يَفقِد من خصائصه.

حُضِّر أيضًا مُستخلَص الصَّبْر الكبريتيك، وذلك بتبخير في حَمَّام مريم، حتّى الوصول إلى القِوام الشَّرابيّ السُّكِريّ، محلول مُستخلِصَ الصَّبْر (١١٥ جزءًا) جزءًا) في الماء المُقطَّر (٤٥٠ جزءًا) يُضاف إليها حامِض كبريتيك نَقيّ (١٤ جزءًا)؛ المُستخلَص المُجفَّف على النَّار المباشرة، يُصبح مسحوقًا.

الطِّبِّ الخَيْلِيِّ يُستعمَل الصَّبْر بشكل مُتَكرِّر جدًّا.

كحولة فيوراڤنْتي، كحولة غَرّوس، مشروب بيطريّ مُسهِّل (دستور ١٩٤٩). صِبْغَة الصَّبْر البسيطة وصِبغَة الصَّبْر المُركَّبة (إكسير إطالة العُمر) وَرَدَت في

⁽١) كلّ التَّسميات ما عدا اللّاتينية للمؤلّف.

أمت

هو قاعدة ثُنائيّة الحامض قابلة لكي تُعطي مجموعتين من الأملاح. الكلورهيدرات المَخزنيّ هو ملح مُتَعادِل.

يَتبلَّر كلورهيدرات الأمتين المُتعادِل مع عدد مُتباين من ذرّات الماء (٣ إلى ٨ عدد مُتباين من ذرّات الماء (٣ إلى ٨ (H₂O)). إن الملح المَخزنيّ في دستور أدوية ١٩٤٩ كان الهيدرات ذو ٥,٥ أدوية ١٩٦٥، كان الهيدرات ذو ٥,٥ أدوية ١٩٦٥، كان الهيدرات ذو ٥,٥ كلورهيدراتان للأمتين، واحد بخمس كلورهيدراتان للأمتين، واحد بخمس ذرّات ماء، والآخر بسبع. هذان الملحان هما اللّذان ذَكرَتُهُما الفرماكوبيا الأوروبيّة الحديثة.

المواصفات - إن الملح المَخْزَنيّ هو مسحوق أبيض، عديم اللَّون، عديم الرَّائحة، يقع في صُفَيْحات مِجهريّة بِلَوريّة. يذوب في الماء، غرام واحد لكل ٧ ملل ماء، ويبلغ دالِف المحلول المائيّ بنسبة غرام واحد في ٥٠ ملل ماء، يبلغ ٦٠٥ PH؛ يذوب في الكحول. نقطة انصهاره إذا جُفِّف عند ١٠٥ سغ تنحصر بين ٢٥٣ و٢٦٥ سغ مع تَحَلَّل.

الحفظ - بمعزل عن الضَّوء في قارورات مُقفَلة جيِّدًا.

الاستعمال - مُذابة مَحقونة من كلورهيدرات الأمّتين، بنسبة ٤٠,٠٤.

لكل ملل. يقضي كلورهيدرات الأمتين على المُتَمَوِّرة الطَّفيليَّة التي تُدعي ذات العمل Entamœba hystolytica المَرَضي جدًّا والمسؤولة عن داء المُتَموِّرات عند الإنسان؛ وكانت تُسمّى قىدىمًا: Entamœba dysenteriæ) في الأنسجة ولكن فعله على الكَيْسَات فضعيف جدًا. وبالإضافة إلى ذلك، فهو مهيِّج للأغشية المُخاطية. وإذا كان كلورهيدرات الأمتين مقشعا بمقادير خفيفة، فإنه يصبح مُقيَّنًا بمقادير أقوى؛ استُعمل كلورهيدرات الأمّتين في الزُّحار الأمِيبيّ، نَفْث الدمّ، إلتهاب الرِّنة وحتى في بعض حالات البرونشيت. وهو غير فَعَّالَ فِي الزُّحارِ العَصَوِيِّ أي الباسيليِّ.

من الواجب إعطاء جُرعات قوية دفعة واحدة لقتل الأميبات؛ وتُعطى، في أكثر الأحيان، زرقات تحت جِلديّة أو ضُمعَضَلية، من ٤٠،٠ غرام إلى ٧٠٠٠ غرام في اليوم؛ ونستعمل أحيانًا الحقنات الشَّرجيّة، أو كذلك البيلولات المُقَرْتَنَة أو المُغَلِّتَنَة (١) Glutinisées. حاليًّا قليل الاستعمال جدًّا، ويُستبدل بالديهيدروأمَيِّن، الأفضل والأقل سُميّة.

المقادير - المقادير الاعتياديّة للبالغين تحت الجلد: ٠,٥ ملغ إلى ملغ واحد لكل كيلو ولجرعة واحدة؛ ملغ واحد بالكيلو وفي ٢٤ ساعة؛ المقادير القصوى: ملغ

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

واحد للكيلو ولكل ٢٤ ساعة؛ المقدار العام لمعالجة واحدة كاملة: ١٠ إلى ١٥ ملغ لكل كيلو.

للأولاد عن طريق تحت الجلد من صفر إلى ١٥ سنة ملغ واحد للكيلو وفي ٢٤ ساعة. جرعة قصوى لمعالجة واحدة وكاملة: من ٦ إلى ٣٠ شهرًا: ٥ ملغ للكيلو، من ٣ أشهر إلى ١٥ سنة: ١٠ ملغ للكيلو. مراقبة طبية. معالجات من ١٠ أيام يفصلها عن بعضها ٤٥ يومًا على الأقلّ.

سام - جدول Tableau C

الحيطات - إن إعطاء جرعات قويّة جدًّا يُؤدِّي إلى هُبوط التَّوتُّر الدَّمويّ، عَدَم انتظامات قَلْبيّة، غَثَيانات، تَقيُّو ات، إسهال. تضاد الاستطباب عند المَقْلُوبِيْن والكُويِّيْن (۱) Les rénaux.

اِمْرُوْس أَغْبَر، كُورُونِيلًا غَبْراء Glaucous Coronilla, Evergreen Coronilla (E)

Coronille glauque, Coronille toujours vert (F)

Blaugrün Kronwicke, Grüner Kronwicke (D) Coronilla glauca, Coronilla Semper-

Coronilla glauca, Coronilla Sempervirens (S)⁽²⁾

جَنبة مُعمَّرة من فصيلة القَرْنيّات الفراشيّة

(١) التَّسمية للمؤلِّف.

(٢) كل التّسميات للمؤلف ما عدا العربية واللّاتيئة. (٣) التّسمية الأولى والثانية للمؤلف.

تَعلو من ١,٥ إلى ٣ أمتار. أوراقها دائمة، مَرْطاء، مُفرَدة التَّركيب الرَّيشيّ من ٥ إلى ٧ وُريقات. أزهارها جميلة اللَّون الأصفر، جَشْويّة التَّجميع المُزَنَّد، عَطِرة خلال النَّهار فقط، كأسها قصيرة الشَّكل الجُريْسيّ، أسنانها العُليا طويلة الالتحام أكثر من سواها، زَورقها حاد. القُرون رقيقة، مُتطاوِلة، مضغوطة، قليلة الانخفاض بين البزور، مهدها منطقة البحر المتوسط.

المُركِّبات - تحتوي البزور على كُوزونيلِّن وهو مزيج من هيتروسيدات مُختلفة، وعلى كُوروتُوكُسِيجانِيْن Corotoxigénine تَركيبُه الكيميائيّ C23H32O5

الخصائص - المادتان مقويتان للقلب. الاستعمال - الإصابات القَلبيّة.

٣٧- أناسِيْكُلُوس قالَنْسِيا، قُنَيْطَسَة فَانْطَسَة فَانْطِسَة فَالْنْسِيا، قُرَيْطُفَة (٣)

Anacycle de valence (F)
Anacyclus velentinus (S)

الإسم التونسيّ الشَّعبيّ قُرِيْطْفَة، وهو نَبات قليل الوَبْر من فَصِيلَة المُركَّبات، سوقُه مُنتصِبة، أوراقها ثُنائيّة التَّشريح الرّيشيّ، ضَيِّقة التَّفصيص. الرّؤيسات الزَّهريّة مُزَنَّدة ومُؤلَّفة من أزهار صفراء اللَّون كلُّها أنبوبيّة، الطَّرفيّة منها ذات

أنا

151

لُسَيِّنات قصيرة جدًّا لا تَتَخطَّى القُلافة. الثِّمار أكنات بيضاء اللَّون، الخارجيّة منها مُزَيَّنة بجناح عَريض، شَفَّاف ورقيق جدًّا، الأخرى لها أجنحة ضيِّقة جدًّا. من هذا الجنس في لُبنان ثَلاثة أنواع أحدها إزهارها من كانون الأوّل إلى نيسان. هو عاقِر قَرْحا أو عُود القَرْح.

> الخصائص - يَشتهر لهذا النَّبات في النَّبات تنثر رائحة نَتِنة. تَسكين آلام المَعِدة والأمعاء، كما يشتهر في مُعالجة الإسهال.

> > طريقة الاستعمال - تُجفّف الأزهار وتُسحق ومن ثمّ تُخلَط مع السَّمِيد ويُحضُّر منها عَصيدة صالحة للتَّداوي. كما يُستعمَل أحيانًا نقيع الأزهار المَغلِيّة ويُؤخَذ منه فِنجانان أو ثلاث في اليوم.

٣٨- أَنَاغُوْرُس طَبِّيّ، يَنْبُوت نَيْن، خَرُّوتْ الخِنْزير، جَرُّوْد، أُمْ كَلْب

Stinking wood, Bean-clover (E) Anagyre fétide, Anagyris, Bois puant, Pudis (F) Stinkbaum, Stinkholz (D) Anagyris fœtida (S)

جَنْبَة بَرِّيّة طَبِّيّة ليفِيّة القَرْنِيَّات الفَرَاشِيَّة، ٣٩- أَنْغُسْتُورَة كَاذِبَة (١) فَرْعاء من قاعدتها، تَعلو ٢ إلى ٣ أمتار. فُروعها مُتَلَوِّيَة. أوراقُها ثُلاثية الفُصوص البَيْضاويَّة أو الإهْلِيلَجيّة الشَّكْل، طولها ٤ إلى ٥ سم، كَلِيْلَة أو حادَّة الرَّأس قليلًا . أزهارها عَناقيد مِحوريّة مُقَنَّبَة مُزَنَّدة. الكأس مُحَدَّية، خُماسية الأسنان القصيرة المُثَلَّثة الشَّكل. أصفر اللَّون

الباهِت، طوله ٢ إلى ٣ سم. الأسدية عَشرة حُرَّة. قرون طويلة تبلغ ١٠ سم، بُزورها بَيضويّة الشَّكل، طولها ٨ ملم، لَونها من البَنفُسجي إلى المُحْمّر.

المُركِّبات والخصائص - جميع أقسام

تَشتهر الأوراق والبزور على أنَّها أدوية مُقَيِّئة ومُسهِّلة. استخرج منها كُلِّ من هاردي وغالوا عام ١٨٨٥ الأناجيرين Anagyrine، وهو قِلَويد سامٌ جدًّا، تركيبه الكيميائي المُرَجَّع C18H20ON2؛ ويُوجَد كذلك السِّتيزين والسَّهَارْتابين؟ كما يُوجَد في البزور أيضًا الزَّيت ومادّة صباغية صفراء.

مُلاحظة - نَبات لُبنانيّ ساحليّ وحيد النَّوع يَرغب الأراضي المُهملة والمَواقع المَشْغُولَة حَديثًا، وهو ينحسر انتشارًا عن ذي قَبْل جاء عنه في «الموسوعة في علوم الطّبيعة»: القليل من نَقيع أزهاره وأوراقه يُنَشِّطُ الإيلاع والباه، والكثير منه مُقَيِّئ.

Angusture fausse (F) Cortex pseudo-angusturae (S)

الأنغستورة الكاذبة هي قِشرة أعطيت عَرَضًا من نَبتة من فَصِيلَة اللَّوغَانِيَّات هي ستريخُنُوس القَيء أو شُجَرة جَوْز القَيء

⁽١) التَّسمة للمؤلِّف.

Strychnos Nux-Vomica . وهي قِشرة طبِّية أعيد تسجيلها في الفَرْماكوبيا عام

المواصفات - إنّها إذًا سَمّ قَوي من المهم جدًّا عدم الإشكال بينها وبين القشرة المسماة أنغستورة حقيقية (أطلبها). وهي تَختلف عنها بشكل جَوهريّ ذلك أنّ حوافي قِطَعها ليست مَقطوعة بحدِّ ماثار، وإنّها عديمة الرّائحة وأشد مَرارة، كما أنّه يُمكننا أن نُشاهد على مَقْطَعها العَرَضيّ، فُرْضَةً أو خطًّا أبيض اللُّون، ليفيّ القِوام، يَقع في نَسيج القِشرة الحَشَوي اللَّحائي، الذي يُميِّزها بشكل قاطع عن الأنغستورة الحقيقيّة الّتي لا وجود له فيها.

. 1940

المُركِّبات - تحتوى هذه الأنغستورة خاصة على البروسِيْن وعلى القليل من الستريكنين.

تجربة اختبار - نُقطة من حامض نيتريك، تُوضع على السَّطح الدّاخليّ لِقشرة الأنغستورة الحقيقيّة، تُعطى بُقعةً مُصْفَرَّة اللَّون وقليلة التَّلوُّن؛ أمّا مع قِشرة الأنغستورة الكاذبة -S. Nux Vomica، فنَحصل على يُقعة دَمويّة اللَّون الأحمر، وهو تَلوين يُحدِثه البروسين Brucine.

٤٠ - أَنِيْسُون نَجْمِي صَغِيرِ الزَّهْرِ، بَدْيان صَغِيرِ الزَّهْرِ (۱) Little leafed star anis,

American staranis (E) Badianier à petites-fleurs (F) Kleine blütsternanis, Kleine blütbadianenbaum (D) Illicium parviflorum (S)

أ ن ي

يضم جنس بَدْيان ستّة أنواع من فَصِيلة المَغْنُوليّات؛ وهي شُجيرات ذات أوراق دائمة. أوراقُها وثمارُها عطرية، منها برائحة البانسون ومنها برائحة الغار أو الكَبَابَة وأخرى برائحة السّاسَفْرَا أو الكُنْ دَ ق.

في الولايات المتَّحدة الأمريكيّة يستعملون الأنيسون النّجمي الصّغير الزُّهر، وهو برائحة الساسَفْرا وثماره سامّة.

٤١- أَنِيْسُون نَجْمِى يَابانِيَ، أَنِيْسُون نَجْمِي مُوَقَّر (٢) Venerate Star anis tree, Japanese star anis tree (E) Badianier du Japon, Badianier vénéré **(F)**

Verehren Sternanisbaum, Japanisch badianenbaum (D) Illicium religiosum (S)

يَتمّ الخَلط بَين الأنيسون النَّجْميّ الحقيقي أي الصِّينيّ والأنيسون النَّجميّ الياباني الذي قد يتسبَّب استعمال ثماره بحوادث خَطِرة. يمكن التَّعرُّف إلى هٰذه الثِّمار من قياساتها، ذلك أنها أصغر من

⁽١) كلِّ التَّسمات ما عدا اللَّاتِنيَّة للمؤلِّف.

⁽٢) كل التسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسمية الفرنسية الأولى والتَّسمة اللاتنيّة.

أ ن ي

ثمار الأنيسون الصِّينيّ بثُلث مَرّة؛ كرابلُها ثمانية، قليلُها فقط يَبلغ النُّضْجَ التامّ. أُريْفة الصِّينيّ تكون مَبتورة بشكل عريض في قسمها العُلويّ، وتَبدو على شكل أسطوانة عريضة نسبيًّا تَتعلَّق بها النَّمار. أمّا عند اليابانيّ، وعلى عكس ما تَقدَّم، تَضيق الأُريْفة Columelle تَدْريجيًّا في قِسمها العُلويّ وتَنتهي برأس حادّ. ومن قِسمها العُلويّ وتَنتهي برأس حادّ. ومن جهة أخرى إن ثمار الأنيسون اليابانيّ ليست لها إطلاقًا رائحة الأنيسون اليابانيّ الصيّنيّ وطَعمه المُمَيَّزين جدًّا. ذلك أنها الصّينيّ وطَعمه المُمَيَّزين جدًّا. ذلك أنها تُذكّر بالحريّ برائحة الغار أو الكيابَة.

تَجْرِبَة - نغلي جُرَيْبًا (ثمرة جرابيّة) خاليًا من البزور ومكسَّرًا في مقدار ٢ إلى ٣ ملل كحول ٩٠ درجة لمدّة عِدّة دقائق؛ إن السّائل المُصَفَّق يَجب أن يضطَّرب مع أنيسون الصِّين بسبب وجود الأنيتول، إذا أضَفنا إليه بعض الماء المُقطَّر، ويَبقى صافيًا مع أنيسون اليابان.

المُركِّبات - إن غِلاف ثمار الأنيسون البابانيّ يحتوي على شِيْكِيْمِيْن C5H10O5 وعلى مِيْكِيْمِيْن كَيْمِيْنِيْكُ: وعلى حامض شِيْكِيْمِيْنِيْنِيْكُ: Shikiminique الذي يُكسبه سُمِّيّته، وعلى جوهر مُرّ يُدعى شِيْكِيْمِيْنِيْنِيْن. لا يلعب الأنيسون المُوقَّر في اليابان سوى دورًا مَأْتَميًا على علاقة بخصائصه السامة المعروفة جيِّدًا في ذلك البلد.

مُلاحظة - كُشِف الأنيسون النَّجميّ السامّ في أوروبا عام ١٨٨٩، مهضل المحوادث التي تَسبَّب

بها؛ ولقد تكرّر ذلك مرارًا منذ ذلك المحين، خاصة عام ١٩٠٧ وعام المحتين، خاصة عام ١٩٠٧ وعام ١٩٢٢. ومن هذه النّاحية تَجدر الإشارة إلى أن وجوده في الأنيسون النّجمي الحقيقيّ يَجب ألّا يُنظَر إليه دائمًا وكأنه غش أو تَزوير، ولكن هذا الخلط بين النّوعين كان يحدث عفويًا في أكثر الأحيان لأن التمييز بينهما كان يَصعُب الأحيان لأن التمييز بينهما كان يَصعُب الأنيسون النّجميّ السام المُستورد إلى الصّين يأتي من اليابان حيث لا يوجد الأنيسون المُوقَر. الله الأنيسون المُوقَر.

هُناك سبب آخر يُجيز الاعتقاد بأن خلط الأنيسونين كان سببه الظّلام الذي خَيم طويلًا على المَصدر البوتانيكيّ لهذا النَّوع أو ذاك. فحوالى أواخر القرن السّابع عشر عَرَف كَمْبْفَر Kaempfer شَجَرة اليابان من دون أن يَرتاب بسُمِّية بُزورِها. كارُل لِينَّيوس أشرك بين النَّوعين. عام ١٨٣٧ أشار سِيبُولُد شجرتين مُختلفتين وأن إحداهُما سامّة. Siebold أشجرتين مُختلفتين وأن إحداهُما سامّة. وبالرّغم من ذلك لم يَرَ بَايُّون Baillon في الشَّجرتين المذكورتين سوى مجرد في الشَّجرتين المذكورتين سوى مجرد ضرّبين لنوع واحد. النّباتان مُمَيَّزان في اليوم تمامًا، وذلك منذ العام ١٨٨٨ وحتى الآن.

أنِيلِين (ألوان ال-)

Aniline (couleurs d') (F)

يَتميَّز الأنيلين بعدد المَوادِّ المُلوِّنة الَّتي يُقدِّمها للصِّناعة.

واحد من أهم تلك المواد هو بَنَفسَج الأنيلين Violet d'aniline (أنيلايين، النيلين، أنْدِيزِيْن، فينامين، قِرْمِز الأنيلين، حَرْمَلِين، إلخ). وهي أوَّل مادَّة عُرِفت وتم اكتشافها عام ١٨٥٦ في پكين. مادَّة مُتبلَّرة تقاوم جيِّدًا تأثير الضَّوء، تَذوب في الماء، وأكثر منه أيضًا في الحامِض الأستيك، الكحول، روح الخشب، أو المادين (كحول في مزيج من المادّتين الأخيرتين (كحول مُمَيْئل méthylé).

إنّ أحمر الأنيلين مَثلًا، الّذي أطلِق عليه في البداية عددٌ كبيرٌ من الأسماء (فُوشِين، لأنّه يُذكِّر بلون الفُوشيا)، أزَلايين، ماجَنْتا، رُوبين، إلخ. إكتشفه هُوفْمَن عام ١٨٤٣، وحُضَّر صِناعيًّا عام ١٨٥٩. ألوان الأنيلين الخضراء الأكثر استعمالًا: أخضر بالألْدَهِيد، إكتشفه

أوزاب Usèbe عام ١٨٦٢. أخضر أن ي بيودور الأثيل (عام ١٨٦٦)؛ أخضر بالبُود..

أزرق الأنيلين إكتشفه عام ١٨٦٠ كلَّ من جيرار ودُولير. أزرق باريس (١٨٦١). بَنَفسَج باريس (١٨٦٦). أسود الأنيلين إكتشفه لايتْفُوت عام ١٨٦٣، وهو لون أسود مُخمليّ جميل جدًّا وغنيّ جدًّا، لا يذوب بالماء والكحول والأثير والبنزين والقلى والحوامِض؛ وهو يَتميَّز جدًّا بلا إمْحائيَّته ولا يُوضع أو يُستعمَل إلّا عن طريق الطَّبع.

الاستعمال - إنّ استعمال ألوان الأنيلين شائع جدًّا في الصِّناعة والإقتصاد المَنزليّ؛ وهو يُستخدَم أيضًا لصُنع أنواع مُختلِفة من الحبر المُلوَّن، ولتلوين المُلبَّس أي اللَّوز المُسكَّر، والمشروبات الروحيّة، والمُربَّيَات، وعُصارات الفاكهة، وبَعض الخمور والشَّرابات، ومُختلَف مَنتوجات صِناعة العُطور.

ر ب

٤٢ - پَارَيْرَا براڤا، كُونْدُودَنْدَرون لِبْدِيّ، كُوكُولُس كُونْدُودَنْدَرُون، كُوكُولُس عَرِيض الوَرَق^(۱) Pareira brava (E) Pareira brava (F)

Chondodendron tomentosum, Cocculus Chondodendron, Cocculus plathyphylla (S)

الپارَيْرا براقا إسم يُطلق على جذر نبات من فصيلة القَمَريّات كان يُعْتَقد لزمن طويل أنّه جذر Cissampelos Parcira L. النّضح فيما بعد أنّه بالواقع جذر الكوندودندرون، وهو جذر مصدره الكوندودندرون، وهو جذر مصدره البرازيل، يختلف حجمًا من قدر الإصبع إلى حجم الذّراع، ليفيّ، مُتَلَوّ، أسود اللّون البُنّي من الخارج، مصفر اللّون البُنّي الفاتح من الدّاخل، يُبدي في مقطعه العَرضيّ طبقات مُتراكِزة مُؤلَّفة من خُزْمات من الألياف، وهي طبقات من كُزْمات من الألياف، وهي طبقات يسهل فصلها. الجذر عديم الرّائحة ومُرّ الطّعم.

المُركِّبَات - كوندودندرين، پالورين. وجد وِيغَّرْز في الجذر عام ١٨٣٨ قلويدًا

دعاه سِيْسَمْهالِين Cissampeline بالُوزِين Pélosine وهو قلويد قد يكون مماثلًا للبَابَايَارِيْن الموجود في نبات من فصيلة الغارِيّات يدعى Nectandra فصيلة الغارِيّات يدعى Rodici في الواقع أن الهارَايْرا براڤا يحتوي على في الواقع أن الهارَايْرا براڤا يحتوي على قلويدين هما: ألفا وبيتا كُنْدُودَنْدرين، قلويدين هما: الفا وبيتا كُنْدُودَنْدرين، مماثلان إلى الألفا والبيتا بَابَايَاريْن، تركيبهما الكيميائي C36H38O6N2 تركيبهما الكيميائي .

الخصائص - مُضاد للتَّشنَّج، مُضاد للألم. الجذر مبوِّل، ولكنّه نادرًا ما يُستعمل نقاعة بنسبة ٢٠ بالألف، أو يستعمل على شكل مستخلص مائع يُؤخذ منه غرام إلى ٤ غرامات في اليوم.

الاستعمال - مغص الكبد، مغص الكلية، ذُبحة الصدر، ربو، طمث مؤلم، ولادات، إلتهاب المثانة البروستاتي، آلام روماتيزم.

طريقة الاستعمال – خمس نقاط من الصبغة في ٢٠٠ غرامًا من الماء. ملعقة كبيرة كل نصف ساعة في حال النوبات؛ مرتان في اليوم كعلاج وقائي، لفترات من ٨ أيام تفصلها فترات من التوقف تدوم ٤ أيام. كما يؤخذ من هذا الدواء تحاميل مُسكّنة.

ملاحظة - إن ما يسمّى Cappeba هو جذر الكوندودندرون كاپيبًا(٢) الذي

⁽٢) التَّـمية للمؤلِّف.

يختلف بالكاد عن جذر الباريرا، وهو مبوّل قوي. وذكر أن الكُرار يعطي قلويدًا طبيًا يدعى د - توبوكورارين يستعمل كمسترخ عضلي، ويستخرج من أنواع مختلفة من جنس ستريكنوس، إلا أن مصدره الأساسي هو جذر الباريرا براقًا الذي أعيد تسجيله في الفرماكوبيا عام ١٩٧٥.

Batiator (۱) بَثْبَاتُور، بَتْجَنْجُور (۴ – ٤٣ (Racine de), Batjenjor (F)
Vernonia nigritiana (S)

القُرْنُونِيَا (٢) جنس نَباتات مُعمَّرة قَوية من فَصِيلة المُركَّبات، تَعلو من ١,٥ إلى ٢ مترًا. أوراقُها مُتعاقبة، بسيطة، بيضيّة سِنانيَّة. رُؤيساتُها سَنَميّة أو عِذْقيَّة التَّجميع العَريض. أزهارُها أنبوبيّة، خُماسيّة السُّيور، مُزدوجة الأقلام المُستطيلة المِخْرَزِيّة الرَّأس. ثمارُها أكنات مُزَوّات ومقطومة. والبَثياتور هو جذر النَّوع: قُرْنُونِيا زنْجيَّة (٢).

المواصفات - البَتْيَاتُور جَذْر طويل، نَحيل، أسطوانيّ ومُجَعَّد طوليًّا، مُرْمَد اللّون، واضح المِكْسَر، حامِز الطَّعم الخَفيف، رائحتُه مَعدومة أو مُغشِية خفيفة، يَكثر استعماله على السّاحل الأفريقيّ الغربيّ.

المُركِّبات - يَحتوي الجذر على

(٢) التَّسمة للمؤلِّف.

هيتروسيد يدعى قُرْنُونِيُوسيد، وتُستخرج ب منه مادّة تُدعى قُرْنُونِيْن، تَركيبُها الكيميائيّ ركيبُها . C10H24O7

الخصائص - دافع للحمّى، مُقَيِّع.

الاستعمال - أكثر ما يُستعمل كدواء دافع للحمّى على السّاحل الأفريقيّ الغربيّ؛ إذا سُحق يُمكن إعطاؤه بالمقادير المُقيِّئة ذاتها الَّتي تُعطى من عِرْق الذَّهَب؛ وهو يُقَدِّم خَدَمات كبيرة للزُّنوج الَّذين يُكثِرون من استعماله في مُعالجة حالات الإسهال والديسنتيريا.

٤٤ - بَرْنُوف، رَاسَن البَراغِيْث،
 شَاهْبَانَج، طباق البَرَاغِيْث، طَيُّون الذُّبَاب
 Flea-wort, Flea-bane, Ladies' gloves
 (E)

Conyse, Conyze, Aunée conyze, Herbe aux puces, Herbe aux mouches (F) Dürrwurz, Grosses flöhkraut (D) Conyza squarrosa, Inula conyza, Inula vulgaris (S)

نَبات بَرِّي زَغِب ولِبْدِي قليلًا، مُحول أو مُعمَّر من فصيلة المُركِّبَات الأنبوبيّة الزَّهر يَعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه مُعَثْكَلة أو مُعَذَّقة عديدة الرؤوس. أوراقه إهليلجيّة سِنانيّة، الجَذريّة منها مُخفَّفة إلى عُنُق طويل، السّاقيّة لاطئة. رؤيساته مُخروطيّة الشّكل المُنْقلِب إلى نِصف كُرويّة، قصيرة الزِّنادات. قُنابات القُلافة حادة، ورَقية بمثلّث صغير أخضر على رأسها. أزهاره عديدة الصّفوف، لا

⁽١) التَّسميتان للمِؤلُّف.

ب س ك تَتَخطَّى القُلافة، ثُلاثيَّة التَّشريم، قصيرة اللَّون اللَّسان، مُصفَرَّة أو مُحمرَّة اللَّون

الخفيف. الأكنة خشنة.

الخصائص والاستعمال - أعيد تسجيله في دستور أدوية ١٩٧٥. كان هذا النبات يُعتبر في الماضي مُطبِثًا وشافيًا للجرح. أوراقه كانت تُخلط أحيانًا، وبشكل عَرَضيّ، مع أوراق الديجيتال، من قبل

اه ٤- بسكويت طارد للديدان بالسَّتُونِيْن Biscuits vermifuges à la santonine (F)

جامعي الأعشاب؛ يمكن كشفها

والتعرُّف عليها بسهولة.

سَتُونِين صِرْف معينة بسكويت جامدة كمية كافية لصنع ألف بسكويتة. كل بسكويتة تحتوي على ٠,٠٥ غرام من السَّتُونين. يعطى منها بسكويتة إلى بسكويتين، حسب عمر الأولاد.

بسكويت طارد للديدان بالسَّنتُونِيْن سَنتُونِيْن ١ دسّغ

عجينة بسكويت، كمية كافية

لصنع بسكويتة، نعطي ربعها أو نصفها أو بكاملها، وحسب قوة الولد، لكي يأكلها.

إن مقادير أقْرَباذِين ١٩٤٩ القصوى هي ما يتبع: أولاد من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة: ١٠٠٠ غرام مقابل كل سنة من العمر، حد أقصى ١٠١٠ غرام للمجموع وفي ٢٤

ساعة. أما بموجب الفرماكوبيا الفرنسية الحديثة فيجب الامتناع عن إعطائها للأولاد.

(١) بسّيْدِيَا مُسْكِرَة، خَشَبِ الكَلْبِ - ٤٦ Jamaica dogwood (E) Piscidie, Bois de chien (F) Piscidia Erythrina (S)

شُجيرة مُعمَّرة من فَصيلة القَرْنِيَّات مُنتشِرة جدًّا في أمريكا الجَنوبيّة، الأنتيل، وخاصّة في المارتينيك. أوراقها، وثمارها، ولحاؤها تمتلك خصائص مُسْكِرة وهذا ما أكسبها إسمها الفَرنسيّ. أهل تلك البلاد يَستعملونها في إسكار السَّمك كما يحدث ذلك في مناطق أخرى بواسطة ثمار السِّنْدِيل أي سَمّ السَّمَك. الإنكليز يُسمُّونها «خشب الكلّب»، وهو الاسم الذي يُطلقونه أيضًا على قُرْنُوس فلوريدا. القشرة هي المستعملة.

المواصفات - تقع قشرة الجذر في قطع طويلة بعض الشيء وغير منتظمة بالمرّة: وتكون القشرة عمومًا مَلْوِيّة إلى الدّاخل أو مُرتَّبة على شكل أنابيب، صفحتها الخارجيّة رماديّة اللّون عليها أثلام طُوليّة متصالبة، قليلة العُمق ومزرقَّة اللّون، صفحتها الدّاخليّة رماديّة اللّون، مُخَطَّطة طوليًّا. طعم القشرة حامز.

المُركّبات - تحتوي القشرة الجذرية

⁽١) التَّسميتان للمؤلِّف.

على پشيدين، وهو مادة متبلّرة، لا تذوب في الماء، قليلة الذَّوبان في الكحول البارد، ذَوّابة جدًّا في الكحول السّاخن؛ وعلى حامض پسيندي، ومن الأرجح أنها تحتوى كذلك على مركِّب فعّال آخر.

الخصائص وطريقة الاستعمال – الأطبّاء الأمريكيّون يستعملون قشرة الپسّيديا كمخدّر ومهدّئ، على شكل مستخلص مائع بمقدار ۱ إلى ٣غ. أو مستخلص رخو بمقدار ١,٠٠ إلى مستخلص رخو بمقدار ٢,٠٠ إلى ١٠,٠٠ إلى ٢غ. في اليوم، وصبغة بمقدار ٢

Campeachy wood, Log بَقَم أَسْوَد - ٤٧ wood (E)

Campêche, Hématoxyle (F)
Campeche baum, Campecheholsz (D)
Hæmatoxylon campechianum (S)

شَجرة شائكة حُرجيّة صَناعيّة من سبط قبيلة السِّيْزَالْبِينِيّات وفصيلة الفَرْنيّات تعلو من ٧ إلى ١٢ مترًا، مهدها أمريكا الاستوائية والأنْتِيْل، تنتج الهيماتُوكْزيلين. مجموعات من الأوراق الرّيشيّة الصَّغيرة تبرز على العِقد الشّائكة في الفروع والأغصان. الورقة من ٢ إلى أزواج من الوريقات العميقة التّقطيع. ومجموعات كثيفة من الأزهار الصَّغيرة الصَّغرة ومُخمونًا اللَّون المُستحبَّة العَرْف، تُعطي قرونًا متطاولة ومستدقة الطَّرفين. قُشورها قابضة ومُضادة للديسنتيريا.

المُرَكِّبات - هيماتوكزيلين

(إيماتوڭزيلين)، مرادفه هيماتوكزيلول بق ن Hé(Hæ)matoxyline ، وهو مُشْتَق عديم اللُّون أو أبيض اللُّون Leucodérivé تركيبه الكيميائي هو C₁₆H₁₄O₆، يُقابل الهيماتايين، يُستخرج من جِلْب خشب البَقَم الأسود، وهو كاشف تحليلي ومُثَبِّت الصِّباغات ومُلَوِّن يُستعمل في علم الحياة ودَلِيْل كيميائي مُلَوَّن. هيماتَاييْن وهو مادَّة مُلَوِّنة حمراء تركيبها C16O12O6 تَنتج من تَأْكُسُد الإيماتوكزيلين؛ وهو مادّة تُستعمل أيضًا ككاشف تَحليلي. خَشَب البَقَم أي الخَشب الأزرق أي خشب الهند: Bois de campêche هي خُطَيْبات أو كَسْرات أو مسحوق أو مستخلص أثيري مائي من خشب البَقَم الأسود، يُستخدم لصنع أنواع اللُّكُّ وأنواع الحبر، ويحتوي على الهيماتوكزيلين. مُستخلص البَقَم Extrait de campêche، هو كتلة لامعة، مُسودّة اللُّون البُنِّي، تَحصل من إنهاك خَشَب البقم إنهاكًا مَنْهَجيًّا، وهو يحل محلّ الخشب ذاته وبفائدة أكبر في كافّة أوجه استعماله.

Devil's-bit scabious (E) بَقَنْقُومُون – الله Scabieuse, Mors du diable, Tête de loup (F)

Tenfelsabbiss (D)
Succisa pratensis (S)

نَبات عُشبيّ منتصب من فصيلة الدِّبْسَاسِيَّات يعلو حوالى ٤٠ سم. جذوره حُزْمِيّة مسودة اللَّون. ساقه هزيلة

ب ل خ

متفرّعة. أوراقه كاملة، بيضويَّة متطاولة، ضُمِّيَّة التَّجميع القاعديّ. أزهاره في رؤيسات كُرويَّة الشَّكل، مزنَّدة. الكأس رباعيّة الفصوص، وكذلك التّاج الذي يكون لونه إلى الأزرق أو الورديّ. الثَّمرة أكنة مُضلَّعة.

المُركِّبات - عفص، سكابيوزِيْن، صمغ، صابونين، سَكَّاروز.

الخصائص - منتًى، مطمث، مبوّل، معرّق، شافِ للجرح.

الاستعمال - النبات بكامله. أكزيما، التهابات الملتحمة، جرب، كدمات دابغة، قوبات، سفلس.

طريقة الاستعمال - نقاعة، مستخلص سائل، صبغة، شراب، ماء مقطّر. يشيع استعمال هذا النّبات في الأرياف الأوروبيّة في كمادات من النّبات الغض المفروم على الظّواهر الأكزيمائيّة وأمراض جلديّة أخرى. ماؤه المُقطَّر، في قطرة عَينيّة، أعطى نتائج جيّدة في التهاب الملتحمة. أوراقه الرَّبيعيّة الغَضّة تؤكل في بعض المناطق الأوروبيّة مضافة إلى سلطات أخرى. الاعتقاد السائد أنّها في معالجة الجرب. لصبغتها عمل خفيف ولكنه أكيد في معالجة الكدمات.

Silk vine (E) بَلَخِيّة يُونَانِيّة - ٤٩ Périploque grec (F) Echte hundsschlinge (D) Periploca græca (S)

- جُنَيْبَة سوقها مُتطاوِلة مُلتفّة نوعًا ما؛ أوراقها مُعَنَّقة: P. græca

- جَنْبَة مُنتصِبة؛ أوراقها لاطئة أو شبه لاطئة: P. angustifolia

البَلَخِيّة اليونانيّة جُنيّبة أنيقة من فصيلة الصُّفُّلَابِيَّات، ليفيّة القاعدة بعض الشَّيء، مَرْطاء. ساقها غليظة، مَدّادة أو صاعدة، مُلتفَّة، تَطول عدَّة أمتار. أوراقها متقابلة، أوراق بعض الفسائل تكون مُخفِقة، خَطِّيَّة، حادّة، الأوراق الباقية بمعظمها، وخاصة تلك التي تجاور الأزهار، تكون بيضيّة إلى متطاولة سِنانيّة، حادّة الرّأس، مستديرة ولكنها غير قلبيّة القاعدة، مُعنّقة، قد تبلغ وتَتَخطّى ٧×٥ سم. أزهارها في سنمات إبطية مُتفرَّعة. سُويقات وزُنيدات مَرْطاء. كأس قصيرة، عميقة الانقسام، فصوصها حادة. التّاج أكبر بكثير من الكأس، قصير الالتحام القاعدي، فصوصه ٤ إلى ٥، منبسطة، متطاولة، مَلْوِيَّة ، بُنِّيَّة أو مُخضرَّة اللَّون، مَرْطَاء في وسطها، عريضة الحوافي الخمليّة بأوبار بيضاء مُحَلَّمة. في وسطها إكليل من ٤ حرشفات شائكة، ذات أذنين تنتهيان بحافة مسودة اللُّون ومُحدَّبة. الثِّمار جِرَابِيّات مَرْطاء، طويلة، مستدقّة الرّأس، متباعدة بعض الشيء.

المُركِّبات - تحتوي، خاصة في قشرتها، وبنسب أقل في أوراقها، على هيتروسيدين هما: پَاريپْلُوسِين (پاريپلوكوسيد) تركيبه الكيميائيّ

 $C_{36}H_{56}O_{13} = 696,8$ تّم اکتشافه عام $C_{36}H_{56}O_{13}$ ، ترکیبه $C_{30}H_{46}O_{8}$.

الخصائص والاستعمال - تُستعمل البَلَخِيّة أحيانًا في مناطق مجاورة للبحر الأسود وأوروبّا الوسطى، كمقويّة للقلب ومضادّة للرّبو، على شكل مستخلص ما على أو صبغة. إن هذا الدَّواء هو دواء خطر.

تبدو الهيتروسيدات من دون فائدة على الديجيتالين أو على أنواع الستروفَنْيين. هنا بعض الصُّقلابيّات المتقاربة من البَلَخِيّة في الهند وأفريقيا الجنوبية، تمتلك جذورًا وسوقًا رائحتها رائحة الوانيلين العذبة أو رائحة الهليوتروپين: Hemidesmus indicus; chlorocodon .whitei

Balsam (E) البلاسم Baumes (F) Balsam (D)

بَلْسَم جَنَفْيَيْڤ، دِهان جَنَفْيَيْڤ de Geneviève زیت زیتونزیت تربَنْتین ۸۰

	C	
٤ غ	أصفر	شمع
۱ غ	ں أحمر مسحوق	صَنْدَا
۽ ج	•	کافہ

مُجِّد في الماضي في معالجة الإنْخِضادات والحُدُور والتَّقَرُّحات.

بَلْسَم دُوْرِیْه Baume Duret

غ	۲									ٔ بن	سِ	ُور	ريز
غ	١٥							Ļ	ئىد	مُر،		یت	کبر
ٔ غ	۲٦						۴.	ديو	سو	الص	ن ا	ار:	بُور
غ	۱٥		 ,	 		 			4	کاد	JI	ت	زیہ
غ	۱۸		 ,	 	 	 		ج .	و-	لنر	U	راذ	قط
غ	۱۳	٥	 	 	 	 		ئي	ما	K	ڹ	ولي	Y
							. ر	همً	مر	ر .	<u>و</u> ض	ر نح	1

٤ ٤ غ	
٤	غَيّاكُول
٠١٠	كافور
٣٠	أسِتُون
محلم لًا .	ن نُحفُ

نضيف المحلول إلى المرهم بمقادير قليلة ونستعمل زيت الخروع كمادة رابطة:

زید خروع ۲۰

بَلْسَم سَانْشِيز المضاد لداء المفصل Baume antiarthritique, de Sanchez

٠٠٠٠	صابون
٨ غ	كافور
١٢٥ غ	روح الخزامى
١٥ نقطة	زيت نعنع طيّار (نقاط)
١٥ نقطة	زيت قرفة (نقاط)
١٥ نقطة	زیت خزامی طَیّار (نقاط)
١٥ نقطة	زیت کبش قرنفل (نقاط)
١٥ نقطة	زيت جوز الطّيب (نقاط)
١٨ نقطة	زيت ساسفرا (نقاط)
٠٥٠ غ	أثير أستيك

ب ل س

ب ل س

بَلْسَم عِطْرِيّ baume aromatique زيت كبش القرنفل ١٢٥ غ

زيت جوز الطيبزيت جوز الطيب روح ثمار العرعر ٢٠ غ

نمزج الكل جيّدًا.

اختلفت تركيبة هذا البلسم في كتب الوصفات اختلافًا كبيرًا.

 مزيج زيتي بلسمي ٣٠غ، نشادر سائل زنجبيل ٦غ، ألوة ٤غ. ٤غ، زيت بابونج طيّار ٢٠ نقطة، كحول مُكَرّر ١٥غ. كان يستعمل ضدّ ضعف النظر في تمسيدات على الجفون. -ملح قرن الأيِّل ٠,٦غ، إفراز القُندُس ٢,٥غ، زيت فَيْجَن ٦ نقاط، زيت جوز طيب ٧غ. في تمسيدات الصدغين في حال الهستيريا. إن هذا البسلم الأخير يُطلق عليه بنوع خاص إسم: البلسم العطرى الأثيري. - زيت جوز طيب ۳۰غ، زیت کهرمان ۲غ، زیت کبش قرنفل ۲غ، زیت خزامی ٤ غرام، زیت عرعر ٤غ. إن ما يسمّى زيت شُرْزَر Scherzer العطريّ ليس إلّا تعقيدًا لتركيبة البلسم السابق. - بلسم البيرو ٢غ، مِسْك ٠٠,٠٦غ، زيت كبش قرنفل ٢,٠٤غ، زبدة جوز الطيب ٧ غرامات.

عُنيبات غارعارعان عار نغلى ١٢ إلى ١٤ ساعة مع التحريك المستمرّ؛ نرفع عن النار ونبرّد. في اليوم التالي نسخِّن من جديد لمدَّة ٣ أو ٤ ساعات، ومن ثم نضيف بعيدًا عن النار:

تریاق ۸غ، زعفران ۸غ، مستخلص

نغلى مجدّدًا مع تحريك مستمرّ طوال ٧ إلى ٨ ساعات ونمرِّر بالقماش؛ نعيده إلى النار ونضيف:

تربنتين ٣٠٠ غ نسخِّن حتى لا يعود الدخان ينثر رائحة التربنتين، نرفعه عن النار ونضيف أيضًا: يخور، أصطرك، وينجوان مسحوقة، من كل واحد ٦ غرام.

نمرٌ ر مرة أخرى ونحفظ.

الاستعمال - مُجِّد كثيرًا في معالجة تشقّقات الثدى والبشرة، وفي معالجة القرحات، وتشققات الصقيع، والروماتيزمات، والمَلْخ، والتواء المفاصل. إن البلسم الإلهي يتقارب منه: Baume divin :

بَلْسَم الفارس لابُورد Baume du chevalier Laborde

غ	١	•	٠	٠		 		 . ,	,										ن	رد	يتر	ز	ن	یت	ز
غ	٦	•				 		 											ية	کِ	K	م	ر	عذ	-
غ	٦	٠			 			 			(~	دَرَ)	و	١	(بر	ف.	ú	ند	سَ	ر	وذ	-
غ	٦	•				 	 						٠.						ی	ذ:	دا	,	ار	ز ه	أز

Coffee-beans (E) بُنَّ أَخْضَر (Café vert (F)

Kaffee (D)

Coffea (S)

البُنّ الأخضر هو الحَبّ المُجفَّف المُقَشَّر للبُنّ العَربيّ Coffea arabica، والبُنّ Coffea canephora وضروبهما. وهو يحتوي على الأقل واحد بالمئة من الكافيين أي البُنين الذي يُحْتَسب بالنسبة إلى المادة اللهمائية.

المُواصَفات - البُنّ الأخضر ذو رائحة خفيفة وخاصة، وطعم حامِز ثم مُرّ. حَبّة البُنّ الأخضر تكون بَيضويّة، مُحدَّبة السَّطح الخَلفيّ، مُسطَّحة الوجه الأمامي السَّطح الخَلفيّ، مُسطَّحة الوجه الأمامي الذي تخترقه السُّرة طوليًّا على شكل تَلْم عميق فيه بَقايا من القشرة الملتصِقة بالسُّويداء. ويُراوح طول الحبّة من ١٠ بالسُّويداء. ويُراوح طول الحبّة من ١٠ إلى ٨ ملم، وهي صُلبة ومُخضرة اللَّون.

المُركِّبات - تَحتوي حُبوب البُنّ الخضراء على ما قدره: ٤ إلى ٥ بالمئة أملاح، ٦ إلى ٨ بالمئة مَواد شُكَّريَّة، ١٠ إلى ١٣ بالمئة مواد دُهنيَّة، ١٣ بالمئة پروتينات، زَيتان دُهنيَّان، حامض كافِتانيك أو كلوروجانيك ٦ إلى ١٠ بالمئة، قاعدة پوريك (مُشْتَق من الپورِيْن) ١ إلى ٢٠ بالمئة، الكافيين وهو جوهرها الفَعّال.

التَّحْمِيص - يَهدف تحميص البُنّ إلى

تَطوير وإنماء زيت مُحْتَرّ يُكسِب البُنّ طعمه وعَرْفه اللَّذان يَجعلانه مرغوبًا من كاقة الشّعوب. إن هذا الجوهر العِطريّ هو الكافِيُون Caféone بنوع خاصّ والذي يبدو أنه يتكوَّن على حساب حامض الكافِتانيك. بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن هناك تشكيل مُستمرّ في التَّحميص للموادّ التّالية: أسيتون، فورفورول، نُشادر سائل، تريمَتِيلَامِيْن، حامض نَملِيك، حامض خَلِيك، ريزورسين نَملِيك، حامض خَلِيك، ريزورسين

الاستغمال - اقترح البُنّ المُحمَّص كمادَّة مُطهِّرة، ولِسَتْر رائحة المِسْك، والحِلْتِيت، واليودوفورم، وإخفاء رائحة وطعم زيت كَبِد سَمَك المُورَة. وكان شراب البُنّ الرُّوحيّ (ليكور) يُستعمل في بعض الأحيان كدواء مُنشِّط في حالات التَّسمُّم بالمخدَّرات، ولسَتْر مرارة الكينا وسولفات المنيازيوم والسَّنَا أو السَّنَى.

البُنُّ المُحمَّص يَجب أن لا يحتوي على أكثر من ٥ بالمئة من الماء؛ ويمكن تغليف البُنّ أو تلبيسه مع السُّكَّر، ومع الزُّيوت، أو مع أيَّة مادَّة أخرى غير ضارّة، وعندما تتَخطَّى مادَّة التَّلبيس نسبة ٢ بالمئة فيجب ذكرها.

غِشَ البُنّ وتَقْلِيْدُه - إن غشّ البُنّ وتَقْلِيْدُه البُنّ وتَزويره يمكنه أن يَطال حبوب البُنّ والبَنّ المَطحون على السَّواء. إن الحبوب المُزيَّفة تَتَفَيَّتُ وتتفسَّخ في الماء

ب ن ا

130

الغال. ويُصار الكشف عن غش البُنّ المطحون بواسطة الفحص المجهري الخاص، حيث يمكن العثور بنوع خاص على بعض العناصر من حبوب السَّنَا والشَّعير والبَلّوط المَشوي والتين وجُذور الهِندباء والحمّص والترمس والخرّوب. إلخ...

إن استخلاص البُنّ المحمَّص المائيّ الحاصل بعد غليانه لمدّة ربع ساعة، يكون عادة بين ٢٧ و ٣٠ بالمئة. إن هذه الطَّريقة في التَّحديد تسمح الكشف عَمَّا إذا كان هناك إضافة لبعض الموادّ الغريبة أو إضافة بُن كان قد استُنفِذ سابقًا.

إن نسبة الرَّماد غير قابل الذَّوبان التي تتركها عيِّنة ما من البُنّ يمكنها أن تَدلّ إلى ما إذا كان البُنّ نقيًّا أو مخلوطًا مع الهندباء؛ مئة جزء من رماد البن تترك في الماء مقدار ٧٠ بالمئة من المواد القابلة للذوبان؛ أما مئة جزء من رماد الهندباء لا تترك منها إلى السائل المذكور سوى مقدار ١٧ بالمئة فقط. أما بالنَّسبة لتقدير البُنيَّن، فيطلب ذلك في دراسته الخاصة.

بَدَائِلُ البُنِّ - عندما أصبح استيراد البُنَ صَعْبًا خلال الفترة بين ١٩٤٠-١٩٤٥، أصبحت بالتّالي بدائله المُقترحَة عديدة جدًّا. وتجدر الإشارة إلى أنّه، بالرُّغم من عدم وجود الكافيُون، إن حبوبًا مُحمَّصة مُختلِفة تتمتَّع بعَرْف يُذكِّر نوعًا ما بعَرْف الدُرِّ.

الشَّعير والبَلوط الحُلو والتُّرمُس الأبيض هي بعض الأنواع المعروفة تمامًا في هذا المحال ومنذ زمن بعيد. ولقد استُعمِلت الصَّويا في بعض المناطق، الصَّويا في بعض المناطق، والأَسْطراغالوس بَيُوتي (١): Astragalus والنَّعمِل الفُول في bœoticus ليوماندي، والتُرمُس البُنّ» Eupinus أي الستُّرمُس البُنّ reticulatus Desvaux الشَّبكيّ (١)؛ ولقد شوهدت كذلك حُبوب الشَّبكيّ (١)؛ ولقد شوهدت كذلك حُبوب البَّقية المجلبان Lathyrus، وحُبوب أنواع الباقية المجلبان Vicia sativa وعيرها، وحبوب اللَّصَيْقي وحبوب النَّعيَ المَّالِيون الأبيض Ceratonia siliqua وحبوب الخَرُوب وحبوب الخَرُوب أنواع المَاقية وحبوب النَّعية وحبوب الخرُوب Ceratonia siliqua وحبوب الخروب وحبوب الخروب الخرو

البُنّ المُنتَزَع البُنيْن - لقد اقترر استعمال البُنّ الخالي من الكافيين لتحضير المشروب اليَوميّ لمرضى القلْب وللأفراد العَصَبيّين. إن هذا النَّوع من البُنّ يوجد في الأسواق العالميّة بأسماء وأشكال مختلفة. وللحصول على ذلك يُصار إلى إخضاع البُنّ الأخضر إلى معالجات خاصة، تُلاثم استنزاف البُنيْن بواسطة سائل حال طيّار. ولا يكون الاستخراج كاملاً: ففي المانيا يتسامح القانون بمقدار ففي المانيا يتسامح القانون بمقدار غرام من الكافيين في كل مئة غرام من البن، وفي بلاد أخرى (هولندة) لا يَسمح القانون سوى بنسبة غرام فقط.

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

المُنْ بَنَاقُسُ مَا يُكُ، جِنْسَن Panax épineux (F)

Acanthopanax (S)

جنس نباتات من فصيلة الأراليّات يضم Kalopanax و Eleutherococus؛ وهي أشجار أو شُجيرات تُزرع لأوراقها التَّزيينيّة بنوع خاص. ساقها شائكة عمومًا. أوراقها مُتبادلة، طويلة الأعناق، راحيّة أو مُتصبِّعة، مُعْبِلة. أزهارها صغيرة القَدّ مُخضرَّة اللَّون عمومًا، خيميّة التَّجميع تُشكِّل أحيانًا رؤيسات هامِيّة ضخمة. الثَّمرة عُنَيْبة سوداء اللَّون. منها:

أنواع أوراقها بسيطة راحِيّة، أنواع أوراقها مُتصبَّعة، ثُلاثيّة الوريقات، أنواع ذات ٥ إلى ٧ وريقات، نادرًا ٣.

٥٣ - بَنَاقَنْقَة لاطئة الزَّهْر، بَناكس لاطئ الزَّهْر، جِنْسَن لاطئ (٢)

Panax à fleurs sessiles (F) Acanthopanax sessiliflorum, Panax sessiliflorum (S) (2)

جَنْبَة من فصيلة الأرالِيّات مهدها منشوريا وشمال الصّين. فروعها قويّة وجالسة، مُزَوَّدة ببعض الأشواك فقط. أوراقها ثُلاثيّة الوُريقات في أكثر الأحيان، وهي متطاولة، سِنانيّة، مُستدقَّة الطَّرف، غير منتظمة التَّسنين،

(٢) كلِّ التُّسميات مَّا عَدا اللَّاتينيَّة لَّلمؤلُّف. ۗ

شبه مالسة. أزهارها إلى البنفسجي، كامدة، شبه لاطئة، كُرويّة التَّجميع على رأس سويقات قويّة ولِبديّة. الثَّمرة عُنيَّبة تَزيينيّة سوداء اللَّون.

ب ن ا

هَنْرِي، جِنْسَن مَنْرِي، جِنْسَن Panax de Henri (F) هَنْرِي (۳) Acanthopanax Henryi, Eleuthero-coccus Henryi (S)

جَنْبة من فصيلة الأراليّات تتقارب من الپناقَنْقة اللَّاطئة الزَّهر. فروعها مزيَّنة بأشواك معقوفة نادرة. أوراقها خمليّة الصَّفحة السُفلي، خشنة الصَّفحة العُليا، ثُلاثيّة إلى خماسيّة الوُريقات الشِّبه لاطئة. أزهارها مزنَّدة. مهدها وسط الصين.

ه ه - بَنَا قَنْتُة لاسِعة، بناكُس لاسِع، Panax piquant (F) (۳) جِنْسَن لاسِع Acanthopanax senticosus, Eleutherococcus senticosus (S)

جَنْبة من فصيلة الأراليّات فروعها جالسة كثيفة الكساء بشوك دقيق. أوراقها من ٣ أو ٥ وريقات مُعَنَّقة، إهليلجيّة أو بَيضيّة متطاولة مستدقّة الطَّرف، واضحة الشّكل المنشاريّ، فاتحة اللَّون الأخضر وهي فتيّة، مُزوَّدة بأوبار بُنِّيّة اللَّون على عروق الصَّفحة السُّفلى وبأوبار مُتفرِّقة على الصَّفحة العُليا. أزهارها في خيمات طويلة العُليا. أزهارها في خيمات طويلة

⁽١) التسميات العربية والتَّسمية الفرنسيَّة للمؤلِّف.

⁽٣) كل التَّسميات ما عدا اللَّاتينيّة للمؤلّف.

ب ن ج

السويقات على أطراف الفروع. منشوريا وشمال الصين.

الخصائص - قيل إن هذه الأنواع هي أنواع مُقوِّية ومُنشِّطة على غرار الجِنْسَن الشَّهير. مُركِّباتها الكيميائية وطُرق استعمالها غير متوفِّرة في المراجع الشائعة.

White مَنْج أَبْيَض، سَيْكَرَان henbane (E) Jusquiame blanche (F) Weisser bilsenkraut (D) Hyoscyamus albus (S)

نَبات حَولتي ومُحول كثيف مُتلبِّد من فصيلة البَاذِنْجَانِيَّات يَعلو من ٥٠ إلى ٦٠ سم، دَبق، ساقه مُنتصِبة، فَرْعاء. أوراقه كلُّها رَخُوة، مُعَنَّقة، قَلبيَّة الشَّكل أو مُزوّات القاعدة، بَيضاويّة الشَّكل الدّائري، مُثلَّثة بشكل مبهم. أزهاره لاطئة، ما عدا الدُّنيا منها التي تكون في الغالب قصيرة الزُّنادات، مُرتَّبة في سُنبلة وحيدة الاتجاه ومورقة، عَقْرَبيّة الشَّكل في البداية، مُتطاولة فيما بعد ومُنتصِبة. قُنابات مُزنَّدة تَتَخطّى الأزهاء، قلبيّة الشَّكل البَيضاوي، مُسنَّنة أو مُتطاوِلة في أكثر الأحيان، كاملة، مُخفَّفة القاعدة. الكأس التَّمريَّة منتصبة، أهُلبيّة، باهِتة اللُّون الأصفر، غير مُعَرَّقَة. نصل منحن أو شبه منحن، فصوصه غير متساوية. الأسدية أطول من العُنق.

الخصائص والاستعمال - يَتمتّع هذا النَّوع الذي يشيع طوعيًّا في لُبنان بخصائص البَنْج الأسود ذاتها. ولكنه لا يُستعمل أبدًا. أعيد تَسجيله في الفرماكوبيا الحديثة عام ١٩٧٥ (البزور).

Benzoate de بَنْزُوَات الصوديوم sodium (F)

ربطة مع المعاد، وبتسخين خفيف مع في قليل من الماء، وبتسخين خفيف مع إضافة الصود الكاوية السّائلة بكثافة الصّود الكاوية السّائلة بكثافة بشكل كامل. يُبَخّر المحلول تحت بَرس يُوضع فوق حامض سولفوريك، فيعطي البنزوات المتبلّرة في إبر مُتَزَهِّرة: Efflorescentes .

المواصفات - الملح المَخْزَنيّ هو الآن الملح اللّامائيّ؛ يَحتوي على ١٥,٩٦ بالمئة من الصّوديوم وعلى ٨٧,٧٤ بالمئة من حامض البنزويك. إنه يذوب في ١,٨ من حامض البنزويك. إنه يذوب في ١,٨ عند جزء ماء عند +٢٠٠ سغ وفي ٤٩ جزء كحول ٩٠ درجة، وفي ٣٥٠ جزء من الغليسرين. محاليلُه المائيّة العِشْريّة تكون مُتعادلة أو قلويّة خفيفة. وهي تُعطي تَفاعُلات ملسوديوم وتَفاعُلات البنزوات. النَّتاج المَخْزَنيّ يَجب أن يَحتوي كحد أدنى التضادّات من بَنْزُوات الصّوديوم. المله من بَنْزُوات الصّوديوم. المناحة من بَنْزُوات الصّوديوم، أملاح الكلسيوم، أملاح

الرُّمال الصَّفراوي . ۗ

والموادّ النّشويّة والأجسام الدَّسمة.

الخصائص والاستعمال - بَنزوات الصوديوم هو الأكثر استعمالًا من البنزواتات: كدواء مُسيِّل مُميِّع وكدواء مُزيل للإفرازات في التهاب القَصَبة °٦٠ سغ في محيط مائي. والشُّعَب وفي حال التهاب الحنجرة، وهذا هو استعماله الأساسيّ. يَدخل في عدد كبير من الأدوية المتخصّصة؛ كدواء مُضادّ للنُّقْرس؛ كدواء مُطهّر للجهاز التَّناسليّ البَوليّ، في التهابات المثانة وفي التهابات الحُوَيْضَة والكلية؛ وأخيرًا در جة . كدواء مُدِرٍّ ومُفْرِغِ للصَّفراء في حال

> مقاديره الاعتيادية من ٠,٥٠ غرام إلى غرام واحد للجرعة ومن غرام إلى ٤ غرامات لكل ٢٤ ساعة. للأولاد: من صفر إلى شهر: الامتناع عن إعطائه، ومن شهر واحد حتى ١٥ سنة: ٠,٠٥ غرام مقابل كل كيلو تُوزّع على ٢٤ ساعة.

٥٨- بَنْكِرِيَاتِيْن Pancréatine (F)

البنكرياتين مادة تحصل من جراء تجفيف لُت بنكرياس (غدة حلوة) الخنزير بحرارة أدنى بكثير من صفر سغ. تُنظُّف المادّة المُجفَّفة من موادّها الدَّسِمة بواسطة الأثير ومن ثم تُسحَق.

يحتوى البنكرياتين على عِدّة أنزيمات مُحَلِّلَة مائية، أهَمُّها: تربيسين، أميلاز، لِيْپّاز أي شِحْمَاز، وهي خمائر تُؤثّر بالوقت ذاته على المواد الهيوليناتية

المواصفات - يقع البنكرياتين على شكل مسحوق باهت اللَّون الأصفر؛ وهو سهل التلف والفساد ويفقد من نشاطه بالتَّسخين عند حرارة أعلى من

البنكرياتين لا يذوب في الماء ولا في الكحول الخفيف (٢٠ إلى ٣٠ درجة) ولكنه يَتخلَّى لهذين السَّائلين عن قسم من مُركّباته؛ إنّه لا يذوب في كحول ٩٥

يتم عمله على المواد الهَيوليناتيّة في محيط مُتعادَل، خفيف القِلْويّة جدًّا أو خفيف الحموضة جدًّا: وهو يحلُّها ويُحوِّلها إلى يَيْتُونات وحوامض أمينيَّة؛ وهو يُسَكِّر المواد النَّشويَّة، ويَسْتَحْلِب ويُصَبِّن الأجسام الدَّسمة.

الحفظ - في قارورات مُقفلة، مُبَرُفَنَة، بمعزل عن الحرارة والضوء.

الاستعمال - يُعطى البنكرياتين في معظم أمراض الأنبوب الهضمتي وفي بعض إصابات البنكرياس، وحده أو مشتركًا مع خمائر أخرى كما إلى الكينازات منذ بعض الوقت.

طريقة الاستعمال - يجب أن يعطى بمقدار ٠,٥٠ إلى ٢ غرام في اليوم على شكل بيلولات مُقَرْتَنَة أو مُجَلْتَنَة.

هناك عِدّة مُستحضرات صَيدليّة معروفة مُصنَّعة أساسها النكرياتين، حيث يشترك فيها غالبًا إلى أنزيمات هضميّة أخرى.

ب و د

Wild May (۱) مو دُوفِلُون دَرَقي – ه apple, Mandrake (E) Podophylle, Podophylle en bouclier, Podophylle petté, Pied de Canard (F) Podophyllum peltatum (S)

نَبات بَرِّي مُعمَّر من فصيلة البَرْبَرِيسِيَّات ينبت بكثرة على ضفاف السواقي في الولايات المتَّحدة الأمريكيّة. أوراقه واسعة، طويلة الأعناق، مزدوجة الأسنان، خماسيّة سباعيّة الفصوص. أزهاره فرديّة، كبيرة، بيضاء، بين ورقتين درقيتين، بتلاتها تسعة، الثلاث الخارجيّة منها أعرض من سواها؛ ٣ كأسيّات بتكلانيّة، زائلة؛ الأسدية ضعف عدد البتلات. ثمارها بيضانيّة، لحميّة، عنها أعرض خفيفة الحموضة، وكل في أمريكا باسم «تفاحة أيار».

الرِّيزوم بحجم الإصبع الصغير، مفلطح بعض الشَّيء، بُنِّيّ اللَّون المُرمَدّ. يقع هذا الريزوم في قطع تحمل، على مسافات متساوية، مفاصل عِقديّة غليظة مزوَّدة بحزوز دائريّة، وتبدي على وجهها العُلويّ ندبة بيضاء هي أكثر الفروع الهوائيّة، ونحو القاعدة السُّفلي، أثر التصاقات الجذور.

رائحته غير مستحبّة، طعمه مُرّ، حامز، ومُغثِ.

بحبوب من النَّشاء تكون تارة بسيطة يبلغ قطرها ٥ إلى ١٢ ميكرون، وطورًا تكون مركَّبة من ٢ إلى ٦ عناصر؛ بعض الأوعية المجدَّعة، الشَّبكيّة، أو الحَلَزونيّة الشكل، وبعضها الآخر، وهو الأَنْدَر، يكون مع تنقيطات دقيقة.

المُركِّبات - يحتوي على أوقصالات

مسحوق الريزوم فاتح اللُّون البُنِّي، غنيّ

المُركِّبات - يحتوي على أوقصالات الكلسيوم، نشاء، بَرْبَارِيْن، صابونينات، راتنج من ٣ إلى ٨٪ هو الپُودُوفِيلِين.

الخصائص - مسهّل قويّ شُعَبيّ ممتاز، لا يُحدِث إمساكًا ثانويًّا، مدرّ الصفراء.

الاستعمال - الإمساك العادي خاصة عند المشلولين، الرمال الصفراوي.

طريقة الاستعمال - على شكل مسحوق، وصبغة، أو مستخلص في إنكلترة، وبنوع خاص في الولايات المتحدة حيث كان الپودوفيلن واحد من المسهلات القوية الأكثر استعمالًا. من الداخل: مسحوق في أقراص من وردوفيلين في أقراص أو بيلولات من الي مستغ (البراز بعد ذلك بحوالي ١٠- ١ يضاف سنتغ واحد من التلافي المغص.

من الخارج: مَسْح الپُودوفيل المحلول في زيت الڤازلين (٠,٥ إلى ١ بالمئة) لمعالجة، أو على الأوْرَام الحُلَيْمِيّة

التَّنَاسُلِيَة البَوْلِيَة: -Papillones génito . ينسب بعض الأطباء الأميركيون إلى البودوفيلين خصائص مضادة لداء السرطان.

Mothmulleine (E) بُوْصِيْر مُسْكِر – ۲۰ Molène sinueuse (F) Wollkraut (D) Verbascum gileadense, Verbascum sinuatum, Syn: Vervascum undulatum (S)

نَبات مُحول من فصيلة الخَنَازِيريَّات يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. مُغطّى بكساء قصير وكثيف، مُرْمَد أو مُصْفرّ اللُّون، يُصبح غالبًا أمْرَط. سوقه أسطوانية تكون عادة فَرْعاء من القاعدة. أوراقه القاعديّة لاطئة أو قصيرة العُنُق، نَصلها مِلْوَقِي متطاول، قياساته ٤-٣٥×٢+١٥ سم. أوراقه السَّاقيَّة لاطئة. إزهراره مُرتخ، عديد الفُروع. أزهاره بضُمّات من ٢ إلى ٧ على إبط القنابات العريضة القلبية الشَّكل المُثَلَّث المُستدقة الرّأس. الكأس من ٢٫٥ إلى ٥ ملم. التّاج أصفر اللُّون، قطره من ١٥ إلى ٣٠ ملم، ذات تنقيط شفّاف، لِبُدى الخارج. الأسدية خمسة. خيوطها ذات أوبار بَنفسجيّة اللُّون الأرجواني، الخَيْطان العُلويّان أمْرَطا الرأس. النَّمرة إهليلجية إلى شبه كُروية، قياساتها ٣-٥ و ٢,٥-٤ ملم، لبدية المظهر.

ملاحظة - نوع من البُوصير اللَّبناني بوط الله الذي نَفْتقِد تحاليله الكيميائية. ولعله يُسمّى هو أيضًا في بعض المناطق «حشيشة عَلْيًا» وتُستعمل بزوره لاتَدْويخ» الأسماك. وإنه من المعروف أن بزور هذا النَّوع تُستخدم في اليُونان طُعْمًا يجتذب الأسماك. ومما جاء عنه في «الموسوعة في علوم الطبيعة» أنّه: «عُشبة مُحوِلة، أزهارها بَنفسجية. ثمارها طبيّة يُقال إنّها مُسْكِرة».

(۱) أَوْط أَسْتَرَالَي، بُوْط رَفِيْع، حَفَاً (٦٠ Reed-mace, Small bulrush (E)
Typha d'Australie, Typhace, Massette des étangs, Quenouille, Tontaque (F)
Schmaler, Rohrkolben (D)
Typha australis, Typha angustifolia,
var. angustata, Typha angustifolia,
ssp. australis, Typha augustata (S)

نبات معمَّر من فصيلة البُوْطِيّات يعلو من 1,0 إلى مترين. أوراقها بحريّة اللون، عرض ٤ إلى ١٠ ملم. سنابله الذَّكريّة والأُنثويّة تتباعد من ٢ إلى ٥ سم، باهتة اللَّون البُنِّي؛ السُّنبلة الذَّكريّة تكون في بعض الأحيان أطول بكثير من الأخرى، وتنقسم إلى قسمين بحَصْرٍ أو تضييق بارز جدًّا؛ السُّنبلة الأُنثويّة أسطوانيّة الشَّكل، متطاولة قليلًا. إزهراره وإثماره في الربيع والصيف، في المناقع والبرك والحفر

⁽١) التَّسمية العربيَّة الأولى والفرنسيَّة الأولى للمؤلِّف.

بى ر الرطبة.

لخصائصه واستعمالاته المحتملة، راجع بوط عريض الورق.

الْحَفَر بَعِمَة مُضَادَة للحَفَر بَعِمَة مُضَادَة Bière antiscorbutique,
للحَفَر Sapinette (F)

الخصائص - مُضادّة لداء الحَفَر، مُشهّية، مُبوِّلة (دستور ١٨٨٤).

ملاحظة - يُمكن تقريب بيرة أخرى من هذه البيرة، وهي البيرة التي تُدعى Epinette أو Bière de Spruce، والتي تُحضَّر من الشَّعير، ودِبْس الشَّوَنْدَر، ومن بَراعِم أبيسَة كندا أو الأبيسة البضاء «Abies».

كان جايمس كُوك قد حَمَى طاقَمه دائمًا من داء الحَفَر بواسطة هذا المشروب خلال أسفاره حول العالم.

(۱) مَنْقُودِيِّ (۱۳ مَنْقُودِيِّ (۱۳ Racemose elder (E)
Sureau à grappes (F)
Sambucus racemosa (S)

شُجيرة أو شجرة فَرُعاء من فصيلة الخَمَانِيَّات، تعلو من ٣ إلى ٤ أمتار. لحاؤها بُنِّيَ اللَّون المرمَّد ولبابها مُصفر اللَّون. أوراقها متقابلة، ثُلاثيَّة التَّقسيم الرِّيشيِّ إلى وُريقات صغيرة الأعناق، بَيضويّة، مُستدِقَّة الرَّأس، مسنَّنة الحوافي. أزهارها مخضرة اللَّون، عُثكوليّة التَّجميع البَيضويّ الشَّكل الهرميّ. كأس أنبوبيّ، خماسي المهرميّ. كأس أنبوبيّ، خماسي الأسنان، وتاج خماسيُّ الفصوص. الشَّمرة عُنَيْبَة حمراء، مُحمضَّة الطَّعم، التَّعري بزورًا عديدة.

المُركِّبات - في الثَّمار: حامض تُفّاحي، حامض خَلِي، حامض دُرْديّ الخمر، سُكَّر، عفص، مادّة ملوّنة، في تامين «ث». في الأوراق: سَمْبُونيغرين، دهن، حامض ناردينيّ، حامض تُفّاحيّ. في البزور: زيت شَحميّ.

الخصائص - له تقريبًا خصائص البَيْلسان الأسود عينها؛ ويَدَّعي القُرويُّون في بعض مناطق أوروبا أنَّ البيلسان الأحمر أفْعَل من الأسود. الثَّمار مأكولة لذيذة الطعم، معرّقة،

⁽١) التَّسميتان للمؤلِّف.

مُسهِّلة، مُنقِّية؛ الأوراق من الخارج لحَلَّ الأوديمات وتخفيف ألم داء المفاصل، وهي مُعرَّقة، مُبوِّلة، مُصرُّفة حالَّة؛ اللَّحاء الثَّاني مسهِّل قوي يفيد في الروماتيزم والحصى والأوديمات.

الاستعمال - روماتيزم، عصير، حصى الكلى، أوديمات، إمساك، داء المفاصل، إلتهاب المفصل، الكريب والبَرْد، نقاعة، معجون عَسَلي، مسحوق.

طرق الاستعمال - نقيع ٢٥غ لحاء مجفّف في ليتر ماء يغلى ٥ دقائق أو أكثر ويغطّى ويصفّى ويؤخذ منه فنجانان في اليوم مع العسل. نقيع ٢٠غ أوراق مجفَّفة في ليتر ماء يغلى ٥ دقائق ويغطَّى ربع ساعة. فنجانان في اليوم. الأوراق الغضّة الممعوسة تُسخّن في المقلاة وتوضع على الأوديمات والمفاصل لإزالة التجمّعات المَصْليّة والانتفاخات. شراب بوضع الثمار في وعاء مع الماء الساخن، ومن ثم تُصفّي وتُعصر بالقماش ويُعاد العصير إلى النار ويضاف إليه وزنه من السكر ويُطبخ حتى الحصول على تماسك الشراب. ملعقة كبيرة في فنجان ماء ساخن جدًّا، ٣ مرات في اليوم، في حال الكريب والبَرْد، وهو شراب معرِّق جيّد.

٦٤- بِيْلُوكَرْبِيْن وأملاحه

الخصائص الطبية للييلوكربين وأملاحه

يبرز عمل الپيلوكربين بشكل أساسي پي ل على: أ) الإفرازات، ب) القلب، ج) العين. وهو بشكل عام مهيّج للجهاز العصبيّ الپاراسَمْپَتَاويّ، كما يُهيّج كذلك جُزئيًا الجهاز العصبيّ الوُدِيّ ويعمل كموسّع عُروقي في الأعضاء الغدّية.

أ-إن ابتلاع ١٠,١ إلى ٢٠,١غ من ملح ما من أملاح البيلوكربين، أو ابتلاع نقاعة من سلا إلى ٤ غرامات من الجابورندي من ٣ إلى ٤ غرامات من الجابورندي تحدث حقنًا دمويًا Hyperhémie في الوجه ومن ثم في كامل البشرة، يتبعه تعرُق غزير خلال ١٠ إلى ٢٠ دقيقة (إلى ٣٠٠ غرام وحتى ٢٠٠ غرام من العرق) وتلَعُّب كثيف (١٠٠ إلى ١٢٠٠ ملل؛ المعدل، حسب ج. پوشِيه، ٢٠٠ ملل لعاب) التي تدوم حوالى الساعتين. إن لعاب) التي تدوم حوالى الساعتين. إن الإفراز المفرط يطال أيضًا الكبد، والبنكرياس، والمعدة، والأمعاء، والغدد الدَّمعيّة، والقصَبيّة الشُّعَبيّة ويبدو أن البُوال والإفراز الصَّفْراوي لا يزيدان.

بعد خَفْقة قصيرة الأمد، تتباطأ الحركات القلبيّة من الهيلوكربين.

ج - إذا ابتُلِع الهيلوكربين يُحدث تَوشَع البؤبؤ، ولكنه إذا قُطِر في العين مباشرة فإنّه يحتّم، وعلى عكس ما تقدّم، انقباض الحدقة مع انخفاض التوتّر داخل العين.

يبدو الپيلوكربين بوجه العموم مضادًا فيزيولوجيًا للأتروبين الولكن هذا

ب ی ل

التَّضادّ، كما ذَكَرَ ج. يُوشيه، لا يمكن عسل جيد ٦٠غ الإفادة منه عمليًا إذ إنّ تحييد تأثيرات الأتروبين يَتطلُّب مقادير هائلة من البيلوكربين، كما أنّه يترك كذلك تأثيرات سامة خطرة».

> إن البيلوكربين لا يبدو فعّالًا في مختلف الحالات التي يُعْتَقَد فيها أنّه بالإمكان الإفادة من عمله المعرِّق: إصابات نَزْلِيَّة، استسقاءات كليوية أو قلبية، حالات الجُناب، تَسمُّمات (بهدف إزالة الرصاص السَّكْبي مثلًا في الأمراض الرصاصيَّة)، تَبَوْلُن الدم، إلخ. وهو لم يعطِ نتائج مرضية فعلًا سوى في طب العين؛ ورغم كونه يقلّص الحدقة بأقلّ قوة من الأزارِين، إلَّا أنه يهيِّج الملتحمة أقلّ منه ولا يحدث سوى آلام هدبية خفىفة .

الاستعمال الخارجي - قطرات ومراهم عينية تحتوى من ٠,٥٠ إلى ٥٪ من كلورهيدرات أو نيترات الييلوكربين. لمعالجة زَرَق العين تحضر قطرات تُحَل فورًا حيث يشترك البيلوكربين مع حامض الأسقوربيك ومواد أخرى.

٦٥- بيلولات

لحديدي المنغنازي	بيلولات بالكربونات ا
٥٧ غ	سولفات حديد نقيّ
۱۲۰ غ	كربونات صوديوم
	سولفات منغانيز نقى

ماء كميَّة كافية نُحضّر كما في بيلولات ڤاليّه Vallet ونَصْنع بيلولات من ٢٠٠٠ غرام فضّيّة. كان يُعطى منها في الماضي من ٢ إلى ٤ في اليوم. لذكرى التاريخ.

بيلولات بالكربونات الحديدية والمنغانية (حَنُّون)

سولفات الحديد ٢٦ غ سولفات المنغانيز٧غ كربونات الصوديوم ٣٥ غ شراب وعسل بالتساوي كميَّة كافية نُحضِّر بيلولات من ٢٠٠٠ غرام. من ٢ إلى ١٠ في اليوم. لذكرى التاريخ.

بيولات برومور الرصاص

برومور الرصاص ٢٠,٠٠ إلى ٠,٠٥ غ مستخلص ست الحُسن ٢٠٠١ إلى ٠,٠٥ غ لوبولان (من الجنجل) ٥,٠٥ إلى ٠,١٠ غ نُحضِّر بيلولات يؤخذ منها ٢ إلى ٣ في اليوم لتهدئة الانتصابات المؤلمة في حال التهابات الإحليل. لذكرى التاريخ.

Pilules (F) بيلولات بُونتيوس

٠	١	•	أَلْوَة البَرْبَاد
:	١	٠	صمغ طَبَرْخا (نقطة)
: _	١	٠	صمغ أمّونياك
٤	٦	•	خل أبيض
و زز	•	و د	نُعالج الموادّ في الخل السّاخن،

مع العَصْر ونُبخِّر في حمام مريم حتى القوام البيلوليّ. نُقسِّم إلى بيلولات من ٢٠٠ غرام (دستور ١٨٦٦).

ضد الاستسقاء. لذكرى التاريخ.

بيلولات حديدية (أنْدرال)

۴,۶ غ	ديجيتال
۲ غ	خسق
۲ غ	بُرادة حديد
كمّيّة كافية	عسل

لصنع ٣٦ بيلولة يؤخذ منها ٢ إلى ٣ في اليوم، بمقادير متصاعدة، في اليرقان. لذكرى التاريخ.

بيلولات حديدية (بلود)

.يد ۳۰ غ	سلفور بروتوكسيد الحد
۳۰غ	كربونات البوتاس
ه غ	صمغ عربي
۱۵ غ	شراب بسيط شراب
	لصنع ۲۰۰ سلولة.

نَحل الصمغ في الماء في وعاء تبخير في حمّام مريم، نُضيف الشَّراب والسُّولفور. نُحرِّك؛ نضيف الكربونات مع تحريك مستمرّ، ومن ثمّ مسحوق السُّوس ونتابع التَّسخين حتى القوام البيلوليّ. نرفع عن النار ونُقسم إلى البيلوليّ. نرفع عن النار ونُقسم إلى ونُفضِّضها. كل بيلولة تزن حوالى ٣٠٠، غرام. نحفظها في قارورات مقفلة جيدًا (دستور أدوية ١٩٠٨). مقاديرها ١ إلى

١٠ لذكرى التاريخ. مستحضر فعال جدًا ومستعمل جدًا في الماضي.

ب ی ل

بيلولات دوپُويتْرَن، بيلولات مضادة للسفلس، بيلولات كلورور زئبقي مؤنين

٠,٤٠ غ	مستخلص الثيل
٠,٤٠ غ	مستخلص الأفيون
٠٠٠ غ	سليماني أكّالّ
كمّيّة كافية	مسحوق السوس
لة تحتوي الواحدة على	نُحضّر ٢٠ بيلو

تحصر ١٠ بيلوله تحتوي الواحده على ٠,٠١ ١،٠٠ غرام من السُلَيمائيّ وعلى ٠,٠١ غرام من مستخلص الأفيون (كودكس).

إِن مستخلص عود الأنبياء الذي لم يعد مسجَّلًا في الفرماكوبيا منذ العام ١٩٠٨ استُبدِل بمستخلص الثيل. (دستور ١٩٣٧).

إن هذه البيلولات تنعم بشهرة استحقَّتها عن جدارة في معالجة السَّفْلس الدَّائم. لذكرى التاريخ. مقاديرها من ١ إلى ٣ في اليوم.

الجدول Tableau C

بيلولات زبدة الكاكاو اليودية الحديدية

٣٢ غ	بُرادة حديد
٤غ	يود
كميَّة كافية	زبدة كاكاو

تذوِّب اليود في زُبدة الكاكاو المذوَّب، ونُقسِّم إلى بيلولات، غير قابلة للفساد بعد تغليفها بالصمغ والسُّكّر.

ب ي ل بيلولات زرنيخية آسيوية

حامض زرنيختي
بهار أسوده ع
صمغ عربيّ١ غ
ماء نقي كمّيّة كافية

نَهرس الحامض الزَّرنيخيِّ مع البهار ونَدُقُه طويلًا، نُضيف الصمغ والماء، ونصنع كتلة نقسمها إلى ١٠٠ بيلولة تحتوي الواحدة على ٥ ملغ حامض زرنيخيِّ (دستور ١٨٨٤). بيلولة في البرَص السِلِّيِّ. نزيد المقدار تدريجيًّا. بيلولات مُستعملة جدًّا في الهند وللحالة نفسها. لذكرى التاريخ.

إن ما كان يسمّى «بيلولات تَنْجُور» التي كانت تُعتمد ضِد لَدْغ الحيوانات السامّة كانت مماثلة.

بيلولات زرنيخية (بُودان)

أرسينيات الصوديومأرسينيات

نَحلّ الأرسينيات (أي الزرنيخات) في عدة نقاط من الماء المُقطّر ومن ثم نُحضًر ٢٠ بيلولة بواسطة كمية كافية من مسحوق الخُبيَّزة.

كان الدكتور بُودان يستعمل عبارة «مَعدِني» بدلًا من عبارة «زَرنيخي» لكل المستحضرات التي يكون أساسها الزَّرنيخ، وذلك لكى لا يُخيف المرضى.

بيلولات زئبقية (لانْيِو)، بيلولات المَرُوخ الزئبقي

نحضّر ۱٤٤ بيلولة تحتوي الواحدة على ٥٠,٠٥ من الزئبق. يؤخذ منها ٣ إلى ١٢ في اليوم. لذكرى التاريخ.

بيلولات زئبقية (مُوسكاتي)

زئبق مُوسكاتي المحلول ٢,٥ غ مستخلص أفيون ٨٠٠ غ مستخلص كينا ٨ غ نحضر ٢٠ بيلولة . لذكرى التاريخ .

بيلولات زئبقية (هانمان)

إن النسب ليست هي ذاتها في كل الفرماكوبيات. الدكتور كازناف يعطي ما يلي: زئبق محلول ١ غرام، خُسل ٣ غرام؛ لمقدار ٤٠ بيلولة.

بيلولات زيت الزعتر الدهني

دهن الزعتر هابون لوزي هابون لوزي هابون لوزي هابون لوزي هابون لوزي هابون كميّة كافية كافية للبيلولة واحدة تُغلّف ببلسم تولو.

مقدارها: بيلولة في اليوم، في اليرقان، فقر الدم، الأنيمية الكلورورية. لذكرى التاريخ.

بيلولات ضد الإمساك (مكاريو)

ألوة٥٠,٠ غ
مستخلص البلّادونالله و ٠,٠١ غ
سولفات الحديد
لمقدار ببلولة واحدة مُفضَّضة.

الى ٣ مساءً عند النوم؛ بيلولة واحدة تكفي في العادة. علاج فعال جدًّا ضِد الإمساك العَصِيّ. لذكرى التاريخ.

بيلولات ضد النزلة المثانية

۱۵ غ	(کُوباهو)	كُوبايو
كمَّيَّة كافية		مغنازيا
۱۵ غ		تربنتين

نحضر بيلولات من ٢٠,٠ غرام.

یؤخذ ۳ إلى ٤ صباحًا، ومثله ظهرًا ومساءً. لذکری التاریخ.

بيلولات ضد النقرس (بيكرال)

۱,٥٠ ع	سولفات الكينا
۲۰,۰ غ	مستخلص الديجيتال
٥,٠ غ	بزور سورنجان
	لصنع ١٠ بيلولات. يؤخأ
. للتاريخ.	بيلولات ولعدة أيام متوالية

بيلولات ضد النقرس (سكودامور)

مستخلص اسيتات السورنجان ١٠ غ تربنتين البندقية Venise

مقدارها: بيلولة في اليوم، في اليرقان، خبيزةكمّيّة كافية بي ل

نحضر ۱۰۰ بيلولة. ١ إلى ٥ في اليوم، حتى الإسهال القوي. نقرس. لذكرى التاريخ.

بيلولات ضد النقرس (هَلْفُورد)

مستخلص اسيتات السورنجان ۰,۱۰ غ مستخلص الحنظل المركب ۰,۱۰ غ مسحوق دوڤر ،۱۰٠ غ

لتحضير بيلولة واحدة، كان هلفورد يعطيها بعد أن يكون قد أعطى للمريض لمدّة بضعة أيام من ٣٠ إلى نقطة من نبيذ السورنجان صباحًا ومساءً.

بيلولات ضد النقرس (هَنْرُوتاي)

 كبريت الإثمد المذهّب
 \$ غ

 مستخلص الأفيون
 *, **0

 سوس
 \$ غ

 لعاب عربى
 **2

نحضر ٣٠ بيلولة. يؤخذ منها بيلولة صباحًا ومساءً لمدة ١٥ يومًا بعد أخذ جَرُوع المؤلّف ذاته.

بيلولات ضد اليرقان

 أرعديّات حديدية بوتاسية
 ١٠ غ

 ألوة مسحوقة
 ١ غ

 إفراز القُندُس المسحوق
 ١ غ

 زعفران مسحوق
 ١ غ

 تربنتين البندقية Venise
 كميَّة كافية

ب ي ل نُحضِّر ۱۰۰ بيلولة من ۰٫۲۰ غرام يؤخذ ،۱۰۰ غرام من الكريوزوت. لذكرى منها ٣ في اليوم في البداية. للتاريخ. التاريخ. بيلولات ضد اليَرقَان (شُومَل) بيلولات الكُوباهو (ريْغِيْني) مسحوق العنصل ٢ غ كوباهو ١٠ غ مسحوق الديجيتال المستخلص راتانيا ۸غ حديد مُسَمَّق كاغ دهن سَاصَفُراء ۰٫٥ غ نُحضِّر ٤٠ بيلولة. من ٢ إلى ٦ في مغنازيا محروقة كمّيّة كافية اليوم. الزلال البَوليّ المشترك مع نَمزج ونصنع ٤٠ بَلْعَة. لذكرى اليرقان. لذكرى التاريخ. التاريخ. بيلولات عرق الذهب المركَّبة، بيلولات بيلولات الكودايين العنصل وعرق الذهب كودايين بسي برج غ مسحوق دوڤر ۱۲ غ خُسنَ ۲٫۰ غ عنصل ٤٠٠ ... ٤٠٠ نُحضِّر ٤ بيلولات مع كمِّية كافية من أمّونياك (نبتة) ٤ غ مسحوق الخبيزة، تؤخذ واحدة كل يوم. لعاب عربيكميَّة كافية بيلولات لَبَنات الحديد نحضر كتلة بيلولية. لذكري التاريخ. لَبَنات الحديد (لَكُتات)١ غ بيلولات عرق الذهب والأفيون غ *ا* خبيزة مسحوق دوڤر٣٠٠٠ غ عسل كمّيّة كافية معلّب الورد١ غ لمقدار ۲۰ بیلولة. لذکری التاریخ. نحضر بيلولات من ٢٠ر٠ غرام. لذكري التاريخ. بيلولات مبولة (كروڤاييه) بيلولات الكريوزوت (دستور ١٩٣٧) كالومَل١ : عنصل كريوزوت مخزنيكريوزوت مخزني ديجيتال مسحوق صابون لوزي مجفف

نُحضِّر ١٠٠ بيلولة تحتوي الواحدة على لصنع ١٢ بيلولة. لذكرى التاريخ.

بالمحم كميَّة كافية

شراب النبق كمّيّة كافية

نضيف إلى البيلولات المسمّاة بيلولات

مستخلص الجنطيانا ١٠ غ

کرونیا :

۲ غ	حلتيت
١غ	مستخلص الحنظل
۲غ	عنصل
١غ	ديجيتال
يؤخذ منها بيلولتان	تحضير ٢٠ بيلولة.

بيلولات مدرة للسوائل

بيلولات مدرّة للسوائل (بُونيتوس)

كل ٣ ساعات. لذكرى التاريخ.

١٠ع	الوة البرباد
١٠غ	صمغ نقطة
ناغ	صمغ أمّونياك
٠٦٠غ	خل أبيض
بيلولة واحدة. لذكرى	مقاديرها:
	التاريخ.

بيلولات المقيئ المسهل

۳,۲۰ غ	مقتيئ مسهل
١٦.٠٠ غ	مستخلص أفيون
٤ ٤ غ	مستخلص الخس
٠,٥٠ غ	صمغ عربي
٠,٥٠ غ	خبيزة
	m 1

نُحضِّر ٣٢ بيلولة تحتوي الواحدة على ، ، ، ، غرام من المقيّئ. نُصح بها الدكتور بُوديه لكي تحلّ محلّ مذابات المقيّئ المستعملة وفقًا لطريقة معيّنة في التهابات الرئة الحادة. للتاريخ.

بيلولات النحاس النشادرية، بيلولات مسحوق ديجيتال ١٠ غ

.

ب ي ل بيلولات يودور الحديد والكينا

بالتساويكمّيّة كافي رُسُو الله

نُحضِّر ٥٠ بيلولة.

يؤخذ منها ٢ إلى ٦ في اليوم في اليرقان، والحميات المقلعة. لذكرى التاريخ.

بيلولات يودور الكبريت

تركيبة أخرى:

يودور الكبريت ١ غ كبريت مغسول ٥٠، غ صابون طبي كميَّة كافية بيلولتان في اليوم. (غير مستعملة اليوم)

بيلولات يودور المنغانيز (حَنّون)

يودور البوتاس، سولفات منغاني بكميات متساوية، مع كمية كافية من العسل. نُحضّر بيلولات من ٢٠٠غ. نحفظها في قارورات. للتاريخ.

Pilules et بيلولات وبَلْعات بيطرية -٦٦ Bols, usage vétérinaire (F)

إِنَّ وزن البيلولات البيطَرِيّة لا يَتَخطَّى ٥ غرامات للبيلولة الواحدة. ولكن وزن البَلْعات، وهي بيلولات كبيرة بَيضائيّة الشَّكل وأكثر رخاوة من البيلولات، فقد يَصل أو حتى يَتخطَّى ٢٠ غرامًا. وتكون بَلْعات الحِصان بشكل عام من ٣٠ إلى ٥٠ غرامًا

بلعة طاردة للدود

لمقدار ۲۰ بيلولة (الكلب). ضدّ الدودة الوحيدة والأقصور، يعطى منها ۱ إلى ٥ حسب القامة. لذكرى التاريخ.

بيلولات (بلعات) دافعة السُّعال

كريوزوت خَشب مسحوق سوس مه غ مسحوق سوس كميَّة كافية ماء مقطر كمَيَّة كافية

لمقدار ٣ بلعات.

برونشيت الحصان المزمن. لذكرى التاريخ.

بيلولة أو بَلْعَة الْوِيَّة للحصان بيلولات أو بلعات قلبية ومبولة ب ي ل ١٠غ ألوة ٢٥غ مسحوق ديجيتال حنظل ۰ ۲ غ مسحوق عنصل صابون جوز الهند المائع كمّيّة كافية مسحوق سورنجان ۲۰ غ لمقدار بلعة واحدة. صابون رخو كمَّيَّة كافية لمقدار ٥ بلعات (للحصان، بلعة بيلولات مسهلة قوية (للكلاب) واحدة في اليوم). للكلب، يعطى ألوة الديجيتال على شكل شراب سكري، حنظل ملعقة أو ملعقتان صغيرتان. لذكرى صابون طبي كمّيّة كافية التاريخ. لمقدار ٢٠ بيلولة. يعطى منها ٢ إلى ٤ بيلولات. بيلولات (أو بلعات) مسهّلة قوية ألْوَة ٤٥غ بيلولات مقوية دُرديات حامض البوتاسيوم ٣٠ غ كربونات حديدي ۲۰غ ١٥ غ يانسون مسحوق ۰ ۳ غ مسحوق الجنطيانا عسلكمّيّة كافية مسحوق الكينا ٠١ غ

لمقدار ٤ بلعات، للحيوانات الكبيرة. لمقدار بلعتين (الحصان).

ري

Taro plant, Big Tayove (E) كَبِيْر، تَارُو القُدَامَى، إِلْقِس كَبِيْر (۱) كَبِيْر Grande Tayove, Taro des Anciens, Alocasie macrorhize (F) Tropenworz, Grosser Tayove (D) Alocasia macrorrhiza, Caladium odorum, Colocasia odora (S)

نَبات كبير مُتَشجَّر من فصيلة القُلْقَاسِيَّات يعلو نحو ٥ أمتار وأكثر. ساقه تعلو حتى المترين وتغلظ نحو ٤٠ سم، تكلِّلها أوراق واسعة تُذكِّر بشكلها بأوراق القلقاس، وهي سَهْمِيّة الشَّكل البَيضيّ، طولها ٦٠ سم، قاتمة اللَّون الأخضر، فصوصها السُّفلي مستديرة، طول عنقها فصوصها السُّفلي مستديرة، طول السُّويقة 10 سم، مسود اللَّون؛ طول السُّويقة أو مصفر؛ أنبوب الجُباب باهت اللَّون الأصفر، طوله من ٧ إلى ٩ سم. مهده الأصفر، طوله من ٧ إلى ٩ سم. مهده سيلان والهند حيث يزرع لسوقه المأكولة التي لا تُرغب جدًّا بسبب حموزتها الشَّديدة.

المُركِّبات - غَنيّ جدًّا بالحامض الأقْصاليك، موادّ نَشويّة.

الخصائص والاستعمال - نبات حامز وسام بعض الشيء، وهو على عكس القلقاس لا تؤكل درناته بل سوقه الغليظة النَّشويّة المادّة، ولكنها لا تؤكل إلا بعد غسلها وطبخها لمدّة طويلة أو طبخه وتغيير مائه عدّة مَرّات. عُصارة ساقه أو أوراقه تُستعمل لتهدئة الحكّات المتسبّة عن نَباتات مُقَرِّحة (بفضل عمل أوكسالات الكلسيوم المعادِل والمُبْطِل التأثير). بعد تسخين العصارة يمكن أوكساه في الأذن لمعالجة التهاباتها. ويتحلّى هذا النّبات أيضًا بخصائص مفيدة للصدر ومضادّة للروماتيزم.

(۲) تُمْبَايَنْغ ، برَازِيَّة التَّمْبَايَنْغ - ٦٨
Tambayang stinking tree (E)
Tambayang, Sterculier tambayang,
Sterculier Scaphigère (F)
Tambayang-stinkbaum (D)
Sterculia Staphigera, Scaphium
Scaphigerum (S)

التَّمْبايَنْغ ثَمرة شجرة من فصيلة البِرَازِيَّات مهدها الهند الشَّرقيّة؛ وهي ثمرة مُخضرَّة اللَّون، جَعِدة البشرة؛ حجمها وشكلها كالخوخة المجفَّفة، أو حتى أفضل من ذلك كثمرة الغُبَيْراء المجفَّفة. غلافها يحضن لُبًّا رقيقًا مسوة اللَّون؛ يليه نحو الداخل غلاف داخلي شبه عظميّ، رقيق، فيه بزرة وحيدة. مُبيضَّة اللَّون ومكوَّنة من فلقتين.

⁽٢) كلِّ التَّسميات ما عدا اللَّاتينيّة للمؤلّف.

إن تنظيم الشَّمرة كما ورد أعلاه، والذي يُذكِّر تمامًا بتنظيم الثَّمار المُفردة النَّواة في فصيلة الوَرْدِيَّات، قد يوحي بأن النَّبات الذي يعطي تلك الثمرة هو فعلًا من الذي ت

المُركِّبات - تحتوي التمباينغ على ٧٪ لُعابًا يكسبها خاصتها التي تجعلها، إذا وضعت في الماء، تكتسب حجمًا يزيد حجمها الأوَّلي من ١٥ إلى ٢٠ مَرَّة؛ أما الباقي فمن مادّة استخراجيّة، نشاء، إلخ. طعم الشَّمرة تَفِه ولُعابيّ. تعطي إلخ. أرمدة غنيّة بالمنغانيز.

طريقة الاستعمال - تعطى على شكل مسحوق، وتحضر منه كذلك نقاعة بمقدار ٥ بالألف وتُحلّى بشراب السفرجل. في التهابات الامعاء (إسهالات، إلخ). وصفت نقاعتها أيضًا في غرغرات لمعالجة الذبحات.

Timbo (F) (المِثْبَو بُولِينِيا رِيشيَّة -٦٩
Paullinia pinnata, Sergjania curassavica (S)

الپُولِّينيا جنس شُجيرات عارشة في فصيلة السابَنْدِيّات. أوراقها متبادلة، مزدوجة أو ثُلاثية التَّركيب المُثْلَث أو ريشيّة التَركيب، معنَّقة، مجنَّحة في أكثر الأحيان. أزهارها صغيرة، باهتة اللَّون، إبطية الارتكاز، خماسيّة الكأسيات، رباعيّة الأسدية.

رائحة جذر التمبُو مِسْكيّة ذَكيّة، وهو توت يحتوي على قلويد دعاه ستانلي مارتن يحتوي على قلويد دعاه ستانلي مارتن يمبُونين، ويُستعمل مسحوقًا كأدوية في أمراض الكَبِد. كما يُطلق إسم تِمبو على نَباتات تُستعمل كمبيدة للحشرات وهي مسحوقة. وهناك نوع آخر من البولينيا يعطى ما يُسمّى يُوكّو Yocco.

Red تُوْت أَحْمَر، فِرْصَاد أَحْمَر mulberry tree (E) Mûrier rouge (F) Rote maulbeerbaum (D) Morus rubra (S)

شَجرة مُثمِرة من فصيلة التُّوتِيَّات تعلو من ١٥ إلى ٢٠ مترًا. لحاء جذعها يَتشقَّق في صُفَيحات. أغصانها تشكِّل هامة كثيفة. فروعها مُصفرَّة اللُّون الأخضر، مَرْطَاء. أوراقها مُتبادلة، عابلة، أكبر من أوراق التوت الأبيض، مَقطومة أو قلبتة القاعدة، مُسنَّنة، قطنيّة ويحريّة اللَّون الأخضر على صفحاتها السُّفلي. أذَّنَاتها مُحمرة اللُّون. السُّنبلة الذُّكريّة في الأسفل، طولها من ٣ إلى ٦ سم. الثَّمرة مُفرَدة النَّواة، أسطوانيّة، مُحاطة بغلاف لَحمى يشكِّل التُّونَة، طولها ٣ سم، مُسودة اللَّون الأرجُواني عن النضج. مهدها جنوب الولايات المتّحدة الأمريكيّة، وهي النّوع الأكثر جَلْدًا من جنسها. الضَّرْب اللَّبْديِّ (٢)

⁽١) التَّسميتان للمؤلِّف.

ت و ي

Tomentosa Bur أوراقه مبيضّة اللَّون على صفحتها السُّفلي.

من التوت ٤ أو ٥ أنواع فقط تنبت في المناطق المعتدلة من أوروبا وأمريكا وآسيا.

- راجع تُوت أبيض وتُوت أسود في المعجم الأول صفحة ٦٨ رقم ٦٣-٦٤، وتُوتَة سوداء أو شَمُّول أسود في المعجم الثاني، للوقوف على المُركِّبات والخصائص والتَّداوي.

(۱) اَوْيَاغَرْبِيَّة، شَجَرَةُ الْحَيَاةِ الْغَرْبِيَّة White cedar, Canoe cedar (E) Thuya du canada (F) Thuja occidentalis (S) Lebensbaum (D)

شَجَرة من فصيلة السَّرْوِيَّات تعلو من ١٥ اللَّي ٢٠ مترًا. جذعها غالبًا مقسَّمة. هامتها هرميّة الشَّكل. أغصانها مورقة مصفرّة اللَّون الأخضر الباهت من تحت، مصفرّة أو محمرّة اللَّون في فصل الشّاء. أوراقها دائمة، صغيرة، قشريّة الشّكل، متقابلة، مُطبَّقة على الأغصان، عديدة الغدد المصفرّة أو المُرزقة اللَّون. أزهارها وحيدة المسكن. طول كرزها من ٨ إلى ١٢ المسكن. طول كرزها من ٨ إلى ١٢ ملم، عرضه نحو ٢ ملم. بزوره صغيرة، ضَيّقة الجناح. ضروبها التزيينيّة عديدة.

المُركِّبات - غلوكوسيد، دهن يحتوي على بينان، فينون، وسيتون يُحْدِث تخلُّجًا ويسمَّى تويون، موادَّ عَفْصيَّة،...

الخصائص - من الداخل: مقشّعة، مبوِّلة خفيفة، مسكِّنة بَوليّة، معرِّقة، مُضادّة للرّوماتيزم، طاردة للدود، مضادّة للسَّرطان؛ من الخارج: مقوِّية.

الاستعمال - الداخلي: التهابات المثانة، تضخُّم الپروستات، إحتقانات حَوْضيّة، سَلَس بول النساء اللَّواتي يشكون من كظَّة الدم، روماتيزم، طفيليّات الأمعاء حالات سرطانية؛ الخارجي: ثؤلول، أورام حُلَيْمِيّة، سَليلات مُخاطيّة أي أورام في غشاء مخاطي، سَعْدَانَة أي وَرَم قَنْبيطيّ قرب الشَّرْج وأعضاء التَّناسل، نابِتات (تغرغر)، وقاية من الأمراض الزُهْريّة. الأجزاء الطبيّة هي الأوراق واللّحاء.

طرق الاستعمال - من الداخل، الأوراق أو اللّحاء: ١٠ غرامات في نصف ليتر ماء يغلي دقيقتان ويغطَّى عشر دقائق ويُسرب خلال ٢٤ ساعة. مستخلص مائي - كحولي في بيلولات من ١٠،٠ غرام، يؤخذ من ٥ إلى ١٠ بيلولات في اليوم. صبغة بنسبة واحد إلى خمسة، من ٢٠ إلى ٤٠ نقطة في اليوم.

من الخارج: دهن أو صبغة، تستعمل مرّتان في اليوم، بواسطة قطنة أو بحقنٍ موضعية.

⁽١) التَّسميتان للمؤلِّف.

Fruits du séné (F) ثِمار السَّنَى -٧٧

إن القرون التي توجد في الأسواق هي نتاج الأنواع الثّلاثة التي ورد ذكرها في دراسة وريقات السّنا، ويُشار إليها بأسماء الوريقات التّابعة لها ذاتها.

°۱ - سَنَى مُسْتَدِقَ الطَّرَف (۱)، سَنَى الاسْكَنْدَريّة

يتألَّف هذ العقّار من الثّمار المُجَفَّفة من السَّنا C. acutifolia. يحتوي على ٣,٤٪ كحد أدنى من المُشتقّات الهيدروكسي أنْتراسانيّة التي تُحْسَب بالسّنُّوسيد Sennoside B (الإصدار العاشر للفرماكوبيا).

المواصفات - رائحة خفيفة، طعم خفيف. الثَّمرة هي قرون مفلطحة متطاولة الشَّكل، بَيضانيّة قليلًا؛ وهي أقصر وأعرض بقليل من قرون السّنا الضيِّق الورق، طولها ٤ إلى ٥ سم وعرضها ٢ سم. جهتها الأماميّة (البَطنِيّة) مستقيمة الخطوط بشكل

محسوس، الجهة الخلفية (الظهرية) قوية التَّحدُّب. نشاهد فيها الرأس القَلميّ والسُّويقة الصغيرة على طرفيّ القرن وإلى الجهة الأماميّة. الصَّفحتان باهتتا اللَّون البُنِّيّ في الأقسام الخارجيّة، وقاتمة اللَّون البنِّيّ في المنطقة الوسطيّة المقابلة للبزور؛ تحتوي على ٦ أو ٧ بزرات، يُظهِر غلاف الشمرة قبالتها نتوءات تكون عمومًا أضيق مما تكون عليه في النوع اللَّاحق (angustifolia) طحرة القرون مكسوة بشبكة من التَّجاعد البارزة.

تُحفظ بمعزل عن الضَّوء والرَّطوبة (الإصدار العاشر للفرماكوبيا).

" مسنى ضيّق الورق (٢) ، سنى هِنْدِي يتألَّف هذا العقار من ثمارِ السَّنا (angustifolia) المجفَّفة. يحتوي على ٢,٢٪ من المشتقّات الهيدروكي أنْتراسانيّة Hydroxyanthracéniques التي تُحْسَب بالسَّنُوسيد B (الإصدار العاشر للفرماكوبيا).

المواصفات - الرّائحة والطَّعم خفيفان. الثَّمرة مؤلَّفة من قرون مفلطحة الشَّكل المتطاول مع جهة أماميّة مَلْوِيّة إلى الدّاخل قليلًا وجهة خلفية مقوَّسة قليلًا. وهي باهتة اللَّون الأصفر البُنِّيّ على الحوافي، أقتم لونًا نحو الوسط الذي يقابل البزور، طولها ١٥ إلى ٦٠ مم

⁽٢) التَّسمة للمؤلِّف.

ث م ا

وعرضها ١٤ إلى ١٨ مم. ينتهي أحد ٣ سَنَ الطرفين برأس قلمي، والطرف الآخر سُوداني بسويقة صغيرة. يحتوي القرن ٥ إلى ٨ قرونه بزور مفلطحة لونها من الأخضر إلى الكلوي البُنِي الفاتح. الطحرة تُبرز شبكة مُتقطِّعة إلى ١٠ من التَّجاعيد العَرَضيّة المُتعرِّجة؛ على حوافٍ مستواها يكون على غلاف الثَّمرة مُحَدَّبًا خطُّ ما وتَتَّجه كلَّ حَدَبَةٍ عاموديًّا نحو أطراف مسحوق الثَّمرة.

°° سَنَى بَيْضِيّ الشَّكل المُنْقَلِب^(١)، سَنَى سُؤدانيّ

قرونه مقوَّسة بقوَّة، بارزة الشَّكل الكلويّ، مُحمرَّة اللَّون البُنِّيّ، تحتوي ٨ إلى ١٠ بزور؛ يغطّي البزور غلاف عليه حوافٍ مع زوائد بارزة مميَّزة تَجتمع في خطً مائل وشبه مواز لحوافي الشَّمرة. مسحوق الأوراق أخضر اللَّون ومسحوق القرون بُنِّيّ اللَّون الأصفر.

الخصائص - مُضادّة لحصاة الكلية والرَّمْلِ البَوْلِيِّ.

الاستعمال - الحَصاة والرُّمال البَوْليُّ .

طريقة الاستعمال - نُحِفِّف الجداجد ونَسحقُها جيِّدًا، ونأخذ من مسحوقها نصف غرام إلى غرام واحد مع سائل ما. ملاحظة - أورَد هذه الطُّريقة الدكتور جان فاكنى، في الإصدار الخامس لكتابه: «التَّداوى بالنَّباتات» Phytothérapie ، عن دار مالوان عام

۷۶- جَروعات Looch, Lok (F)

جروع الأكونيت

. 1914

كحولتور الأكونيت١ غ نقاعة المليسة ٠٣٠ شراب دیاکو د

حُذِف الأكونيت من الفرماكوبيا منذ القرار الرسمي في ١٧/٥/٨٤.

أعطى كتاب الوصفات الصادر عام ١٩٧٤ تركيبة جديدة تحلّ محلّ تركيبة دستور أدوية ١٩٣٧ (أطلب مستحلب زيت الڤازلين).

٧٣- جُدْجُدٌ حَقْلِيّ، صَرّارُ اللَّيْلِ الحَقْلِيّ Sylvan-cricket, European field cricket (E)

Grillon des champs, Grillon champêtre, Cricri (F)

Feldgrille (D)

Gryllus campestris (S)

حَشَرة طِيَّة نَطَّاطَة من رُتبة مُستَقيمات الأجنحة Orthoptères وفصيلة الجُدْجُدِيّات Gryllidés، غليظة الجنَّة طولها من ۲۰ إلى ۳۰ ملمترًا، أرجلها الخلفية مُعدّة للقَفْز، ثوبها إلى السواد اللهمع، رأسها غليظ، قرونها الاستشعارية طويلة ومُستدِقّة. ذكرها مُجَهّز بعدة صرصارية نشيطة يستعملها في اللِّيل والنّهار. تعيش في جميع الأماكن أخصها البساتين والأراضى المزروعة حيث تحفر أنفاقًا مستطيلة جروع استحلابي بزيت الڤازلين أو قليلة التّعاريج والعُمق في الأتربة البرافين الخَوّارة والأماكن الرَّفيعة التي لا تَخشي غَمر المياه. وهي من الحشرات النّافعة لأنها تلتهم النمل وأكثر الحشرات الضّارّة الصّغيرة القَدّ. منها نوع يعيش في المنازل والمطابخ والمطاحن زيت فازلين مائع ٥٠٠ غ

صمغ كثيراء مسحوق ٢٥٠٠ غ ميكانيكيّ. جيلوز ٢٠٥٥ · طريقة الاستعمال – من ١ إلى ٢ ملعقة غليسّرين٥غ كبيرة للبالغين بعد وجبة المساء. نجدّد دهن ليمون الحامض ٢٠,١٠ غ حامض بنزویكع ڤانيلين ٥٠,٠ غ كحول ٣ ملل صباحًا عند النهوض. ماء منقَّى، كمَّيَّة كافية بالليتر ١٠٠ ملل ننثر الجيلوز كالشتاء في ٤٠ ملل من الماء، نضعه في حمام مريم ونمزج حتى الذوبان التام. نضع، من جهة ثانية، الصمغ العربي وصمغ الكثيراء، في هاون جاف تمامًا، نبلِّل المزيج بملل واحد من الكحول، نضيف الغليشرين ونهرس الكل جيّدًا.

> ومن ثم نضيف زيت الڤازلين بمقادير صغيرة ونمزج في كل مرة حتى رفض اللعاب للزيت؛ عندها نضيف محلول الجيلوز بمقادير صغيرة. بالتبادل مع ما بقى من زيت الڤازلين.

> نذوب دهن الحامض، والڤانيلين، والحامض البنزويك في ٢ ملل من الكحول. نضيف المحلول الكحولي الحاصل إلى المستحلب. نكمل إلى ١٠٠ ملل بواسطة ما بقى من الماء. نحرٌك جيدًا.

المواصفات - سائل سميك جدًّا، جروع بنزوات الأمونيوم ثقله النوعى ٠,٩٤٠؛ حفظه محدود.

صمغ عربي مسحوق ٢,٥٠٠ غ نخضّه قبل الاستعمال. مُشهل عملهُ

صباحًا إذا لزم الأمر. من ١ إلى ٣ ملاعق صغيرة للأولاد مع حليب بارد أو مربّى بعد وجبة المساء، وإذا لزم الأمر،

جروع برُومِيّ أو برموريّ

برومور البوتاس ٢,٠ غ ماء الخُس ۹۰ غ شراب الخبيزة ٣٠ غ يؤخذ خلال يوم في الإصابات الخنازيرية.

جروع بلسمي قلوي أثيري، جروع الكوباهو القلوي الأثيري

كوباهو ٣٠٠ غ ماء النعنعماء النعنع شراب الصمغ ٣٠ غ كربونات الصوديوم أثير سولفوريك٢غ

نذُوِّب الكربونات في ماء النعنع، نضيف الكوباهو، نحرَّك ونضيف المواد الباقية. بذلك يكون الكوباهو قد أصبح مستحلبًا.

أبيض، رائحته ليمونية، طعمه حلو، بنزوات الأمونيوم ٠,٣٠ غ روح الأثير النيتريك (أو ٥٠ نقطة) ١ غ

the first take exclusive the	
نحضر نقاعة في ١٨٠ غرام ماء غال.	
	خليط مكوفر ٣٢ غ
روم ۳۰ غ	يؤخذ على ٣ دفعات في اليوم. ضدّ
شراب سِیْسَنْبُرِیُون ۳۰غ	زلال البول الحمّي القِرمزيّ.
شراب تولو ١٥ غ	-
صبغة القرفة غ	جَرُوع حامض، جُلَاب مُزَجَّج، جُلَاب
في فقدان الصوت المتسبب عن الوَهْن	مضاد للنزيف
-	ماء النعنع ١٨٠ غ
وضعف الحيوية .	شراب الفرمبواز۳۰
جروع ضدّ التشنّج مُؤَفْيَن	حامض سولفوريك مخفّف ٤ غ
شراب الأفيون ١٥ غ	ملعقة أو ملعقتان كل ساعة.
شراب السكر	
ماء زهر البرتقال ١٥ غ	جروع حامض فوسفوريك
ماء عادي ١٠٠ غ	حامض فوسفوريك طبي
۔ أثير اغ	ماء النعنع المفلفل ١٥٠ غ
	شراب قشر البرتقال ١٥ غ
جروع ضدّ التشنّج نَتِن	- يؤخذ بالملاعق في الإسهال،
صبغة إفراز القندس	والديسنتيريا، والكُساح.
روح قرن الأيّل ١,٢٠ غ	<u> </u>
ماء زهر البرتقال 83 غ	جروع زُلالي
شراب قشر البرتقال 80 غ	ماء الخس المقطر ٢٠ غ
لذكري التاريخ .	شراب أفيوني ٣٠ غ
	زلال بیض ۱ أو ۲ عدد
جروع ضدّ النهاب الصِمَاخ (طبلة الأذن)	نمزج. يؤخذ خلال النهار، ضدّ
دهن التربنتين۲ غ	الإسهال أو الديسنتيريا الحادّة.
زيت خروع٣ غ	The second secon
ماء ٢٤ غ	جروع ضدّ اختفاء الصوت
لعاب صمغ عربيّ كمّيّة كافية	شاي هِسْوَن Hyswen ٨ غ
يُعاد كل ٦ ساعات لإعادة تنظيم	عشقة٨غ
المحتوى الامعائي وتهدئة الجهاز	أزهار بوصير ٤ غ
العصبي .	سوسن ٢,٦ غ

ج ر و

نشادر سائل تقط جروع ضد الدودة الوحيدة ج رو ٣٠غ يؤخذ ملعقة كل ساعة في الشُّهاق زیت خروع أثيرسولفوريك ٨ غ العَصِيّ. ملعقة كل ساعتين. جروع ضدّ الكزاز نقاعة أرنيكا مشبعة ١٢٥ غ جروع ضدّ زلال البول ماء لُوس Luce أماء لُوس حامض غَلِّيك ٠,٥٠ غ كافور ٤ غ شراب بسيطشراب بسيط مسك ماء مقطّر ۽ ٦٠ لذكرى التاريخ. يؤخذ بالملعقة خلال النهار. جروع مضاد خُناقِي (بريمن) جروع ضدّ الشّعال شراب دياكود ٣٠٠ خ دُرْدِي مُثَمَّد ... ٢٠٠ غ إكسير مهدّئ ع غ نبيذ عرق الذهب ... ٣غ ١٢٠غ لعاب الصمغ ماء مقطّر ماء الكرز الغاري٨غ شراب الخبيزة٨غ لعاب صمغ عربيّلله ٣٠ غ ماء مقطّر ٠٦٠ غ ملعقة كل ساعتين. ملعقة صغيرة كل ١٠ أو ٣٠ دقيقة، مع إعطاء ماء فاتر مسكّر للشرب بين جروع ضد السفلس المراحل، أو مزيج من الماء واللّبن محلول يوديّ زرنيخيّ زئبقيّ ع غ (الحليب). ٠٨ غ ماء مقطّر جروع مضاذ للإسهال شراب الزنجبيل ١٥ غ ٥٠,٠ غ مستخلص أفيوني إصابات سفلسية. لذكرى التاريخ. ۲ غ تحت نيترات البيزموت جروع ضدّ الشهاق (لوڤرات) ماء مقطّر٧٥ غ ١٢٥ غ شراب السفرجل١٥٠ غ هيدرولة الخَس (ماء) ٤١٥ هيدرولة زهر البرتقال (ماء) ٨ غ ﴿ شُرَابِ النَّعْنَعُ ٣٠غ يؤخذ بالملعقة من ساعة إلى ساعة، شراب الفاوانيا

شراب ست الحسن المستسلم ع ويخض كل مرّة.

العزيز من سوريا. أمّا انتشار النَّوع ففي جع د مُحيط البحر المتوسِّط وفي آسيا القُبُليَّة، ويُزهر من أيار إلى أيلول.

مقدّمة - قَلّما عانيت مِع نَبات طبّيّ مثلما عانيت مع هذا الطُّوقَريُون الذي يكاد اللَّبنانيُّون يُجمعون على تسميته بالجَعْدَة. إلَّا أن بعضهم يُسمِّيه عُشبة الرِّيح وبعضهم الآخر عشبة مار الياس، وهذا ما يُشير إلى انتشاره في الطبّ الشُّعبيُّ. ولكنُّهم يَختلفون في وصفات استعماله من منطقة إلى أخرى. وبانتظار الحصول على مُعطَيات عِلميّة دقيقة ترتكز على التحليل المخبري والتَّجربة، أوردَ أدناه مُختلف الاستعمالات التي تَوفَّرت لديّ إن عن طريق التّداوي الشُّعبيّ أو عن طريق بعض المراجع المُتوفِّرة. هذا وقد ورد وصف الجنس عامة والنَّوع المقصود أعلاه خاصة في مقال شامل عنوانه «طُو قَرْ يُون».

الخصائص والاستعمال - أُعيد تسجيل الطُّوقَريُون اللَّبد في الفرماكوبيا الفرنسيّة عام ١٩٧٥. وذَكر إدوار غالب في الموسوعة في علوم الطبيعة أن حشيشة الرّيح كانت ولا تزال تُستعمَل في بعض المُستحضرات الطبّية. وأوردَ في مكان آخر، تحت عنوان جَعْدَة Polium ما نَصّه:

الجَعْدَة عُشبة بَرِّيّة طبّيّة قيل في وصفها ما يلى: «حشيشة تنبت على شاطئ الأنهار وتجعد»./ «شَجرة خضراء تَنبت في شعاب الجبال بنَجْد وفي القيعان»./

٧٥- جَعْدَة، جُعْدَة، مِسْك الجنّ، حَشِيْشَة الرِّيْح، عُشْبَة مار الياس، طُوْقَرْيُون كبد، عُشبة الطِّحال، طُوْقَرْيُون أضفر Cat thyme, Hulwort, Yellow germander (E)

Germandrée tomenteuse, Polium, Pouliot jaune, Germandrée jaune, Germandrée flavescente (F) Poleigamander, Gelber gamander (D) Teucrium polium, Teucrium aureum, Teucrium flavum (S)

وَرد الطُّوقَريُون أو الطيُوقَريُون اللَّبد في فلورا لُبنان تحت ضَرْبَين: الضَّرب الأوّل، وهو لُبنانيّ، نَقترح له إسم طُوقَريُون لبِد مُستطيل الورق، أو جَعْدَة مُستطيلة الورق L Teucrium polium var. angustifolium Benth. اللَّبديِّ أي الصّوفيّ يكون أكثر التصافًّا، وسوقه أكثر هُزالًا ونُحولًا، رؤيساتُه الزُّهريّة أصغر حجمًا، وخاصة أوراقه أصغر قدًّا وأقوى التفافًا على ذاتها؟ وهو ضرب ذُكر في عَمشيت ودير القَمر وسواهما.

أمّا الضَّرب الثّاني، وهو سُوريّ المَنبت، فنقترح له إسم طُوقَريُون رَخْو، أو جَعْدَة رَخْوَة L. أَوْ جَعْدَة رَخْوَة Hand-Mazz var. mollissimum ويكون كساؤه الصوفي كثيفًا حول السّوق والفُروع بنوع خاص. وهو نَبات قَوِيّ النُّموّ «de forte venue» في كُلِّ أقسامه. ذُكِر هذا الضَّرب في جبل عبد

ج ع د

«عُشبة خضراء وغَبْراء تَنبت في الجبال، يُغلي قليلًا ويُؤخذ خلال النهار. لها رَعْثَة مثل رعثة الدّيك طيّبة الرّيح تَنبت في الرَّبيع وتَيبس في الشِّتاء وهي من تنبت على شطوط الأنهار وليس لها رَعْثَة الأزهري. / الشجرة طيِّبَة الرِّيح خضراء لها قضب في أطرافها ثمر أبيض تُحشى بها الوسائد لطيب ريحها. وهي جهيدة يصلح عليها المال» النضر بن شميل./ رَغْثَة، رَعَثَة، رُغْثَة: نتوء لحميّ في رؤوس بعض الطّيور: . Caroncule

> أما العالم النّباتي الاب يول موتيرد فيقول إنّها تزهر من أيار إلى أيلول، وتَنبت على كامل الأرض اللّبنانيّة، من الساحل حتى ضفاف نهر دِجلة، ومن شواطئ البحر حتى قِمم لُبنان. ويُضيف أنّه نبات مرغوب جدًّا لخصائصه المُسكّنة Sédatives

في جَنوب لُبنان، يَستعملها أحدَ (أطلبه) ومن النخل الملكي. مسؤولي ما سُمِّي بمخيّم المُبْعَدين عن فلسطين، كنبات مُنقِص للسُّكَّري في الجسم. أمّا في كسروان فتُستعمل لطرد المَغْص والرّيح.

صَيدليّ لُبنانيّ يَنصح بها للشُّكَّريِّين، لوحدها أو مُضافّة إلى مجموعة من الأنواع المُنقِصة للشُكِّر مِثال إبرة الرّاهب، قَنطُريُون، كُنْباث، أرضى شوكى، قرون فاصولياء عريضة مُجفَّفة مع حبوبها، كأن يُؤخذ قبضة (٢-٣غ) حوامض دسمة متعدّدة التركيب من كل نوع في مقدار نصف ليتر ماء

أمّا الاستعمال الشّعبيّ الذي وصل إلينا مؤخَّرًا فهو أخذ العُشبة المَغْليَّة لحلَّ البَقول» عن أبي حنيفة./ بَقلة برِّيّة لا حصى الكلى المُستعصى. ولكن هذا الأمر لم يزل بحاجة إلى تكرار التجربة الواعية. وفي أيّ حال، إن الجَعْدَة أصبحت تجد مكانها بين الأعشاب الطبيّة التي تباع في صَيدليّة لُبنان.

٧٦- جُمّار، جُمّارة، جامورة marrow (E) Palmite (F)

الكرنب النخلى أى الجمّار هو طعام عُصاري جدًا وفي منتهى النكهة اللذيذة؛ يؤكل بطرق مختلفة؛ نيئًا، مقطِّعًا ومتبِّلًا كالسلطة؛ أو مطبوخًا، يتقارب طعمه من طعم الأرضى شوكه ولكنه يفوقه تماسكًا ونكهة. إن أجود أنواع الجمّار هي من النخل الكرنبي

إن زيت النخل الملكيّ يستعمل في الفرماكوبيا الأفريقية كترياق ضد السموم؛ وهو زيت أحمر اللون، طبّي وغذائق وتجميلتي شائع الاستعمال. أمّا معدّل نسب الحوامض الدسمة فيه هي التالية:

حوامض دسمة مشبعة ٥٤٪ حوامض دسمة وحيدة التركيب غير المشبع 7.20 7.1. غير المشبع

٧٧- جَوْزَة العَفْصَة، عَفْصَة، عَفْصَة Noix de galle, Galle, Galle de السَّنْدِيَان chêne (F)

Galla quercina, Galla turcica, Galla tinctoria, Quercus lusitanica var. infectoria (S)

هي جوزة العَفْصَة الَّتي تُدعي جَوزة حَلَب. يُطلق إسم عَفْصات السُّنديان أو جوزة العُفْصة على بَرْزات تَتَشكَّل من جرّاء وخَز حشرة من فصيلة غِشَائيّات الأجْنِحة تُدعى Cynips gallæ tinctoriæ أى ما يمكن تسميتها بآبرة العَفْصَة الصِبَاغِيّة (١)، مرادفها Diplolepsis gallæ tinctoriæ، على براعم سنديان العَفْص Quercus infectoria، وهي شُجرة تَنبت بكثرة في آسيا الصغرى وبنوع أخص على طول سواحل البحر المتوسط، وتُعرف باسم مَلُّول في بعض المناطق اللُّبنانيَّة، وباسم عَفْص في بعضها الآخر. إنّ براعم هذه الشَّجرة وأوراقها وفروعها الطَّريّة هي الأجزاء الّتي تَتعرَّض بنوع خاص للإصابة بالحشرة الآبرة التي تضع بيُوضها عليها. عند ذلك تكثر عُصارات الشَّجرة في ذلك المكان، تَتَجمَّد فيه وتُشكِّل البَرْزَة التي تُدعى عَفْصَة Galle. عندما تُكمِل الحشرة الفتيّة كافّة مَراحل تَطَوُّرها، تَثقُب عندها حَبْسَها حوالى آخر شهر تموز (يوليو) وتهرب منه. ولأن العَفْصات غير المثقوبة هي الأكثر

جودة وتقديرًا من سواها فإنّها تُجمع عادة حوالي أواسط تموز.

ج و ز

تقع العَفْصات في الأسواق على شكل أجسام كُروية أو كُمَّثرية مُزركشة بحَدَبَات ونتوءات عديدة. وإذا كانت العَفْصات غير مثقوبة يكون لونها إلى الأخضر الزيتوني وثقيلة الوزن (عفصات خضراء أو زرقاء أو سوداء)، وتكون خفيفة بعد خروج الحشرة منها ويكون لونها بُنيًّا مصفرًا، ومبيضًا تقريبًا (عفصات بيضاء).

الشَّرق، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا تُنتج جَوْز العَفْصة.

إن أجود أنواع العفصات هي تلك التي تأتي من حَلَب والتي يُشار إليها باسم عَفْصات حَلَب Galles d'Alep في الأسواق؛ وهي مُزيَّنة بخشونات أو تَضَرُّسات مُرَوَّسة أكسبَتْها إسم العَفْصات الشائكة؛ يكون حجمها قدر البُندقة تقريبًا، ثقيلة الوزن، قاتمة اللَّون ولا يوجد بينها بالمرة تقريبًا عَفْصات بيضاء ومثقوبة. إن عَفْصات بيضاء بقليل، أخف منها وزنًا وأفتح لونًا ومخلوطة مع عَفْصات بيضاء؛ وهي بالتالي أقل تقديرًا وأدنى جودة منها.

عِدّة أنواع من السنديان التي تنبت في أوروبًا وغرب آسيا تنتج بَرْزَات مماثلة لعفصات الأسواق، من حيث المصدر والطبيعة. ويُطلق إسم عفصة هنغاريا أو عفصة پيامُونت على شذوذ أو تَشَوُّه يطرأ على قمع بلُّوطة السنديان العادي من جراء

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

ج و ز

وخز آبرة، وإسم عفصة تركيا أو عفصة الشُّرق، وإسم Vélanède، على نتاج مشابه ينمو على السِّنديان الرُّوحِيّ: . Quercus Aegilops

إن طعم جوزة العَفْصة الحامز مردُّه إلى العَفْص Tanin أو الحامِض الغَلُوتانيك أو المُطاوِعَة، التَّعقيبات وحُرقات البَول. الكوَرْسِيتانّيك التي تحتوي منه بنسبة ٦٠ إلى ٧٠٪. ونجد فيها كذلك سُكِّر، راتنج، القليل من الحامض الغَلْيك وموادّ هَيوليناتِيّة. إن الحامض التانّيك هو نموذج لطائفة كبيرة من الأجسام القِلَويدات، الجيلاتين. التي تدين لها النّباتات بخصائصها القابضة. إن الموادّ العَفْصيّة كانت تُعتبر منذ فترة طويلة على أنّها مشابهة للموادّ الموجودة في جوزة العفص، ولكن الأبحاث التى تَمَّت خلال السَّنوات الأخيرة بيَّنَت أن عفص مختلف النَّباتات ينعم بخصائص مُتميِّزة. ولقد وَجَد غيبُورت في العفص مقدار ٢٪ من جوهر ملون أصفر، هو الحامض اللُّو تَايُو غَلِّيك .

> إن الماء والكحول والأثير المائيّ تُشْحَن بسهولة بجواهر العفصات الفعّالة. إن نقاعة العفصات المائيّة أو صبغتها الكحوليّة هي كاشف يدلّ على الحديد، الجيلاتين والقلى النَّباتيَّة التي يُرسِّبها من محاليلها. يُستخرج العَفْص بشكل حَصْري تقريبًا من جوزة العفصة، على لحاء السّنديان بالأفضليّة، ويَتميَّز بالعفص الفيزيولوجي أو بالعفص المَرَضى تبعًا لمصدره.

الخصائص - العفصة هي قابض قوي. إستعمالها في الطبّ يرتكز برمّته على هذه الخاصِّيّة. تُستعمل في تَنقيعات ونُقاعات، وكمادات، وحقن شَرجيّة ضِدّ الإسهال، وخاصة في رزقات ضد النّزيفات نادرًا ما تستعمل من الدّاخل؛ وبالرُّغم من ذلك فقد استُعملت كترياق ضِدّ الدُّواء المقيِّئ القويُّ وضدُّ القِلمِي النَّباتيَّةِ.

تَضَادَّاتها - الأملاح المعدِنيّة،

طريقة الاستعمال - مسحوق ٠,٥ إلى ٢غ؛ نقاعة أو نقيع ٢٠ ٪؛ مستخلص ٢,٠ إلى ١غ؛ صبغة ٤ إلى ١٢ غ.

-۷۸ جُوفْريَّة، أَنْدِير (۱۱) Cabbage tree Geoffrée, Arbre à chou, Andire (F) Unechter Kohlbaum (D) Geoffræa, Andira (S)

جُوفْريَّة سَرْحَة، أنديرا ملساء^(٢) Geoffrée inerme, Andire inerme (F) Geoffrœa inermis, Andira inermis (S)

جُوفْرِيَّة سُورِينام، أنديرا سُورِينام^(٣) Geoffrée de Surinam, Andire de surinam (F) Geoffrœa surinamensis, Andira surinamensis (S)

⁽١) التَّسمية العربيَّة الأولى للمؤلِّف والثانية لإدوار

⁽٢) التَّسمِية العربيَّة الأولى والتَّسميتان الفرنسيَّتان

⁽٣) كل التَّسميات ما عدا اللاتينية للمؤلِّف.

جوفرية طاردة الدود، أنديرا طاردة Géoffrée vermifuge, Andire vermifuge (F) Geoffræa vermifuga, Andira vermifuga (S)

أنْجَالِيْن، أَنْجَالِيْم (٢) Angéline, Angélim, Angélin (F)

الدود(١)

قشورهما مُرَّة الطُّعم، تَنبتان، الأولى في مذكورتان في بعض الفرماكوبيات على ثمارها باسم أنجالين أو انجاليم. أنَّهما طاردتان للدّيدان بمقدار من ١٠٠٠

إلى ١,١٠ غرام؛ وتُصبحان مُقيِّنتان جوف بمقدار أعلى من ذلك. قشورهما تحتوى على جوهر أميني خاص، هو التيروزين المُمَثْيَلِ (٣ Méthylée بالأزوت، يُدعى أنْدِيرِيْنِ مُماثل إلى الرَّاتَانِيْنِ في أنواع الرَّاتَانيا.

> الجُوفْريَّة الطَّاردة للدّود شُجرة من الجُوفْريَّة السَّرحة وجُوفْرية سُورينام فصيلة القَرْنِيّات الفَراشيّة تَنبت في شجرتان من فصيلة القَرْنِيَّات الفَراشيّة، البرازيل، حيث تَتَمتَّع بزرتها بشهرة عالية جدًّا على أنها طاردة للدود، تُعطى الجماييك، والثانية في سورينام؛ وهما في مسحوق أو في نقاعة. وتشتهر لوزة

⁽١) التَّسميتان العربيّتان والفرِنسيّتان للمؤلّف.

⁽٢) التَّسميتان العربيّان للمؤلّف.

9

۷۹ حامِض دُهْنيّ، حامِض ستيارِيك، Acide Stéarique, دُهْنِين، ستِيارِيْن Stéarine (F)

 $C_{18}H_{36}O_2 = 284,5$

يُشار إلى هذا الحامِض في الأسواق خطأً بإسم ستيارين، فالحامِض الدُّهني المَخْزَنيّ هو مَزيج يَحتوي على مُختلَف الحوامِض الدَّسِمة بنسب مُتفاوتة، خاصّة على الحامِض الدُّهنيّ أو الستياريك: $CH_3(CH_2)_{16}.CO_2H = 284,5$ والحامِض النَّخلِيِّ أو بالمِتيك: وعالى، $CH_3(CH_2)_{14}CO_2H = 256,4$ كمِّيّة صغيرة من الحامِض الزَّيْتيّ أو أولايــــك: CH₃(CH₂)₇CH = : أستعمَل .CH(CH₂) $_7$ CO $_2$ H = 282,5 الحامِض الدُّهنيّ في تَحضير كريمات أساسها ستياراتات الصوديوم أو الأمّونيوم. بَعد أن ظهر في الكُودكس باسم حامِض ستياريك، أعيد تسجيله عام ١٩٦٥ باسم "مَزيج يُقال له حامِض ستياريك" ومن ثمّ أدرج بإسمه القديم عام ١٩٧٢.

المواصفات - يقع في شَذْرات أو في كُتَل بَيضاء اللَّون، لامِعة، زَيتيّة الملْمَس.

رائحتها ضعيفة وطعمها طعم الوَدَك. نِتاجه المَخْزَنيّ يَجب ألّا يَنصهر دون درجة ٥٦° سغ وألّا يَتَجَمَّد في درجة أدنى من ٥٤,٧° سغ. لا يَذوب في الماء، يَذوب في ٢١ جزء من الكحول، وفي ٣ أجزاء من الأثير أو في جزئين من الكلوروفورم (كودكس). وهو مَزوج تمامًا مع الكحول عند ٧٠° سغ.

الاستعمال - كريم بستيارات الصوديوم (كودكس ١٩٤٩). يُستخدَم في تحضير الستياراتات المَعدنيّة التي يَستخدمُها عدد كبير من الإختصاصييّن كسَوّاغات للمراهم.

۱۰ حامِض سِیانْهیدْرِیك، حامِض پروسِّیك، حامِض شِیازِیك Acide cyanhydrique, Acide pressique, Acide chyazique, Acide hydrocyanique (F)

HCN = 27

إكتشفه Scheele الذي استَخرجه من أزرق پروسيا؛ ولكن غاي لُوسّاك كان أول من حصل عليه، عام ١٨١١، بحالته اللّامائيّة. إنّ حامِض السّيانهيدريك اللّامائيّ الّذي يَتم تَحضيره في المُختبرات هو سائل عديم اللّون، كثافته المُختبرات هو سائل عديم اللّون، كثافته درجة صفر سغ، يَتجمَّد عند درجة ضفر سغ، يَتجمَّد عند حرجة كلّا؛ ولأنّ درجة غلّانه (٢٦° سغ) تَتقارب جدًّا من مُتوسِّط درجة حرارة المُحيط العام، فإنّه من الخُطورة بمكان تَناقلَه

بالأيدي كما هو؛ لذلك لا يُستعمَل في الطُّت إلَّا مَحلولًا.

إنّ محلول حامض السّيانْهيدريك كان عُشْريًّا (١٠) في كُودكس ١٨٦٦، وخُفُف $rac{1}{1}$ فی کُودکس ۱۸۸۶ فأصبح مِئويًّا ($rac{1}{1}$)، ومن ثمّ جَعَله كُودكس ١٩٠٨ محلولًا مَخْزَنيًا بنسبة ٢ بالمئة بالوزن، وذلك تَمشِّيًا مع اتفاقيَّة بروكسل الدُّوليَّة.

لم يَعد هناك في الكُودكس ما يُسمّى محلول حامِض سيانهيدريك سوى «ماء الغار الكَرزي» المُعَيَّر بنسبة ٠,١٠٠ غرام من الحامِض بالمئة.

إنّ مُذابَة حامِض السّيانْهيدريك المَخْزَنيّة تُستعمل كمُسكّن للجهاز العَصبي، وللوجع، وللشَّعال. وتُستعمَل من الدَّاخل ضِدَّ العُصَابات الخَلَجانيَّة، والأوجاع السَّرطانيّة، والسُّعالات الحُمِّيّة، والشُّهاق، وأوجاع المَعِدة. ونادرًا ما تُستعمَل من الخارج ضِدّ الحَكَّة الشَّديدة .

سام جدًّا - جدول «أ» - Très toxique. Tableau A

٨١- حامض سيانهيدريك (سُمِّيَّة الـ)، سِمامَة الحامِض السِّيانُهيدري Acide cyanhydrique (Toxicologie) (F)

HCN = 27

إن الحامض السيانهيدريك هو في منتهى السمّية (سام جدًّا جدًّا، جدول أ). بمقدار مميت من ٠,٠٥ غرام على

الأكثر، يُحدِث الحامض اللهمائي خلال ے ا م ثواني عند البالغ ألمًا حادًّا يُترجَم بصرخة قلق وجَزَع (مستمرة تقريبًا) يليها شلل مفاجئ في الجهاز التنفّسيّ وفي القلب. وقد يمتلئ الفم بالرُّغُوة ويندمج الفكَّان.

> ويمقادير أقلّ، يُحدِث عُسر التنفّس، وازرقاق البشرة المصحوب بفتور حرارة الجسم، وحوادث اختناقيّة، وجَزَع أما قَلْبِيّ، ودوارات، وتخلّجات جزئية سرعان ما تُعمَّم. التسمَّم الخفيف يؤدّي إلى تقلّص بلعومي، وإلى انذهالات ودوارات مصحوبة برؤاس وتوصيم، أي وجع وتكشّر في الجسد.

المعالجة - لمحاربة التسمّم السيانهيدري نلجأ إلى غسل المعدة المتكرّر بمحلول بنسبة ٢ بالألف من برمنغانات البوتاسيوم الذي يعمل كمؤكسد Oxydant. ومن الترياقات الأخرى الفعّالة إذا أعطيت فورًا بعد ابتلاع السمّ: الماء المتأكسج المُشَعْشَع جدًّا (جزء واحد في ٤٠٠ جزء) الذي يحوّل السمّ إلى أُوكْسامِيد غير سامً؛ الغلوكوز يعطى ضمن الوريد؛ المواد المحوّلة لخضاب الدمّ: Méthémoglobinisantes: هِييُوسُولْفيت الصوديوم في محلول بنسبة ٣٪ ضمن الوريد (يشكل سولفوسيانور غير سام)؛ نيتريت الصوديوم ١٪، في حقنة من ١,٥ غرام؛ غلوتاثيون مُخْتَزَل Glutathion في محلول بنسبة ١٠٪ في حقنة من ١٠ ملغ

ح ا م

لكل كيلو (يسهِّل استعادة التَّنفِّس النَّسيجيّ)؛ أزرق المثيلان بنسبة ٠,٠١ غرام لكل كيلو، ضمن الوريد.

بالإضافة إلى ما تقدُّم، نواجه الحوادث التسمّمية برشّات باردة؛ بالفَصْد أي فتح عرق، باستنشاقات أوكسيجين، بسَخْب أو جَذْب مَوزون ومُوقّع للّسان، بحقن من الزيت المكوفر، والكافيين، والوبائين.

٨٢- حامِض لَبَنيك مَخْزَنِيّ، حامِض لَبَنِيك مُرَازَم Acide lactique officinal, لَبَنِيك مُرَازَم Acide lactique racémique (F)

 CH_3 -CHOH- $CO_2H = 90.1$

إكتشفه Scheele عام ۱۷۸۰. يُوجد في العُصارة المِعَويّة وفي عدد كبير من خِلْطاتنا Humeurs، وفي صَفَار البَيض وفي الكثير من السَّوائل المُتخمِّرة. إنَّه مَزيج من حامِض لَبَنيك صِرْف ومن لامائيُّه الدَّاخليُّ لَكُتيل لَبَنيك الحامِض، يَحصل الحامِض اللَّبَنيك من تَفَكُّك لَبَنات الكلسيوم المُكرَّرة (١٠٠٠ غرام) بالحامِض الكَبْريتيك المَخْزَني (٣٥٠ غرام) (كُودكس ١٨٨٤). يُحضَّر أيضًا بتخمير العُصارات السُّكَّريَّة بواسطة حامِض لَكْتيل لَبَنيك. العُصَيَّة اللَّبنِيكيَّة المَوجودة في الجُبْنة الحامِضة. ويَتمّ تَحضيره صِناعيًّا من النَّشاء واللُّبِّ والدَّقيق المُحوَّلَة إلى مَلْتُوز بفضل عمل الأنْبَخَانَة التَّخميريّ المَوجودة في المَلْت.

المُواصفات - يَقع الحامِض اللَّبَنيك الصِرْف في بلُّورات صُلْبَة، تَنصهر عند +١٨° سغ، ولكنّ الحامِض المَخْزَنيّ الَّذي يَحتوي على بعض الأجزاء المئويَّة من الماء، هو سائل شَرَابِيِّ القِوام، عديم اللُّون أو بالكاد يَصطبغ بالأصفر. وهو مزيج من حامض لَبَنيك صِرْف ومن حامِض لَكْتِيل لَبَنِيك، ومن حوامِض پُولي لَبَنِيك وماء. إنّ التَّوازن بين الحامض اللبنيك والخوامض البولي لَننك يَتعلُّق بالتَّركيز وبالحرارة.

عديم اللُّون وطعمه قَويّ حامِض. كثافته تتقارب من ١,٢٠.

إذا تُرك لذاته لمدَّة طويلة وفي الحرارة العاديّة فإنّه يَخسر من مُيوعته وذلك بسبب تَشَبُّعه بالحامِض اللَّكْتيل لَبَنيك، وهو مُرَكِّب يَحصل من أَسْتَرَة جُزَيْئَة من الحامِض اللَّبَنيك تَعمل ككحول. بجُزَيْئة أخرى تعمل كحامض.

الحامِض اللَّبَنيك قابل للمَزْج بكلّ النِّسب مع الماء، والكحول، وقابل للذُّوبان في الأثير. النِّتاج المَخْزَنيّ يجب أن يَحتوى كحد أدنى ٣٠ بالمئة حامِض لَبَنيك، وكحدّ أقصى ٦٥ بالمئة

الخصائص والاستعمال - يُستخدَم في الصَّيدليّة لتحضير شَراب اللَّكْتُوفوسفات الكُلْسِيِّ السُّكُّريِّ، والحامِض اللَّبَنيك المَخْزَني المُخفَّف، والغُرّيّاء الحامِضة المُركَّبة.

ح ب ق . ، ، كان يُستعمَل من الدّاخل، في محلول مُشَعْشَع ومُحلّى بالسُّكَر، ضِدّ الإسهال الأخضر الّذي يُصيب الرُّضَّع، وضِدّ الكوليرا، وضِدّ التهابات المِعَى الهَيْضِيّة الشَّكْل Cholériformes أو السَّليّة، وحُمّى التيفوئيد أو الحُمّى التيفيّة، وفي السُّكَري، وفي تَبَوْلُن الدّم Urémie

من الخارج، في مُعالجات مَوضعيّة، ضِد التَّقرُّحات الفَمِّيّة البَلْعوميّة، إلتهاب الحنجرة السِّلّي، والتَّقرُّن الفَمِّيّ الأَبيض Leucoplasie، والخُناق، وداء الثَّعْلَب، والقُرّاض Lupus، إلخ.

المِعَوِيّ الشُّكُل.

يُحضَّر حاليًّا مَحلُول من الحامِض اللَّبَنيك غير المُخَصَّص للحَقْن، لَغْسل المَثانَة، تَركيبته هي التّالية:

حامِض لَبَنِيك مَخْزَنيّ مُخَفَّف
حامِض لَبَنيك مَخْزَنيّ ٢٥
ماء مُقطَّر ٧٥
نَمزُج. نَستعمِل في لَيْموناضة لَبَنيّة

نَمزُج. نَستعمِل في لَيْموناضة لَبَنيّة (حَليبيّة) (كُودكس ١٩٣٧).

(۱) حَبَق أَخْضَر، حَبَق البَرْغَش Basilic vert, Basilic à moustiques, Plante à moustiques (F) Ocimum Viride (S)

نَوع من الحبق يُطلق عليه الإسم الفَرنسيّ «نبات البرغش»، يُستخرج من أوراقه زيتٌ دُهنيّ بُرتقاليّ اللَّون برائحة الزَّعتر، يَحتوي على ٣٢ إلى ٥٠ بالمئة من التيمول، وعلى سيترال، وتَرْبانات.

Basilic à feuilles (۲) حَبَقَ بَنَفْسَجِيّ الوَرَق violettes (F)

Basilic à feuilles (۲) حَبَق جِعْدِيّ الوَرَق frisées (F)

Basilic à feuilles (۲) حَبَق خَسِّيَ الوَرَقَ de laitue (F)

ضُروبٌ ثَلاث من الحَبَق المَعروف أي المليعقة، وهي تَزيينيّة. إلّا أن الحبق الخَسِّيّ يُرغَب في تحضير صَلْصة تُضاف إلى بعض الأطباق الإيطاليّة، أخصُها المَعكرونة، كما أن أوراقه الكبيرة الجميلة اللّون الأخضر تُضاف إلى

⁽١) التَّسميتان العربيّتان والتَّسميتان الفرنسيّتان الأولى والثانية للمؤلَّف.

⁽٢) التَّسمية العربيَّة للمؤلِّف.

ح ب ق

السلطات والأطباق النَّيئة، وهو من الأنواع الشائعة في لبنان.

مُلاحظة - الحبق هو نبات مقدَّر جدًّا في اليونان لخصائصه المطَهِّرة. إن بَلَّ الحبق vassilicos بالماء لفترة طويلة يمنعه من الفساد والتَّعَفُّن. ويُنسَب إلى هذه الخاصِّية المُنقِّية المُطَهِّرة استعمال الحبق من قبل الكنيسة اليُونانيّة الأورثُوذُكْسِيَّة لتَبريك الماء خلال القدّاس الإلهيّ.

۸۶ حَبَق صَغِیْر، حَبَق گرْمَانِي، حَبَق الله مَنْسِمَة (لبنان)، حْبَاق (تونس)، سُمَیْسِمَة (لبنان)، حْبَاق (تونس)، Bush basil, سُاهِسْفَرَم، رَیْحَان صَعْتَرِيّ small leaved basil (E)
Basilic fin, Petit basilic, Basilic fin vert, Pistou (F)

Kleines basilien kraut (D) Ocimum minimum (S)

نَبات عُشبيّ حَوْليّ صَغير القَدِّ من فَصِيلة والسَّفَويَّات يُشبه الحَبَق المَعروف (المليعقة) ولٰكِنّه مُتراصٌّ أكثر منه، يَعلو والمن من ١٥ إلى ٢٥ سم وأكثر. سُوقُه مُربَّعة، الفَا دقيقة الزّغب الخَمْليّ، فُروعُه وفُرَيعاتُه حا دَقيقة. أوراقُه لَسِنَة جميلة الخضار شُالعاديّ، ذَكيّة العَرْف المُستَحَبّ. النا إزهرارُه سَنابل مُستطيلة. أزهارُه بَيضاء يَقْل اللّون أو وَردِيّة. مَهدُه الشّيلي وسيلان. رُو اللّون أو وَردِيّة. مَهدُه الشّيلي وسيلان. رُو منها زُك اللّون أو المُتراص الأخضر، والقرم الله المتراص المنتراص الأخضر، والقرم الله المتراص المنتراص الورق. وهو نَبات الله المتراص المنفسجيّ الورق. وهو نَبات الله المتراص المنفسجيّ الورق. وهو نَبات الم

الشّرفات والحداثق والنّوافذ اللّبنانيّة عامّة.

المُركِّبات - زيت دُهني من ١,٥٠ إلى ١,٥ بالمئة، مؤلَّف عُمومًا من أُوسِيْمان، لينالُول، غني بالأستراغُول الموجود في دهن الطَّرخُون، أو جينُول أساس دهن القرنفل، وأحيانًا التِّيمُول الموجود في الزَّعتر والصَّعتر والنَّدْغ وسواها.

الخصائص - مُقوِّ (عَصبيّ بنوع خاص Bodart) ومقوي القُشور الكُظْرِيَّة (Cortico-surrénales مُنشِّط، مضاد للتَّشَيّْج (يُخَفِّض النشاط المُخِّيّ الشَّوكيّ بعد أن يكون قد نَشَّطه)، مُسكِّن: كان يُنصح به في مُعالجة الهستيريا، نافع للمعدة، مطهّر المعدة والأمعاء، مُطمِث، مِدِرّ الحليب، صَدْريّ، مُعطِّس، طارد للريح، وقيل إنه مُنعِش مُعطِّس، طارد للريح، وقيل إنه مُنعِش ومُضادّ للتَّعقيبة، التَّداوي التُونسيّ يَعتبرُه ناعظًا ومفيدًا في العُقْم النُسائيّ والأمراض الجلْدية المختلِفة.

الاستعمال - الوَهْن العَصبيّ، الإرهاق والإجهاد الفِكريّ، الحَصْر، الكُرْب، الفَمّ، القَلَق، التَّقلُّصات المِعَويَّة في حالات عسر الهضم، إصابات الأمعاء، شُههاق، دوارات، دَوْخات، آلاء الشقيقة، داء التقطة (Pline)، شلل، نِقْرِس، شَحِّ الطَّمث، تَقَيُّؤات، قُلاع، رُؤاس، تَطَبُّل البطن، وخز الحشرات، زُكام، فقدان حاسة الشَّمّ، البرود الجنسيّ والعُقْم النَّسائيّ، الأمراض الجلدية.

طريقة الاستعمال الداخلي - نُقاعة الأوراق والرووس المُزْهِرة في الماء الغالى، فنجان بعد كل وجبة كمهضّم. الزيت الدُّهني، ٢ إلى ٥ نقاط في محلول مائتي أو كحولتي أو مع العسل، ثلاث مرات في اليوم. مَلْتُوت سُكّريّ مُضادّ للتَّشنُّج يُحضَّر من دُهن الحَبَق ومن دُهن المردكوَش بمقدار غرام واحد من كل منهما، شُكَّر مسحوق ٥٠ غرام، يُؤخذ من هذا المُستحضر نصف مِلعَقَة إلى مِلعَقَة صغيرة في فنجان زيزفون أو رغى الحمام بعد كل وجبة. الأطبّاء العَرَب يُعالجون القُلاع بنقاعة الحبق بمقدار ١٠ غرامات حبق في نقيع مغلى مُركّز يُستعمل غرغرة. كما يَنْصَحُ الطبُّ الشَّعبيُّ التُّونسيّ بنقاعة الحبق في حال البرود أو العجز الجنسي. طريقة الاستعمال الخارجي - أوراق الحبق المجفَّفة المسحوقة تُستعمل عَطوسًا في حال فقدان حاسة الشَّمّ المُتسبِّب عن زُكام مُزمِن Coryza. الزَّيت الدُّهني أو الأوراق الغضَّة المفرفكة توضع على عَقْص الزنابير والزَّلاقط، وعلى لَدْغ الأفاعي كعلاج تَكميلي مساعد. نقيع الحبق الغَضّ المغلى يُنصح به في التّداوي التُّونسيّ في حال العُقْم النّسائيّ على أن يُستعمل في خُقُنات وحَمّامات فَرْجِيّة. كما يُستعمل النَّقيع ذاته من الخارج في

ملاحظة - الحبق هو العُشبة الملكية Herbe royale، وهـو إسـم مـصـدره

مُعالجة مختلف أمراض البشرة.

كلمتين يُونانيَّتين معناهما «أشْعُر، أحس» ح ب ي و «ملكى». إن رؤوس الحبق المُزهرة الغَضّة تُستعمل في تحضير الكحولة الشَّافية للجرح (دراسة أحادِيَّة)، وقد أُعيد تسجيلُها في الفرماكوبيا الفرنسية عام ١٩٧٥ . أمَّا حساء الحَبَق ١٩٧٥ Pistou، وهو أشهر شوربا خضار في مقاطعة پروڤانْس الفرنسيّة، فيحضر من الحبق الصغير خاصة، كما يحضّر من الحبق المعروف أيضًا. ولقد أوردتُ تفاصيل تحضير هذا الحساء القديم الشهير في دراسة الحبق المعروف أي الملَّعقَة.

٨٥- حُبَيْبَات، حُبَيْبَة Granules (F)

الحبيبات هي بيلولات صغيرة مُخصَّصة لكي تُؤخذ بالفَمّ تزن الواحدة منها عادة من ٥ إلى ٦ سنتغرامات.

يُوصى دستور الأدوية لتحضيرها باستعمال مسحوق الصمغ العربي، وسُكّر الحليب المسحوق، والشّراب السُّكَّرِيِّ البسيط كسَوَّاغ لها (ملحق الفرماكوبيا الصادر عام ١٩٧٦).

تكون الحُبيبات بشكل عام من صنفين: الواحدة تحتوى على ملغرام واحد من المادة العِلاجيّة في الحُبيبة الواحدة وتكون بَيضاء اللُّون (أنْهيدريد زَرنيخيّ، سولفات الأتروپين، سولفات الستركنين)؛ وتحتوى الأخرى على واحد من عشرة $(\frac{1}{1})$ من الملغرام من

ح ر **ف**

الخصائص - نيات مُضاد لداء الحَفَر.

۸۷- حزاز Lichen (F)

حَزَاز بَيَاضِ الثَّلْجِ^(١) Lichen blanc de neige (F) Physica nivalis (S)

Lichen des murs (F) $\stackrel{(7)}{=}$ Imbricaria parietina, Parmelia parietina (S)

قُدِّم هذا النَّوع كبديل للكينا، وهو يحتوي على جوهر مُرّ يُدعى کريزو سکّرين.

إِنَّ الأَنواع التي وردت أعلاه هي من بين أنواع الحزاز التي كانت تُستعمل في الماضي للتَّداوي، والَّتِي تَذَكُّرها الفرماكوبيات المختلفة، ومن دون أي تفصيل عن خصائصها في بعض الأحيان.

حَزَاز الرَّنَات (۲) Lichen des rennes Cladonia rangiferina (S)

(F)

Peltigera canina (S)

Lichen entrelacé (F) Usnea plicata (S)

كان هذا الحزاز يُعرف في الماضي

المادّة العِلاجيّة وفي الحُبيبة الواحدة؛ مقربة من الماء. وهى تُحضَّر بواسطة المساحيق المَخزَنيّة بنسبة واحد من مئة (١٠٠٠)، وتُلَوَّن بالتّالي أُعيد تَسجيلُه في كودكس ١٩٧٤. باللُّون الوردي. ويمكن كذلك تحضير حُبيبات تحتوى إمّا على نصف ملغرام $(\frac{1}{2})$ ، أو على ربع ملغرام $(\frac{1}{4})$ من المادّة العِلاجيّة: تُلوَّن الأولى باللُّون الأخضر والثّانية بالأصفر.

> ٨٦- حُرْف الحَقْل، صِنَاب الماء Cuckoo flower, Ladies' Smock, Meadow bitter-cresse (E) Cardamine des prés, Cresson élégant, Cresson des prés, Cressonnette (F) Kukucksblume, Weisenschaumkraut (D) Cardamine pratensis (S)

الصِّنَابِ جنس نَباتات حَوليَّة مُحولة أو مُعمَّرة من فصيلة الصَّلِيبيّات. أوراقها بسيطة أو مُركَّبة. أزهارُها بيضاء، ليلكيّة أو أرجوانيّة، عُنقوديّة التَّجميع الهاميّ. أربع كأسِيّات خُرّة وأربع بَتَلات على شكل صليب. ست أسدية اثنان منها أصغر من الأخرى. الثَّمرة قَرْن مُنْفَلِق حَزّاز الكَلّب (٣) Lichen contre la rage يَنفتِح عن مِصراعين.

حُرْف الحَقُّل نبات مُحوِل أو مُعمَّر. حَزَاز مُتَحابِك، أَشْنَة الجمجمة (٣) ساقُه جالسة، هزيلة. أوراقُه مُتعاقِبة، مُركَّبة . أزهارُه من الأسض المُتورِّد إلى الوردى اللَّيلكيّ. طعم أوراقه يَتقارب من طعم قُرَّة العَيْن. أوراقه ويزوره حِرِّيفة نافِطة. يَنبت على حوافي الجداول وفى المروج الرَّطبة وعلى

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسميات للمؤلِّف.

⁽٣) التَّسمات للمؤلِّف.

باسم «أشنة جمجمة الإنسان»؛ وكان يُدفع ثمن هذا النوع الّذي يَنبت ويعيش على جمجمة المَشنوقين، مقدار وزنه ذهبًا، ويُستعمل ضِدّ داء النّقطة.

Lichens tinctoriaux حَزَاز صِبَاغِي -۸۸ (F)

إِنَّ أنواع الحزاز تُعطي الصِّباغ أربعة ألوان هي البُنِّيِّ والأصفر والأرجوانيّ والأزرق. اللُّون البُنِّيِّ يحصل من الحزاز المُتَبَثَّر والرئويِّ؛ والأصفر من حزاز الحيطان والحزاز التَّعْلَبيّ. الأنواع التي تُعطى اللُّون الأحمر أو الأرجواني هي من البَرّ أو من البحر. تَنتمي أنواع البحر إلى جنس رُوكْسَلّة (١) Roccella، والنوع الأكثر استعمالًا منها هو رُوكُسَلّة صِباغِیّة (۱ R. tinctoria وهو نوع یعیش على الصخور البحرية في الرأس الأخضر، ومادير، والموغادور، وسردينيا، وكورسيكا، والكناري، والأسور. ونجد في المحيط الهندي النَّوع روْكُسَلَّة مونْتاني^(۱) R. Montagnei. أُشْنَة الصبّاغين المَدَغشقريّة تنتج من روكْسَلَّة زُنْبُورِيَّة الشَّكل (١) R. fuciformis. وهناك أنواع أخرى منها في أمريكا وسواها.

تَنتمي أنواع البَرّ إلى جنس جُدَرِيّة (۱) Variolaria منها بنوع خاص الجُدَرِيّة المبيَضّة (۷. dealbata (۱)، وجُدَرِيّة

أورْسِينا (١٠ V. Orcina أي Parelle وهما نوعان اكتشف فيهما رُوبيكيه مادَّتَين مُتبلِّرتين هما: ڤاريُولِين، وأورْسِيْن، وهما يعيشان في جبال الپيرينيه والأوڤَرْنيه والألب، إلخ. اللَّون الأزرق يحصل من أنواع شَحْمَة الأرض الدَّرية (١٠ Lecanora). وبنوع خاص من شَحْمَة الأرض التَّترية (١٠)

ح ز ا

إذا مُرِثَت أنواع حزاز اللَّون الأحمر مع البَول، تُشكِّل تلك المواد الصِّباغية البَنفسجية اللَّون التي تعرف باسم «أشنة الصِباغين»، وهي تَصبغ باللَّون القِرمزيّ الزّاهي من دون مُرْسِخ (مادَّة كيميائية تُثبَّت اللَّون أو الصِّبغة)؛ وحسبما تكون من البحر أو من البرّ، فإن الأشنة الصِّباغية تُدعى أُشْنَة البحر (أشنة الجزر أو الكناري أو العُشب) أو أُشْنَة البرّ (أشنة أوڤرنيه، أَشنة ليون).

يُحضَّر لَكَ أزرق اللَّون بواسطة شحمة الأرض والنُّشادر أو البول، مماثل لدوّار المحلول الذي يُستخرج من الكروتُن الصِّبَاغين الصِّبَاغين الصِّبَاغين الصِّبَاغين Croton tinctorium أي Maurelle وهو أكثر حساسية، كمادّة كاشفة، من هنا الأخير.

إن المادّة المُلوِّنة لا توجد في هذه الأنواع من الحزاز بشكل مُسْبَق ولكنّها تتشكَّل نتيجة ظواهر خَمائريّة وَصَفها كلّ من غُورِيْس ورُونْسْرَاي عام ١٩٠٦. هكذا

⁽١) التَّــمية للمؤلِّف.

de veau (F)

شريحة عجل مقطعة ۶ ۱۲۰ نَغلى بحرارة هادئة، في وعاء مُغطّى، لمدّة ساعتين. نُمرّر السّائل عندما يبرد (دستور ۱۸۳۷، و۲۸۲۱). نُحضِّر بالطُّريقة ذاتها حَسَاء رئة العجل، والدِّجاج، والقريدس، والسلحفاة،

والضَّفادع (دستور ١٨٣٧).

حساء العجل المُتَقى Émétisé يُحضَّر بإضافة ٥ سنتغ من المقيِّئ إلى حساء العجل، والحساء المسهِّل، وإضافة ٦٠ غرام من سولفات المغنازيوم إليه.

حساء الأفاعي كان مذكورًا في دستور ١٨١٨، وكان يُحضُّر على غرار حساء العجل من أفاعي منزوعة الرأس والذُّنب، بمعدّل ١٢٨ جزء لكل ٣٨٤ جزء من الماء.

٩٠ حَشِيْشَةُ اللَّيْمُون، عُشْبَةُ الشَّاي (١) Lemon grass (E)

Verveine indienne (F)

Citrongrass (D)

Andropogon citratus, Cymbopogon citratus (S)

نَبات عُشبي مُعمّر من فصيلة النَّجِيلِيَّاتِ. أوراقه عصفيّة النَّصا ، ليمونيّة الرّائحة، ذكيّة العَرْف، تُستعمل

(١) التَّسمة الثَّانة للمؤلِّف.

ليكانوريك أو أورسَليك) الذي يوجد مسبقًا في الجُدريّة المبيّضة وفي جُدرية أورسينا وفي شحمة الأرض التَّتَريّة، والَّذي اكتشفه شُونْك، إذا غُلِيَ بالماء أو أخضِع للتَّقطير الجافّ، فإنّه يَتحوَّل إلى أورْسِيْن (أو أورْسِينُول، وهو ل -متيل - رِيزُورْسِينُول)؛ إن هذا الأخير، وبالفعل المتزامن للأوكسجين والهواء والنُّشادر، يُعطى أورْسَاييْن، أي مادّة الأشنة المُلوِّنة (وكذلك مادة دوار المحلول).

> إن الأريترين الّذي اكتَشفه «كان» Kane يُوجِد مُسبقًا في الروكُسَلَّة الصِّباغيَّة، ويَتغيّر، بملامسة الهواء والنشادر، إلى أماريترين أي مُرّ الأريترين الذي يُصبح، نتيجة ملامسة أطول، التَّلَريترين، ومن ثم الأورْسَاييْن. إنّ الرُّوكْسَلّين أي الحامض الرُّوكْسَلِّيك، الَّذي يوجد أيضًا في الروكْسَلَّة الصِّباغيَّة، يمتصّ الأوكسيجين ويُشكِّل، حسب روبرت كان، الحامض الأريترولاييْك. إن هذه الموادّ إذا احتفظ بها محلولة مع زيادة من النُّشادر، تُشكُّل أشنة الصبّاغِين Orseille.

Pustuleux	مُتبثر
Vulpin	ثَعْلَبِحُ
En forme de frelon ق	زُنْبوږ
آرية Fermentaire	خَما
Pulmonaire	رئوي

Para cress, ح ش ي النّتَاق – ٩١ Spilanthes (E) Cresson de Para, Cresson du Brésil, Spilanthe (F) Parakresse, Husarenknopf (D) Spilanthes oleracea (S)

نَبات حَوْلِي مِن فَصِيلَة المُركَّبات، مهده أمريكا الجَنوبيَّة. سوقُه نائمة على الأرض. أوراقُه بَيضَويّة الشَّكل، كامِلة. رُؤيساتُه الزَّهرِيَّة هامِيَّة الارتكاز، مَخروطيّة الشَّكل، صَفراء اللَّون (بُنيَّة كُل أقسام النَّبات لها طَعْم لاذع وعِطريّ. كُل أقسام النَّبات لها طَعْم لاذع وعِطريّ. الشُّكل، تُسمّى إسْبِيلَتُول أو إسْبِيلَتُون، من إسْبِيلَتَان، ومن مادَّة مُتَرَجَة عديمة السَّكل، تُسمّى إسْبِيلَتُول أو إسْبِيلَتُون، وهي مادَّة سائلة صَفراء اللَّون، تِبْنِية الرّائحة، ومن مادّة بِلُوريّة، لها صفات وهي مادّة مورقيل. ومن المُركِبات مادة الفيتوسُتارول. ومن المُركِبات مادة مؤلّفة بمعظمها من غليسريد حاصِض سِيروتيك.

الخصائص - عناصر حشيشة النَّتاق مُضادَّة لداء الحَفَر، مُلَعِّبَة، مُرْضِبَة Sialagogue، ضُراسِيَّة (نافع لوجع الأسنان).

الاستعمال - دَاء الحَفَر، وَجَعِ الأسنان، ضَعف اللِّئَة، فَقْد الرِّيق.

طريقة الاستعمال - تُؤكّل الأوراق الفَتِيّة الطَّرِيّة في السَّلَطة. يَدخل هذا النَّبات، كمضاد قويّ لداء الحَفَر، في تَحضير بعض الأطباق المَدَغَشْقَريَّة.

إستعمال الشاي. وهو نبات يُزرع للزّينة في لبنان، حيث يبدو أنّه لا يزهر أبدًا.

المُركِّبات - زيت دهني يحتوي خاصة حتى ٨٥٪ من السيترال.

الخصائص - منبّهة للمعدة، مطهّرة، منظّمة للعَصَب المُبْهَم السَّمْيتاوي، مُدرّة للحليب؛ من الخارج مبيدة للطفيليّات.

الاستعمال الداخلي - كسل المعدة، عسر الهضم، إلتهاب المعى، إلتهاب القولون، كسل العَصَب النُّبوتيّ، شَحِّ الحليب، الخارجي: تَقَمُّل.

طريقة الاستعمال - يؤخذ من الزَّيت الطيار ٣ إلى ٤ نقاط مع العسل أو في محلول كحولي، ٢ أو ٣ مرات في اليوم. لم تُذكر أية استعمالات للأوراق.

ملاحظة - يَشِحّ الكلام عن هذا النّبات في الكتب الطبّية، وتقلّ التفاصيل أو تغيب، ربما للدلالة على «حذر ما» يخالج المؤلّفين ذوي الخبرة والاختصاص من التّشجيع في استعماله بكثرة؛ وبينما نلاحظ الغموض الذي يلفّ هذا النّبات الذكيّ الرّائحة في لبنان من حيث الهوية النّباتيّة والخصائص الطبّيّة، نَرى من جهة ثانية، شيوع استعماله الشّعبيّ عندنا، أقلّه في بعض المناطق، وبشكل لا يبرره، في ظنّنا، المناطق، وبشكل لا يبرره، في ظنّنا، سوى التلذّذ بالعرف الذكي الفوّاح الذي المنارل. وبالتالي، نُذكّر بعدم الخلط بين حشيشة وبالتالي، نُذكّر بعدم الخلط بين حشيشة اللّيمون وبين نبات يشبهه هو عود الوَجّ.

Lavements, Clystères,	حُقَن	-4 Y
Enègmes (F)		

	نُحضِّرها كما يلي:
	أوراق حشيشة النَّتاق ٤٠ غ
٥	أوراق الرَّاسَن inula bifrons ١٠ غ
س لو	حشيشة الحُمّى ١٦ غ
ىو ما	كحول ٨٦ درجة٨٠ غ
	نُقَطِّع كافَّة الموادّ المذكورة، ونَنقعِها
	في الكحول لمدَّة ١٥ يومًا. نُصفِّي
٦	ونعصر. إن هذا المُستحضَر كان يُباع
<u> </u>	في الماضي لمعالجة آلام الأسنان بإسم
ما	. Paraguay-Roux

نُبَلِّل قطنة صغيرة أو صُوفان بالمُستحضر، وندخلها في السِّن المُتَسَوِّسَة، أو نضيف عدَّة نِقاط منه إلى كوبٍ من الماء، نَتَغَرْغَر به عِدَّة مَرَّات.

تَركيبة أُخرى:

۲۰۰ غ	أوراق حشيشة النَّتاق
۱۰۰ غ	حَشيشة الحُمّى
٠٠٠ غ	كحول ٩٠ درجة
	نَنقع الأعشاب المُقطَّعة با
مَر للتاريخ.	ثلاثة أيّام، ونُصفّي. مُستحط

مُلاحظة - إن طَعْم حَشيشة النَّاق القَويّ جدًّا، الحارق، الخاصّ بها، يَجعل منها خضارًا أَقَلَ جودة من قرّة العَيْن. ولكنّها تُعتَبَر مُضادًّا قَويًّا لداء الحَفَر. تُرغبُ جدًّا في المناطق الاستوائيّة، ومن هذه الزّاوية على الأخصّ. راجع أيضًا بحث:

حقنة طاردة للحتى سولفات الكينا لودائم روسو ماء الخس المقطر الكمية لربع حقنة . حقنة جيلاتينية

لاتين شائع	جي
	ماء
نحلّ على الساخن.	,

٤٧ - حقنة مُغَلْسَرَة

غليسّرين متعادل ٤٠ إلى ٦٠ غ ماء

٤٨ - حقنة زيتية

حقنة مليّنة ١ عدد زيت أبيض ٢٠غ

٤٩ – حقنة زيت الخروع

زيت خروع ٥٠٠ غ نقيع الخبيزة ٣٠٠٠ غ

٥٠ - حقنة مُيَوَّدَة

عادية سلفًا.

صبغة اليود (البوتاسيوم ١ إلى ٢٠ نقطة يودور البوتاسيوم ١ إلى ٢٠ غ ماء ٢٠٠ إلى ٢٥٠ غ ضد الديسنتيريا المزمنة . تعطى حقنة

٩٣ - حَلْحَلِ أَشْعَرِ، يُلْيُوسِ أَشْعَرِ، حَلْحَل أَزَب، بُلْبُوس الكَلْب، بَصل صمغ، موادّ سُكَّريّة، أملاح معدِنيّة. الزِّيْز، بَصَل المِسْك، سِلَّيْتَة، بَصَلَ الدِّيْدِ، بَصَلَ الدِّيْدِ، (۱)

> Fair-haired hyacinth, Tassel hyacinth **(E)**

Muscari chevelu, Muscari à toupet, Jacinth à toupet, Ail à toupet, Lilas de terre, Vaciet (F)

Schopfmusk (D)

Muscari comosum, Hyacinthus Comosus, Muscari longissimum (S)

نَبات صغير مُعمّر من فصيلة الزَّنْبَقيّات، بصلته من ٢ إلى ٤ سم، بنيّة الغلافات. أوراقه ضُمِّية، لحميّة، عريضة الشَّكل السِّنانيّ، مُروَّسة، يبلغ عرضها ٢٢ ملم أحبانًا، هوامشها مُهدَّية صغيرة الأسنان. ساقها هزيلة، أسطوانيّة تعلو ٣٠ إلى ٧٠ حمّام زيزفون سم. إزهرارها في عُنقود مُرتخ طوله ١٠ إلى ٣٠ سم. الأزهار المُخفِقة عديدة، مُتراصة، سُويقاتها أطول من سُويقات الأزهار المُخصية، باهتة اللَّون الأزرق. الأزهار المُخصبة ذات سُويقات متفاوتة الطُّول، قصيرة جدًّا، أو تبلغ وتَتَخطَّى السنتمتر الواحد، بُنَّة اللَّون أو مُخضرة أحيانًا، طولها ٤-٦ ملم، مستديرة أو شبه مقطومة القاعدة. عُلسة شبه كُرويّة ثُلاثيّة الصَّفحات، طولها وعرضها متساويان، مستديرة وغير منفرجة الرّأس. يزهر من آذار إلى حزيران في الحقول والمراعى

(١) التَّسمية الأولى والثانية للمؤلِّف.

المركّبات - في البصلة لُعاب، عَفْص، حم ا

الخصائص - مُبوِّل، مُليِّن.

الاستعمال - نقيع، لصوق. بصل الحلحل يُؤكل مطبوخًا بسبب طعمه المُرّ. وإذا هُرِست توضع لَصوقًا على البشرة المُحمرَّة. وبشكل عام نحصل من هذا البصل على تأثيرات البصل الزِّراعي ذاتها، خاصة في ما يتعلَّق بالخصائص المبوّلة. البصلة قد تُحفظ في الخَل فتفقد بذلك الكثير من جوهرها المُرّ .

٩٤ - حَمّامات Bains (F)

Bain de tilleul (F)

نقاعة ٥٠٠ غرامًا من أزهار الزيزفون في الماء الغالي، نصفيها بالقماش ومن ثم نضيفها إلى ماء الحمّام.

حَمّام ضد الجَرَب (بيطري) Bain antigaleux (vétérinaire) (F)

۲۰ کلغ	كرازيل
۱ کلغ	أنْهيدريد زَرْنيخيّ
۱۰ کلغ	پُوليسُولفور البوتاس
۱۰ کلغ	كربونات الصوديوم
J 1 · · ·	ماء

حَمَّام فعال ضِدَّ الجَرَبِ وفَعَال أيضًا ضد القُراد.

حمّام مُصرّف، حمّال حالً Bain résolutif (F)

۸۰ غ كبريت ملح بحري ٢٠ غ كربونات الصوديوم ١٥ غ ١ إلى ٢ كمشة مريمية (كمشة) J7

في حمامات، لوسيونات، رَشّاشات (دوش)، في العِقْدَة الخنازيرية أي السَّلَعَة وفي الشَّوْك المنفوخ -Spina . ventosa

حَمّام مضاد للطَّفَيْليّات بالنيكوتين Bain antiparasitaire à la nicotine (F)

عصير تَبْغ بنسبة ١٥غ ۱۰۰غ نيكوتين في اللّيتر 11...

إن عصير التَّبغ يُعيِّر بين ٨ و٢٠غ من النِّيكوتين في اللِّيتر، ومن المناسب تَعديل كمِّيَّة العَصير التَّبغي في المحلول بحيث يُصبح عِيار النِّيكوتين ١٫٥ في الألف. عدم مُعالجة الحيوانات التي يُوجد على جلدها بَرزات أو زوائد فُطريّة. يُحْتَفظ به للخُواريف فقط.

حَمَّام مُنَشْدَر حَدِيدِيّ Bain ammoniaté ferrugineux (F)

۱۵ غ	كلورهيدرات الأمونياك
•ه غ	كلورور الحديد
كمّيَّة كافية	ماء

يؤخذ ضدَّ الكُساح والخَرَع وتَعقُّد (١) التَّسمية للمؤلِّف.

المفاصل.

	حمّام مُنشّط
رر	أَنارِف أي أُنجَبا
۸۱ غ	ناردین
٨١ غ	بيلسان
۱۸ غ	بابونج
١٥٠٠ غ	ماء غال
و دقائق، نسكب الكل في	ننقع لمدّة ١٠

ماء الحمام ونضيف:

حامض أستيك ٣٦٠ غ ماء حياة/ قنديد

الانتباه إلى سَكْب المزيج الأخير على ثلاث دُفعات يفصلها ربع ساعة كل مرة، وحتى يشعر المريض بحرارة مستحبّة. في معالجة التيفُوس أي الحُمّى الصفراء.

٩٥ - حُمَّيض منفرج الوَرَق (١) sauvage, Parolle, Rhubarbe sauvage **(F)**

Rumex obtusifolius (S)

نَبات مُعمَّر من فصيلة البَطْبَاطِيَّات يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه الزَّهريَّة خشنة، قوية، مضلِّعة، مُحمرَّة اللَّون؛ أوراقه السُّفلي مُتبادلة، مُعنَّقة، عروقه الوَسطيّة مُحْمرَّة اللُّون، يَبضويَّة، قَليتة: أزهارها مخضرة اللُّون، زناداتها خَيضية الشَّكل، دُوّاريّة التَّرتيب، سُنبليّة التَّجميع، ٣ كأسيات ضيِّقة، مُنبسِطة، ٣

كأسيّات مُنلَّنة، مُطرَّزة بمصاريع منها مِصراع أو مصراعين مُزوَّدان بحُبَيْبَة، ٦ أسدية، ٣ أقلام ذات سِمات؛ الشَّمرة مُثلَّنة الزَّوايا، ذات بزرة واحدة محميّة المصاريع؛ الجذر غليظ، خشن، بُنيِّ اللَّون، مقطّعة أصفر. الرّائحة حامزة؛ الطَّعم مُرَّ وحامز.

الأقسام المُستعملة الأوراق العصير الطّازج الجذور المجفَّفة التي تُنظَّف من دون غسيل.

المُركِّبات - مُركِّب من الحديد والفوسفور، مواد عَفْصَانيّة، غلوكوسيدات.

الخصائص – مُضادّ لفَقْر الدمّ، قابض، منتِّ، مُبوّل، مُسهّل، مقوّ.

الاستعمال - فقر الدم، يَرقان، إمساك، علاج ربيعي، أمراض جلديّة (قوباء)، كُباد، قرحات الساق.

طريقة الاستعمال - قريب الحميض الزِّراعي أي الحُمَّيْضَة؛ طعمه خالٍ من الحموضة ولكنّه مُرِّ جدًّا. مُركِّباته فعّالة عمومًا، ولكنّها لا تؤثِّر إلّا بعد فترة طويلة.

لمعالجة فقر الدم يؤخذ نقيع الحميض يُوميًا، أو غرامان من مسحوق الجذر ممزوجان مع العسل أو برشام بسبب الطَّعم الشَّديد المرارة؛ في الإمساك يُؤكل الحميض الغَضّ؛ في القُوباء والأمراض الجلديّة يؤخذ لمدّة أسبوع،

" فناجين يوميًّا من نقيع ٢٥ غرام من الجذر المجفَّف المُقطَّع في ليتر ماء يغلى دقيقتين ويغطّى ١٥، وذلك بهدف دعم العلاج الخارجيّ للقوباء؛ للكبد، " فناجين يوميًّا، واحد منها على الريق، من نقيع ٢٠ غرام جذور في ليتر ماء يغلى ٥ دقائق ويغطّى عشرة؛ أما على قرحات الساق فنضع لصوقات من الجذر الغض المهروس. في معالجة البشرة يؤخذ طوال المهروس. في معالجة البشرة يؤخذ طوال غرام جذور في ليتر ماء يغلى ٥ دقائق غرام جذور في ليتر ماء يغلى ٥ دقائق ويغطّى بعض الوقت.

كان ما يُجْمَع في الماضي من الحميض الشَّلَبي يُنْسَب دائمًا إلى الحميض المنفرج الورق.

رغْلِيل رَغْلِيل - عَوْذَان شَقِيّ ، زِغْلِيل Celery leaved crowfoot, Water الفِسْق Celery, Marsh crowfoot (E)

Renoncule scélérate (F)

Gifthahnenfuss (D)

Ranunculus Sceleratus (S)

نبات حَوْلِيَ من فصيلة الحَوْذانِيَّات. جذوره مبيضًة اللَّون، هزيلة. وهو نبات أمْرَط أو قليل الزغب، فاتح اللَّون الأخضر، وحيد الساق في غالب الأحيان. ساقه مُنتصِبة تعلو من ١٥ إلى ٦٠ سم، غليظة، ناسوريّة، فَرْعاء جدًّا، فروعها مُنتصِبة. أوراقه الجذريّة ضُمِّية، طويلة العنق كما الأوراق السَّاقيّة

ح و ذ

ح ي ا

الشّفلى، وهي مَرْطاء، كلويّة النَّصل، راحيّة التَّفصيص أو التَّقسيم إلى ٣ أو ٥ سَكَمات خفيفة التَّفصيص. الأوراق العُليا قصيرة العنق أو لاطنة، سَكَماتها أقل تقطيعًا أو حتى كاملة. أزهار عديدة جدًّا، صغيرة، قطرها ٥ إلى ٦ ملم. كأسيّات منبسطة ومن ثم مَلْوِيَّة إلى الوراء، بَيضويّة الشَّكل. البتلات كبريتيّة اللَّون الأصفر. أكنات صغيرة جدًّا اللَّون الأصفر. أكنات صغيرة جدًّا وعديدة جدًّا، بَيضانيّة، مضغوطة، ذات منقار جانبيّ، تُشكّل سُنبلة بَيضانيّة منقار جانبيّ، تُشكّل سُنبلة بَيضانيّة الشَّكل. الشَّكل. الشَّكل. الشَّكل. منقار جانبيّ، تُشكّل سُنبلة بَيضانيّة الشَّكل.

أطلب المركبات والخصائص والاستعمال في دراسة أحادية خاصة.

۹۷ حَيِّ العالَم المِكْرَار، حَيُّون مِكْرَار، وِدْنَة مِكْرَارَة - Orpine, Livelong, Mid Summer men (E)

Sédum reprise, Orpin reprise, Grand orpin, Herbe à la coupure, Joubarbe des vignes, Sédum télèphe (F)

Grosse Fetthenne, Rote bergfetthenne (D)

Sedum telephium, Sedum purpureum, Sedum Vulgare (S)

طريقة الاستعمال - نَضع على الحروق لَصوقًا من الأوراق الغَضَّة المَمْروثة في النَّوم، نُكرِّر النَّيت، عِدّة مَرّات في اليوم، نُكرِّر اللَّصوق حتى اختفاء الثَّفَن؛ وعلى القُوبَة عصير النَّبات الطّازج يُضاف إلى مِقدار مرّتين وزنه من الماء؛ ونَدهَن الفِلْع والصَّدْع والشَّق، عند النَّوم، بأوراق النَّبات المَمروثة في زيت الزَّيتون؛ وعلى البواسير لَصُوق الأوراق المَمروثة في زيت الرَّيتون، وعلى قرحات المَمروثة وعلى قرحات

خُماسيّة الكأسِيّات القصيرة، خُماسِيَّات البَتَلات، عُشاريَّة الأسْدِية. خمس كَرابل، بزور صغيرة، ريزوم قويّ، قصير، الجذور سميكة، رائحة معدومة. الطَّعم حُلو في الأوراق وحامز في الجذور.

إلى اللُّون الأرجوانيّ، أو الأبيض، أو

الأصفر الفُستُقي، أو الوردي (حسب

الضُّروب)، وهي عِذقيّة التَّجميع،

المُركِّبات - أملاح مَعدِنيّة، تَلافيوسيد، عَفْص، لُعاب، سكاكر.

الخصائص - قابضة، مُنظِّفة، مُليَّنة، شافية للجرح، مُنعِشة، مُبوَّلة، هاضمة.

الاستعمال - العصير الطّازج، كل أقسام النّبات المُجفّف، الأوراق الغَضَّة أو المحفوظة في الزّيت (تجفيفُها صعب). حرق، جُسْأة، تَكَلْكُل، رَضَّة، كَدمة، ثَفَن، عُسُق، قُوباء، فِلْع، صَدْع، شَق، بَواسير، ثُؤلول، قُرحة.

نَبات مُعمَّر من فصِيلة المُخَلَّدات يَعلو من ٣٠ إلى ٢٠ سم. ساقُه مُنتصِبة، قاسية، مَرْطاء، قَليلة الفُروع. أوراقُه مُتَقابِلة، مُتَعاقبة أو دَوَّارِيّة، وهي لاطئة، مُسَطَّحة، لُبابِيَّة، شَحيمة، بَيضوية الشَّكل، رَخْوَة التَّسَنُّن. أَزهاره

البَشرة المحيطة بالثَّولول.

٩٨- حَيّ العَالَم الوَرْدِيّ، حَيّون وَرْدِي Joubarbe rose, Orpin rose, Rhodiole **(F)**

Sedum roseum, Sedum rhodiola, Rhodiola rosea (S)

نَبات مُعمَّر من فصيلة المُخَلَّدَات يَعلو من ١٥ إلى ٣٠ سم، أرومته عَطِرة، من دون فسائل عقيمة؛ سوقه مُنتصِبة،

البَشَرة، لصوقًا من الأوراق عينها. أمّا مَرْطاء، بحريّة اللَّون، مورقة جدًّا. حي ا على الثَّؤلول فتُمْعَس الأوراق الغَضَّة أوراقه متقاربة، بَيضويَّة الشَّكل السِّنانيّ، حتى اختفائه، مع وجوب الحفاظ على مُستدِقّة الطَّرف، لاطئة، مُسنَّنة في قسمُها العُلويّ. أزهاره ثُنائيّة المَسْكِن، مُحمرّة اللُّون الأخضر، عِذْقية التَّجميع المُتَراصِّ؛ أربع كأسيات؛ ثمان أسدية بارزة؛ أربع كرابل. جبلي. عَدو الكلس. ملاحظة - أربع نَباتات تَنتمي إلى فصيلة المُخَلَّدات وتُسمّى خَلُّود أو عَمِيْر، تذكرها الفرماكوبيات الأجنبية المُختلفة

كأنواع طبيّة، منها الخَلُّود الورديّ.

خ

Mauve alcée, Alcée خُبَّازَة خُطْمِيَّة -٩٩ (F)

Malva alcea (S)

نَبات مُعمَّر من فصيلة الخُبَّازِيَّات يَعلو حتى المتر. حَمْلُه مُستَرْخ، أوراقُه كَفِّية مُشَرَّمة الأقسام، خضراء اللَّون الفاتح، خَمْلِيَّة الكَساء. أزهاره وَرديّة اللَّون الأرجوانيّ الباهت، قطرها ٥ سم، الأرجوانيّ الباهت، قطرها ٥ سم، السُّفلي منها إبطيّة مُنفرِدة، العُليا مجموعة بباقات إبطيّة وهامِيّة. إزهراره صَيفيّ.

ري المُركّبات - مَوادّ لُعابِيّة .

الخصائص - مُسكِّنة لَلجهاز التَّنَفُسيّ، مُللِّنة، مُسهِّلة؛ من الخارج مُلطَّفة للبَشَرة وفَعّالة في علاج الإلتهابات التي تُصيب كافّة التَّجاويف الجَسديّة الخارجيّة.

الاستعمال - إصابات الجهاز التَّنَفُّسيّ، إصابات الشُّعَب، إمساك، إلتهاب المِعَى، مغص الأمعاء، البَشرة، الفَمّ، اللَّنَّة، اللِّسان.

طريقة الاستعمال - نُقاعة الأزهار في الماء المَغليّ، تُحلّى بالعَسَل ويُؤخَذ منها ك فناجين في اليوم وفي إصابات الجهاز التَّنَفُّسيّ. نَقيع الأزهار المجفَّفة يُغلى ٥

دقائق ويُؤخذ منه فنجان في اليوم الإصابات الشُّعبيّة، أو صباحًا على الرّيق في مُعالجة الإمساك. تصلح النُّقاعة من الخارج لغَسْل البَشرة المُحمَّرة والمُلتَهِبة ، ولغسل تجويف الفَمّ في علاج الالتهابات التي تصيب الفَمّ واللَّقة واللَّسة واللَّسان، كما تصلح حِقنًا شَرجيّة في التهابات المعى ومغص الأمعاء.

١٠٠- خَرْبَق أَخْضَر (١)

Green hellebore (E)

Ellébore vert, Ellébore à fleurs vertes (F)

Grüner nieswurz (D)

Helleborus viridis (S)

نَبات طبِّي تَزييني مُعمَّر من فَصيلة الشَّقِيقيَّات يَعلو حوالي ٤٥ سم. أوراقُه قُرصيَّة التَّجميع تَنْشرِم عن ٩ إلى ١١ وُريقة مُستطيلة، نَصلُها مالس البشرة، قاتم اللَّون البَحري. ساقُه شِمراخيّة تَحمل من ٣ إلى ٥ زهرات كبيرة القدّ، زاهية اللَّون الأخضر، خالية من العُرْف. يَنبت في الأحراج القريبة من الغُرْف. يَنبت في الأحراج القريبة من الغُرواحي الباريسيّة حيث يُعثر عليه مع الخَرْبَق النَّجِس. إزهراره من آذار إلى أيار.

المُركِّبات - يحتوي على خَرْبَقين أخضر أي ألابُورِين وعلى خَرْبُوقين أي ڤيراترين.

الخصائص - مُجِّد في الماضي في

(١) التَّسمية الإنكليزية والألمانية للمؤلف.

معالجة الأمراض الجلديّة. وذُكر أنه الأمراض العَقْليّة، وهو نوع كان ينبت خ ر ب يُستعمل طبّيًا استعمال الخَرْبَق الأسود إِلَّا أَنَّهُ أَخْصَب مادَّةً وأَشَدَّ مفعولًا.

> ١٠١ - خَرْبَق الشَّرْق، خَرْبَق مَخْزَنِيّ (١) Oriental hellebore (E) Ellébore d'Orient, Ellébore officinal **(F)** Orientalische nieswurz (D) Helleborus orientalis, Helleborus officinalis (S)

نَبات طبِّي تَزييني من فصيلة الشَّقِيقِيَّات يَعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم، أوراقه قرصيَّة التَّجميع، دائمة، مَرْطاء أو مُوبرة، الجَذريّة منها كبيرة جدًّا تَطول حتى ٤٠ سم، دَوَّاسِيَّة الشَّكل، تَنقسم من ٥ إلى ١١ وُريقة. الشِّمراخ الزَّهريّ مُورق، قصير القُنَيبات، يَحمل من ١ إلى ٤ زهرات تبدأ زبديّة اللُّون ومن ثم تميل إلى الأخضر المُصفَر البُنِّيِّ المواج. الكأس من ٦ كأسيّات بَتلانيّة بَيضويّة الشَّكل. البَّتلات مُختَصَرة إلى بُوَيْقات صغيرة أقصر بكثير من الأسدية العديدة الملوَّنة. الثَّمرة جرابيّة. البزرة سوداء اللُّون اللَّامع. أشكاله الجُغرافيَّة عديدة. مهده اليونان وآسيا الصُّغرى. يُزهر من شباط إلى نبسان.

الخصائص - يَعتقِد الخُبراء أن خَرْبَق الشَّرق هو النَّوع الذي كان القُدامي يستعملون منه قشرة الريزوم لمعالجة

بشكل أساسيّ في ضواحي Anticyre في اليونان، كما أنه النَّوع الوحيد الذي صادفه تُورنفُور في رحلاته إلى الشَّرق.

١٠٢ - خَرْبَق مُنَفِّط ، خَرْبَق أَمْرَط (٢) Blister hellebore, Vesicatory hellebore (E) Ellébore vésicant, Hellébore vésicant **(F)**

Blasenzichend nieswurz (D) Helleborus vesicarius (S)

نَيات مُعمَّر من قَسلة الخُرْيقتات وفصلة الشَّقِيقيّات، يَعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم، أَمْرَط جِدًّا، غالبًا ما يكون مُتعدِّد السّوق. أوراقه القاعديّة واسعة، ثُلاثيّة التَّشريح، شُدفاتها صغيرة العُنَيقات ومُقسَّمة إلى سُيور سِنانيّة. أوراقه الزّهْريّة لاطئة، مُشرَّمة، ثُلاثية - خُماسيّة الأقسام. أزهاره صغيرة القدّ، جَرسيّة الشَّكل، خضراء اللُّون، غالبًا ما تَتَموَّج بالأرجواني. كأسيّاتها مُنفرجة جدًّا، طولها حوالي ١,٥سم. منابرها خالية من النُّتوء، سَرْحَة. كرابلها شبه دائريّة، مُستديرة الرّأس. يُزهر في المناطق الحُوجيّة من شباط إلى أواخر نيسان.

الخصائص - نبات سام يكثر في بعض الجبال السُّوريّة المتوسِّطة الارتفاع عامّة وفوق سلنفة وكسّاب بنوع خاص. مُركّباته قد تكون مُخدِّرة ومُسهِّلة، كما قد تكون

⁽١) التَّسمة للمؤلِّف.

هذا النُّوع للوقوف على ما يحويه من الخُرْبَقين وسواه.

١٠٣ - خَشَب Wood (E) Bois (F) Holz (D)

إن الأخشاب التي كانت في الماضي خَشَب الحَفِث أو الحِفْث(١) تُستعمل في التَّداوي عديدة جدًّا، ولكن عددها تراجع اليوم كثيرًا. نذكر منها الأخشاب التّالية:

بَقَم أَسْوَد Bois de Campêche (F)

نبات من فصيلة القرنيّات إسمه العلمي ، Hæmatoxylum campechianum في كمپاش وهي مدينة تقع في جنوب المكسيك، وتنبت في الجماييك. خشبه أحمر أَدْكَن من خشب الألوة وأكْمَد منه ؛ حَطَبَاتِهِ المقشَّرةِ وغيرِ المنتظمة تُعطى في الغالب بَعضًا من الشَّكِير الأبيض. يَجِب أن تكون مُحمرَّة اللَّون الخارجيّ وبُرتقاليّة اللُّون الدّاخليّ.

المُركِّبات - إكتشف شَقْرُويْل في هذا الخشب جوهرًا عِطريًا هو الهيماتين أو الهيماتوكسيلين Hématine, Hématoxyline. يُستخدَم في الأعمال الفَنِّية للصِّباغ بالأسود والرَّمادي والبَنَفسجيّ والأزرق والقِرمِزيّ، وهي ألوان قليلة الصّلابة؛ ويَدخل كذلك في عدد كبير من الألوان المُركَّبة.

الخصائص والاسعمال - في الطبّ

خ ش ب مُميتة بجرعة قويّة. من المفيد جدًّا تحليل يُعتبر دواء مقوِّ وعَقُول، وكان يُحضَّر منه مياه مُقطَّرة (٥٠٠ بالألف)، ومُستخلَّص (من ١ إلى ٢٠)، ونبيذ؛ وكان أساسًا لدواء عَسَلت. أنه يُلوِّن البَوْل بالأحمر. الاستعمال العِلاجيّ لتلك المادّة مُحدود جدًا. استعملت أحيانًا كدواء عَقول ومُضادّ للإسهال.

Bois de couleuvre (F)

يُوجِد منه عِدَّة أصناف؛ ولكن يبدو أن الصِّنف الطبِّيِّ منها هو جذر الستريكنوس الحِفْثِيّ Strychnos colubrina (۱) من فصيلة اللّوغانيات. وهو جذر يأتي من المولوك، ثقيل الوزن، عديم اللُّون؛ أليافُه حريريّة؛ مُجِّد في الماضي ضِدّ نَهْش الأفاعي والحيوانات السّامّة وفي معالجة الحُمَّيات. وهو غير مُستعمل اليوم.

خَشَب رُودِس (١) Bois de Rhodes (F)

هو خشب أعْقَد، متلوًّ، ثقيل الوزن، طبقاته مُتراكِزَة بشكل مُتراص، لونه إلى الأصفر المُشقَرّ القاتم المحيط؛ قِشرتُه رَماديَّة اللُّون، خَشِنة جدًّا؛ رائحته رائحة الورد المُستحبَّة جدًّا. ومن المعلوم اليوم أن هذا الخشب يحصل من نوعين من اللَّبُلاب المتَشجَّر في جُزر الكناري. Convolvulus scoparius ، وكلاهما من

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

فصيلة المَحْموديّات. وهو الخشب الذي كان في الحقيقة خشب رودس عند الصّيادِلة والعَطّارين، ولكنه ليس هو ذاته خشب صانعي الأثاث الذي يحمل الاسم ذاته.

Bois (۱) خَشَب الأَلْوَة (۲) خُشَب الأَلْوَة (۲) d'aloès (F)

ينتج خشب الألوة الحقيقي من نبات من فصيلة القَرْنيَّات إسمه العلمي Aloexylon فصيلة القرْنيَّات إسمه العلمي agallochum أغَلُّوشا»، أو ألوة أغَلُوشا الخَشبيّة)، وهو خشب يأتي من الكُوشَنْشِين.

يكون خشب الألوة التجاري مائلًا إلى اللَّون البُنِّيّ على وجهه، وعَقِدًا جدًّا في بعض الأحيان. إذا نُشِر يكون مَقطعه مالسًا، راتنجيًّا، ومنقَّشًا بنقط صغيرة بيضاء. رائحته عِطريّة وراتِنجيّة.

خَشَب الوَرْد Bois de rose (F)

في مناطق الغِيّان، وفي شمال البرازيل عِدَّة أشجار تَنتمي إلى جنس "أوكُوتِيا" تُعطي ما يُسمّى به "أخشاب الوَرْد". وهو جنس من فصيلة الغاريّات يَضم عددًا كبيرًا من الأشجار والشُّجيرات ذات الأوراق الرِّيشيّة، المتبادلة، وذات الأزهار الصّغيرة القَدّ، العُثكوليّة التَّجميع الإبطيّة الارتكاز.

إن خشب الورد الذَّكريّ يَتحلَّى برائحة

اللّيمون أو البَرْغَموت؛ ويُستخدم على خ ش خ الأكثر في صُنع الأثاث. أما خشب المورد الأنشَوي، وهو الأكثر جودة واعتبارًا، فينسب إلى النوع Ocotea واعتبارًا، فينسب إلى النوع caudata أوكُوتِيا مُذَنَّبة (٢٠)؛ يُعطي دهنا يُقال له «دهن اللّينالول»، وهو اسم تَشترك فيه أدهان تحصل من فصائل نباتية مختلِفة؛ يُجمع الخشبُ في قِطع قُطرها من اللّي ١٠ سم، قُشورها مُحمرة اللّون من اللّي ١٠ سم، قُشورها مُحمرة اللّون البُنِيّ؛ المركب الأساسيّ الطّاغي في دُهن البُنِيّ؛ المركب الأساسيّ الطّاغي في مرغوب في صناعة العُطور. أما بالنّسبة مرغوب في صناعة العُطور. أما بالنّسبة في مواقعها.

Lebanon (۳) خَشْخَاش لُبْنَان – ۱۰٤ poppy (E) Coquelicot du Liban (F) Libanon mohn (D) Papaver libanoticum (S)

نبات محول أو معمّر من فصيلة الخشخاشيات. جذره متليّف. سوقه عديدة، نائمة أو صاعدة، أحيانًا له ساق واحدة منتصبة وفرعاء تعلو من ٥ إلى ٣٠ سم. أوراق النماذج العديدة السوق تكون قوية التجميع نحو العنق Collet، وأوراق النماذج الوحيدة الساق تكون عديدة على الساق. الأعناق متمدّدة القاعدة، كثيرة الأهداب والحرائر البيضاء المنتصبة

⁽١) التَّسميتان العربيّتان للمؤلّف.

⁽٢) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٣) كلّ التَّسميات ما عدا اللّاتينيّة للمؤلّف.

خ ل و

سكمات مفصصة بدورها. مجموع منعشة للبشرة. الأوراق باهت اللون الأخضر الذي يميل إلى اللون البحري. السوق متلوية دقيقة، لاصقة الحرائر المتفرّقة. البتلات معبلة، باهتة اللون الأحمر الشمس والطَّفْح الوَرْدِي. البرتقالي المواج، غير ملطّخة بالأسود. العُليبة مسودة اللون الأزرق، مُتطاولة، مخفَّفة الطرفين، تكلَّلها أسطوانة ضيَّقة، مخروطية. العليبة الناضجة تنفتح بأربعة مصاريع. نبات محصور في لبنان، ازهراره صيفي في الجبال العالية.

> ١٠٥- خَلُوْد عَنْكَبُوْتِي، عَمِيْر عَنْكَبُوْتِي Jupiter's beard (E) Joubarbe Toile d'Araignée (F) Hauswurz (D) Sempervivum arachnoideum (S)

> نَبات صغير مُنتصِب مُعمَّر من فصيلة المُخَلَّدَات يَعلو من ١٠ إلى ١٥ سم. أوراقه بيضية مُنعكِسة، مُستطيلة، ضُمَّتة التَّجميع، شبه حادّة الرّأس، غِدِّيّة، مكسوة بأؤبار بيضاء متصالبة فيما بينها كنَسْج العنكبوت. أزهاره عِذقيّة التَّجميع، بَتَلاتها ١٢، مَرْطاء، سِنانيّة، وَرديَّة اللَّون القِرمزيِّ البَنَفسجِيِّ المُواجِ. يرغب الحجارة والصخور.

> المُرَكِّبات - لعاب، عَفْص، حامض نَمْلي، مَالَات malates.

الخصائص - مُلبِّنة، مزيلة للثَّفَنِ

الطويلة. نصل الورقة ريشي التقسيم إلى والثؤلول، مُسكِّنة، رقوءة، عينيَّة،

الاستعمال - دمامل، رُعاف، نزيف، جروح، ألم الأسنان، التهابات الأذن، ثَفَن، ثؤلول، حمرة البشرة، إحمرارات

طرق الاستعمال - الأوراق المدقوقة توضع على الدَّمامل فتعجُّل في إنضاجها. العصير الطازج المُستنشَق يوقف الرُّعاف، ونزف الجرح. لَوْك الأوراق له مفعول مزيل للألم للأسنان. العصير الفاتر، يُقطر في الأذن، فعّال في معالجة إلتهاباتها. الأوراق المنقوعة في الخَلّ توضع على الثفن والثؤلول حتى تشفيها. لُّبِّ النبات يصلح قِناعات منعشة للبشرات المحمرة والطفع الوردى المتسبّ عن الشمس.

١٠٦- خِيَارِ الأَنْتِيلِ، خِيَارِ الكُورُنيشُونِ، كُورْنِيشُون، قَاوُون هِنْدِي(١)

Beergherkin, West indian gherkin **(E)**

Concombre des Antilles, Concmbrecornichon, Concombre marron, Cornichon, Angurie, Anguria (F)

Birngurke, Anguriengurke (D)

Cucumis anguria (S)

نَبات حَولي من فَصيلة القَرْعِيّات. فُروعه مَدّادة أو عارشة بعض الشَّيَّ.

⁽١) التَّسميات العربيّة للمؤلّف.

خ ي ا

والأغير.

ثماره تُحضَّر بطرق مُختلِفة، فإمَّا أن ثماره عديدة، مُضلَّعة القُشور، حجمها تُقطَف قبل اكتمالها، تُقَشَّر وتُحضَّر على غرار الفاصوليا الخضراء حيث تُشكّل طبقًا لذيذًا مُستحبًّا، وإمَّا تُكْبَس في الخل على غرار كل ما يُسمّى «كُورنيشُون»؛ والكورنيشون، أي خيار الكبيس، هو كل خيار من أي ضرب كان قُطِف باكرًا، قبل اكتمال بزره،

أوراقه راحية، ثُلاثيَّة النُصوص المُستديرة، الثُّلاثية الفصوص بدورها. وشكلها كالبيضة، مُزركَشَة برؤوس ونُتوء خَشِنة صُلْبَة كما في ثمار القَسْطَل هِنديّ. يَنبت طوعيًّا في جميع مناطق الأنْتيل كما يُوجد في كافَّة مناطق أمريكا الجنوبيّة خاصّة في قِسمها الشّرقيّ حيث يُزرع غالبًا كالخضار. ضروبه عديدة منها الأخضر والأصفر والمجذّع والموشّم للأكل أو للكبيس.

۱۰۷ – دِرْیاس، دَرُوس، دَرْسَت، إِذْرِيَاس، ثَابْسِيا غَرْغَانُو (١٠) Drias plant, Smooth thapsia (E) Thapsie, Faux fenouil, Faux turbith, Panacée d'Esculape (F) Falsche turbith (D) Thapsia garganica (S)

نَبات بَرِّى خَشِن معمَّر من فصيلة الخَيْمِيَّات يعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. كحول ٩٠ درجة أوراقه لامعة، ثلاثيّة التَّشريح الرّيشيّ وقويّة، مصفرّة اللُّون، قُلافتها معدومة أو عابلة. أكناته تساعيّة الأضلاع. وهو نبات يشيع بنوع خاص في الجزائر وصقلية والبلدان الحارة، عرفه تيوفراستُس، ديوسقوريدس، يلاينُس، وغالينوس. وهو يوجد بكثرة في شِناخ إسمه غَرْغَانُو Gargano يقع في جزيرة تَبْسُوس. جذره حامز جدًّا ومُرّ جدًّا، ويُستعمل أحيانًا كمسهِّل قويّ يحلّ محلّ نيات التُّوْيُد.

المركّبات - قشرة الجذر تحتوي على الحلول محل ثابْسِيا غَرْغَانُو.

(١) التَّسمات العربيّة للمؤلّف.

٢٠٪ من النشاء، ٥٪ راتنج رخو أصفر اللُّون، محمِّر جدًّا للبشرة (راتنج الدرياس، كودكس ١٩٣٧) اكتُشف عام ١٨٥٧. كذلك وُجد فيه حامض كَيْرِيليك، حامض كَيْرُويك، حامض أنْجليك، حامض إيزوناردينيك وثائسيك، كذلك فيه مادة متعادلة، غير أزوتية، منفّطة.

الاستعمال - يُستخدم هذا الراتنج لتحضير الغُرَيّاء، لَصْقة مُشمّعة، تَفْتات مُحمِّرة للبشرة؛ وإذا سُيِّل بواسطة الكحول أو الزيت، توضع منه طبقات محمِّرة بواسطة فرشاة صغيرة.

قشور مشرَّحة من جذر الدرياس

كميَّة مطلوبة

كمَّة كافية

نغسل قشر جذر الدرياس بالماء الفاتر الدَّقيق. أزهاره في خيمات مُركَّبة ونجفَّفه ونسحقه خشنًا. ننقعه على مرحلتين في الكحول الساخن في حمام مريم مغطّى . نُصَفِّق ، نُصفّى ونُقطّر للحصول على الكحول: إن الفضالة هي راتنج الدرياس، ممزوجًا إلى كمية ما من الموادّ الغريبة، نغسل الفضالة عدّة مرات بالماء الساخن، وعندما لا يعود الماء يحلّ شيئًا، نبخر في حمام مريم حتى قوام المستخلص الرخو (دستور ١٨٨٤).

ملاحظة - يقول هَكُل أن الثَّابْسِيا المُوبِرَة (٢) Thapsia villosa L. يمكنها

⁽٢) التَّسمة للمؤلِّف.

Derris (E) دِرِّیْس – ۱۰۸ Derris, Deguélie (F) Derris, Deguelia (S)

يُشار باسم درّيس إلى جنس من فَصيلة القَرْنِيّات الفَراشِيَّة، قريب من أجناس الغُبَيْدة Lonchocarpus، والبِسِّيدِيا(۱) Piscidia والبُنْغَامِيَا(۱) Piscidia (دَلْبُرْجِيَة في غير مرجع)؛ ويَتمثَّل بعددٍ ما من أنواع المناطق الاستوائية.

في بلادها الأصليّة، يَستخدِم البَلديّون الدرّيس لإخبال الأسماك وتخديرها؛ ولقد تَمّ التَّحقُّق لاحقًا بأن تلك النَّباتات هي سامّة للحشرات، ولكنها شبه عديمة الضّرر للإنسان والحيوانات الدّاجنة. ومن هنا انتشر استعمالها المعروف، يومًا بعد يوم، كمبيدات للحشرات.

إن الأنواع الأكثر استعمالًا هي الدِّريْس الاهْلْيلجيّ D. elliptica، والدرّيس المَنقَعِيّ D. Malaccensis، والدرّيس المَنقَعِيّ D. uliginosa؛ وهي تنمو في الهند والشَّرق الأقصى، وفي بُورينو وسومَطرة بنوع خاص، حيث يُشار إلى جدورها بأسماء؛ Akar toeba بالماليزيّة، Tuba wortel بالهولَّنديّة، بالماليزيّة؛ المؤلّفون بالأميركيّون يُطلقون غالبًا على جنس الأميركيّون يُطلقون غالبًا على جنس درّيس الاسم اللّاتيني Deguelia الذي المؤلّفة عليها قديمًا Aublet . وقام بدراسة الدرّيس التَّشريحيَّة المؤلّفة المؤلّفة الدرّيس التَّشريحيَّة المؤلّفة المؤلّفة المؤلّفة عليها قديمًا J. Maheu

خاص، ووجد في سوقها وجذورها دري خلايا مُنْتِجة للرّاتنج.

المُركِّبات - من الوجهة الكيميائيّة، إن المَركِّبات الفَعّالة المركِّبات الفَعّالة هو الرُّوتينون Roténone، مُكياسِر، دُيَاسِر، (٤ إلى ٨ بالمئة)، قابل للتبلّر، مُيَاسِر، يَتمتَّع بشكلين، واحد يَنصهر عند ١٦٣ سغ، الشّاني عند ١٨٠ سغ؛ وله مجموعتان مِيتوكْسِي وعمل لَكْتُون.

ويُوجد الرّوتينون كذلك في غُبَيْدة نيكُو (٢) Lonchocarpus Nicou الغِيّان، وفي غُبَيْدَة ذَهَبِيّة الوَرَق (٢) لا إلغِيّان، وفي غُبَيْدَة ذَهَبِيّة الوَرَق (٢) الغِيّان، وفي بعض أنواع الله (من القَرْفِيا (٢) دولي بعض أنواع الله من القَرْفِيات الفَراشِيَّة، مثال تَفْروزيا فُوجل (٢) تَفْروزيا كبيرة فُوجَل (٢) T. wogelii مَنْفروزيا كبيرة الوَرَق (٢) macrophylla أبى الرّوتينون، يُوجد فيها مواد مُتقاربة الله الرّوتينون، يُوجد فيها مواد مُتقاربة كيميائيًّا، كال دَغَلِيْن (٢) Déguéline مُتَجازي يَنصهر عند ١٧١ سغ، والله وهو لَكُتون يَنصهر عند ١٧١ سغ، والله وهو لَكُتون يَنصهر عند ١٩٨ سغ، درسه في الماضي هَنْريُو.

مُواصفات عامة – يُعرف جذر غُبَيْدة نِيكُو في أميركا باسم Cubé، كذلك بأسماء Barbasco، Timbos، إلخ؛ ويُطلق في سورينام على الغُبَيدة الذَّهبيَّة الوَرَق إسم Nekoe.

نظرًا للفائدة التي تُمثِّلها هذه المُبيدات

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

د ر ی

الحَشَريّة الجديدة، ومناجمها التي قد تصبح غير كافية، عمدت البلاد الاستواثية المناخ إلى زراعة تلك الأنواع وتكثيرها عن طريق العُقَل بالأفضلية. عام ١٩٣٤، صَدَّرت مناطق الهند النرلندية ١٤٣ طنًّا من الجذور. سِعْرها يُقدَّر حسب مضمونها من المُستخلَص الأثيري أو من الرُّوتينون. إن جذرًا من الصِّنف الجيِّد لدرّيس أو لـ Cubé يُعطى من ١٥ إلى ٢٠ بالمئة من المُركِّبات القابلة للَّوبان في الأثير، ومن وعلى حشرات فصيلة البراغيث. ٥ إلى ٨ بالمئة من الرّوتينون؛ إن جذر ال Nekoe هو أقلّ غِنّى، ولكنّه مع ذلك يُستعمل. واستنادًا إلى الأبحاث الحديثة، فإن الدريس المَنقِعيّ هو أدني بشكل واضِع من الدريس الإهليلجي والدرّيس المَلَقي وسواهما.

> بالنِّسبة لتقدير الكمِّية، يمكن الاستناد إلى مقدرة الرُّوتينون المُيَاسِرَة، أو اللَّجوء إلى استعمال الطُّرُق التَّحليليّة المِلْوَانِيّة Colorimétrie، أو كــذلــك إلــي وزن الروتينون المستخرج على التوالى بواسطة حالّات عُضويّة مُتعدِّدة (أثير، بنزان، كلوروفورم، تريكلور الأتيلان، تتراكلورور الكربون).

وبالإضافة إلى الرّوتينون، إن الأشكال الأخرى المُستعملَة هي مسحوق الجذر المُعَيَّر والمحلول مع مسحوق هَامِد كالطُّلْق وسواه، رَازِيْنَات(١) جذر

الدرّيس (Résinates: صابون غير قابل للذُّوبان، من الكلسيوم أو من الزنك؛ لَكّ)، مُستخلصات سائلة، إلخ. ويمكن كذلك تحضير مزيج مُعَلَّق من مسحوق الدريس في محلول مائي من الصابون عند الحاجة. إن مساحيق الدريس والغُبَيْدة يجب أن تُحفظ بمعزل عن الضُّوء والرَّطوبة في أوعية مُقفلَة تمامًا.

فی کودکس ۱۹۶۹ ذکر مُستحلّب من مسحوق الدريس للقضاء على الأساريع

١٠٩- دَزَرْبِيدِيْن Déserpidine (F)

 $C_{32}H_{38}N_2O_8 = 578,64$

قِلَويد عُزل من جذور الرولْفِيا المُبيَضَّة Rauwolfia canescens کیلورهیدراته يَنصهِر عند ٢٤٧، ٣٥٣° سغ مع تَحَلُّل.

الزربيدين، كيميائيًا، هو الرزريين الذي استُبدِلَت فيه مجموعة ميتوكي في وضعية ۱۱ بدُرّة هيدروجين.

فَرماكولوجيًّا، هو مُهدّئ مُسَكِّن يَتحلَّى بعمل مُنْقِص للتوتّر جَرَت عليه التّجارب في طِب الإنسان عن طريق الفَمّ بمقادير ٠,١ إلى ملّغرام واحد. لم يَعد يُصَنَّع.

١١٠ دُسُوم مُهَذْرَجَة، دُهُون مُهَذْرَجَة Graisses hydrogénées (F)

للحصول على زُيوت أجمد أي أكثر كثافة اعتبارًا من زُيوت أو دسوم رَخُوة،

نُعرِّض هذه الأخيرة للهَدْرَجَة، في درجات حراريّة تَختلف حسب الطُّرق المُتَّبعة وتحت الضَّغط بشكل عام، بوجود حافِز Catalyseur (نيكل مُفَعَّل أو سوى ذلك).

إن ترابُطات الذَّرّات الأتيلانيكيّة المُزدوِجة في الحوامض الدَّسمة تَتَشبَّع هكذا بالهيدروجين، فننقل، مثلًا من الحامض الرَّايْتيك (مع C₁₈ غير مُشْبَع)؛ إلى حامض دُهنِيّ (مع C₁₈ مُشْبَع)؛ يَتغيَّر بذلك قِوام الدَّسَم ونقطة انصهاره.

طُبِّقت هذه الطَّريقة على زيت فستق العبيد، وزيت السُّمسم، وزبدة جوز الهند، إلخ. وعلى دسوم حَيوانيَّة كزيت البَال.

إن المواد الحاصلة تكون جامدة، جميلة اللَّون الأبيض، وتجد استعمالاتها في التَّغذية كما في الصَّيدليّة (تحضير مراهم، سَوّاغ للتّحاميل، إلخ).

الأُخَوَيْن، دَمِّ الثِّنْيْن، دَمِّ الثُّغْبَان - ١١١ Dragon's-blood (E) Sang-dragon, Sang-de-dragon (F) Drachenblut (D)

Calamus draco, Dracæna draco, Pterocarpus draco (S)

مادّة راتنجيّة دَمويّة اللَّون الأحمر، عديمة الرَّائحة، تَفِهة الطَّعم، صلبة، فَتَاتة، لَهُوبة، تَحترق مع نثر رائحة اللهُ حدًّا في اللهُ على الله

الكحول، والأثير، والزُّيوت الدَّسِمة، والزُّيوت الدَّسِمة، والزُّيوت الطَّيّارة. يحتوي بعض أنواعها على حامض البَنْزَوِيْك؛ ولقد تمَّ الاتّفاق على إدراج دَمّ الأخوين بين البَلاسِم. يقع دمّ الأُخوين في الأشكال التّالية:

١ - في شكل عِيْدان أو قضبان كبيرة التشابه مع شَمْع الأختام أي الشَّمْع الأحمر أو اللُّك، تكون واحدتها مُغلَّفَة بورقة شجرة من فصيلة النَّخْلِيّات وجنس كِرْفِئة Corypha؛ وتُحفَظ مُتماسكة بواسطة سَيْرٍ من أسَل الهِند؛

٢ - في شكل كتل مُستديرة أو كُريّات زِنتها من ١٥ إلى ٥٠ غرامًا، ومُغلّفة كذلك بورقة شجرة، وتكون أحيانًا مُعلَّقة الواحدة بالأخرى في شكل مَسْبَحة: إن هذين النّوعَين من دمّ الأخوين هُما ما يُسمّى دم الأخوين القَصَبِيّ الشَّكْل؛

٣ - في شكل قوالب أو كتل كبيرة الحجم، تكون جَيِّدة الصنف أحيانًا، ولكنها تكون في أكثر الأحيان مُسودة اللَّون وغير نَقِيّة؛

٤ - في شكل طلامي بحجم أسطوانات الشَّمع الأبيض، لونها إلى البنِّي المُسْمَر. إن هذا الصنف الأخير يكون مُتدنِّي الجودة. وفضلًا عن ذلك إن دماء الأخوين القَصبية التي كانت تُعتبر من الأصناف العالية الجودة في الماضي، تُستبدَل اليوم في غالب الأحيان ممنتوجات مغشوشة الصنع تتداولها

دما

Dentaria pinnata, Syn. Cardamine pinnata (S)

يتم الحصول على هذه الأنواع المختلفة من دم الأخوين في الهند، عن طريق عليان ثمار أَسَل الهند أي قَصَب دراكو غليان ثمار أَسَل الهند أي قَصَب دراكو أمّا دمّ الأخوين في جزر الكناري فينتج من القاطر الجبّار .Dracæna draco L من القاطر الجبّار ، وهو صنف لا يوجد في فصيلة الزَّنْبقيّات، وهو صنف لا يوجد في الأسواق؛ كذلك هو الحال مع الصنف الحاصل من شجرة قَرْنِيّة تدعى الحاصل من شجرة قَرْنِيّة تدعى الحاصل من شجرة قَرْنِيّة تدعى أعيد إدراج هذه المواد الرّاتِنجيّة في الإصدار التاسع للفرماكوبيا الفرنسية عام الإحدار التاسع للفرماكوبيا الفرنسية عام 19٧٤.

المُركِّبات - يتمّ إستيراد دمّ الأخوين من الهند الشَّرقيّة على شكل مسحوق؛ ويُعتَقد إن هذا المسحوق ليس إلّا ثمار أسَل الهند المسحوقة. يتركَّب هذا المسحوق على الأكثر من أستيرات بَنْزُويّة ومن بَنْزُويْل أستيك الدراكُورازِيْنُورَيّة والمسحوبة بالدراكُورازِيْن وبالدراكُوألْبان وبالقليل من حامض البَنْزُويك الحُرّ والقليل من حامض البَنْزُويك الحُرّ والقليل من النَّيت الدُّهنيّ.

الخصائص والاستعمال - قابض، رَقَوْ، مُنظُف أسنان. جرعته غرام واحد إلى ٥ غرامات. أما في الصناعة فيصلح لتحضير أنواع الوَرْنيش.

۱۱۲ - دَنْتَارِيَا رِيْشِيَّة (۱۱۲ - دَنْتَارِيَا رِيْشِيَّة

(١) التَّسمة للمؤلِّف.

الدَنْتَارِيَا (۱) جنس نَباتات مُعمَّرة من فصيلة الصَّليبِيَّات، تَتميَّز عن أنواع الحُرْف Cardamines بأرومتها ذات الريزوم الأفقيّ الامتداد، الحرشفيّ المظهر، وبقدِّها الأَكْبَر.

الدَّنْتَاريا الرِّيشيّة نوع يَعلو من ٣٠ إلى ٢٠ سم. أوراقه ريشيّة مُفَلَّقة، مُركَّبة من ٥ إلى ٩ وُريقات مُتقابلة. أزهاره بيضاء أو وَرديّة اللَّون، تبرز من نيسان إلى حزيران. يتكاثر هذا النَّوع بواسطة البزور وفَسْخ الأرومة، ويَرغب ظلال الأحراج الرَّطبة في تُربة دُبَاليّة مُبحِصة.

الاستعمال - كانت الدنتاريا الرّيشيّة مسجَّلة في دستور الأدوية الأوروبي عام ١٨١٨.

(لا نملك أيّة تفاصيل أخرى عن هذا النبات، سوى ما أوردناه أعلاه) إسم النوع من اقتراحنا.

Essence (۲) دُهْن تِيْكُوتِيْس أَجْوَان (۲) ما ۱۱۳ de Ptychotis ajowan (F)

ته غرام واحد إنّ دُهن أو ستِيَارُوپُتَان التيكوتيس صناعة فيصلح يُستخرج من الأُجُوان وهو نَبات من فصيلة الخَيْمِيَّات مهده الهند الشَّرقيّة، حيث يُرغب جدًّا في تلك المناطق حيث لُرغب جدًّا في بازارات پُوناه لخصائصه العِطريّة. في بازارات پُوناه

ومُدن أخرى في دَكَان، يُباع الدُّهن باسم «أَجْوَان رافُول»، أيّ زَهر الأَجْوَان، وهو يُحضَّر في فصل الشِّتاء في مناطق الهند الوسطى.

المواصفات - يَقع هذا الستيارويتان في بِلُّوْراتِ شَفَّافَة مُتطاوِلة، تَشْتَقّ من مَوْشور مُعَيَّنيّ مُنْحَنِ يَتمتَّع بانفساخ سَهْل، أخفّ من الماء، يَنحَلّ بسهولة في الكحول والأثير؛ رائحته تُذَكِّر بالزَّعت والمردكوش. يبدأ الانصهار عند ٤٢° سغ ويمكن تَقطيره في مَجْري من حامض الكربونيك. يَتألُّف هذا الدُّهن من مزيج من التيمول والسِّيمان، مع القليل من الكَرْقُكْرول وكربورات مختلِفة. وهو يُشكِّل مصدرًا صِناعيًّا للتِّيمول. إن زراعة الأجوان أدخلها الإنكليز قبل العام ١٩٢٠ إلى جزر سِیْشُل والی مونت سِیَیرًا. وهو یحتوی، وحسب المناطق، على ٣٨ إلى ٥٠ بالمئة من التّيمول في دُهنِه .

المُخرَّامَى الهَجِيْنَة (۱۱۶ - دُهْن الخُزَامَى الهَجِيْنَة (۱۱۶ - Essence de lavandin, Essence de lavande bâtarde (F)

دُهن يُستخرَج بالتَّقطير البُخاريِّ من رؤوس الخُزامي الهجينة المُزهِرة: Lavandula hybrida (وهي نَوْع يَحصل من تهجين الخُزامي الحقيقيَّة والخُزامي

(١) التَّسمة العربة للمؤلِّف.

الذَّكريَّة)، وهي أنواع تُزرع في جنوب ده ا شرق فرنسا بين ارتفاعَيّ ٥٠٠ و١٠٠٠ مترًا عن سطح البحر. إنتاجُها يكون من واحد إلى اثنين بالمئة من الدَّهن الذي يَحتوي على ٢٠ إلى ٣٥ بالمئة من الأستيرات المُعبَّر عنها بأستات اللّيناليل.

المواصفات - دُهن الخُزامى الهجينة هو سائل مُخضر اللَّون الأصفر، مُتحرِّك، رائحته قويّة تُذَكِّر برائحة دُهن الخُزامى، ولكن مع لَمْسَة خفيفة التَّكَوْفُر، طعمه عطري. وهو قابل للنَّوبان بكل النِّسب في الكحول، والأثير، والزيوت، والدّهون. يحتوي على: لينالول، جيرانيول، أستات اللّيناليل. نتاجه المَحْزَنيّ يجب أن يحتوي على ٢٠ بالمئة كحد أدنى من الأستيرات العامّة المُعبَّر عنها بأستات اللّينالول.

الاستعمال - لَزْقة زئبقيّة (كودكس ١٩٤٩). يُستخدم في صناعة العطور.

۱۱۵ - دُهْن يَنُون، دُهْن يَلانِج، دُهْن گانْنْغَا (۲۲) Essence d'ylang-ylang

يُطلَق هذا الاسم على دُهون ناتجة عن أشجار من الشَّرق الأقصى (سُومطرة، جاڤا، فيليپين، إلخ) تَنتمي إلى فَصيلة Unona odorantissima ou القِشْطِيّات: Artabotrys odorata ou Uvaria

⁽٢) التَّسميات العربة للمؤلِّف.

. odorata ou Cananga odorata

المواصفات - نَحصل بالتَّقطير على كيلو واحد من الدُّهن مقابل ٥٠ إلى ٦٠ كيلو من الأزهار الغَضّة. إن رائحة هذا الدُّهن عَذْبة جدًّا، ويَغلي عند حوالى ١٦٠° سغ؛ وله استعمالات عديدة في صناعة العطور.

إن الثّوابت الفيزيائيّة تَختلف قليلًا تبعًا للمصدر الجغرافي. كثافته ٩٣٠، إلى المصدر الجغرافي. كثافته ٩٣٠، إلى ٩٦٥، مُركِّباته الأساسيّة: لينالول حُرّ ٣٢ بالمئة، ولينالول مُؤَسْتَر (أستات وبنزوات اللِّيناليل، من كل واحد يُوجد من ٧ إلى ١٠ بالمئة)، بينان، سَسْكي من ٧ إلى ١٠ بالمئة)، بينان، سَسْكي تَرْپانات (كادينان)، القليل من الجيرانيول، إلخ.

إن الدُّهن المُسمَّى كانَنْغا هو أقل جودة من الدُّهن المُسمَّى يَلانج يَلانج، ويُباع باسم دُهن كانَنْغا في أكثر الأحيان الكمِّيات الأخيرة الحاصلة من تقطير دُهن اليلانج، المُركِّبات الأساسيّة هي إذًا ذاتها؛ ويُوجد فيه أحيانًا، بالإضافة إلى ما تَقدَّم، حتى ١٢ بالمئة من الأوجانول.

إن زَيْف المُزَوِّرات الأساسيّة التي يجب قشور إشقيل الكشف عنها في هذا الدُّهن أو ذاك هي بولوغالن ڤيرجينيا زيت الجوز الهندي ودُهن التَّر پنتين.

الخصائص - مُضاد للتَّشنَّج (عام وقلبيّ)، مُقوِّ عَصَبي (عُجز جنسيّ)، مطهّر.

ملاحظة - منذ حوالى ٥٠ سنة أدخلت زراعة اليلانج إلى الاتحاد، حيث أنتج ٣ أطنان من الدهن في السنة، ومن ثم إلى مدغشقر حيث وصل الإنتاج حتى ١٢ طنًا في السّنة، وإلى نُوسِّي - بَيْه وإلى السّيشَل.

إن الدُّهن الأعلى سِعرًا هو دُهن مانيلا، ومن ثم دهن الاتحاد، يليه دهن جاڤا ومدغشقر. إن العُطور المنافِسة لدُهن اليلانج هي اليلانج - يلانج الاصطناعيّ ودُهن الياسمين النَّاتج في الكوت دازور.

Médicament (F) دواء -۱۱٦

دواء الأشْقِيْل العسلي، عَسَل إشْقِيلي

نحضر كما في العسل المورَّد (دستور ١٨٦٦).

نحضر بالطريقة ذاتها دواء بَصَل السورنجان العسلى.

١٦ - دواء الأشقيل العسلى المركّب

قشور إشقيل ١٢٥غ بولوغالن ڤيرجينيا ١٢٥غ

نغلي في مقدار ٤٠٠٠ ملل ماء حتى إنقاص الربع، نمرّر ونضيف إلى السائل الحاصل:

غَسَل despumé

د ي ج

الدِّيجيتال أو نُقاعتها تبدو أفضل تحمَّلًا من الجسم بكثير.

بجرعات علاجية، إن الديجيتال، وكذلك الدّيجيتالين، هي المُقوِّي القَلبيّ المُمتاز المثالي: فهي تُبطئ، تُقوى، تُنظّم وتُسوِّى التَّقلُّصات والانقباضات القَلبيّة؛ وهي، بالإضافة إلى ذلك، تُمارِس على الجهاز الوعائتي الطّرفي عملًا شديدًا مَقبِّضًا للعُروق، مصدره مُباشر ومركزي في الوقت ذاته (تَهَيُّج الجهاز الوُدِّيُّ). إن ذلك الانقباض العُروقي يُؤدّي إلى ارتفاع بارز في التَّوتُّر الشِّريانيّ (إرتفاع الضَّغْط) يمكنه أن يُسهِّل البُوَال (غزارة البَوْل). ولكن البُوَال الديجيتالي، الذي لا يَحدُث إلّا بصورة مُتأخِّرة، لا يَتَّصل سوى بشكل إضافي جدًّا في ذلك التَّوتُّر الشِّريانيِّ المُرتفِع؛ وتُحدِث على الأكثر زيادة في سرعة الدم وتُسبّب امتصاص الاستسقاءات أو الأوديمات، والتي تكون ضرورية لحدوثه.

إن الإشارات الأساسية للديجيتال أو للديجيتالين، خاصة عندما يكون النبض سريعًا، غير منتظم وغير متساوٍ هي: نَقْص النقباضيَّة القَلْب (١) Asystolie (لأي سبب القراض كان): إسترخاء القلب بسبب الأمراض القاجِيّة الفَلبيّة، خاصة الأمراض التاجِيّة العَدوائيّة المُرتفِعة Pyrexies (إلتهابات

نغلي كذلك حتى إنقاص ربع آخر، نمرر ونضيف لكل ٥٠٠ غرام من النتاج: درديات البوتاس والانتيموان ٢,٠ غ

دواء البنفسج العَسَلي، عسل بنفسجي عصير بنفسج، عسل بالتساوي نطبخ حتى التماسك المطلوب.

يحضر البعض هذا الدواء على طريقة تحضير شراب البنفسج السكري، كذلك دواء النيلوفر العسلي.

دواء الزعفران العسلي

زعفران ، ، ، ، ، ، ، ، ، ؛ غ عسل أبيض ، ، ، ، ، ؛ غ

Finger flower, ديجيتال أرْجُوَانِيّة –۱۱۷ Bloody finger, Digitale pourprée, Grande digitale (F) Fingerhut (D) Digitalis purpurea (S)

الخصائص الطبية - جواهر الديجيتال الفعالة لا يمتصها الجسم، عن طريق المعدة، إلّا ببطء كبير، وبطريقة لم تزل مجهولة حتى اليوم؛ كما أن التّخلُص من تلك الجواهر ليس كذلك أقلّ بُطئًا، وأن تراكم الجرعات المتتالية منها وتكويمها يمكنه أن يُؤدي فجأة إلى تأثيرات تسمُّمِيّة، مما يُوجب الحذر الدّائم منها. إن إعطاء الديجيتال في أقراص أو بيلولات غير مرغوب فيه؛ أما محاليل الدّيجيتاليين، ومُستحضرات مَرْث

الرِّئة، حُمِّى التِّيفوئيد، إلخ). إن طريقة اس استعمالها يَتطلَّب الكمال النِّسبيّ لنَسيج ومستحضراتها القَلْب العَضَلِيّ. أ - مسحوة

> أما استعمال الديجيتال أو الديجيتالين فغير صالح وغير مرغوب فيه في: فَرُط إنْقِبَاضِيّة الْقَلْبِ(') Hypersystolie، وفَرْط التَوتُّر الشَّريانيّ (إلّا إذا كان هناك نزارة في البَوْل، وتمدُّد قَلبِيّ)، وتَوازن إنقباضِيّة القَلْبِ ('') Eusystolie وخَفْق قَلْبِي بَطيء Bradychardie ، وتَصَلُّب قَلْبَيِّ (١٠) Cardiosclérose أو نَشاف قَلْبِيِّ (۲۰)، وضَعْف كلوى (ليس دائمًا)، وحساسيّة المَعِدة والأمعاء المُفرطة. وإذا أُعطِيت باتّجاه معاكس ولا منطقى، أو بجرعات قَويّة وطويلة الأمد، فإن الدّيجيتال يمكنها أن تؤدّي إلى نتائج مَشؤومة: إفراط الهَزَع أي الاختلاج القلبيّ Ataxie، نبض بائس، زُرَام أي انحباس البَول Anurie، تقيُّوءات، إسهال، إلخ.

> بجرعات سامّة يُحدِث الدّيجيتالين اضطرابًا قلبيًّا Arythmie خاصًا يتميّز بمجموعات من ٢، ٣ أو ٤ انقباضات مُتقارِبة تَفصلُها وَقُفَات مُتفاوِتة الوقت، مُرفَقة بغثيانات وتقيّوءات، واضطرابات في النّظر، وفتور الحرارة في الجسم، دُوار وهَذيان.

بجرعة مُميتة يبطل نشاط الانقباضات البُطَيْنِيّة فجأة بعد فترة أخيرة من خَفْقَة قلبيّة مُنتظمة؛ ويتوقَف القلب أثناء الإنقباض.

طريقة استعمال الديجيتال

أ - مسحوق الأوراق المُعَيَّر بيولوجيًّا والمحفوظ في الفراغ أو في غاز خامِل في أمْبُولات مختومة من ١، ٢، ٥ و١٠ غرامات (إهمال القسم غير المستعمل): في نقاعة من ٢،٠٠ إلى ٢٥٠٠غ؛ في مَرْث من ٣٠٠٠ إلى ٢٠٠٠غ، هذا الشكل من ٣٠٠٠ إلى ١٠٨٠غ، هذا الشكل الأخير هو الأفضل.

طريقة الفرماكوبيا: بالغون: عن طريق الفم: مقادير اعتيادية: ٢٠,١٠غ إلى ٧,٧٥ لجرعة واحدة ولكل ٢٤ ساعة؛ مقادير قصوى: غرام واحد لجرعة واحدة ولكل ٢٤ ساعة.

التداوي الولادي (حسب دستور أدوية 1970). عن طريق الفم: من صفر إلى 1970 سنة: ٢٠ ملغ لكل سنة من العمر. ب – صبغة (مُراقَبَة بيولوجيًّا): ٢٥ نقطة منها تساوي غرامًا واحدًا. مقادير اعتيادية (بالغون): غرام واحد وحتى ٤ غرامات لكل ٢٤ ساعة. مقادير قصوى في دستور الأدوية: ١٥٠٩غ للجرعة و٦ غرامات لكل ٢٤ ساعة؛ للأولاد من صفر إلى كل ٣٠ شهرًا ومن ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة: عشر نقاط مقابل كل سنة من العمر.

ج - شراب شُكّري (۲۰ غرام تحتوي على غرام واحد من الصبغة): ۲۰ إلى ۸۰غ؛ أولاد: ۱٫۵۰ غرام لكل سنة.

د - مستخلص كحولي: ۰,۰۳ إلى ٥,٠٥غ؛ حدّ أقصى: ٠,٠٥غ للجرعة و٠,٢٠غ لكل ٢٤ ساعة.

ه - نبيذ الديجيتال المركّب (نبيذ من مسحوق الديجيتال وتحتوي على جرعات اعتيادية: ٢٠غ لجرعة واحدة التراكميّة التكويميّة السامّة. و٥٠٥غ لكل ٢٤ ساعة للبالغ.

ملاحظة مهمّة - أيًّا تكن المستحضرات د ي ج تروسّو): ٢٠غ توازي حوالي ٠,١٠غ المنتخبة للاستعمال، من المناسب عدم إطالة استعمالها لها أكثر من ٣ إلى ٥ غرام واحد من أستات البوتاسيوم؛ أيام، لكي نتلافي تأثيرات الديجيتالين

Resin (E) راتِنْج، راتِنْب، راتِنْج، ر

الرّاتِنْجات هي موادّ نَباتية عديمة الشّكل عادة، نادرًا ما تكون مُتبلّرة، صُلبة، منصهرة بالحرارة، وهذا ما يميِّزها عن الصّموغ، ولكنّها لا تصبح أبدًا مائعة تمامًا، وهذا ما يفرِّقها عن الأجسام الدُّهنيّة؛ لَهوبة (قابلة للاحتراق)، لا تذوب في الماء، تذوب في الكحول، والكلوروفورم، والأثير، والأجسام الدُّهنيَّة، والموادّ الزِّفتيّة (الزفوت الدُّفتيّة (الزفوت في صفراء اللَّون بشكل عامّ، كسورة، فهي صفراء اللَّون بشكل عامّ، كسورة، أثقل من الماء (١,١٢٥). ويبدو أنّها نتيجة أكْسَدة الزِّيوت الطيّارة.

هناك أيضًا راتِنْجات أُحْفورِيّة من المرجَّح أن يكون مصدرها من النَّباتات. يبدو الهِيْغات (١) Hygate ، وهو راتنج مَعدِنيّ، أنّه كهرمان أصفر. ليست هناك من راتنجات بالمعنى

الصَّحيح في مملكة الحيوان، ومع ذلك، فإن اللَّكِيّة: Coccus lacca تنتج، أو أقلَّه تُحدِث تكوين راتنج اللَّكَ. تدين الرّاتنجات بلونها إلى مواد غريبة، وبرائحتها إلى زيت طيّار؛ أمّا الرّاتنجات النَّقيّة فتكون بَيضاء اللَّون وعديمة الرّائحة. أطلق بُوناسُتْر اسم وعديمة الرّائحة. أطلق بُوناسُتْر اسم مواد تتركَّد بشكل بِلُوريّ من المُذابات مواد تتركَّد بشكل بِلُوريّ من المُذابات الرّاتنجيّة الكحوليّة.

درس تشيرش وطلابه من بَرْن، عددًا كبيرًا جدًّا من الرّاتنجات وخصصوا لها مجلًدات عديدة: Die Harze und) المعتلف المعالجات بالقِلَى، والكربونات، وسوى الكن حوامض راتنجيّة (تختلف تقريبًا باختلاف كل نوع نباتي)، وراتنجات، بنجوان، ورازيتَنُولات أي: (راتنجات عَفْصيّة)، مثال: تَرْبَنْتينات الصَّنوبريّات، بَنجوان، صموغ راتنجيّة، إلخ.

يمتلك الكثير من الرّاتنجات خصائص حامضة خفيفة تكفي، بالرغم من ذلك، وفي بعض الأحيان، لتحليل الكربوناتات القِلويّة وتكوين ما يُسمّى بشكل غير صحيح رازِينات Résinates أو أصبان الرّاتنج. هذه الأجسام ترغي بالماء، ولكنّها تتميّز عن الأصبان الحقيقيّة كونها غير قابلة التَّرسيب من محاليلها بواسطة الملح البحريّ.

⁽١) التَّسمية للمؤلَّف.

البلدان الحارة. الفصائل التي تنتشر فيها هذه المواد أكثر من سواها هي فصائل الصَّنَوبَريَّات، البُطْميَّات، وتأتي في الخط الثّاني فصائل الفَرْنيَّات، والسَّذابيَّات، والشُّراصِيَّات، والسُّبويَّات، إلخ.

بعضها يَنْتج طوعيًّا، ولكن الحصول عليها يتمّ في أكثر الأحيان بحَزِّ قشور الأشجار الرّاتنجيّة. تسيل منها بشكل ترْبينات صافية فاتحة اللَّون محلولة في زيت دُهنيّ، وهي صفة تُميِّزها عن الصموغ الرّاتنجيّة، التي يتمّ الإشراك بينها في أكثر الأحيان، والتي تكون لبنيّة الرّاتنجيّة بملامسة الهواء. إن العصارات الرّاتنجيّة بملامسة الهواء. إن العصارات التي تبقى منها بحالة نصف مائعة تشكّل الريّشين. أمّا تلك التي تتَجمّد، ولكنها تحتوي على حامض من المجموعة ولكنها تحتوي على حامض من المجموعة عنهري) فتسمّى بلاسِم طبيعيّة.

بعض الرّاتنجات يحصل في مختبر الصَّيدليّ. تُنْهِك الموادّ أوّلًا بالكحول ٩٠ درجة، ومن ثمّ نُقطِّر حتى ﴿ الماء مع الفضالة ٤ إلى ٥ أحجام من الماء المقطّر، نجمع الرّاكد الرّاتنجيّ الذي يتكوَّن، نغسله بالماء السّاخن، نسكبه في صحون نضعها في المِحَمّ حتى يصبح الرّاتنج كَسُورًا. قبل معالجة الموادّ بالكحول تُنظّفها من عناصرها الاستخراجيَّة بواسطة الماء وفقًا لطريقة الاستخراجيَّة بواسطة الماء وفقًا لطريقة

نُحضِّر هكذا راتِنجات الجَلَبَة، الغَيّاك أي عود الأنبياء، الكَنْكينا، عشبة الحمّى، السَّقَمونيا، والتوربيت. بالنسبة للجلبة، هناك طريقة للحصول على راتنج

يلانش.

أبيض اللُّون من هذه المادّة.

نحظى في دراسة البِدُفِيل(۱) Podophyllum على تحضير ومواصفات وتجربة البُودوفِيلِين، وفي دراسة سقمونيا المكسيك على تحضير ومواصفات وتجربة راتنج سقمونيا المكسيك.

الرّاتنجات بشكل عام هي منشّطة، بعضها مُسهِّل قويّ، بعضها الآخر كاوٍ. وهي تُشكِّل أساس المَروخات. عدد كبير منها يُستخدم في الصناعة لتحضير الورنيشات، والأصبان، وغاز الإنارة، إلخ.

Rhubabr (E) راوَنْد، رَوَنْد Rhubabres (F) Rhabarber (D)

Rheum (S)

التركيب الكيميائي - عام ١٨٤٤ عاوَد كلّ من شلُوسّبَرْغَر ودُوپِّنْغ دراسة الراوند الكيميائيّة، وهي دراسة كانت إلى ذلك الحين هدف أبحاث عديدة، تَعَرَّفا إلى وجود جسم محدَّد بشكل جيّد أطلقا

⁽١) التَّسمية لإدوار غالب.

راو

عليه اسم حامض كُرِيزُوفانِيْك؛ إنه دِيُوكْسي-١-٨-مَتيل-٣-أنْتراكِيْنُون. وعَزَل من الراوند فيما بعد، كلّ من وارّن، دولارُو، مُولِّر، عزلوا مادّة جديدة دُعيت إيمودين؛ إنّها ترِيُوكْسي-١-٨-مَتيل-٣-أنْتراكِيْنُون.

يحتوي الرّاوند، حسب تشيرش وهُوبَرْغَر، على صَفّين من المركّبات:

" - غلوكوسيد عَفْصيك (رايبوتَنُوغلوغلوكوسيد الغلوكوسيد رايبوأنتراغلوكوسيدات. الغلوكوسيد العفصيك المحلَّل بالماء بواسطة الحوامض المخفَّفة، يعطي سُكَرًا، وأحمر الراوند، والحامض العَفْصيك، والحامض العَفْصيك، الأنتراغلوكوسيدات تعطي الحامض الكرِيْزُوفانيك (كريزُوفانُول)، الأيمُودِيْن (أيمُودُول)، والرَّايِيْن الذي يمتلك بناء متقاربًا من بناء الألويمُودين مع عمل حامض ومع الرّايُوكريزيديْن الذي هو الأيمُودُول الذي تَأْسَتَر فيه عَمل فينول بواسطة الكحول المثيليكي.

وعندما درس جِيلْسُن مواد الرّاوند العَفْصيَّة Tannoïdes، عزل منها ما يلي:

۱° - هيتروسيد يدعى غلوكوغَلِّين ينشطر بالتحليل المائي إلى غلوكوز وإلى حامض عَفْصِيك؛ ٢° - تَتْرارِيْن يعطي بالتأثيرات عينها الغلوكوز، الحامض العَفْصيك، الحامض العَفْصيك، الحامض العَفْصيك، الحامض العَنْهريك، رايُوزْمِين؛ ٣° نوع

من الكاتشِيْن؛ ٤° رايُوكرِيزِيْن يعطي، إذا انشطر، الرّايُوكريزِيديْن والغلوكوز.

إقترح جيلُسُن للمجموع الغلوكُوسِيدي اسم: Rhéopurgarine.

عام ١٩٢٤-١٩٢٥ بَيَّن عدد من العلماء أن الراوند يحتوي، بعد شتاء قاس، على أنْترانُولات Anthranols تحصل من جرّاء اختزال الأنْتراكِينُونات الكيميائيّ. إن هذه الأنْترانُولات تتَحلّى هي أيضًا بعمل مسهل.

إن الحسواة المسشتقة من الأنتراغلوكوسيدات، إذا اتّحدت مع الأوكْسِي مَتيل - أنتراكينونات الحُرّة، تشكّل جواهر راوند الصّين المسهّلة القويّة، أمّا خصائصه القابضة والمقويّة فمردُّها إلى الغلوكوسيدات العَفْصية الكريزُوفانيْك والأيمودِيْن يوجدا معًا في الخلايا ذاتها، محصوران في الشُعاعات النَّخاعيَّة التي تخطّط القسم اللِّيفيّ، كما في تلك التي توجد في النجوم.

يحتوي راوند الصين، بمعزل عن هذه الأجسام، على كمَّيَّة وافرة من أوكسالات الكلسيوم، والنَّشاء، والپَكتِيْن، ومادَّة صمغيّة، وپروتيدات (حَيُوليّات)، وجواهر عِطريّة طيّارة، وراتنج.

الرّاوند الإنكليزي يحتوي على معظم الأجسام الموجودة في الرّاوند الصينيّ، ولكن عمله الفيزيولوجي وتأثيراته العِلاجيّة هي أدنى منه بكثير.

البيطري.

الرّاوند المسجَّل في الإصدار العاشر للفرماكوبيا يتألَّف من الأعضاء التَّحْتُرابيّة المُجفَّفة من الرّاوند الكَفِّيّ أو من هجن هذين من الرّاوند المَخْزَنيّ أو من هجن هذين النَّوعَين أو من خليطهما. الرّاوند يجب أن يحتوي على ٢,٥٠٪ كحدٍّ أدنى من مشتقّات هيدروكسي أنْتروسِيانيكية، تُحْسَب بالرّايِيْن، بتركيب كيميائيّ ديهائيّ.

طريقة الاستعمال - للرّاوند أهمّية طبّية فعليّة. إنّه واحد من أفضل المُسهّلات للأولاد. مقوّ بمقدار ٠,٣٠ إلى ٠,٦٠ غرامات فرام، ومسهّل قوي بمقدار ٣ غرامات وأكثر.

طريقة استعمال مسحوق الرّاوند للبالغين عن طريق الفم، وحسب الفرماكوبيا الحديثة؛ المقادير الاعتيادية من ٢٠٠٠ إلى ٠,٥٠ غرام لجرعة واحدة، والمقادير القصوى غرام واحد

للجرعة و عزامات لكل ٢٤ ساعة راو (بالغون).

طريقة الاستعمال للأولاد، من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة: ٠,٢٠ إلى ٣٠,٣٠غ. إن هذه الطريقة لم تعد متبعة في فرماكوبيا

يُعطي الأطبّاء عادة الصُرّات أو البرشامات أثناء الوجبة، كمُثيرة ونافعة للمعدة؛ ومن ثمّ المستخلص (دستور ٢٥)؛ ١٠،٠ إلى ٢٠،٠٥غ، الصبغة (دستور ١٩٣٧)، ٥ إلى ٢٠ غرام؛ الشراب البسيط وخاصّة الشراب المركّب (دستور ٣٧)، ١٠ إلى ٣٠ غرام. يدخل الرّاوند في تركيب الجَروع المسهّل القوي في دستور ١٨٦٦. يشارك الكالومل، والمغنازيا، والألوة، إلخ. يمتص اليود ويحتفظ به؛ الحصول سهل على مستخلص، شراب، أو نبيذ الرّاوند المُيَوَّد.

كان الأطبّاء يعطون في غالب الأحيان قطعًا من الرّاوند في صرَّة ممروثة في الماء (بنسبة ٥ إلى ١٠٠٠). الرّاوند يجب أن يُعالَج بالمرث لمدّة ٥ ساعات، إذ إن النقيع المغلي يُدخِل إلى سوائله كمَّيَّة كبيرة من النشاء تجعلها عكرة ومضطَّربة.

الرّاوند يَفقُد خصائصه الماسِطة بالتَّحميض ويكتسب خصائص مقويّة أكبر.

عدم ملاءمة - حوامض مركَّزة، ماء الكلس، دواء مُقيِّئ، نقاعات قابضة،

ر او

عفص .

١٢٠ - رَاوَنْد رِيْبَاسِيّ، رِيْبَاس، رباص، Currant fruited rhubarb, Gooseberry Currant (E) Rhubarbe-groseille (F) Persischer rhabarber (D) Rheum ribes (S)

ريزوم معمَّر غليظ من فصيلة البَطْبَاطِيَّات. ساقه قويّة غليظة، مرتفعة، قد تَتَخطّي المتر، مورقة القاعدة فقط، تحمل عثكولًا واسعًا، منتصبًا. أوراقه بحريّة اللُّون، أوراق الضُمَّة القاعديّة جلديّة النّصال، مستديرة، طولها أقلّ من عرضها، شبه قلبيَّة الشَّكل، قد تبلغ ٦٠ سم، عروقها راحِيّة ومتشابكة فيما بينها، غالبًا ما تتغطّى صفحتها العُليا بحُلَيْمات خشنة، مسنَّنة الحوافي. ساق طويلة، خالية من الأوراق، تكسوها نتوءات مصفرة اللُّون. سُويقات حُزميّة خيطيّة الشَّكل، أطول من الأزهار ومساوية للثُّمرة. أكسنة كبيرة القَدِّ، تصبح عُصاريّة في النّهاية، قلبيّة، بَيضويّة، أجنحتها ثُلاثة أضيق من الغمد. مَنبتُه الجبال اللّبنانيّة العالية.

المركّبات والاستعمال - جاء عنه في «مَخْنَزَن» دُوْرُقُو، الإصدار الشاني والعشرين، ما يلى: الرّاوند الرّيباسي يَنبت في جبال لبنان العالية وفي سوريا، عرفه اليونان والرّومان.

سُليماني، سولفات الحديد، والزنك، للحو ٢٠٠٠ مترًا عن سطح البحر؛ وهو الذي عرفه العرب منذ القرون الوسطى، وقام بدراسته اللّبناني إيلي فَرَح عام . 194.

يُستعمل هذا النُّوع محلِّيًّا (أي في لبنان) كمسهّل قويّ. وهو يقع، من حيث بنائه التَّشريحيّ ومحتواه من الجواهر الأنْتراكينونِيّة، بين أنواع راوند الصّين والأنواع الأوروبيّة.

- أطلب الدراسات المفصّلة عن أنواع الرّاوند الآسبويّة والأوروبّيّة، ومواصفاتها التَّشريحيّة، ومركّباتها الكيميائيّة.

١٢١- رَاوَنْد مَخْزَنِيّ، رَاوَنْد صِيْنِيّ Rhubarb (E) Rhubarbe, Officinale (F) Echter rhabarber (D) Rheum Officinale (S)

نَبات معمّر قويّ من فصيلة البَطْبَاطِيَّات. ساقه غليظة، قصيرة، تعلو من ٢٥ إلى ٣٠ سم. أوراقه متعاقبة، مُعنَّقة، طولها من ٥٠ إلى ٦٠ سم. نصلها مِرْوحيّ الشَّكل الكبير، من ٦٠ إلى ١٠٠ سم وأكثر. الشَّمراخ الزَّهريّ منتصِب ومُتفرّع، يعلو من ٢ إلى ٣ أمتار. أزهاره باهتة اللُّون الأخضر. مهده الصّين والتّيبت. أثره التَّزيينيّ جميل جدًا. عرفه الصينبُون منذ آلاف السنين لخصائصه المُسهِّلة؛ ومن ثمّ

المركبات - حامض أقصاليك، حامض عفصيك، حامض عَبْهري، غلوكوسيد، عفص، نشاء، حديد، مغنازيوم، ڤيتامين ب، ث.

عدم ملاءمة – عفص، دواء مقيّئ، ماء الكلس.

الخصائص - مقوي مُرّ مُمَعدِن ومُضادّ لفقر الدّم، قابض بمقادیر خفیفة، مشة، یزید حجم الصَّفراء، مضادّ للعفونة، منعش، مسهّل قويّ بمقادیر کافیة، ولکن هذا التأثیر یتبعه إمساك، فلا یُعطی منه سوی بشکل عابر، طارد للدود (خصائصه الاحتقانیّة تجعله ممنوعًا عن المصابین بالبواسیر).

الاستعمال - فقر دم، ضعف عامّ، فقد الشَّهيّة، كسل المَعِدة، كُباد، إمساك، طفيليّات الأمعاء، إسهالات مزمنة، ديسنتيريات.

تضاد الاستطباب - إرتفاع حموضة المعدة، بواسير، نقرس، رمال أقصالي.

طريقة الاستعمال - مسحوق في أقراص من ٢٥، ٤٠ قرص في بداية الوجبتين الرئيسيّتين، طوال ١٥ يومًا (مقوَّ، مضاد لفقر الدم، حالات الهضم البطيء). مسحوق، غرامان مع العسل كمسهّل قوي وطارد للدود. شراب سُكّري من ١٠ إلى ٥٠ غرام، كمسهّل. خليط مشهً ونافع للمعدة: صبغة جوز القيء ٥غ، صبغة الراوند وصبغة الباديان بالتساوى

وما يكفي ٣٠ ملل. يؤخذ ٢٠ نقطة مع قليل من الماء قبل الوجبتين الرئيسيّتين.

ر م ر

الكَلْب، رَمْرَام، رَمْرَم، فِسَاء الكَلْب، Wall goose- مَزْرِيْطَة، أَثِيْنَة الحِيْطان (۱۹۰ مَزْرِيْطَة، أَثِيْنَة الحِيْطان (E) Ansérine des murs, Patte d'oie vraie (F)

Gänsefussmelde, Mauergänsefuss (D) Chenopodium murale (S)

نَبات حَوْلِيّ من فَصِيلَة السَّرْمَقِيَّات سَاقُه مُتصِبَة تَعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم، كثيرة الورق، مُحمرَّة اللَّون أحيانًا، غير طَحينيَّة أو خفيفة الكساء الطَّحينيّ، فَرعاء منذ القاعدة. أوراقُه مُعنَّقة، بَيضويّة مَعَيَّنِيّة إلى مُتطاوِلة حادّة، قويّة التَّسْنين غير المُتساوي على هوامشها، نَصلُها لامع الصَّفحتين الخَضراوين. إزهراره في الصَّفحات إبطيّة وهاميّة الارتكاز. الكأسيّات خفيفة التَّزورُق. البُزور الكأسيّات خفيفة التَّزورُق. البُزور الهامش. يُزهر على مدار السَّنة تقريبًا الهامش. يُزهر على مدار السَّنة تقريبًا في الحقول والحدائق والرّدوم.

الخصائص - ذكر إدوار غالب أنّ: «أنفعه وأجوده خواصًا ما نَبت في الأتربة الكلسيّة. وهو مُضادّ للتَّشنَّج. يَدُرّ الطَّمْث ويَنفع التَّخمة ويَذهب بالدِّيدان المِعَويّة». يَشتهر هذا النّبات في شمال تُونس في شِفاء المَريض

⁽١) التَّسميات العربيّة للمؤلّف.

رم ر المريض أن يَفرك جسده بالأوراق قَبْل وتَمسيدًا خارجيًّا. أن يَستحمّ، وأن يَحتفظ ببعض الأوراق

الواهِن الذي يكون بُوَاله مُحمرً اللَّون قُرْب الوِسادة أثناء نومه. إنَّ نَقيع الأوراق وتَعرُّقه غَزيرًا؛ وفي ذلك يَتوجَّب على يَشتهر كذلك في طرد الحُمَّى فَرْكًا

وطعمه قوي المذاق المُرّ المُكَوْفَر. ولقد زدو استَخْرَج منه ترومُسدُرْف مادّة مرَّة الطَّعم هي الدزدواريْن Zédoarine؛ ويحتوي الزَدوار، إضافة إلى ذلك، دهنًا بنسبة واحد بالمئة، يحتوي بدوره على السِّنابول.

مسحوق الزَّدْوار مُصفرٌ اللَّون الرماديّ.

مواصفات المسحوق المجهرية - خلايا بَشَريَّة (بَشَرة) مُسَدَّسَةُ الزَّوَايا والأَضْلاع، مع قاعدة الشُّعيرات. خلايا زَيْتُوراتنجيّة (۱): Oléorésine. شُعيرات طويلة وحيدة الخليّة، سميكة الأَجْوال أي الحواجز الحُجْرويَّة. خلايا ليفيّة عديدة مصدرها النَّسيج الحَشُويَ. نشاء بوفرة، حبوبه مستطيلة الشَّكل، مستدقة الرَّأس الصّغير، مع لُوْمَن Lumen نُقُطي الشَّكل يقع على طرفها الصغير، خطوطها مُتراكِزة.

إِنَّ الزُّرُنْبَاد أو الزُّرُنْبَة Zérumbet، أو ما سُمِّي زنجبيل بَرِّي:

Curcuma zerumbet, Zingiber zerumbet, Amomum zerumbet

والنَّوع المُسمِّى Cassumuniar، إن هذه الأنواع تتشابك مع أنواع الزَّدُوار بحيث لم يَتوصَّل المؤلِّفون الأخصَّائيّون إلا بجهد وصعوبة كبيرين إلى الكشف عن اختلافها عنها، ونَسَبوها تارة إلى أنها زَنجبيل وطورًا إلى أنها قاقُلَّة أي هال.

ارُدُوَار ، جَدُوَار ، سَطُوَال Zedoary, Setwall (E) Zédoaire, Curcuma zédoaire, Gingembre bâtard (F) Zedoarwurzel, Zittwer Kurkume (D) Curcuma zedoaria Rosc. (S)

إن الزَدُوار المَخْزَني هو ريزوم كُرْكُم زَدُوَار، وهو نَبات من فصيلة الزَّنْجَبيليَّات يُزرع في الهند والكوشَنشِين وماليزية. يُعْرَض دواؤه على شكل شَرائح صغيرة مستديرة مُسطَّحة، تبلغ سماكتها حوالى ٥ ملم (زَدُوار مستدير) أو على شكل قِطع وكِسْرات غير منتظمة، مُزوَّات، يبلغ طولها من ٣ إلى ٤ سم رزَدُوار طويل) وتحصل من جرّاء قِطع وأجزاء عَرْضِيّة أو طُوليّة. ويكون وأجزاء عَرْضِيّة أو طُوليّة. ويكون الرّماديّ، مُمَركًا بآثار الجُذَيرات والشُعيرات الجَذْرِيّة. ويكون مِحْسَرها والشُعيرات الجَذْرِيّة. ويكون مِحْسَرها وأنيّ المظهر، مُرمَدّ اللَّون الأبيض.

المُركِّبات - تحتوي كلّ الأجزاء على خلايا مملوءة بالدهن.

رائحة الزَدْوار مماثلة لرائحة الزَّنْجبيل،

زرا

إنَّ كلِّ هذه الموادِّ هي موادٍّ مُنَبِّهة مهيِّجة قليلة الاستعمال في يومنا.

- راجع دراسات الكُرْكُم الأُحادِيَّة.

١٢٤ - زَرَاوَنْد فُغْبَانِيّ، أرستولوجية ثُعْبَانِيَّة، لُوْف عِطْرِيّ

Virginia snake-root (E) Serpentaire de Virginie, Vipérine de Virginie, Couleuvrée de Virginie, Aristoloche serpentaire (F) Virginischer Hohlwurz, Virginischer osterluzei (D) (1) Aristolochia serpentaria (S)

نَبات طبِّي ليفي معمَّر من فصيلة الزَّرَاوَنْدَيَّاتِ. ساقه منتصبة تعلو حوالي ١٠٠ سـم. أوراقه قىلىبيّة القاعدة، أرسْتُولُوخِيَة ثُلاثِيّة الفُصوص^(٣) إهليلجيّة الرّبع النّاني والنّالث، سِنانيّة الأخير، ثُنائية التَّقوُّس، صغيرة القَدّ. ريزومه دقيق، أليافه هزيلة، متشابكة؟ لونه الخارجي إلى البُنِّي، والدَّاخليّ مُصْفَرّ. رائحته قويّة، نَفّاذة وكافوريّة؛ طعمه مرّ، عطري. ينبت في أمريكا، لويزيانا، كارولينا، ڤرجينيا. أعيد تسجيله في الفرماكوبيا عام ١٩٧٤.

> المُركِّبات - زيت طيّار ١ إلى ٢٪ غنى بالبورنيول، موادّ صمغيّة راتنجيّة، أملاح كلسيوم، مادة مُرَّة عديمة الشَّكل تُدعى سَرْبَنْتَارِيْنِ.

الخصائص - يبدو أنّها تدين إلى الزّيت الطبّار . مقوّ ، منشّط ، معرّ ق غزير ، مُقَمِّع : مسهِّل قويّ بمقادير مرتفعة.

الاستعمال - كان الدكتور شَيْمَان يعتبه مفيدًا جدًّا لوقف الاستفراغات.

طريقة الاستعمال - نقاعة ٢٠غ في ليتر ماء غال. مسحوق ٠٥٥٠ إلى غرامين. مستخلص مائع ٣٠,٥ إلى غرامين. استُعمل أحيانًا كبديل لريزوم هِدْراسْتُس كندا. يُغش جذر الزراوند الثعباني بريزوم القَنْفَانِيَّة الزغبيَّة (٢) Cypripedium pubescens wild من فصيلة السَّحْليّات.

١٢٥ زَرَاوَنْد ثُلاثِي الفُصوص،

Trilobate Worm-killer, Trilobate birthwort (E) Aristoloche trilobée (F) Dreilappigosterluzei, Drei-

lappighohlwurz (D)

Aristolochia trilobata (S)

نَبات طبِّي من فَصِيلَة الزَّرَاوَنْدِيَّات مَهده سُورينام والجماييك، يُقال إنّ خصائصه الطبِّيَّة أعلى من خصائص الزَّرَاوَنْد الثُّعْبانيِّ. جُذوره كانت ولم تَزل مُسجَّلة في الفَرْماكوبيا .

⁽١) التَّسمتان للمؤلِّف.

 ⁽٢) التَّسمية للمؤلَّف.

⁽٣) كلّ التَّسميات للمؤلّف ما عدا الفرنسيّة

جُنَّبَة ليفيّة بَرِّيّة مُجَبْجِبة، صغيرة القَدّ جدًّا، من فَصيلة الشَّفُويَّات. فُروعها غليظة، مُنتصِبة، مُتفرِّعة بدورها، صُلْبَة، طَحْلاء اللَّون. فروع عقيمة، مُسْتَشُوكَة، مُتجمِّعة مُتضامَّة وقصيرة جدًّا. الشَّفة السُّفلي أطول، مَقسومة إلى سِنَّيْن مِخْرَزِيَّيَ الشَّكل. التَّاج وَردي اللَّون، له أُنبوب قصير البروز. مآبر اللَّون، له أُنبوب قصير البروز. مآبر بارزة. إزهرارها من أيّار وحتى تشرين الأوّل، على الشَّواطئ البَحريَّة في حوض المُتوسِّط والبرتُغال.

وردت لهذا النّبات في المراجع العَربيّة الأسماء التالية: حاشا، سَعْتَر العَبْس، سَعْتَر أو زَعْتَر فارسيّ، صَعْتر بَرِّيّ. أمّا التّفاصيل الطبّيّة له فلقد أوردها الدكتور جان قالني، نَقلًا عن ميشال بواروت M. Poirotte، وهو صاحب أطروحة دكتوراه في الصّبْدَلة (مون بوليه، ١٩٨٣)، ويَتعلّق مَوضوعها بنوع بوليه، ١٩٨٣)، ويَتعلّق مَوضوعها بنوع

Big flowering worm-killer, (۱)أهُر، اَرِسْتُولُوخيَة جَبَّارَةً (۱) Geant birthwort (E) Aristoloche à grandes fleurs, Aristoloche géante (F) Groberblüte Osterluzei, Riesenhohlwurz (D) Aristolochia grandiflora, Aristolochia gigas (S)

نَبات طبِّي من فَصِيلَة الزَّرَاوِنْدِيَّات ساقُه عارشة مُلتَقة. أوراقُه قَلبيَّة الشَّكُل مُستدقة الطَّرف طويلة السّويقات مُتعاقِبة. أزهاره فرديّة الارتكاز، تبرز في الجهة المُقابلة للورقة، كبيرة جدًّا، أنبوبها مُنحنِ ومُنتفِخ القاعدة، طوله من ٢٠ إلى ٢٥ سم، ومن القاعدة، طوله من ٢٠ إلى ٢٥ سم، ومن شمّ يَعرض إلى نَصْل قُطْره ٢٠ إلى ٢٥ سم، يَنتهي رأسه بزائدة خَطيَّة هزيلة طولها ٣٠ إلى ٤٠ سم. داخل النَّصل مُصفر اللَّون ومُبَقَّع باللَّون البُنيِّ مُصفر البُوبة ومُبَقَّع باللَّون البُنيِّ المُواج. تَنثُر الزَّهرة رائحة البَيْعة. مَهده البرازيل، وهو من الأنواع البَيْ تُرْرع في البيوت المَحْمِيَّة.

الاستعمال - كثيرًا ما يُستعمَل هذا النَّوع في البرازيل في مُعالجة الاستسقاءات وعُسر الهضم والشَّلَل.

⁽١) كلِّ التَّسميات ما عدا اللَّاتينيَّة للمؤلِّف.

ز ع **ت**

۱۲۸ - زُغرُور شَائك، شَوْكَة حَادَّة Hawthorn, white thorn, May bush, Quick (E)

Aubépine, Épine blanche, Noble épine, Senelle, Aubépinie épineuse, Bois de mai, Senellier (F)

Gemeiner dorn, Hagedorn, Weissdorn (D)

Cratægus Oxyacantha, Mespilus Oxyacantha (S)

جَنْبَة بَرِّيّة شائكة مُعَمَّرة من فَصيلة الوَرْدِيّات، تَعلو من ٢ إلى ٦ أمتار. لحاؤها الفَتى يَكون فاتِح اللُّون الرَّماديّ، مالِس الرُّقعة، يُصبح فيما بعد بُنِّي اللَّون ومُتَفَلِّع. أوراقُها مُعْبِلَة، بَيضَويَّة الشُّكل الإسفينيّ، ثُلاثِيَّة إلى خُماسِية الفُصوص المؤذَّنة، القليلة العُمق، الدَّقيقة النَّسْنين، عُروقُها مُتَّجدة الاتِّجاه. أزهارُها بَيضاء أو مُتورِّدة اللُّون، عِذْقيَّة التَّجميع، خفيفة الرَّائحة غير المُستَحبّة، خُماسِيّة الكأسِيّات، خُماسِيّة البّتلات الحُرّة، أقلامُها من ٢ إلى ٣، أَسْدِيتُها حَمراء. الثَّمرة نَوَويَّة. بَيضانِيّة الشَّكل، طَحِينيّة اللَّب، حمراء اللُّون، تحتوى على عَجَمَتَين أو ثلاث. طَعمُها سُكّري تَفِه. الأقسام المُستَعمَلة هي الأزهار والأوراق والثِّمار والقشور. نَبات يَشيع في أوروبّا، ولا يُوجد في

من الزَّعتر الَّذي يُقَطَّر في إسبانيا ويُصَدَّر دُهنه منها للتِّجارة باسم «الزَّيت الدُّهنيّ لصَعْتر إسبانيا»، جاء عنه ما يلي:

المُركِّبات - غَنيّ جدًّا بزيت دُهنيّ يُستخدم لصناعة التيمول ويحتوي على ٩٢ مُركِّبًا، أَهمَّها كَرْفَكرول من ٦٦ إلى ٨٣ بالمئة، حامض هِيدروكسي تريتَرْپينيك بَنْتا-سيكليك، حامض أوليانُوليك، فلاڤونُولات، فلاڤونُولات،

الخصائص - أكَّدت التَّجارب الحديثة على أهمِّيَّة خصائص دُهن الزَّعتر الإسبانيّ المعروفة جيِّدًا في إبادة البَكتيريا، وهي خصائص مُماثلة لخصائص زيوت دُهنيّة أخرى اتُّخِذت كعناصر للمقارنة، وهي: دُهن القرفة وكبش القرنفول والزَّعتر والنَّدْغ، والَّتي تشتهر بالتَّالي فَعاليَّتُها الفَويّة في هذا المجال ومنذ زمن بعيد.

ويشير واضع الأطروحة إلى نشاط الزَّعتر الإسبانيّ المُضادِ للتَّشَنُّج والَّذي يفيد في علاج الرَّبو الشُّعَبيّ منذ القرون الوُسطى. ويضيف قالني: «تجدر الإشارة إلى أنّ الخاصَّتين المذكورتين أعلاه، أي إبادة البكتيريا ووقف التَّشَنُّج الشُّعَبيّ لتلتقيان معًا كذلك عند أنواع الصَّعْتر وعند الزَّعتر، وهذا ما يُعطي مجالًا للاعتقاد بأنّ خصائص واستعمالات تلك الشَّفَوتات الثَّلاثة قد تَتشابه».

المُركِّبات - إنّ التَّركيب الكيميائيّ للزعرور غير معروف بشكل كامل.

وكان لوروا Leroy قد كشف في الماضي عن قِلُويدَيْن في اللّحاء هما: الكُراتاجِين عن قِلُويدَيْن في اللّحاء هما: الكُراتاجِين Cratægine، والأوكْسِياكَنْتِيب اللّخير Oxyacanthine. إنّ هذا القِلَويد الأخير هو قاعِدة ثُلاثيَّة وُجِدت أيضًا في عدد كبير من البَرْبَرِيسِيَّات والقَمَرِيَّات. وفي الأَزهار تمَّ تَمييز التُرِيْمَتِيل أَمِيْن وأُجْسام أَمينية مُختلِفة أُخرى. البزور تحتوي على بقايا حامض سيانهيدريك. الثمار تحتوي على على على Caroténoïdes خِضابات وعلى حامِض أَسْقُورِبيك أي ڤيتامِين "ث». حامِض أَسْقُورِبيك أي ڤيتامِين "ث». وذكرت المُركِّبات التَّالية: كَرْسَاتِين، عَلْوكوسيد...

الخصائص - عَمليًا يمكن اعتبار الزُّعرور نباتًا قليل السُّمَّيَة جدًّا. أَزهارُه مُقَوِّية للقَلْب، مُنْقِصة للقَلْب، مُنْقِصة للتَّوتُّر الشَّريانيّ (بتوسيع العروق)، مُضادَّة للتَّصَلُّب مُضادَّة للتَصلُّب الشَّرايين، طاردة للحُمّى، مُهدَّئة الشَّرايين، طاردة للحُمّى، مُهدَّئة للأَعْصاب. الثَّمار قابِضة وعَقُولَة (إسهالات)، حالَّة للحَصَى.

الاستعمال - الأزهار قَبْل تَفَتُّحها. الشَّمار في أواخر أيلول. لحاء الفُروع الفَيَّة خلال شباط. من المُحَبَّذ التَّقيَّد بالمقادير. كما أنّ زهر الزُّعرور يُستعمَل لفترة طويلة من دون أن يتراكم في الجسم. ذُبحة الصَّدْر، تَقَلُّصات وعائيَّة عرْقِيَّة، خَفَقان، إختلاج، آلام قَلْبِيَّة، نَفْحات إحْتِقانِيَّة، نَزَق، شُرعَة الغَضَب، تَقُدُّحات الْعَقْف.، عالات الأرق في سِنّ القُعود تأثُّريَّة، حالات الأرق في سِنّ القُعود

خاصَّة، عُسر الهضم، تَصَلَّب الشَّرايين، ارتفاع التَّوتُّر، اضطرابات الضعف العَصبيّ النَّباتيّ (قَلَق، دوار، دوخة، طنين أذنين)، الأرق، إسهال؛ ديسنتيريا: (الثّمار)، رُمال بَوْليّ ورُمال صَفراويّ (الثّمار). كان رينون Rénon يجمع التِّيُوسِينامين والزُّعرور مَعًا كعناصر مُنقِصة للتَّوتُّر الشَّريانيّ.

طريقة الاستعمال - نُقاعة، نَقيع، صبغة كحوليّة، مُستخلَص سائل، مُستخلَص جافّ، مُستخلَص مائع مائيّ، شَراب، ماء مُقطَّر. مسحوق أو أزهار في نُقاعة بنسبة ٢ إلى ٤ غرامات في اليوم. نُقاعة ٢ إلى ٤ غرامات أزهار مُجفَّفة في مقدار فنجان ماء غال يُغطّى ١٠ دقائق. فنجانان أو ثلاث في اليوم. صبغة فبل كُلِّ من الوجبات الثَّلاث، وطوال تُعلِّ من الوجبات الثَّلاث، وطوال ثلاثة أسابيع من الشَّهر (في حال ارتفاع النَّوم كمضادة للتَّشَنُّج ومُنوِّمة خفيفة اليوم هادِئة. نقيع ١٥ غرامًا من الثَّمار في ليتر ماء غال، يُؤخذ منه ٣ فَناجين في اليوم.

خَليط مُضاد للتَّشَنُّج:

زع ر

ز ف ت

خَليط مُضاد للتَّشَنُّج:

يُؤخَذ منه ٢٠ نقطة مع قليل من الماء، مرّتان في اليوم، في حاّل القَلَق، الاكتئاب العُصابيّ.

الزعرور هو موضوع دراسة أُحادِيَّة في الإصدار العاشر للفرماكوبيا الفرنسيَّة الحديثة ١٩٧٥. عددٌ كبير من الأدوية الصَّيدليَّة يحتوي على الزُّعرور.

۱۲۹ - زِفْت راتِنْج، راتِنْج، راتِنْج أَصْفَر Poix résine, Résine jaune (F)

يتم الحصول على هذا الرّاتنج الأصفر بمزج الرّاتنج الَّذي يبقى في قعر الخلقين بعد تقطير دُهن التَّربنتين، بالماء الغالي وتحريكه طوال حوالى ٢٠ دقيقة. إنّه إذا قُولُوفان معجون مع الماء. وهو مصفر اللَّون، صلب وفَتُوت.

زفت أسود (F) Poix noire

إنّه حصيلة احتراق غير كامل لمصافي القَشّ استُخدِمت في تنقية التَّربنتين والغاليبوت، ومن قطع التَّنُوب أيضًا. نجمع الكلّ في كومة نُضرِم فيها النار. يسيل الرّاتنج المنصهر نحو وعاء مملوء بالماء، حيث ينفصل إلى مادّة نصف صُلبة يجب تجميعها للحصول على الزفت الأسود، ومادّة ثانية تطفو، يُطلق عليها

اسم زيت الزفت: Huile de poix ou . Pisselæon

مادة سوداء، مالسة، فَتُوتة، رائحتها شياطيَّة، يَسهل تليينها عند حوالى ٣٧٥ سغ وتصبح سائلة تمامًا في الماء الغال. تُستعمل كمرهم بيطريّ مُنفَّط.

۱۳۰ زَیْت زَیْتُون مُعَادَل ومُعَقَّم (دستور Huile d'olive neutralisée et (۱۹۶۰ stérilisée (F)

زيت زيتون كمّيّة مطلوبة كربونات صوديوم متبلَّر نقيّ كمّيّة كافية ماء مقطّر كمّيّة كافية

نُقدِّر كمِّيّة الحوامض الدَّسمة الموجودة في الزَّيت. لذلك، نُعادِل بشكل دقيق بواسطة محلول بوتاس عيارى نموذجي عشرى ١٨/١٥، مزيجًا من ٢٥ مليليترًا من الكلوروفورم ومن ٥٠ مليليترًا من كحول ٩٥ درجة، بوجود مليليتر واحد من محلول فتالايين الفينول، التَّلوُّن الوَرديّ الذي يبرز يجب أن يدوم مدّة ١٠ ثوان. نُضيف ١٠ غرامات من زيت الزَّيتون. ونكسب محلول KOHN العياري النَّموذجي العِشري N/10 حتى التَّلوُّن الوردى الذي يدوم ١٠ ثوان. نَعتبر n عدد المليليترات المُستعملة، فإنّ كمّية الحوامض الحُرة، المُعبَّر عنها بالحامض الزيتيك والموجودة في ١٠٠٠ غرام زيت تُعطى وفقًا للمُعادَلة ٢,٨٢× n.

نأخذ وزنًا من Na₂CO₃ المُتبلَّر يساوي مَرتبن ونصف المرّة وزن الحامض الزَّيتيك الذي حُسِب أعلاه (بطريقة نستعمل معها زيادة ملحوظة من هذا الملح). نُسخِّن الزَّيت عند ٤٥° مع تحريكه. نسحق الملح ونُذوِّبه في مقدار عُشر وزنه من الماء المُقطَّر بحرارة ٤٠° سغ. نسكب هذا المحلول رويدًا رويدًا، أو أفضل نقطة نقطة، في الزَّيت السّاخن مع خليط المزيج بقوّة. نَترك الكُلّ للرّاحة لمدّة ٢٤ ساعة. نُصفِّق ونُصفِّي الزَّيت الرَّيت المُصَفِّق على ورق.

إن زيت الزَّيتون المُعالَج هكذا هو زيت مُعادَل بشكل محسوس، وفي كلّ حال، إنّ حموضته المُعبَّر عنها بالحامض الزَّيتيك، يجب أن تكون أقلّ من ١٥٠٠٪.

الاستعمال - قَطْرة زَيتية بالأزارِيْن بنسبة واحد من مئة، مُذابات زيتية تُزْرَق (مذابة الكافور الزيتية المزروقة، والكَلْسِيفارُول، والهروجَسْتَارُون، المحلول الزَّيتيّ المُعلَّق المزروق المُحضَّر من يُودُوبيسْمُوثيت الكينا، إلخ)، إن هذا الزَّيت يجب أن يُسخَّن سَلفًا عند حوالى ١٣٥ إلى يُحفَظ في قارورات مُعقَّمة.

۱۳۱ - زَيْت الكَتَان ۱۳۱ - الكَتَان ۱۳۱

نحصل عليه من بزور الكَتّان التي تُعطي منه حوالى ٢٢ إلى ٣٤٪ من وزنها. فإذا حصل على البارد، وهذا هو الأفضل، يكون الزَّيت فاتح اللَّون الأصفر، بينما

إذا حصل على السّاخن يكون لونه إلى البُنّي. رائحته خاصة. كثافته عند ١٥٥ سغ هي ٩٣١، إلى ٩٣٦، يذوب في ما أجزاء كحول غال، وفي ٤٠ جزءًا من الكحول البارد، وفي ١,٦ جزء أثير. يحتوي على الأكثر غليسريدات زيتية، لينولاييكية ولينولانيكية، مواد فعالة ترنّخ بسرعة. ويحتفظ في شكل محلول على مُخاط وعلى ألبُومين يمكن التخلُص منهما بمزج الزّيت مع سولفات رصاصية بكميّة كافية لكي يَتشكّل نوعٌ من الكريما السّميكة، نُحرِّكه عند ذلك طوال ٣ أو ٤ أيّام، نتركه يرتاح ومن ثم نُصفّق.

استُعمل زيت الكتّان الحديث الصَّنع في بعض الأحيان في الطبّ بمقدار ٢٥ إلى ١٠٠ غرامًا في حقن شَرجيّة كعقّار مُليِّن.

إنّ لزيت الكتّان في عالم الفُنون أهميّة كبيرة جدًّا. إنّ ميزته التي يختصّ بها بدرجة عالية تجعله صالحًا جدًّا للاستعمال في الرَّسم. فإذا غليناه في وعاء مُغطَّى وانتبهنا إلى حركه باستمرار، فإنّه يَنقلِب رويدًا رويدًا إلى كتلة دَبقة جدًّا، تُستعمَل باسم دِبْق Glu لالتقاط العصافير. وإذا أشْعَلْنا أبخرته، بعد رفعه عن النّار، وتركناها تشتعِل لفترة من الزَّمن، ومزجنا مع المادّة النّاتجة عن ذلك السُّخَام، فإنّنا نحصل على حِبر المَطْبَعة. إذا غليناه طويلًا مع الماء المامض الذي نُضيف إليه قليلًا من الحامض

117

ز ي ت

ز ی ت

النيتريك، بدلًا من إضافة السُّخَام، واستبدلنا من وقت إلى آخر الماء الذي يَتبخُّر بسواه، نُحوِّله بذلك إلى مادّة لها الكثير من خصائص المطّاط، وهي مادّة دعاها جُوناس مطّاط زيت الكتّان الذي يُستخدَم في صنع المَحاجيج (مِحْجاج، هومِيْل يُقَدّر به عُمْق الجُرْح)، والفِرْزَجات (فِرْزجة، هي «كعكة» تُفَحَّم في المَهْبِل لمنع الحمل أو لتصحيح وَضْع الرَّحم)، والقُنَيّات (حِفَن)، والتَّفْتَة المصمَّغة، ولُوازم الصَّيدليَّة. وفي مَعمل الصَّابُون تَسمح بصناعة أصبان رخوة إنَّ هذا البَرنيق يَجفُّ تمامًا. عالية الجودة. وهي مثاليّة لصنع اللِّينولايوم أي مُشَمَّع الأرْضِيَّة. إذا بتسخينه من ٦ إلى ٨ ساعات مع جزء احتفظنا بزيت الكَتّان بحرارة متقاربة من درجة الغَليان، وبملامسة الهواء طوال ٨ إلى ١٢ ساعة، وكنّا قد أضفنا إلى كلِّ ١٠٠٠ جزء منه، ١٥ جزءًا من المَرْتَك المسحوق جيَّدًا، و٤ أجزاء من سولفات الزنك، نحصل على زيت يَجفّ إذا مَدَدْناه بطبقات رقيقة، خلال ٢٤ ساعة، وهو زيت يُشار إليه بأسماء الزَّيت المطبوخ، زيت الكتّان المغشوش بالرّصاص أو المُمَرْتَك، ورنيش أو بَرْنيق. وإذا خضّينا زَيت الكَتّان ببساطة مع مُذابة أستات الرّصاص، فإنّنا نُزيل لونه ونزيد من خصائصه المحفِّفة.

ولأن للألوان المُحضَّرة من زيت الكَتَّان الرَّصاصي سيِّنة كونها تَسْوَد مع الوقت تحت تأثير التَّصاعدات السولفهيدريكيّة،

فلقد اتبعت في إنكلترة طريقة تسمح بزيادة خصائص زيت الكَتّان المُجفُّفة، من دون مشاركة مركب من الرصاص. إنّ هذه الطَّريقة هي من جُوناس، وتقضى بتسخين ١٠٠ جزء من زيت الكتّان في وعاء نُحاسي حتى حرارة مُعيَّنة (لم تُذكر بالتَّحديد)؛ نرفع بعد ذلك الزَّيت عن النّار ونُضيف إليه نقطة نقطة، مع التَّحريك المُستمرّ، ١٢ إلى ١٥ غرامًا من الحامض النيتريك المُركَّز الذي يُحدِث عملًا عنيفًا. نترك الكُلّ للتَّركيد عِدّة أيّام ومن ثمّ نُصفِّق.

ونجعل الزَّيت كذلك مُجفِّفًا أكثر من عشرين (١٠٠٠) من بيروكسيد المنغانيز، أو مع ٢ إلى ٦ أجزاء من ألف من سولفات المنغانيز ومن ييروكسيد (فَوْق أوكسيد) الرّصاص: وهو بذلك الزّيت المُمَغْنَةِ L'Huile Manganésée.

١٣٢ - زَيْتُون بَرِّيّ، عُتْم، عُتُم Wild olive tree (E) Oléastre, Olivier sauvage (F) Wilder ölbaum (D) Olea sylvestris, Olea oleaster (S)

شجرة بَرِّيَّة من فصيلة الزَّيْتُونِيَّات تَعلو من ٥ إلى ١٠ أمتار. فروعها وأفنانها شائكة. أوراقها مُعنَّقة، سِنانيَّة، نصلها حادّ الرَّأس. جلدي الرّقعة، طوله من ٥ إلى ٨ سم، صفحته العُليا بحرِّيَّة اللَّون والسُّفلي خَمليَّة فضِّيَّة المُواج. إزهرارها عُنقوديّ التَّجميع،

إبطيّ الارتكاز. أزهارها صغيرة القدّ، بيضاء اللَّون، خضراء الموادّ. ثمارها بَيضيَّة الشَّكل، صغيرة القدّ، قليلة اللَّب تُدعى زغْبَج أو زَغَنْبَج. وهي «مثل النَّبق الصِّغار تكون خضراء ثمّ تسود فتَحُلُو في مرارة وعجمتها مثل عجمة النَّبق. تُؤكل وتُطبخ ويُصفيً ماؤها حتى تكون رُبًا كرُت العِنَس».

المُركّبات والخصائص - يُنتِج جذع الشَّجرة المعمَّرة العتيقة مادّة خاصة مُحمرَّة اللَّون البنِّي تُدعى صمغ الزَّيتُون أو راتنج الزَّيتُون: Gomme d'olivier ou Résine d'olivier ou Gomme lecca ينصهر عند ١٣٠° سغ ويَتألَّف بكامله تقريبًا من مادّة بيضاء، بلُّوريَّة شَفَّافة تُدعى أُولِيڤيل Olivile. تَتميَّز هذه المادّة برائحة الوانيليا القويَّة الَّتي تنثرها إذا أحرقناها بحرارة ١٢٠ إلى ١٥٠° سغ. وهي مادّة تُستعمل في صناعة العُطورات كما تُستعمل لتحضير بعض شُموع الأختام الحمراء المُعَطِّرة. كما يُستخدم هذا الرّاتنج الصّمغ في تَدخينات وتَبخيرات لمعالجة الالتهابات الشَّعَبيّة والنَّزلات الرُّ ثويَّة .

ولقد حَضَّر هُوسْت Hoste من الزَّيتون البرِّيّ مُستخلَصًا مائِيًّا حامِضًا البرِّيّ مُستخلَصًا مائِيًّا حامِضًا Hydroacide أَطلَت عليه اسم أُولِياسْتِيرِيُوم Oleasterium يُوصى باستعماله بديلًا لسولفات الكينا كدواء طارد للحُمَّى ويُعطى على شكل نبيذ أو بيلُولات.

۱۳۳ – زَیْنُون عِطْرِيّ، عَوْف عَطِر (۱) Odoriferous osmanthus, Odoriferous olive tree (E)

Olivier odorant, Osmanthe odorant (F) Riechölbaum (D)

Olea fragrans, Osmanthus fragrans (S)

جَنْبَة من فَصِيلة الزَّيتُونِيَّات تَعلو من ١٥٠ إلى ٣٠٠ سم، فروعها وأفنانها مُنسجمة الارتكاز، مُعتدِلة الكثافة. أوراقها مُتقابلة، دائمة، بَيضويَّة الشَّكل المتطاول، طولها من ٦ إلى ١٢ سم وعرضها من ٣ إلى ٥ سم، نصلها جِلديّ الصَّفحة، لامِع البَشَرة، مُسنَّن الحافّة. أزهارها إبطيَّة وهامِيَّة الارتكاز، صغيرة أفراحة العرف العَنْب الأخّاذ. الكأس جُدًّا، قصيرة الأنبوب، كبيرة الفلقة، وُباعيَّة الأقسام المُسنَّنة. التّاج رُباعيَ البَتَلات المُتراكِبَة. الشَّمرة مُفردة النّواة، بَيضانِيَّة الشَّكل. أوراقها وأزهارها بُعطير الشَّاي.

۱۳۱ - زَيْرَفُون عَرِيْض الوَرَق، زَيْرَفُون كَبِيْر صيفي، زَيْرَفُون كَبِيْر صيفي، زَيْرَفُون أَنْشى، زَيْرَفُون كَبِيْر Tilleul à (۲) الزَّهْر، زَيْرَفُون شَجِيْح الزَّهْر (۲) grandes feuilles, Tilleul d'été, Tilleul femelle (F)

Tilia platyphyllos, Tilia grandiflora, Tilia pauciflora, Tilia europaeavar, platyphyllos (S)

ز ي ت

⁽١) التَّسمية العربيّة الأولى والتَّسميات الإنكليزيّة والألمانيّة للمؤلّف.

⁽٢) كلِّ التَّسميات العربيّة للمؤلّف ما عدا الأولى.

شجرة من فصيلة الزَّيْزَفُونِيَّات تعلو ٣٠ مترًا وتعمر طويلًا. لحاء الجذع والأغصان مالس. فروعها زغبية. أوراقها متبادلة، معنَّقة، مستدقَّة الرّأس، شبه مستديرة، لا متناسقة القاعدة، خفيفة التَّسنُّن، كامدة اللَّون الأخضر، صفحتها العُليا مَرْطاء، السُّفلي لِبديّة طويلة الأوبار، خاصة على تقاطع العرق الرَّئيسيّ مع العروق النَّانويّة. أزهارها في باقات صغيرة متدلية، قُناباتها في باقات صغيرة متدلية، قُناباتها البَتلات. الشَّمرة كُرَويَّة، صلبة، موبرة، مقطعها خماسيّ الزَّوايا، أضلاعها بارزة.

المركبات - دهن يحتوي على فرنيزول، منغانيز، خميرة تأكشد، مواة عفصية، غلوسيدات، فيتامين «ث»، ستيرولات، لعاب، كاروتين... في الأزهار: ٣٠,٣٠٪ زيت طيّار، عفص، سُكَّر، الكثير من الصمغ، كلوروفيل. البذور تحتوي على ٥٨٪ زيت دسم غير مُجفَّف، خالٍ من الرّائحة والطَّعم المُرّ، يتقارب من زيت الزّيتون الجيِّد. الشَّكير والقشرة الأولى: لعاب سميك مليّن وملطّف.

الاستعمال - تَقلَّصات، تَشنُّجات، حالات عسر الهضم، حالات أرق، عُصابات، هستيريا، وسواس المرض، سُوَيْداء، تصلُّب الشَّرايين، كظَّة الدَّم،

آلام الشَّقيقة (الأوراق)، حالات حُمِّيَّة.

الخصائص - مُضاد للتَّشنُّج، مُدِرِّ

العرق الغزير، مسكِّن، منوِّم خفيف، يؤثّر على زيادة لزوجة الدَّم وتخثّره، مُوِّل، مُهدَّئ، ملطَّف، مليِّن.

طريقة الاستعمال - تُستعمل الأزهار بشكل عام في نقاعة بنسبة ١٠ بالألف، كمضادة للتَّشنُّج ومعرِّقة غزيرة، وبنسبة ٥٠٠ غرامًا في حمّامات مهدِّئة. كما تستعمل هيدرولة الزَّيزفون، أي ماؤه المقطَّر، كسَوَّاغ لعدد من الجروعات الطَّبِيَّة.

وأكثر ما تستعمل الأزهار مرفقة بقناباتها ممّا يعطي مشروبًا أقلّ نكهة وفعاليّة. أمّا لعاب الشَّكير والقشور فينصح به كمليِّن وملطِّف على الحروق وآلام النقرس، وفي معالجة التهابات المَعِدَة والأمعاء المزمنة (الدكتور كازان). ويُعتبر الشَّكير ولعابه دواء شافي للرِّمال الصَّفراوي في نقيع من ٣٠ غرامًا في ليتر ماء يُغلى، كما يعتبر مضادًا للتَّشنَّج والتَّقلُص الكَبِديِّ الصَّفراوي.

هناك مضغوطات مُلبَّسة ومعيَّرة بنسبة ٢٥٠ ملغ من مستحضر الشكير، تُنظُم صبيب الصَّفراء، وتوقف تَشنُّج المجاري الصَّفراويّة كالتَّقلُص والرُّمال والاضطرابات الكَبديّة.

نقاعة الأزهار، من ١٥ إلى ٣٠ غرام في ليتر ماء غال يغطّى عشر دقائق ويؤخذ منه ٢ إلى ٤ فناجين يوميًّا. نقاعة الأزهار مع

أوراق البرتقال، للإصابات العصبية، زَيْت صديق الشَّغر(١١) Huile philocome **(F)**

ز ي و

مُخ ثور زيت لوز زيت بندق

بمقادير متساوية.

تجميلي للشعر. من كلمتين يونانيتين: صديق، شعر.

Huile de garou (F) قشرة كَرُدمانة جافّة١ جزء ندقّها في هاون مع الكحول، ونتركها تنهضم في: زىت زېتون ۲ جزء

نُمرِّر مع العطر القويّ.

زَیْت مسهّل قَوی (Huile purgative (F سَقَمُونيا أي محمودِيّة ١,٢٧ غ ٠٣٠غ نحل؛ ١٥ إلى ٥٠ غرامًا في مستحلب.

زَيْت مُفَنَّك أو مُفَنَّال Huile phéniquée ou phénolée (F)

زيت الخشخاش المنوم ٩٨ غ فينول مخزني ۲ غ

دستور أدوية ١٩٠٨.

زيوت طبِّيَّة زَيْت مُكَوْفَر، مَرُوخ مُكَوْفَر Huile camphrée, Liniment camphré **(F)**

كافور طبيعتي غير مُصْطَنَع مبثور ١٠٠ غ

(١) التَّسمية للمؤلِّف.

والرَّبو، والسُّعال النوبيّ، والتَّخلُّجات، وآلام الشقيقة، والقيئ العَصبيّ.

ملاحظة - عندما قرَّر النَّازيُّون، عام ١٩٤٠، تجويع الشُّعب الفَرنسي، عَمَد البروفسور ليون بينيه إلى تحضير ما سُمّى بـ «الطَّحين الأخضر» من أوراق الزَّيزفون بعد تجفيفها وسحقها ونخلها. وكان يتمّ خلط الطَّحين الأخضر مع ﴿ زَيْتِ الكَرْدَمَانةِ طحين الشَّعير أو مع طحين السَّرَّازان، واستهلاكه في التَّغذية العامّة. وكان هذا الطُّحين يؤمِّن حوالي ٢٨ بالألف من الأزوت و٢,٥ بالألف من الكلوروفيل.

۱۳۵ - زيوت طبيّة Huiles médicinales

زَيْت الذّراح (Huile de cantharides (F) ذُرّاح (حشرة) مسحوق خشن 💮 ۱۰۰ غ زيت لوز زيت زيتونناب إستعمال بيطري.

> دستور ۱۸۸٤. موضعی یستعمل کَنَار سائلة.

> زَیْت رَمَادِی Huile grise (F) أطلب مَحلول زئبقيّ مُعَلَّق يُزْرق.

> زَيْت السَّرْخَس الذَّكر Huile de fougère mâle (F)

> مستخلص الرخس الذكر المؤثير ٢٠ غ زيت فستق العبيد ١٨٠ غ إستعمال بيطري.

ضد داء المَشْقُوبات عند المُجْتَرّات.

111

 Huile iodée (F)
 وَيْت مُيَوَّد

 ه غ
 يود

 زيت لوز
 ١٠٠٠ غ

نَحلِّ اليُود في الزَّيت بواسطة الهاون، ونُسخِّن في حمَّام مريم حتى إزالة اللَّون. إنَّ هذا الزَّيت يحتوي على ٠٥٠٠ غرام من اليود في ١٠٠ غرام.

مقداره: مِلعقة إلى ملعقتين صغيرتين. نُصِح بالزَّبت المُيَوَّد كدواء بديل أو بالحري كدواء مُجانس لزيت كَبِد المُورَة. إنّ زيت پَرْسُنّ المُيَوَّد مَرَدُّه إليه؛ ولكن پَرْسُنّ كان يُحضِّره بجعل مجرّى من نجار الماء يصل إلى السّائل المزيج. إنّ زيت ڤيزو Vézu بيودور الكبريت يعود إلى مزيج من الزَّبت المكبريت المُكبرت الخفيفين. المنود والزَّبت المُكبرت الخفيفين. أدخِل إلى التّداوي منذ عدّة سنوات أدخِل إلى التّداوي منذ عدّة سنوات زيوت مُيوَّدة أكثر تركيزًا بكثير (١٠ زيت السمسم، ويحضر وم٣٪) تحصل بجعل كلورور اليود يتفاعل على زيت السمسم، ويحضر أيضًا زيوت بروميّة بالطُّرق ذاتها.

زَيْت الورد الباهت، زَيْت الورد الجوري، نَيْت مُوَرَّد Huile de roses pâles, Huile rosat (F)

زيت زيتون أو فستق عبيد ٩٠٠ غ زَيْت مُيَوَّد

نَحلّ الكافور في الزَّيت إمّا على البارد أو في حَمّام مريم عند ٣٠° سغ، ونُصفّي. (دستور ١٩٦٥). إنَّ زيت راسْبَايْل المُكَوفَر لا يختلف عن هذا الزَّيت.

تجربته - ينصح عددٌ من المؤلّفين، لتقدير الزَّيت المُكَوفَر، باستعمال المِقطاب؛ كلّ درجة انحراف في الأنبوب ٢ دسمتر تقابل حوالى ١٪ من الكافور. الزَّيت المخزنيّ بنسبة ١٠٪ يجب أن يعطي إذًا انحرافًا قدره + ١٠٠ إذا استعملنا الكافور الطبيعيّ المُيامِن.

إستعماله - مَرُوخ نُشادريّ مُكَوفَر (دستور ۱۹۶۹).

التَّركيبة ذاتها اعتُمِدت في كتاب الوصفات الفرنسيّ الوطنيّ الصادر عام ١٩٧٦؛ استعمالها كمروخ مُصَرِّف.

Huile camphrée زَیْت مُکَوْفَر مُرکَّز concentrée (F)

ضِد قُلابات الحصان (التهاب العَضَلة القلبية).

Huile camphrée زَیْت مُکَوفر یُزْرَق injectable (F)

أطلب مُذابة الكافور الزَّيتية المزروقة.

177

ز ي و

الورد مساوية للكمِّيَّة الأولى، مع تكرار العمل كما ذكرنا أعلاه؛ نُصفّى الزَّيت أخيرًا (دستور ١٨٦٦).

نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها زيت القرنفل، والسُّوسَن، والياسمين، والبنفسج.

Huile de cire (F)

١٣٦ - زيُوت مُختَرّة

زَيْت الشَّمْع

شمع أصفر ٥٠٠ غ قرميد مدقوق النَّضِيْد ورميد مدقوق النَّضِيْد النَّضِيْد نصهر الشمع بطريقة يمكن معها صنع كُرات مع مسحوق القِرميد ونقطّر في حمام الرمل. يعطى التَّقطير الأوَّل زيتًا زِبْديًا، هو زبدة الشَّمع، نمزجها مع القرميد المدقوق، ونعاود تقطيرها ثانية

> نحضر بالطّريقة ذاتها زيوت الموادّ الدَّسمة .

حتى يصبح النّتاج الحاصل مائعًا.

زَيْت صمغ الدَّوْرَم المخزني المُحتَرَ Huile de gomme ammoniaque pyrogénée (F)

پروس يستبدل القرميد بالكلس.

صمغ دُوْرَم مخزنی۲ جزء

نقطّر، نفصل الزّيت وننقّيه.

نحضر بالطِّريقة ذاتها زيوت المُرِّ، والينجوان، والصّابون، المُحترَّة.

Huile de schistes (F)

نصح بهذا الزّيت المسحوب من الأحجار النَّضيديّة بالتَّقطير، في تمسيدات لمعالجة الجرب، بمقدار ۱۰۰ وبضعة غرامات.

يتم الحصول على الزّيت الكبريتي Ichtyol بتقطير جافّ لبعض أحجار نَضيديَّة زفتيَّة وأحافيريَّة.

س

۱۳۷ - ساغُو Sago (E)

Sagou (F)

Sago (D)

نشاء على شكل حبوب صغيرة قطرها من ١ إلى ٨ ملم، مستديرة، مبيضة أو مُحمرَّة اللَّون، صلبة جدًّا، مطّاطة، قرنيّة، عديمة الرّائحة، تَفِهة الطعم الخفيف الحلاوة. تَتلَيَّن وتنتفخ في الماء الغالي. دخلت إلى أوروبًا عام المولوك، من لُبّ عدّة أنواع من فصيلة النّخليّات:

Metroxylon (Sagus) Rumphii Mart. Metroxylon Sagu Roth.

Sagus (phœnix) Farinifera Gaert.

Raphia pedonculata Beauv. Etc...

ذكر بَرْجِيُوس أنّ المولوكيِّين يُقَطِّعون جذع النخلة إلى قِطع يشقونها طوليًّا ويسحبون اللّب الذي يَحلّونه بالماء لكي يصنعوا منه عجينة يمررونها في الغربال ويجفّفونها. جذع واحد يعطي ٣٠ كلغ من السّاغُو أحيانًا.

الخصائص - مقوٍّ مُنَشَط Analeptique منهضم جدًّا.

الاستعمال - يستعمل الشرائد أي الأحسية المُركَّزة في إنكلترة والهند. أعيد تسجيل السّاغو في الفرماكوبيا عام 19٧٤. يجب عدم الإشراك بينه وبين ساغو الهند الغربية، وساغو البرازيل أي Tapioca الذي يختلف مصدره تمامًا والذي يُحضّر من طحين المَنْيوك أو مَنْهُوت.

الدود، عُشْبَة الهند (۱۳ مبيجالِيَة طاردة (۱۳ مبيجالِيَة طاردة (۱۳ کشبَة الهند (۱۳ Spigélie anthelminthique, Brinvillière (F)

Indianisches wurmkraut (D) Spigelia anthelmia (S)

نَبات عُشبيّ حَوليّ من فصيلة السبيجاليّات يعلو من ٢٥ إلى ٤٠ سم. أوراقه متقابلة سِنانيّة النَّصل. أزهاره في سنابل وحيدة الاتِّجاه لونها إلى الوَرديّ، باطنها أصفر. ثماره عُليبات كُرويّة صغيرة القدّ. الكأس والزهرة خماسيّة الأقسام. أوراقه وجذوره وسوقة وأزهاره تُستعمل في الطبّ منذ العام ١٧٤٠.

المركبات - الجذور والعُشبة تحتوي، حسب Fenculle (۱۸۲۰) على «مادة مُرّة» دعاها سبيجالين، وهي بالواقع قلويد. بُوورسما عزل من النّبات قِلَويدًا سامًا للغاية يُذكّر بالستريكنين.

⁽١) التَّسمية العربيَّة الأولى والثَّانية للمؤلِّف.

الخصائص - المادّة المُرَّة مسهِّلة قويّة، القِلَويد مُكَزِّز.

الاستعمال - نُصح بأنواع السبيجالية كمهيِّجة، ومسهِّلة، وبنوع خاص طاردة للدود. وهي نَباتات سامّة إذا كانت غضَّة.

طريقة الاستعمال - لطرد الديدان عند البالغ ٠,٥٠ إلى غرامين في اليوم.

ملاحظة - السبيجالية المرطاء (۱) ملاحظة - السبيجالية المرطاء (۱) Spigelia glabrata Mart من البرازيل، وأنواع أخرى سواها، تشترك بالخصائص الطبيَّة ذاتها.

المُرَط، مُرَّيْرَة الغابُون، مَرَّيْرَة لَطِيْفَة، الْمُرَط، مُرَّيْرَة لَطِيْفَة، الْمُرَط، مُرَّيْرَة لَطِيْفَة، Glabrous strophanthus,

Agreeable strophanthus (E)

Strophanthe glabre, Strophanthe agréable (F)

Strophanthus gratus (S)

نَبات عارش ليفيّ من فصيلة الدِّفْلِيَّات. أوراقه متقابلة، ريشيّة التَّعريق. أزهاره سَنميّة التَّعريق. أزهارو سَنميّة التَّجميع الهاميّ. مهده الغابون والكامرون والكونغو ومناطق نيجيريا الجنوبيّة. ثماره تحتوي على عدد كبير من البزور التي تعلوها ضمّة من الأوبار الحريريّة التي يحملها شِمراخ يطول

حسب الأنواع. بزوره إلى البُنني سن ر الشاموا، وهي أفتح لونًا من بزور النَّوع الهُلْبيّ، طولها من ١٢ إلى ١٣ مم كحدً أقصى، عرضها ٣ إلى ٥ مم، مستديرة الشَّكل، مَرْطاء المظهر، منفرجة القاعدة، مُخفَّفة الرأس إلى منقار، مُتَلَوِّيَة في غالب الأحيان.

القُنزعة مشابهة لما في الأنواع الأخرى، ولكن القسم الشّفليّ من شمراخها عار وأقصر حيث يمثّل حوالى الثلث ($\frac{1}{7}$)؛ القسم العُلويّ الذي يحمل الأوبار الحريريّة المنبسطة يبلغ حوالى 70 مم طولًا، ويمثّل حوالى ثلثي ($\frac{1}{7}$) الشمراخ.

أحد وجهي البزرة المسطّح القاعدة، يحمل عند ثلثها السفليّ عرفًا بارزًا صغيرًا هو الرّآفة Raphé؛ أما الوجه الآخر المُحدَّب فيحمل في وسطه خطًّا بارزًا يمتدّ بانتظام حتى رأس المنقار.

إن هذه المواصفات هي مواصفات واضحة المعالم أكثر بكثير، ممّا هي عليه في الستروفنتوس الهلبيّ والكُمْب، ذلك أنّ طحرة البزرة تكون خالية من الأوبار الحريريّة اللَّاصقة التي تكسب بزور النَّوعين المذكورين، الكُمْب بنوع خاص، مظهرها المتموّج Moiré إن طعم بزور هذا النوع هو أقلّ مرارة من طعم النَّوعين إيّاهما بشكل ملموس.

المركّبات - إن الهيتروسيد المتبلّر الذي يُستخرج من ستروفنتوس الغابون هو

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسمية العربيَّة الأولى والثَّانية للمؤلِّف والتَّسميَّان الإنكليزيَّتان للمؤلِّف.

الوَبائِينِ. إن بزور هذا النوع لا تَتَلُوُّن مع الحامض السولفوريك المركز باللون الأخضر الذي نلاحظه مع النَّوعين الآخرين؛ ولكننا نشاهد ألوانًا ورديّة أو بنفسجيّة. ونظرًا لهذا الفارق البارز يضع بعض العلماء هذا النوع في جنس متقارب يطلق عليه اسم Roupellia grata. في أنواع سحلب أوروبًا والشَّرق من فصيلة كودكس ١٩٧٢ ذكرت بزور نوع الغابون

١٤٠ - سجائر زَرْنيخيّة Cigarettes arsenicales (F)

ماء مقطِّ

تُدعى "ورقة بَرْزَليوس" تمتص المُذابة؛ وتُجفّف. أنبوب ورق السجائر.

> ١٤١ - سجائر بودان الزَّرْنيخية، سجائر ديوسقوريدس Cigarettes arsenicales de Boudin (F)

أسِتات زَرْنيخيّالسنتغ نحل الأستات في عِدّة نقاط من الملح، نَمتص المُذابة بواسطة قطعة من الورق نُجفِّفها ومن ثمَّ نَلفَّها كالسيجارة.

الاستعمال - في الرَّبو.

١٤٢- سَخُلُب، سَطوريُون Salep (E) Salep, Satyrion, Salap, Scrotum de chien, Patte de loup (F) Salepwurzel (D) Orchis (S)

يَتَكوَّن السَّحْلبِ من درنات مختلف السَّحْلَبيّات أو الشُّحْريّات. أهمّها ما

Orchis Morio L. سَحُلب مزدوج الورق(١) Orchis bifolia L.

سَخْلُب عَسْكَرِي (۱) Orchis militaris L. أرْسينيات الصوديوم المتبلّر ا غ سَحْلب عريض الورق.Orchis latifolia L ۲۰ غ سَحْلب ذکر Orchis mascula L.

نَحل الملح بالماء؛ نَجعل ورقة تصفية تُغْسَل الدرنات، تُغلى بعض الوقت

نُجفِّفها ونُقطِّعها إلى ٢٠ قطعة تحتوي يقع السَّحلب في درنات لَوزيَّة الشَّكل كلّ منها على ٥ سنتغرام من الزَّرنيخ. المستدير البَيضائي أو الرّاحي، صلبة نَلفٌ كل مُرَبّع على ذاته وندخله في جدًّا، لونها إلى الرَّماديّ المصفر، مكسرها قرني ونصف شفّاف. ينثر السَّحلب رائحة خاصة خفيفة؛ الماء يُلَيِّنه ويسهِّل سحقه. يتألُّف السَّحلب من نشاء، ومن مَنّانات Mannanes ومن ۼؙۘٳٙڲ۬ٵڹٳؾ؞

الخصائص والاستعمال - يُستعمل السَّحلب دائمًا مسحوقًا. تُحضَّر منه ثرائد أو عصائد، مُجمَّدات، شوكولاته مغذِّ ومقوِّ ومنشِّط. كانت درناته تستعمل

⁽١) التَّسمات العربة الثّلاث للمؤلّف.

في الماضي كناعظة، وهي خاصة نُسِبت إليها من دون شك بسبب ما كان يُسمّى «نظرية التَّشابه»، أي بسبب ترتيبها على غرار كيس الخِصْيَتين.

ملاحظة - إن درنات نبات "سَحْلَبيّة السرَّجُل السه شنوق" (۱) Aceras السرَّجُل السه شنوق" مين في مينية مينيّا مينيّا؛ وهو السَّحْلَبيّات، تعطي سحلبًا جيّدًا؛ وهو نبات شائع في فرنسا والجزائر، يشبه جدًّا النبات اللّبنانيّ Ssp.galilaea. أوراقه تحتوي على كومارين، وتتحلّى، إذا تخمَّرت بعض الشيء، بخصائص مشابهة لخصائص الشيء، بخصائص مشابهة لخصائص مفيدة في إصابات الأعضاء التنفسية. معرّقة وقد تكون نقاعتها ٥ بالألف. يحضر منها مستخلص ومسحوق وماء مقطر.

المَّانَّة صَغِيرة، مَلِيْنَة صَغِيرة، صَغِيْرة، صَغِيْرة، Small honey-wort, (۲) كشِيْشَة البَرَص (۲) Wax flower (E)

Cérinthe petite, Petit mélinet, Mélinet minor (F)

Gelbe wachsblume (D)

Cerinthe minor (S)

نَبات مُحوِل أو مُعمَّر من فصيلة الحِمْحِميّات، أمرط، مُتعدِّد السّوق، يَعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم؛ سُوقُه مُنتصِبة، فَرعاء. أوراقُه مالِسة أو مُتدرِّنة

(٢) التَّسمية العربيَّة الأولى والثّانية لإدوار غالب.

الصَّفحة العُليا، القاعديّة منها مُتطاوِلة وَلُوَقيَّة تَضيق إلى عُنق، الساقِيَّة قَلبيَّة القاعدة، مُتطاوِلة مِلْوَقيَّة مُستديرة الأُذَيْنات. سَنماتُه الشَّمرية تَستطيل جدًّا في النّهاية. قُناباته قَلبيَّة تَتخطّى الكؤوس وتَخفي قسمًا كبيرًا من الأزهار أثناء تَفتُحها. فصوص الكأس سِنانيّة، مُستديرة القاعدة. التاج مَرَّة ونِصف المَرَّة طول الكأس، باهِت اللَّون المُصفر، ينقسم حتى ثلثه إلى فصوص اللُبنانيّة مُستدِقَّة الرّأس. يرغب المناطق اللَّبنانيّة العالية عن سطح البحر.

الخصائص والاستعمال - قيل عن السَّرنْتَة إنها جنس نباتات مِغثريّة طبيّة تفرز رحيقًا عَسليّ المادّة يجرسه النَّحل. أوراقُه طبيّة تُستعمل في علاجات العَين. بزوره تُسكّن المغص وأوجاع الجنب والظهر. فُرُزُعة منه مع الزَّعفران والعسل بعد الطهر تعين على الحمل. وهو يُهيِّج الباه.

۱٤٤ – سَرَنْتَهٔ كَبِيْرَة، مَلِيْنَهٔ كَبِيْرَة (٣) Major honey-wort, Major wax flower (E)

Cérinthe majeure, Grande cérinthe, Grand mélinet (F)

Grosser wachsblume (D)

Cerinthe major, Cerinthe aspera (S)

نَبات حَولي من فَصيلة الحِمْحِميَّات غالبًا ما يكون مُستمرطًا وبحريَّ اللَّون،

177

س ر ن

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٣) كلِّ التَّسميات ما عدا اللَّاتينيَّة للمؤلِّف.

Runde zyperwurzel (D) Cyperus rotundus (S)

نبات مُعمَّر من فصيلة السُّعْدِيَّات، ريزومه نحيل، رئدي، يَنتفخ بدرنات بيضيّة الشَّكل، مسودّة اللُّون، كافوريّة الرّائحة. سوقه خشنة تعلو من ١٥ إلى ٦٠ سم، مَرْطاء، مالسة، مُثَلَّثُة الزَّوايا، مورقة القاعدة فقط. الأوراق أقصر من السَّاق عادة، مُزَوْرَقَة خارجيًّا، مَرْطاء، رقيقة الحوافى الشفّافة. الأوراق القلافيّة ٢ إلى ٨ تتخطّى الأنْثيل(١١) Anthèle المرتخى المؤلّف من ٣ إلى ٨ شعاعات غير متساوية قد تبلغ ٨ سم، مُغَمَّدة القاعدة بورقة أنبوبيّة باهتة اللُّون. الأَنْيُثلات (٢٠ Anthélules عِذْقِيَّة الشَّكل، شعاعاتها قصيرة وقليلة العدد مؤلَّفة من ٣ إلى ١٠ سُنَيبلات شبه مزدوجة الصفوف، من ١٠ إلى ٢٠ زهرة طولها ٢ إلى ٣ سم. عَصْفات كثيفة التّراكب لونها إلى الأحمر البُنِّيِّ وحتى الأصفر الوسخ.

الخصائص - الريزوم والدرنات مُنشَّطة، مستدرّة للعرق الغزير، مبوَّلة، مطمئة، مُضادّة للإسهال، طاردة للحمّى، طاردة للدود. أعيد تسجيله في الفرماكوبيا.

الاستعمال - رُمال كليوي، كريب، إسهال، طمث، اضطرابات كَبِديّة. وقويّ البُنية. ساقُه مُنتصِبة، بسيطة أو متفرِّعة، تَعلو من ٢٠ إلى ٢٠ سم. أوراقُه بَيضيَّة الشَّكل المُنعكِس، مَزمومة القاعدة، العُليا بَيضيَّة مُنفرِجة، مُزَرْكَشة السَّاعدة، العُليا بَيضيَّة مُنفرِجة، مُزَرْكَشة التصل، تُعلِّف السّاق، مَكسوَّة بتدرُّنات بيضاء اللَّون، مَرْطاء الصَّفحة العُليا، شقراء السُّفلي. أزهاره كبيرة القد هامية التَّجميع الكثيف العَقْربيّ الشَّكل القصير، التَّجميع الكثيف العَقْربيّ الشَّكل القصير، واحد، قَنِينيّة الشَّكل، مُوبِرة، تاجها واحد، قَنِينيّة الشَّكل، مُوبِرة، تاجها الأسنان المُقوَسة، وهو أصفر اللون أو مُبقًع القاعدة ببقع أرجوانيَّة، جالس، عُماسيّ عريض، فصوصه قصيرة جدًا.

الخصائص والاستعمال - قيل عن السَّرَنْتَة إنّها جنس نباتات مغثرية طبّية تفرز رحيقًا عسلي المادّة يجرسه النحل. أوراقه طبيّة تُستعمل في علاجات العين. بزوره تسكّن المغص وأوجاع الجنب والظهر. فُرزُعة منه مع الزَّعفران والعسل بعد الطهر تعين على الحمل. وهو يُهيِّج الباه.

السَّرَنْتَة الكبيرة نبات لبناني نادر جدًّا، على عكس السَّرَنْتَة الصَّغيرة، أمَّا تَسميته سَرَنْتَة ومَلِيْنَة فلإدوار غالب.

١٤٥ - شُغد شَرْقيّ، شُغد مُسْتَدِيْر، شُغد الحَيْر الحَمِيْر، رَزِّيْن، صَباح الخَيْر

Nut-grass (E)

Souchet rond, Herbe à oignons (F)

⁽١) التَّسمية العربيّة للمؤلّف.

⁽٢) التَّسمية العربيّة للمؤلّف.

طريقة الاستعمال - نقيع ٢٥ إلى ٥٠ غرام من الريزوم والدرنات في ليتر ماء يُغلى ويغطّى ١٠ دقائق ويؤخذ منه ٣ فناجين يوميًّا. درنات الرَّزِّين بطعم الكستناة، تستعمل مهروسة، في بعض الرُّيف اللُّبنانيّ، لمعالجة حَبِّ الشّباب.

(۱) مَغْزَني مَغْزَني مَغْزَني - ۱٤٦ Cevadilla (E) Cévadille, Sébadille, Sabadille (F) Schœnocaulon officinalis, Sabadilla

officinarum (S)

نَبات بَصلى من فَصيلة الزَّنْبَقِيَّات السورنجانِيَّة. ساقه عُشبيَّة تَعلو حتى المترين، وتنتهي بازهرار سُنْبُليّ التَّجميع. أزهارُه صغيرة القَدّ، بَيضاء اللُّون. ثمرتُه عُلَيبة صغيرة بَيضويَّة الشَّكل تُشبه إلى حدٍّ بعيد حَبَّة الشَّعير أو حَبَّة الشَّيْلَم المُغَلِّفة، مُصفرَّة اللُّون، عديمة الرّائحة؛ طعمها حافر ولاهب. البزرة عديمة الرائحة، طعمها حامز ومُرّ، سِنانيَّة الشَّكل، خفيفة التَّحدُّب، دقيقة الرأس، مُسطَّحة الطُّرف وغير منتظمة الزُّوايا. طولها الوَسَطيّ نحو ٨ ملم، وعرضها ١,٥ ملم. سطحها لامع اللُّون البُنِّيِّ المُسوَدِّ، ومُزَيِّن بخطوط طُوليَّة دقيقة القشرة الملوَّنة تُغلِّف سُويداء قَرْنِيَّة، مَبيضَّة اللُّون، تُحيط بجنين صغير يقع على قاعدة الحَبَّة.

المُرَكِّبات - لقد أمْكَن عَزْل الموادِّ س ف د التَّالية من الحَبَّة:

فيراترِيْن (٢) أي خُرْبُوقِيْن، وهو مزيج فَلُويدي، يجعل البزرة سامّة جدًّا، سَبَدِيْلِيْن (٢) أو سَوَادِلين أو سِفْدِيْلِيْن (٣)، عزله عزله Couerbe، سَبَتْرِيْن (٤) عزله Weigelin، وهذا ما يُشكِّل مجموع (٣,٥٠ إلى ٤,٢٥ بالمئة من القَلْويدات. إن هذه القلويدات تكون مشتركة مع عدّة حوامض من بينها حامض عَفْصِيك، وحامض فيراتريك أو خُرْبوقيك.

مواصفات المَسْحوق التشريحية - مسحوق قاتم اللَّون البُنِّي يتألَّف من خلايا كبيرة مُتطاوِلة، بُنيَّة اللَّون، مُتعدِّدة الزَّوايا، تَختص بالبَشرة، ومن خلايا تحصل من السُّويداء القَرْنيَّة وتترافق بتنقيطات أو جدارات معدومة التنظيم البنيوي. أكثر ما تُستعمل لاستخراج الشيراترين.

المسحوق يُحدث العَطْس.

الخصائص والاستعمال - مُنبَّهة مثيرة ومُهيِّجة. يُستعمل السَّبَديل من الخارج في مسحوق مشترك مع مسحوق العائق الجَبَلي أو عُشبة القَمل، باسم «مسحوق الكبوشيين» Poudre des Capucins، أو باسم «مسحوق النَّظافة» Poudre de فذلك للقضاء على القمْل.

⁽٢) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٣) التَّسمية لإدوار غالب.

⁽٤) التَّسمية للمؤلِّف.

س ك ا

ويستعمله المكسيكيون ضِد رُهاب الماء (خَوف مَرَضي من الماء، داء الكَلَب). ولقد جرت محاولة استعماله في فرنسا ضِد الحالات عينها، ومن ثم استُعمِل ضدّ السَّكْتة الدِّماغيَّة أي النَّقْطة، والشَّلَل، والدِّيدان، وفي المجالات المُخصَّصة للسُّورَنْجان.

العَرَب يُدخِلون الثِّمار المدقوقة في الهاون في مسحوق مُخصَّص للعينين.

طريقة الاستعمال - مقادير السَّبَديل من ، ٠,٥٠ إلى ٠,٥٠ غرامًا.

ملاحظة - في الطبّ تُستعمل البزرة الأذنات. (كودكس ١٩٧٤). يُنسب هذا النبات ملاحظة الدواء الآتي من المكسيك وأمريكا في الجنالوسطى، في بعض الأحيان وعن خطأ، النّباتات إلى جِنس «خُرْبُوق» Veratrum. وكان جدًّا. لم مونارْدِس قد عَرَّف به عام ١٥٧٢.

رَّةَ فِضَّيَّةً، فَاقُوعِ فِضِّيِّ الْكَوْرَةِ فِضِّيَّةً، فَاقُوعِ فِضِّيِّ الْكَوْرَةِ فِضِّيّةً، فَاقُوعِ فِضِّيّ الكابيُورَة أُوكُرانِيَة (۱۹۷ Ukranian Scabious (E)

Scabieuse argentée, Scabieuse

d'Ukranie (F)

Scabiosa argentea, Silberskabiose (D)

Scabiosa ucranica (S)

نبات مُحوِل أو معمَّر من فصيلة الدَّبْساسِيَّات، سوقه منتصبة، خشنة، دقيقة، فرعاء جدًّا، تعلو من ٥٠ إلى

٨٠ سم. أوراقه زغبية إلى مبيضة اللّون الفضي، أو خضراء وشبه مَرْطاء، مختلفة الأشكال، السُّفلى ريشية الأقسام إلى فصوص متطاولة خطية، العُليا خَطية ضيقة، مفصَّصة أم لا. قُنابات القُلافة خطيَّة سِنانية، أقصر من الرؤيس أو مساوية له. الرؤيس الزَّهريّ مسطّح، قطره ١,٥ سم. النّاج فاتح اللَّون، أبيض، أبيض مصفر أو ورديّ الصِّبغة. الرؤيس الثَّمري كُرويّ، غالبًا ما تتَخطّاه القُنابات المُبنَقة. القُليْفة ذات أنبوب القُنابات المُبنَقة. القُليْفة ذات أنبوب البيض، حريريّ. نصل الكأس قصير الأذنات.

ملاحظة - نَبات لبناني شائع جدًّا يُعرف في الجنوب باسم فاقوع، وهو من النَباتات المِغثريّة التي يرغبها النَّحل جدًّا. لم يرد ذكره في المراجع الأجنبيّة الطبيّة، وهو يشبه إلى حدٍّ كبير النَّوع الطبيّيّة، وهو يشبه إلى حدٍّ كبير النَّوع الطبيّيّ Scabiosa Succisa. مُركِّباته وخصائصه مجهولة، ومن المفيد تحليله المخبري أو أقلّه تجربته في نطاق الخصائص الواردة لأنواع السكابيوزة الأخرى. أسماؤه المقترحة أعلاه هي ترجمة للاسم العلمي.

Poisonus بُحَالِيّ - ۱٤٨ Sumach (E) (1) Sumac vénéneux, Arbre du poison (F)

Giftigesumach (D)

Rhus toxicodendron (S)

نبات من أمريكا الجنوبية من فصيلة

 ⁽١) كل التَّسميات للمؤلِّف ما عدا اللاتيئية والتَّسمية الإنكليزية الأولى.

البُطْمِيَّات. سوقه سَرْعِية ومتجذَّرة. أوراقه ثُلاثية الوريقة البَيضيّة، الكاملة الحوافي (ذكر بعض المراجع العلميّة أنّها منشارية الأسنان)، لامعة الصَّفحة العُليا، زغبيّة الصَّفحة السُّفلى. هي أوراق ذات حموزة تكفي معها ملامستها فقط حتى تُهيِّج البشرة بشكل عنيف وتُحدِث عليها النُّفْخات والنُّفْطات، ومن الخطورة سكب عصارتها على الجلد وحتى فركها قرب الأغشية المخاطيّة. أزهاره مُخضرة اللَّون، عذْقيَّة التَّجميع.

المركبات - تفقد الأوراق الكثير من فعاليتها إذا جُفِّفت؛ وهي تدين بسمِّيتها إلى وجود الكَرْدُول ذو التَّركيب الكيميائيّ (C₁₅H₂₇.C₆H₃(OH)2 من بلاذُر الشَّرق: Anacardium .

الخصائص - مهيِّج سام، مُنفِّط.

الاستعمال - نُصح به ضِدّ القُوبات والشَّلل والسَّلَعَة أي العِقدة الخنازيريّة.

طريقة الاستعمال - مستخلص، كحولتور، مسحوق. نصح بالمستخلص ضد السَّلَعة والشَّلَل وسَلَس البول اللَّيليّ. ويُعطى مسحوق الأوراق بمقدار ٥٠,٠ إلى ٢٥,٠٥غ، تُكرّر حتى الإحساس بحكة أو وَخْز أو نخْز أو تَنَمَّلِ ما. قليل الاستعمال، أدخله أَلْدَرْسُن إلى المادّة

الطبِّيَّة عام ١٩٧٤، وأعيد إدراجه في سن د الفرماكوبيا الفرنسية عام ١٩٧٥.

Quercus alba (S)

سنْدِيان أَمْرِيكيّ - ١٤٩ White oak, American oak (E) (2) Chêne blanc, Chêne d'Amérique (F) Weisser eiche, Amerikanischer eiche (D)

شَجرة كبيرة تَعلو من ٢٥ إلى ٣٠ مترًا وأكثر، أمَّا في المناطق الجبليَّة فإنَّها تتَّخذ شكلًا دَغْليًا مُنخفضًا. مَهدها وسط وشرق أمريكا الشمالية حيث يستخدم خشبها الثَّقيل في صنع المراكب والأثاث والعوارض والبراميل وفي التَّدفئة. أوراقها مُعبلة، طولها ١٢,٥ إلى ٢٢,٥ سم، قصيرة العُنق، مُزوّاة القاعدة، مُقَطِّعة من ٥ إلى ٧ فصوص مستديرة من كل جانب، قاتمة اللُّون الأخضر اللَّامع على صفحتها العُلبا، زغبية الصَّفحة الشُّفلي في البداية، تَصطبغ باللُّون البَنفسجي عند تمام الإيراق، تَنقلِب إلى اللُّون الأحمر الشَّديد في الخريف، غالبًا ما تبقى على الشَّجرة طوال الشتاء. بَلُّوطها مأكول، طوله ١,٨ سم، لاطئ غالبًا، يتساقط في الخريف؛ قمعها قليل العمق، حراشفه منتفخة ومُرْمدَّة اللَّون. وهو من الأنواع المذكورة في مراجع النباتات الطبية.

⁽٢) التَّسميات الإنكليزيّة والألمانيّة للمؤلّف.

⁽١) التَّسمية الإنكليزيّة والألمانيّة للمؤلّف.

س ن د

ار مِنْدِیان بُلاخ ، بَلْخ ، جِیْدار – ۱۵۰ Kermes oak, Scarlet oak (E) Chêne kermès, Chêne cocciné, Chêne garouille (F) Kermes eiche, kermesbaum (D) Ouercus coccifera (S)

شُجيرة صغيرة دغلة في أكثر الأحيان تكثر في الأراضي الكلسية وتعلو من 100 إلى 200 سم. فُروعها هزيلة. أوراقها دائمة، صغيرة القَد، جلدية النِّصال البيضية المُتماوِجة، شائكة الأسنان، لامعة اللَّون الأخضر الفاتح، مُرْطاء الصَّفحتين، مُستدقة الرأس، طولها من ٢ إلى ٦ سم وعرضها من ١٠ إلى ٢٥ ملم. بَلُوطتها كبيرة القَدّ، لامِعة القشرة، مُمراكِبة، خشِنة، منبسِطة أو مُحدَّبة. أعيد تسجيل هذه الشُجيرة في الإصدار التاسع للفرماكوبيا الفرنسية عام ١٩٧٥.

Dyer's oak, البُرْتُغال، عَفْص، مَلُوْل العَفْص، سِنْدِيان العَفْص، البُرْتُغال، عَفْص، مَلُوْل Gall oak, Nut gall oak (E)
Chêne à galles, Chêne du Portugal,
Chêne des teinturiers (F)
Echte galleiche, Galläpfel eiche (D)
Quercus infectoria, Quercus lusitanica (S)

شَجرة لُبنانيّة تَعلو ١٠ أمتار وأكثر، قليلة التاسع للفرما التَّقرُّع بشكل عامّ. لحاؤها مُرْمَدٌ اللَّون، تُصاب أوراقه حَرشَفيّ، غير قُرْقِيّ. فروعها مُرمدَّة منها العفص.

اللُّون، كثيفة وهي فَتيَّة، كذلك الأوراق كثيفة ولبديَّة، ولكنَّها سُرعان ما تُصبح مَرْطاء الصَّفحتين، شبه جلديّة النّصال، نصف دائمة، هوامشها مُتماوجة، مُسنَّنة، مُستدِقَّة الرَّأس، مُختلِفة التَّفريض أو شبه كاملة ولكنُّها مُتَلوِّيَة، وأحيانًا أخرى تكون كاملة تمامًا. عُنقها مُتفاوت الطّول من ٥ ملم إلى ٢ سم. القِدّات الذِّكريّة لِبديّة القُلافات، الأنثويّة قصيرة. السُّويقة النَّمريَّة مُتفاوتة الطُّول، قد تكون قصيرة جدًّا أو تطول حتى ٢ سم. قمع البَلوطة رمادي اللُّون، حراشفه لاطئة، تتَخطّاه البلوطة بشكل بارز. نوع يُصاب بتدرُّنات مَرَضيَّة يُطلق عليها اسم «جوز العَفْص» Noix de galle . أعيد تسجيله في الفرماكوبيا الحديثة عام . 1970

الاستعمال - راجع دراسة أحادية عن مركبات السنديان وخصائصه وطرق استعماله في المعجم السادس ص ١٢٢ رقم ١٤٦.

Chêne à سِنْدِیان عُنْقُودِیِ – ۱۵۲ grappes, Chêne à galles (F) Quercus racemosa (S)

شَجرة أُعيد تَسجيلُها في الإصدار التاسع للفرماكوبيا الفرنسية عام ٩٧٥. تُصاب أوراقها بعَفْصات مَرضيَّة يُستخرَج منها العفص.

Chestnut سِنْدِیان کَسْتَنِیّ الوَرَق – ۱۵۳ foliate oak (E)
Chêne à feuilles de Châtaignes (F)
Blattkastanie eiche (D)
Quercus castaneifolia, Quercus æsculus (S)

شَجرة مُعبِلَة الأوراق تَعلو ٣٠ مترًا، مهدها غابات جنوب وغرب بحر البلطيق وهي من الأنواع النادرة. أزهارها تبرز في نيسان وأيار مع الأوراق. الأنثويّة منها على إبط الفُروع الفَتيّة الهامي. بَلُوطها مأكول، طوله ٢٫٥ سم، يَنضج في سنته الثّانية ويتَساقط في تشرين الأول. الأوراق قاتمة اللَّون الأخضر اللّامع على صفحتها العُليا، رَماديّة اللَّون الكامد على السُفلى، طولها من ٧٫٥ إلى ٩ سم.

من الأنواع المذكورة في مراجع النَّباتات الطبيَّة العلميَّة.

White acacia (E) هَرَاس Acacia blanc, Mimosa blanc (F)
Weisse akazie (D)
Acacia albida (S)

شَجَرة لُبنانيَّة تَعلو من ٢ إلى ٥ أمتار وأكثر من فصيلة القَرْنِيَّات. أغصائها بيضاء، مَرْطاء، قليلة الشَّوك. أوراقُها مُزدوِجة التَّركيب الرِّيشيّ، قد تَبلغ ١٥ سم، وُرَيقاتها تَطول نحو ١ سم وتَعرض ٢ ملم. أزهارُها سُنبليّة التَّجميع، بَيضاء

اللَّون، مُنفرِدة أو مُجتمِعة، أقصر من سور الأوراق، ٥ إلى ٦ سم. الثَّمرة سميكة، غير مُنتظِمة الشَّكل، مَضغوطة جانبيًّا نوعًا ما. إزهرارها ربيعيّ. مَنبتها ضواحي المُدُن السّاحليّة.

Blue مَنْطَ أَزْرَقَ، أَقَاسِيا زَرْقَاء – ١٥٥ acacia (E) Acacia bleu, Mimosa bleu (F) Blaue akazie (D) Acacia cyanophylla (S)

شَجَرة صغيرة من فَصيلَة القَرْنِيَّات مَهدها أستراليا الغَربيّة؛ فُروعها مُتَلَوِّية ومُزَوَّاة. أوراقُها قِلْدات طولها ١٠ إلى ٣٠ سم، بَحريّة اللَّون الأزرق، عَريضة وضَيِّقة الشَّكُل السّنانيّ، وتكون أحيانًا خفيفة الشَّكل المِنْجَليّ. عِرْق وسطيّ واحد. أزهارُها كثيفة التَّجميع في رُؤوس كُرَوِيّة الشَّكُل جميلة اللَّون الأصفر، من ٣ إلى ٨ على فُروع إبطيّة قصيرة، إزهرارها في الرَّبيع. فرُوعت منذ سنوات طويلة في مختلف مناطق السّاحل اللَّبنانيّ.

Autumn سُوْرَنْجان الخَرِيْف – ۱۵٦ colchicum, Meadow saffron (E) Colchique d'automne (F) Herbstzeitlose (D) Colchicum autumnale (S)

طريقة الاستعمال - تتَحلّى مُستحضَرات السّورَنْجان بخصائص بارزة مُضادّة

للنَّقْرس وتتفاعل على المَعِدة والأمعاء بشكل شديد؛ وعندما تبرز رَدّة الفِعْل هذه على المَعِدة والأمعاء تكون نَوبة النَّقْرس في العادة قد شُفِيت؛ وتُعطى من مُستحضَرات البزور. أما مُستحضَرات السُّورَنْجان في هذا النَّطاق بمقادير تتصاعد تدريجيًا في أكثر الأحيان حتى بروز اضطرابات خفيفة في المَعِدة والأمعاء. إنها مُستحضَرات فَعَالة أثناء حدوث النَّوبة النَّقْرسيَّة الحادَّة ولكنَّها غير فَعَّالة في الفَتَرات الَّتي تَفصلها.

> إن أفضل مُستحضَر هو صِبغة البزور (كودكس ١٩٤٩)، تُحضّر عُشارية ($\frac{1}{1}$)، وهي نصف مرة أقل فعالية من صبغة دستور ۱۸۸٤، وتحتوى حوالي ٠,٠٣٥٪ من الكُولْشِيسين. غرام واحد منها يقابل ٥٦ نقطة. يعطى منها ٣٠ إلى ٤٠ نقطة في البداية؛ نضيف ١٠ إلى ١٥ نقطة في الأيام التّالية ومن ثم نُوقف العِلاج بعد حصول أكثر من ٣ أو ٤ تَغيُّطات في اليوم. إن المقادير الاعتيادية التى يَذكرها الدستور لهذه الصّبغة هي غرام واحد للجرعة، ١,٥ إلى ٣ غرامات لكل ٢٤ ساعة؛ المقادير القصوى: ٣ غرامات لجرعة واحدة و١٢ غرامًا لكل ٢٤ ساعة (بالغون).

> إن مسحوق البزور نادرًا ما يُعطى في بيلولات بمقدار ٥٠,٠٥غ إلى ٢٠,٠٠غ في اليوم. مقاديره الاعتيادية ٠,١٠غ لجرعة واحدة، ٢٠,٠٠غ لكل ٢٤ ساعة. مقاديره القصوى هي ٣٠,٣٠غ لجرعة واحدة، ١,٢٠غ لكل ٢٤ ساعة (بالغون).

إن المُستحضَرات التي تُحضَّر من بَصَلَة السورنجان أو أزهاره لم تعد تُذكر في دستور الأدوية، وهي أقل فَعاليَّة بكثير كحولتورات البصل والأزهار (دستور ١٨٨٤) فكانت تحتوى على ١,٠٣ إلى ٠,٠٦٪ من الكولْشِيسين؛ مقاديرها ١ إلى ٣ غرامات في اليوم. أما صبغة البصل الخماسية (أ) في دستور ١٨٨٤ فكانت تحتوي على ٠,٠٢ إلى ٠,٠٣ غرامات بالمئة من الكولْشِيسين؟ مقاديرها ٢ إلى ٥ غرامات في اليوم.

إن الأدوية الفعّالة النّاجعة Héroïques يجب ألّا تُعطى على شكل خمر (اتفاق دولي)، إن خمر بصل السورنجان، بنسبة ١٦٠ غرام في الليتر، الذي ذكر في دستور ١٨٨٤، ولم يعد مذكورًا في الفرماكوبيا، كانت مقاديره ٥ إلى ٢٠ غرامًا لكل ٢٤ ساعة. أمّا خَلّ السّورنجان، بمقدار ٢٠٠ غرامًا من البصل في ليتر خَل، المذكور في دستور ١٨٨٤، فكان يعطى بمقادير من ۲ إلى ۱۰ غرامات.

كان السورنجان أساسًا لعدد كبير من المُستحضَرات الصَّيدليّة المُضادّة للنّقرس مثال بيلولات لارتيغ Lartigue، مسحوق بسْتُويا Pistoïa، ليكور لاقِلّ Laville، صبغة كُوشو Cocheux، ماء هُدْسُن الطبي Hudson، نقاط رَايْنُولْد Reynold، مُضادّ وَانْت النَّقْرسيّ Want، دواء بيجيان المُتخصِّص Béjéan، إلخ.

الماه - سُوْرَنُجان دُوكاين، لَحُلَاحِ Decaisne colchicum, دُوْكاين (۱) Decaisne meadow saffron (E) Colchique de Decaisne (F) Decaisne Zeitlose, Decaisne Licht-

Colchicum decaisnei (S)

blume (D)

دَرَنة مُعمَّرة بَصَلتة الشَّكل من فصيلة السُّؤرَنجانِيَّات مُتَوسُّطة الأحجام يُغلِّفها إهابان أو ثلاثة إهابات دائمة إجمالًا لا تُعرِّى الدَّرَنة وقاعدة السّاق إلَّا نادرًا؛ وهي إهابات تستطيل حول قاعدة الأغَمِدة Cataphylles الّتي تَحصُرُ الأوراق والأزهار. أزهارها نادرًا ما تكون أكثر من ٢ إلى ٦، أنبوبها في العادة أطول من التَّبَلات التي تكون باهتة اللُّون الوَرديُّ أو نادرًا شبه بَيضاء، إهليلجيّة الشَّكل أو سِنانيّة، ضَيّقة أحيانًا، طولها من ٥ إلى ٦ سم وحتى ٨ سم أحيانًا وعرضها من ٤ إلى ١٢ ملم. الأسدية أقصر من غلاف الزَّهرة بنصف مَرّة، بالكاد تَتخطَّاها الأقلام أو لا تَتَخطَّاها. الأوراق من ٣ إلى ٥، منفرجة، عرضها على الأرجع. من ٢,٥ إلى ٥ سم. إزهراره خلال تشرين الأول والثاني. أوراقه تبرز من شباط إلى أيار؛ وهو من الأنواع الشائعة جدًّا في لبنان، في الحقول والأراضي المحجرة والصخور والأماكن الكلسية بنوع

> (١) كلّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسمية الفرنسيّة واللّاتينيّة .

خاص. ورد باسم سورنجان دكني في س و س بعض المراجع.

تحليله المخبريّ مَرغوب للوقوف على مدى نسبته بالكولشيسين.

۱۵۸ مئوس (مُركِّبات كيميائيّة)، تَركيب السُّوس الكيميائيّ Réglisse (Composition Chimique) (F)

يحتوي جذر السوس على مادة مُلوِّنة، وحامض مالِيْك، وأَسْهاراجِيْن بنسبة ٢ إلى ٨٪، وعلى جوهر خاص يُدعى غليسِرِّيزِيْن Glycyrrhizine أي حامض غليسِرِّيزِيْن غليسِرِّيزِيْن الله ٢١٪، وهو غليسِرِّيزيك بنسبة ٦ إلى ١٢٪، وهو الذي أطلق عليه پفاف اسم غليسِيُون Glycion (وعن خطأ: سُكَّر السُّوس). النشاء، ٢ إلى ٤٪ من السَّكاكر المُحَلِّلة كيميائية. وقد بَيَّن رُوسّان، عام ١٨٧٥، ان الغليسِرِّيزِيْن النَّقيّ هو غير قابل الذَّوبان وهو وتَفِه الطَّعم، وأن عمله حامض؛ وهو وتَفِه الطَّعم، وأن عمله حامض؛ وهو خصائصه ويُعظِّمها ويرافقه في النبات على الأرجع.

يمكن الحصول على الغليسرِّيزيْن بترسيب مُستخلِص السُّوس المحلول في حامض سُولفوريك خفيف، نَغسل الرَّاسب بالماء المُحْمَض أوَّلا، ومن ثم بالماء النَّقيّ؛ نَحلّه في الكحول، نُعادله بواسطة كربونات البوتاسيوم، نُصفيً ونُبخُر حتى الجفاف التّام. يكون

ين و س

الغليسِرِّيزين الذي يحصل بهذه الطريقة في كتلة فاتحة اللَّون البُنِّيّ، لامعة، كَسُورة وشديدة الطَّعم السُّكَريّ. وهي تنتفخ بالحري في الماء أكثر ممّا تذوب فيه؛ تذوب في الكحول وليس في الأثير.

إن الغلِيسِرِّيزين ليس غلوكوسيدًا كما اعتقده البعض عام ١٨٦١، ولكنه في الحقيقة أشتير الحامض الغليسريزيكي الدِّيغْليكورونيّ diglycuronique؛ يُعطى بالتحليل المائى الحامض الغليسريزيكي وذَرّتَين من حامض الأورونيك Uronique؛ ولقد تَمّ التَّعَرّف لاحقًا على وجود الغليسِريزين في جذور وأوراق عُصْبَة السُّوسُ أي الشَّشَم Abrus .pecatorius L وفي جيذور وأوراق اللُّتَّيْنِ الشَّائِكِ^(١) Ononis spinosa (وهو ما يُسمّى في جنوب لبنان: شْبَيْرَقَة)، وفي جذور وأوراق نَفَل الجبال(١١) Trifolium .alpinum L وعند الكُشْني السَّوداء .Orobus niger L وعند اليَرْيانُدرا الحُلْوَ (۱) Periandra dulcis Mart. وفى أوراق الأسطراغالُس السُّكِّريّ السؤرَق (۱) Astragalus glycyphyllos L. وأسطراغالس آخر يُدعى Astragalus .Ammodytes Oall، وهي تنتمي جميعها إلى فصيلة القرنيّات؛ كما وُجِد، بالإضافة إلى ما تقدّم، في ريزوم بعض السَّراخس، مثال البَسْبَايج أي عَرَقْسُوس Polypodium .vulgare L وعند خَيْمِيَّة تدعى مِرِّيْس

Myrrhis odorata L. وهي نبتة تشبه جدًّا نباتًا لبنانيًّا عطريًّا من فصيلة المُركَّبات يُدعى .Tagetes minuta L. مُخْمَلِيَّة صَغيرة (۱۱)، وفي نبات من السَّبَنْديّات يُدعى .Chrysophyllum glycyphlæum يُدعى :Cas. كريزوفيلُم سُكَّريّ (۱۱) (كلمة كريزوفيلُم من إدوار غالب).

كان تركيب الغليسِريزين الكيميائي مدار جدل، خاصة بين كل من هابرمان، وتشيرش، وسَدَرْبَرْغ (١٩٠٧)، غُوشُمان (١٩٠٩)، إلىخ. عام ١٩٣٧-١٩٣٦ العترح قُوس ومن ثم رُوزِيكا التركيبة التالية: С42H62O16 للغليسِريزين، والتركيبة С30H46O4 للعليسِريزين، الغليسراتيك. يمكن الحصول على ٣٠ من الغليسريزين من ١٠٠ من مستخلص الشوس. ولان الغليسريزين لا يذوب في الماء. فإن الغليسريزين النشادري هو الذي يستخدم للحاجات الصيدلية.

مُركِّبات جذر السُّوس الكيميائية - ماء ٨٤٪، رماد ٢٪، مواد دهنيَّة ٥،٠ إلى ١٪، نشاء ٣٠٪، سَكّارُوز وسكاكر مُحلِّلة كيميائية ٢ إلى ٤٪، مُنبِّت، جوهر مرّ، هيتروسيد فلاڤونيّ: ليكيريتُوسيد، جوهر مُسَكَّر، غليسِرِّيزين ٥ إلى ١٥٪ بشكل مُشتقّات كلسيّة ونشادريّة. إن جذر السّوس المؤلّف من الجذر والركوب غير المنظّفة والمجفّفة، يجب أن يحتوي، وحسب الفرماكوبيا الفرنسيَّة، على ٤٠٪ من الحامض

الغليسر يزيكي كحد أدني.

لوحِظ غش عصير الشوس بواسطة ما يُدعى Masticogna وهو عصير نبات من فصيلة المركّبات مهده أفريقيا الشّمالية يُسمَّى إشْخِيص أو شَوْك العِلْك . Atractylis gummifera L.

يستخدم خشب السُّوس يوميًّا في تَحلية الزهورات. وما يجب التنبّه له هو ألّا نستعمله سوى نُقاعة أو مَرْثًا، ذلك أن جوهره الحامز ينحلّ بالغلّيان وينتقل إلى السَّوائل. ولهذا لا يُضاف السُّوس إلى الزهورات المَغليّة إلّا بعد رفعها عن النار. ويجب كذلك قشره بالسكين لكي ننزع عنه القشرة البنيَّة، ومن ثم نُقطَّعه إلى قطع صغيرة نَنخلها لكي ننزع عنها الغبار. إن مسحوق خشب السوس يكون فاتح اللون الأصفر.

إن السُّوس الممروث بالماء مع كمية صغيرة من الكزبرة يشكِّل المشروب الشُّعبيّ المعروف باسم كوكو Coco.

مستخلص السوس ومسحوقه (دستور ١٩٦٥) يستعملان جدًّا بهدف إعطاء بعض القوام للبيلولات. مستخلصه الخام (دستور ١٩٦٥) أي عُصارته يُستعمل كما هو، ويدخل في تحضير عجائن صدريّة ويستخدم في تحضير عصارة الشوس المُيَنْسَنَة. وهي دواء شعبى ضد الزكام (مقشع ومضاد للشعال). بالإضافة إلى ذلك، لمسحوق السوس خصائص مسهلة.

وهو يستعمل أيضًا في معالجة حالات سوس تقطّع الطمث وعسره، في مرث ١٠ غرامات لكل ليتر ماء ولمدة ٥ ساعات، كمضاد للتشنُّج.

> إن استعمال السُّوس في معالجة التهابات المعدة أو في معالجة قرحات المعدة والعفج، إما على شكل مستخلص أو بإعطاء مشتقات الحامض الغليسراتيك، هو حصيلة أبحاث قام بها عالِمان (١٩٤٨) وعالِم آخر عام ١٩٥٠، ومن ثم أجراها في فرنسا كل من غُوتُمان وغِي أَلْبُوت عام ١٩٥٣؛ ومن ثم أجرى بعد ذلك كل من مارتان وهالْبَرن دراساتهما على الحيوان عام ١٩٥٣.

هناك مُستحضران مُتخصِّصان يستعملان هذا المبدأ في معالجة القرحات والآلام المعوية، منهماك مستخلص عصارة السوس الذي يحوى على ٦٪ من الحامض الغليكورونيك الحُرّ أو المُركّب، بالاشتراك مع مسحوق السوس، ويكون في مضغوطات من ٥٠٠ ملغ تحتوي الواحدة على ٣٠٠ ملغ من السوس. إن هذا المستحضر يجب ألا يستعمل في معالجة القرحات ولكن في علاج أعراض الآلام الشُّرْسُوفيَّة. التَّنبُّه إلى أن الغليسرِّيزين يُحْدِث انحباس الصوديوم، وفقدان البوتاسيوم (مجازفة ارتفاع التَّوتُّر الشّريانيّ).

Réglisse (۱) مُنُوس شائِك (۱۵۹ مُنُوس شائِك (۱۵۹ مُنُوس شائِك (۱۵۹ مُنُوس شائِك (۲۰۰ مُنُوس شائِک (۲۰۰ مُنُوس شائِك (۲۰ مُنُوس شائِك (۲۰ مُنُوس شائِك (۲۰ مُنُوس شائِک (۲۰ مُنُل مُنُل مُنُلُك

نَبات معمَّر أَمْرَط أو شبه أَمْرَط من فصيلة القَرْنِيَّاتِ (أوبار نادرة قصيرة جدًّا). سوقه مُنتصبة أو نائمة طولها حتى المتر أو أكثر. أذَّناته صغيرة جدًّا. أوراقه مُركَّبة من ٣ إلى ٦ أزواج من الوريقات المتطاولة أو الإهليلجية، المُستدقَّة الرَّأس. سويقاته قصيرة جدًّا، تحمل أزهارًا صغيرة، تجتمع في رؤيس كثيف. الكأس من ٢ إلى ٣ ملم، أسنانه أطول من الأنبوب، غِدِّي وزَغِب. التّاج أزرق اللُّون البِّنفسجيّ، بتلاته ضيِّقة وحادّة. رؤيسات مثمرة كُرويّة قطرها ٣-٤ سم. القرون بيضيّة الشَّكل المُنقلِب إلى متطاولة، مضغوطة قليلًا، ذات بزرتين، كثيفة الكساء بحرائر صلبة ومزركشة. يزهر من أيار إلى تموز في الأراضي المهملة.

Mountain (۲) اسَوْقُم الجِبال (۲) (العِبال (۲) Aubour de montagne, Cytise de montagne (F)

Berggoldregen (D)

Laburnum alpinum (S)

شَجرة تَزيينيّة جميلة جدًّا من فَصيلة

القرنيّات الفراشيّة تَعلو ١٠ أمتار. أغصانُها مَرْطاء، أحيانًا خشِنة الأوبار. أوراقُها مُعْبِلَة، إهْليلجيّة، طويلة العُنق، أوراقُها مُعْبِلَة، إهْليلجيّة، طويلة العُنق، لا إلى ٧ سم، ثلاثيّة الوريقات الشّبه لاطئة، مُهدَّبة الحوافي. أزهارُها صَفراء في عُنقود ضَيِّق، هاميّ الارتكاز، مُنتصِب، يُزيِّنه بَعضُ الأوبار أحيانًا، قد يَبلغ ٤٠ سم. الشَّمرة قرن ضيِّق، مَضغوط، أمْرَط، يَنْفَلِق متأخِّرًا جدًّا عن بُرورٍ عديدة، كلويّة الشَّكل، بُنيَّة اللَّون، خالية من الزَّوائد.

المُركِّبات - قِلَوید سام في الأزْهار والبُزور: السِّتِیزین Cytisine؛ مرادفاته: باتِیْتُوکْسِیْن، لابُرْنِیْن، صُوفُورِین، أُولَکْسِیْن، یُستخرج أیضًا من اللَّزّان، ترکیبُه الکیمیائی C₁₁H₁₄ON₂.

الخصائص - مُدِرّ للصَّفْراء، مُسهِّل قَوى، مُوتِّر الأوعية الدَّمَويّة.

الاستعمال - الإمساك، التَّتَبُّغ، الكَبِد، الخفاض التَّوتُّر.

طريقة الاستعمال - الدكتور لوكلير ينصح بنقاعة ١٠-١٠ غرامًا من الأوراق في فنجان ماء غال يُؤخذ كمدر قَويّ للصَّفراء. السِّتيزين يُستعمل طبيًّا على شكل كلورهيدرات لمحاربة التَّسمُّم بالتَّبغ. إن استعمال السَّوْقَم يَجب أن يُستَعْد من التَّداوي المنزليّ.

⁽١) التَّسمية العربيّة والفرنسيَّة للمؤلّف.

⁽٢) كلّ التَّسميات للمؤلُّف ما عداً اللّاتينيّة.

Cactus à (۱۱ میئروس کبیر الزَّهْر ۱۲۱ – سیئروس کبیر الزَّهْر ۱۲۱ – ۱۲۱ grandes fleurs (F)
Cereus grandiflorus, Cactus grandiflorus (S)

يتميَّز جنس سيريوس عمومًا بنباتاته الشَّجَرانيَّة أو الصَّغيرة القَدّ، وبأزهاره الكبيرة، الحالية من الحراشِف، والتي تَسقط بعد الازهرار من دون أن تَترك نُدْباتٍ على الثَّمرة. وسيروس كبير الزَّهر نوع من فصيلة الصَّبّاريّات دَرَسه بُونييَّه وبواتَسييه عام القلبيّة.

المُرَكِّبات - قَلْويد غير واضح التَّحديد: كاكْتِيْن، صَبَّارِيْن.

الخصائص - مُقوِّيَة للقلب.

الاستعمال - الزَّهرة الكبيرة الصَّفراء اللَّون المَقْدُودَة: إصابات قَلبيّة.

طريقة الاستعمال - صبغة بنسبة جزء من خمسة أجزاء، يؤخذ منها ١٠ إلى ٤٠ نقطة، ٣ مرّات في اليوم؛ كَاكْتِين، الجرعة القُصوى ٥ ملغ.

ملاحظة – كانت خصائص هذا النبّات المُقوِّية للقلب مَثار جَدَل، ذلك لأنّه كان، وبوجه الاحتمال، قد استبدل غالبًا بالأزهار السهلة التّمييز لصَبّاريّات عديدة مختلفة.

(أطلب دراسة صَبْرَة أو كَاكْتُوس في س ي س الله المعجم الرّابع ص ١٣٥ رقم ١٦٩).

Skirret (E) بينسَارُون – ۱۹۲ Chervis, Cherouis (F) Zuckermerk (D) Sium Sisarum, Pimpinella Sisarum (S)

يَتألَّف جنس Sium من نَباتات عُشبيَّة مائيّة عمومًا، من فصيلة الخَيْمِيَّات، تكون أوراقها ريشيّة التَّفليق. من أنواعها السيسارون الصينيّ المهد. وهو نَبات طَوعيّ مُعمَّر في آسيا الوسطى، يَعلو نحو ١٥٠ سم. جذوره عُسقوليّة غليظة مِغزليّة الشَّكل، مأكولة، لُبابها أبيض اللَّون كمِكْسرها، نشويّ التَّركيب، سُكَّريّ الطَّعم.

الخصائص - الجذر دواء مُطْمِث، مُبوِّل، طارد للحمّى. البزور تابلة.

الاستعمال - تُؤكل الجذور مَطبوخة كجذور السَّلْسَفيل، وهي طحينية المادّة السُّكَريّة جدًّا. أما أسطوانتها الوسيطة فتَتليَّف جدًّا، ومن الملائم نزعها ورميها. الثَّمار، وهي بزور تُشبِه بزور الشّومر، ولكنّها أدَق منها، يَستعملُها الإنكليز والألمان كتابِل.

ملاحظة - يُزرع السيسارون منذ أمد طويل في فرنسا، حتى إنه كان كبير الانتشار في حدائق عصر النَّهضة. ولكن نتاجه الخفيف جعله يُهمَل لحساب الدَّبَحْ

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

 س ي س الزِّراعي أي القَعْبَارُون وأنواع السَّلْسفيل. ويَتمّ تكثير السيسارون بالبزور في تُربة خفيفة، عميقة، جيِّدة التَّسميد العُضويّ. ويَتمّ ذلك في الخريف أو في أوائل الربيع، وفي خطوط تبعد عن بعضها نحو ۲۰ سم.

١٦٣- سَيْسَبان كَبِيْر الزَّهْر Great flowered Sesban, Danchi plant (E)⁽¹⁾ Agati, Sesbanie à grandes fleurs (F) Grossblüte Sesbanie, Schnurfrechme **(D)** Sesbania grandiflora (S)

شُجَيرة أو شَجَرة صغيرة مَجهولة المنشأ من فَصيلَة القَرْنِيَّاتِ القَراشِيَّة تَنتشر زراعتها في حَدائق الزِّينة. أوراقُها ثُنائيّة التَّقسيم الرِّيشيّ إلى وُرَيقات عديدة.

إزهرارها إبطى الارتكاز، عُنقودى التَّجميع المُرتخي. يُقال إنَّها من النَّباتات الطُّبُّيَّة يُتداوى بها لتفتيت حَصَى المَثَانة. من جنسها حَوالي ٥٠ نوعًا.

الخصائص والاستعمال - قشرتها غنية بصمغ قابض، وتشتهر على أنّها طاردة للحُمّى؛ مُستخلصها مُشةً ومُضادّ للإسهال، مُقيِّئ وماسِط بمقادير مُرتفِعة. أوراقها مُبَوِّلة؛ وهي دواء مَوضعيّ لمعالجة الكدمات والرَّضّ والفَكْش. أزهارها تُشكِّل عِلاجًا شَعبيًّا في كاليدونيا الجديدة ضد الزُّكام المُزمِن والشَّقيقة بحيث يُسْتَنْشَق عَصرها بالمنخرَيْن. أزهارها الفَتية غَنية بالموادّ السُّكُّريّة، نَبْتُها الفَتِيّ وأوراقها الفَتيّة تُؤكّل مَطبوخة أو مَقْلِيّة.

⁽١) التَّسمية الإنكليزيّة الأولى والتَّسمية الألمانيّة الأولى للمؤلِّف.

ذكر كذلك أن جذوره وساقه وأوراقه ش ب ي وبزوره تفيد المَعِدة وتُقوِّي القَلب وتَصرِف الغازات وتوقف الفُواق. ويُستخرَج من جميع أجزائه زَيت طيّار فافع له استعماله الطبِّق.

ش

Spiny burdock, (۱) فُبَيْط شائك – ۱۶۰ Spiny burrweed (E) Xanthium épineux, Lampourde épineuse (F) Stachelspitzklette (D) Xanthium spinosum (S)

Meu, مُوْم، مُو – ١٦٤ Spignel (E) Meum, Aneth sauvage, Fenouil d'ours (F) Wilder dillen, Feine Bärwurz (D) Meum athamanticum, Ligusticum mem (S)

المُوم جنس نَباتات مُعمَّرة عِطريَّة من فصيلة الخَيْمِيَّات تَنبت في ضمَّات في جبال أوروبا الغربيّة. والشَّبْث البَرِّيّ نوع أمْرَط، رائحته نَفّاذة. سامّة مُخطَّطة، تعلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم، مُخطَّطة، بسيطة. أوراقه مُتطاولة، عديدة السَّكَمات التي تبدو كأنَّها دَوَّاريَّة النَّجميع، سيورها دقيقة، شَعريّة. الخيمة عديدة الشُّعاعات. النَّمرةُ مُتطاولة، مُزَوْرَقة الضُّلوع. البزرة ذات مُنْقي مُقَعَر.

يَتمتَّع هذا النَّبات بكامل مظهر الشَّومر، إلّا أنَّه يَتميَّز عنه بعنقه المحاط بالأوبار الصَّلْبَة المُنتصِبة وهذا ما أكسَبه الاسم الفرنسي شومر الدَّب.

الخصائص - مُنشِّط، مُبوِّل. لم يعد مستعملًا.

نَبات حَوليّ منتصب متفرّع من فصيلة المُركَّبات يعلو من ٢٠ إلى ١٠٠ سم ساقه مَرْطاء، أسطوانيّة، مزوَّدة كالفروع بأشواك قويّة مثلَّنة طولها ٢ إلى ٤ سم. الأوراق سِنانيّة، حادّة، غير منقسمة أو مزدوجة ثُلاثيّة التَّفصيص، مَرْطاء، قاتمة اللَّون الأخضر على وجهها العُلويّ، صُوفيّة اللَّون الأبيض على الوجه السُّفلي. رؤيساته الذَّكريَّة هاميّة وقصيرة. القُلافات الأنثى إبطيّة، فرديّة، تتدلّى في النّهاية، متطاولة، مصفرة اللَّون، عميقة الأثلام، أشواكها دقيقة ومعكوفة الرأس.

المركّبات - إستخرج زَانْدَر من بزوره عام ۱۸۸۱ مادّة Xanthrostrumarine، وهي غلوكوسيد يشبه الدّاتِسين.

⁽١) كلّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا الألمانيَّة واللاتينية.

ش ج ر

الخصائص - مُلَعّب، مبوّل خفيف، زاوية قائمة فيجعلان الورقة تبدو وكأنَّها عمله أقلّ بروزًا بكثير من عمل الجابورَنْدي.

> الاستعمال - كان يقال إنّه فعّال ضِدّ الكَلَب، بمقدار ٠,٦٠ غرام من الأوراق المجفّفة المسحوقة للبالغ، ٣ مرات في اليوم، ولمدّة ٣ أسابيع. وقد كشف كلّ من تراسْبُوت ونُوكارد أنّه نَبات خال تمامًا من الفعالية في شفاء الكَلُّب أو حتى اتقاء كبير من الحراشف المتراكبة. تطوّره، بعد التَّلقيح الطَّبيعيّ أو التَّجريبيّ. ذُكر أن الشُّبِّيطُ الشَّائك والشُّبِّيط .macrocarpum DC هما بديل مزوّر لمختلف الأوراق المَخْزَنيّة، كأوراق تولِيبيفاريْن. الداتورة وسواها. إن كشف هذا الغش يسهّل من مظهر الثّمار المخلوطة إذا مقوّية. الجذر مُرّ وعِطريّ. وُجدت، بالإضافة إلى الفحص المجهري.

> > ١٦٦ - شَجَرَة التُّولِيْب، شَجَرَة القَيَاثِير، شَجَرَة الزَّنْبَق (۱) Tulip tree, Lyre tree, Saddle tree (E) Tulipier, Liriodendron, Tulipier de Virginie (F) Echeter tulpenbaum (D)

Liriodendron tulipifera (S)

شجرة جميلة الشَّكل من فصيلة المَغْنُولِيَّات تعلو من ٣٠ إلى ٤٠ مترًا، في قطر متناسق. أوراقها عريضة، مَرْطاء، كبيرة النَّصل الرُّباعيّ الفصوص، الفَصَّان الهاميّان يتقاربان في

(٢) كلِّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسمية الفرنسيَّة

شَجَرة من فَصِيلَة الدُّفْلِيّات تَشيع في أدغال كاليدونيا الجديدة وترغب التربة

مقطومة. أزهارها عرفية الرّائحة، كبيرة القَدّ، تُشبه التُّوليب، لونها إلى الصفار

الأخضر، مع بقعة بُرتقاليّة. خشبها ناعم

الرقعة، خفيف الوزن، تبنّى اللّون. إزهرارها في حزيران وتموز، وهي لا

تزهر قط قبل ٢٠ أو ٣٠ سنة. الثَّمرة شكل من المخروط المؤلّف من عدد

المركّبات - وجد فيها أَمَتَ جوهرًا

قابلًا للتبلّر، غير أزوتي: لِيريو دَنْدرين؛

وقال آخرون إن فيها عفص، وقلويد:

الخصائص - طاردة للحمى، منشّطة،

الاستعمال - الحُمّيات، الوهن.

طريقة الاستعمال - تعطى في أمريكا

الشمالية كطاردة للحمى بديلة عن

الكينا، ومقوّية في نبيذ أو مستخلص.

١٦٧- شَجَرَة الشَّمْع، باجِيَنْتَا شَمْعِيَّة (٢)

Arbre à cire, Pagianthe cérifère (F)

Wax tree (E)

Wachs baum (D)

Pagiantha cerifera (S)

القشرة، خاصة قشرة الجذور.

المقادير من ٤ إلى ٦ غرامات.

الأولى والتَّسمية اللَّاتينيَّة.

الشَّديدة القِلَويَّة .

المركّبات - قِلَوِيْدات عديدة مُختلِفة تَخضع لدراسات مُعَمَّقة.

الخصائص - إنّ مَرْت قُشورها يشكِّل مُسَهِّلًا عَنيفًا ماسطًا.

Mock عُرِيْض الوَرَق – ۱۶۸ privet (E) Phillyrée à larges feuilles, Filaria à larges feuilles, Alavert, Aouret (F)

Feinfilzige Lorbeerlinde (D)

Phillyrea latifolia (S)

الشُّخص جنس أشجار أو شجيرات من فصيلة الزَّيْتُونِيَّات. أوراقها دائمة، جلديّة النَّصل. كأسها رباعي الفصوص. تاجها على شكل دولاب رباعيّ الأجزاء نوعًا ما. مئابرها شبه لاطئة. الثَّمرة عُنيبة لحميّة، نواتها سهلة المكسر.

المُرَكِّبات - يحتوي الشحص على فِيلَيرِيْن (أي فيليروسيد)، وعلى هيتروسيد يتحوّل بواسطة الحامض الكلورهيدريك إلى غلوكوز وإلى فيليجانين.

الخصائص والاستعمال - الشحص العريض الورق شجرة إسبانية المهد تُستعمل أوراقها كطاردة للحمّى على شكل مسحوق أو نقيع، وهي أوراق قَدَّمها الدكتور جاشَلي، من فرّاري، كبديل للكينا.

ملاحظة - إن شكل الشحص الذي

يوجد في شرق المتوسط، ذات الأوراق شح ص المُسنَّنة، كان سِبَسْتيان قد ألحقه عام ١٩٥٦ بالشحص العريض الورق الذي قد يكون نُويعًا منه، بالرُّغم من قاعدة أوراقه غير القلبيّة الشَّكل. لذلك أورد أدناه مواصفات النَّوع اللَّبنانيّ الذي قد يمتلك المُركِّبات والخصائص ذاتها.

Phillyrée intermédiaire, (۱۲۹ شخص مُتَوسَط الورق، شُخص Phillyrée intermédiaire, شرقي (۲۱۹ Phillyrée orientale (F)
Phillyrea media, (Syn.: Ph. latifolia subsp. orientalis) (S)

شجيرة ليفيّة من فصيلة الزَّيْتُونِيَّات فرعاء جدًّا تعلو من ٢ إلى ٤ أمتار. فروعها الفتيّة وبنوع خاص أعناق أوراقها قصيرة الهُلْب اللَّبديّ، وكل ما عدا ذلك أمرط. أوراقها قصيرة الأعناق جدًّا، غير قلبيّة القاعدة، بَيضاويّة نادرًا متطاولة، جلديّة، وهي دائمًا تقريبًا قويّة التَّسنين المِنشاريّ (في لبنان)، نادرًا كاملة. أرهرارها إبطيّ، حُزميّ. أزهارها أزهرارها إبطيّ، حُزميّ. أزهارها جدًّا، قمعيّ الشَّكل، يقسم سَطحيًّا إلى جدًّا، قمعيّ الشَّكل، يقسم سَطحيًّا إلى الكأس، رباعيّ الفصوص. الثَّمرة عِنبِيَّة كُرويَّة، قطرها ٤ ملم، حمراء ومن ثم سوداء، تنتهي برأس حاد قصير. مجالها سوداء، تنتهي برأس حاد قصير. مجالها

⁽١) التَّسميتان العربيَّتان والتَّسمية الفرنسيَّة الثانية للمؤلِّف.

من ٥٠ غ	من ٤٠	من ۳۰	شراب ليمون
۲۰غ	17	17	هيدروكربونات المغنازيوم
۳۲غ	70,7	19,7	حامض سيتريك
۳۰۰غ	٣٠٠	٣٠٠	ماء مقطر

(دستور أدوية).

الجغرافي محيط البحر المتوسط؛ والأماكن الحُرجية في لبنان.

۱۷۰- شراب ليمون سيترو-مَغْنازِي، شراب ليمون مسهّل قوي بسيترات المَغْنازيوم (Eimonade (F)

أدخل روجيه دُولابار هذا الشَّراب إلى المادّة الطبِّيّة منذ العام ١٨٤٧. عِدَّة تركيبات قُدِّمت لتحضيره. تركيبة دستور ١٩٦٥ هي من ٥٠ غرامًا، ولكن التَّركيبة من ٤٠ غرامًا مذكورة فيه أيضًا.

نَحُلّ الحامض السيتريك في الماء، ونُضيف هيدروكربونات المغنازيوم. عندما يَتمّ التَّفاعل، وهو يحصل بسرعة، نُصفّى المحلول ونُضيف:

البطاقة يجب أن تُشير إلى مقدار سيترات المغنازيوم الموجود في الشَّراب، ويُفتَرض بالسيترات أن يكون مُتبلِّرًا. يُسَلَّم هذا الشَّراب في غالب الأحيان خالٍ من الغاز.

يمكننا استبدال شراب الحامض السُّكَّري البَسيط بشرابات الكشمش، الكرز، الفرمبواز، شرط ألّا تكون قد تَنقَّت أو رُوِّقَت بواسطة بياض البيض، إذ إن بقايا من الألبومين تُسهِّل نمو العُفونات. إقلال كمِّية الماء كذلك إذا أمكن.

يمكننا أيضًا تحضير هذا السّائل المُسهِّل القَويِّ بطريقة أسهل بواسطة سيترات المغنازيوم المَخزنيِّ الذي أشرنا إلى طريقة تحضيره، إذ إنه وهذه الحال، لن يكون هناك سوى التَّذويب، والتَّحلية والتَّغيير، إذا كان ذلك مطلوبًا. إن بعض أنواع السيترات التجاريّة، الكثيرة الحموضة، تذوب بصعوبة، يجعلها البعض ذَوّابة بإضافة كربونات المغنازيوم إليها.

المواصفات - إن شراب اللَّيمون

طعمه الذي يكون طعم المتعة، لا يترك مجالًا للشك بوجود ملح مغنازيّ يوجد سيترو-مغنازي. فيه، بالرغم من ذلك، بنسبة قويّة. شراب اللَّيمون المَغنازيّ يَفسُد بسهولة؛ فيصبح غَبَشيًّا ودَبقًا؛ يحتوي عند ذلك على عفونات، من بينها فطور البنيسيليوم: des Penicillium. لذلك يجب تحضيره عند الحاجة فورًا.

> يَذكر جُوليارد طريقة لحفظ شرابات اللَّيمون من التَّلَف، نوردها كالتالى: نُحضّر محلول سيترات المغنازيوم على السّاخن، نُصفّى، نُضيف ٥٠ غرامًا من شواب السُّكُّر، ونُعيد الكُلِّ إلى النار ونَغلى. نَسكُب السّائل الغال في قنّينة على غرام واحد من كحولتور ليمون الحامض ونقفلها فورًا.

> يقترح شميدت، لمنع ترشب سيترات غير قابل للذُّوبان، بتحضير محلول بنسبة الثلث من سيترات المغنازيوم، ومن جهة أخرى، تحضير محلول بالنسبة ذاتها من سيترات الصوديوم:

۱° حامض سيتريك۱۰ ۱۸۰ غ كربونات المغنازيوم ٤ ٧٥٠ ماء مقطر، كمية تكفي ۲° حامض سيتريك۲۰ بيكربونات الصوديوم ٢٥٠ غ ماء مقطر، كمية تكفى نمزج المحلولين معًا؛ بعد مرور ٢٤ ساعة، نُصفّى ونَحفظ في القبو. فيكون لدينا بذلك مُستحضر بنسبة الثلث من

السيترو-مغنازي هو عديم اللُّون، صافٍ؛ السيترات المزدوج الذي يسمح لنا بالحصول على شراب ليمون صودي -

ش رع

إقترح البعض استبدال سيترات المغنازيوم بدُرْدِيّ الخمر «ترترات» الذي يحصل بواسطة حامض دُرُدِي الخمر المعدُّل بالحرارة أو حامض ميتاترتريك.

١٧١- شَرَعْطُط مَنْقِعيّ، شَمَار الماء Water drop-wort, Water hemlock (E) Phellandrie, Fenouil d'eau, Ciguë aquatique, Millefeuille aquatique (F) Wasser Filipendel, Wasser Pfersaat **(D)**

Phellandrium aquaticum L., = Oenanthe phellandrium (S)

الشُّرَعْطُط جنس نَباتات مائيَّة أو راطِية، مَرْطاء، من فصيلة الخَيمِيَّات. أوراقها مُقطُّعة. أزهارها ضُرِّيَّة بيضاء أو مُتورِّدة اللُّون بعض الشيء، مشعّة في أكثر الأحيان. أسنان الكأس حادة. البَتلات يَبضاوية الشَّكل المعكوس، مُقَوَّرَة، مَثْنيَّة الصَّفحة. حامل القَلم مخروطي الشَّكل. الثُّمرة متطاولة، دَوَّاميّة أو أسطوانيّة الشَّكل، مُكَلَّلة بالأقلام المنتصِبة. الماريكاربات خُماسية الأضلاع المُنفرجة، كلُّها أو الجانبيَّة منها على الأقل فِلْينية، سميكة. يَتمثَّل هذا الجنس في لبنان بأربعة أنواع على الأقل، يغيب عنها الشُّرَعْطَط المنقعيّ.

الشَّرَعْطَط المَنقعي إذًا هو نُبات شائع

ش ق ا

في كافّة أنحاء أوروبًا. يَنبت في الماء مُكوَّنة من ٣ وعلى حوافي المجاري. يُشبه لاطئة، والكُلّ الشَّوكران. أوراقه نوعان: أوراق الزَّهرة. الزَّهر مَغمورة خَطِّيّة الشَّكل؛ وأوراق هَوائيّة كأسِيّة بَتَلانِيَّة. ثَنائيَّة أو ثُلائيَّة التَّفليق الرِّيشيّ.

المُركِّبات - يحتوي النَّبات على كربور تَرپينيِّ يُدعى فلَّانْدران، وعلى ألْدَهيد كَمَّونيِّ مُهَدْرَج يُدعى فلَّانْدرال.

الخصائص والاستعمال - كانت العُشبة من أربعة أنواع أعيا تُستعمل، وخاصة بزورها. وهي بزور الفَرْماكوبيا الفَرَنس تُشبه بزور الشّومر، رائحتها قويّة، عير مُستحبَّة، أعيد تسجيلها في بأزهاره الأصغر حجم الفرماكوبيا الفرنسيّة عام ١٩٧٥. يَعمل البَنفسجيّ الأرْجُوانيّ. شرعطط الماء كمخدر، ومُقشِّع، ملاحظة - بالنّس ومُبوّل، ومُضادّ للسِّل، وطارد للحمّي. والخصائص الطبيّة وال

طريقة الاستعمال - مقاديره من المسحوق غرام واحد إلى ٣غ في اليوم. أما مقاديره من المستخلص المائع فمن ١,٠٠ إلى ٠,٥٠ غرام في اليوم، للبالغين. لذكرى التاريخ.

Anémone des (۱۷۲ – شُقَار المروج –۱۷۲ prés (F)
Anemone pratensis (S)

الأنيمُون جنس نَباتات مُعَمَّرة، رِيزُوميّة من فَصِيلَة الشُّقَارِيَّات. ساقُها فَرديّة الزَّهرة أو تكون أحيانًا مُتفرِّعة وعديدة الأزهار. أوراقُها القاعديّة مُحَزَّزة مَشروطة بعض الشَّيء، السّاقيّة مُحَتَصَرة إلى قُلافة

(١) التَّسمية للمؤلِّف.

مُكوَّنة من ٣ أوراق دَوَّاريّة التَّرتيب، لاطئة، والكُلِّ مُتَباعد بعض الشَّيء عن الزَّهرة. الزَّهرة الهاميّة من ٤ إلى ٢٠ كأسِيّة بَتَلانِيَّة.

أمّا شُقّار المُروج، أي أنيمون المُروج^(۱) فنوع لم يَرِد ذكره في فلورا لبنان، ونادرًا جدًّا ما يرد في مَراجع النَّباتات الطبَّيَّة المُتداوَلة؛ ولكنّه واحد من أربعة أنواع أعيد تسجيلها في الفَرْماكوبيا الفَرَنسيّة عام ١٩٧٥. ويختلف هذا النّوع عن شُقّار الفِصح بأزهاره الأصغر حجمًا، والأَقْتَم اللّون البَنفسجي الأرْجُوانيّ.

ملاحظة - بالنسبة للمُركِّبات والخصائص الطبِّيّة والاستعمال وطرقه: (أطلب دراسة: شُقّار، أنيمون في المعجم الرابع ص ١٢٦ رقم ١٥٩).

Vegetable wax (E) مُنْمُعُ نَبَاتِي – ۱۷۳ Cires végétales (F)

أهم الشموع النباتية تعطيها شجرة «نَقُوس الشَّمْع»(٢) أي Copernicia (شَمع الكَرْنُوبا) من فصيلة النخليّات؛ وشجرة «نَخْل فصيلة النخليّات؛ وشجرة «نَخْل أنْدِيْكُولا»(٣)، أو «سِيْروكْسِيل أنْدِيْكُولا»(٣) أو «سِيْروكْسِيل أنْدِيْكُولا»(٣) Humb. (شمع النَّخْل، سِيْروكْسِيلَيْن (Céroxylone

⁽٢) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٣) التَّسمية للمؤلِّف.

من البرازيل على الأخص.

يأتي شمع الكَرْنُوبا خاصة من البرازيل حيث يحصل من نَتْح أوراق نخلة نَقُوس الشَّمع في الشَّمع في ألواح مُخضرَّة اللَّون قد تزن عِدَّة كيلوغرامات.

ينصهر شمع الكَرْنُوبا عند ٨٤° سغ، وهو قليل الذَّوبان في الكحول وفي الأثير، يَذوب في دُهْن التَّربَنْتين والبنزان؛ غير قابل الذَّوبان في الحامض الخلِّيك وفي الصّودا الكاوِية؛ يَحتوي خاصّة على سيرورات الميرشتيل المصحوبة بحامض كَربُونيك وبكحول مَلْيْسِيّ، وبقليل من حامض سيروتيك. السّعمالاته الصّناعيَّة مُهِمَّة (صُنع السّموع، دُهون الأرضِيّات الخَشَبيَّة، الورنيش والألوان الشَّمعيّة، دِهانات الأحذية).

ويُنسب شمع كَنْدَلِينا إلى نَبات قد يُسمّى
«رِجل الطّاوس»(۱)، اسمه العلميّ
(رِجل الطّاوس»(۱)، اسمه العلميّ
(فَرْبيون مُضادٌ للسِّفْلِس»(۱): Pedilanthus Pavonis Boiss.
Euphorbia: (۱) (مُضادٌ للسِّفْلِس»(۱) (مُضادٌ السِّفْلِس» (۱) (مُضادٌ السِّفَكُل في المكسيك، والتي الصَّبارِيَّة الشَّكُل في المكسيك، والتي
تغطّى كل أجزائها الهَوائيّة بالشَّمع. إن
هذا الشَّمع يَنصهر، وحسب العيِّنات،
عند ٦٤ إلى ٧٧° سغ.

ويُجمع الشَّمع، أي الـ Cérosie، وكنتاج ثانويّ من معامل السُّكِّر، وهو

صلب وفَتوت ويمكن استعماله كشمع شمع كُرُنُوبا ذاته، ولكنّه يَحتوي على ٧ بالمئة من الغليسرين المركّب.

شموع أخرى، أغنى بالغليسريدات والحوامض الدُّهنيّة، وهي شُموع من الأفضل تسميتها شحومًا نَباتيّة، وتَنتُج غالبًا من الثَّمار. هكذا هي الحال مع شحم «شجرة الشَّحم» Stillingia

schott. شَمع أوكُوبا أو شمع فِيْرُولا

من نبات .Myristica sebifera Sw شمع

أوتُنوبا من نبات Myristica otoba

. Humb.

الشَّمع النَّباتيّ أكثر صلابة من الشَّمع العاديّ. شمع اليابان يَنصهر عند ٤٠° و٤٤°؛ السيروكُسِلِّين عند حوالى ٩٥°؛ شمع بيكويبا عند ٣٥٠؛ شمع أوكوبا عند ٣٦٫٥°؛ شمع الشَّمعيّة ينصهر عند ٤٧ إلى ٩٤°؛ إن هذا الشمع الأخير له ثقل نوعي من ٤٠٠،١ إلى ٢٠٠٦؛ وهو شمع كَسُورٌ أكثر من شمع العسل، وينحَلّ في ٢٠ جزءًا من القلى الغالية (مؤور).

يُستعمل السيروزين كبديل للشَّمع في صُنع الشُّموع والدِّهانات، وهو نوع من

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

ش م و

الپرافِیْن الَّذی یَحصل من معالجة الأوزوكرِیْت أو شمع Galicie المُتَحجّر بالحامض السولفوریك؛ ینصهر عند ٦٨-٦٦ سغ.

في كثير من الحالات، تدين بعض النِّمار أو بعض الأوراق أو بعض الألياف بلمعانها إلى نسبةٍ صغيرةٍ من الشَّمع، ثمار التُّفّاح والبَنِنكُوزا(١) Benincosa، أوراق الموز والكوكا والزَّيتون والصَّنوبريّات، إلخ. وألياف الكَتان والقُطْن والقابُوق.

شَمع اللِّينيْت، أو شَمع مُونتان montane يُستخرج بالحرارة من بعض أنواع اللِّينيت. يَحتوي على حامض مونتانيك (٢) حُرّ، وعلى أستيرات من هذا الحامض عينه ومن حامض سيروتيك، وعلى كَرْبُورات، وراتنجات، إلخ.

شَمع العَنْبَر: يرد «أبيض البَال» في الفرماكوبيا الفرنسيَّة بإصدارها التاسع، وفي دراسة أحادِيّة عنوانها «شمع أو شحم العَنْبُر».

۱۷۶ - شُمُوْع طِبُيّة، شَمْعَة طَبُيَّة Medicinal Candles (E)

Bougies médicinales (F)

Heilstearinkerze (D)

إن اللَّجوء إلى الشُّموع الطبَّيَّة تَوارى تمامًا من الاستعمال.

الشُّموع الطبَّيَّة هي أسطوانات مُتفاوِتة الطَّول والثَّخانة، ولكنّها تكون في الغالب نحيلة دقيقة ولَدنة، وتكون مَخروطيّة الشَّكل في أحد طرفيها وتُخصَّص لكي تُدْخَل في قناة الإحليل (شُموع إحليليّة) أو في المعى المستقيم (شموع شرجيّة). وتُقسم الشُّموع إلى لاصقة أو مطّاطة أو أدويّة.

تُستعمل الشُّموع اللّاصقة إما كجسم مُمَدِّد مُوَسِّع أو كجسم مُذِيب مُسهِّل الإنصهار، ومُقَسَّطِر Cathérétique (مُفْرغ البَوْل بالقَسْطَر) ومُجفِّف؛ أمّا الشُّموع الأدَويَّة Instrumental فلا تُستخدم قط إلّا لتمديد وتوسيع القناة البَوْليّة في حال انسدادها ولتسهيل إخراج البول. نحضّر للأولى كتلًا من زبدة الكاكاو أو من الغليسَّرين المُجَمَّد، أو مزيجًا من اللَّكْتُوز والصمغ، أو من الشمع والشحم، إلخ. بالإمكان إضافة أدوية مختلفة إلى تلك الكتل. الشُّموع الطبِّيَّة يجب أن تُعقُّم، وأن يكون قطره عادة ٤ ملم وطولها من ١٠ إلى ١١ سم. إن المواد التي تصلح لتحضير تلك الشموع هي سَبيبات أو شُرَيْطات من القماش أو من الخيوط الحريرية أو القُطنيّة، تُوضَّب على شكل فتائل، ومن ثم الشمع والمُذابات الشَّمْعيّة Cérolés واللَّزْقات، إمَّا لوحدها أو ممزوجة بالمواد العلاجية الفعّالة.

تُصنع هذه الشموع بتغطيس الفتائل في المواد المنصهرة، ومن ثم لَفّها على

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسمية للمؤلِّف.

مُسَطَّح سَوِيّ لإكسابها الشكل الملائم. يجب أن تكون الفتائل مالسة جيّدًا وأن يكون طولها من ١٠ إلى ٣٠ سم.

وتُحضَّر الشموع أو الأمْيال Sondes (المَحاجيج) المطاطة بتغطيس ضمَّة مخروطيّة الرأس نوعًا ما من الخيطان أو القماش الحريريّ الملفوف، في برنيق (تركيبته أدناه) عدّة مرّات، تُجفَّف بعد كل مرة في المِحَمّ وتُصْقَل. أمّا صنع هذه الشموع والمحاجيج فهو وقفٌ على صانعي الأدوات الجراحيّة.

بَرْنیق الشموع المطّاطة - دهن تربنتین الله مقدار، زیت کتان مُمَرْتَك Lithargirée مقدار، مَطّاط مقدار، مَطّاط ۱٫۲۰ مقدار.

۱۷۵ - شَوْكُران (Ciguës (F)

تُشرِك اللَّغة الفَرنسية الشَّعبيَّة بين أربع نَبْتات يُطلَق عليها اسم شَوكران Ciguë: ثلاثة منها ورد الكلام عنها في دراسات أحاديّة؛ أما الرَّابعة فهي الشَّرَعْطَط المَنقعيّ Phellandrie.

إنّه من الأهمِّية بمكان أن نتمكَّن من تمييز تلك الأنواع عن بعضها عند الحاجة؛ لذلك نرى من المفيد وضع جدول يُبَيِّن صِفاتها المميِّزة، خصوصًا وأن أنواعًا خُضريَّة مأكولة أخرى هي عُرضة كذلك للخلط مع هذه الأنواع السامَّة، كالبقدونس والسِّرْفِل، وهذا ما يجعل ضمهما إلى الجدول المذكور أمرًا

ضروريًا. إن ما يُجمع كل هذه الأنواع هو انتماؤها إلى فصيلة الخَيْمِيَّات، وتَشابهها الكبير فيما بينها بأوراقها، وحتى بمظهرها العام. (الجدول على ورقة مرفقة).

هناك خَيْمِيَّة سامّة أخرى: رَازِيَانَة زَعْفرانيّة (١٠) Oenanthe Crocata، وهي نبتة مَرجِيَّة، كانت تَسَبَّب أيضًا بالكثير من الأخطاء المشؤومة القاتلة، إما بواسطة جزورها الذي يُشبه لِفْتَة صغيرة، وإمّا بواسطة أوراقها التي اتّخذت على أنها أوراق البقدونس أو أوراق الكرفس. أما صفاتها المتميّزة الأكثر بروزًا فعصيرها الأصفر اللَّون (Crocata)، من Crocata أي زعفران) المُلْبن المظهر، الذي يسيل أي زعفران) المُلْبن المظهر، الذي يسيل من الساق عند حزّها أو جرحها، ومن جذورها العِطريّة التي تُشبه اللَّفْت من الصغير. إن الإيْنانَثَة الزَّعفرانيّة (٢) هي احداث الموت.

يكمن جوهرها الفَعّال، حسب فِنْسَنْت الذي حَلَّلها، في عصيرها الصمغيّ - الرَّاتِنجيّ وفي زيتها الدُّهنيّ. وقد استخرج منها J. Pohl عام ١٩٠٤، مادّة الـ Oenanthotoxine، وهي سَمّ يُحدِث التَّشْتُج والاختلاج.

تنتشر هذه النَّبتة بنوع خاص في غرب فرنسا ونواحي شواطئ بحر المانش، كما تَنتشر كذلك في بريطانيا.

ش و ك

⁽١) التَّسمة للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسمية للمؤلِّف.

=	_								
الأسماء	رائحة	جنر	ساق	قلا فة	فَالْقَهُ	أزهار	<u>نار</u>	زمنها	بنا
شوكران كبير	نتنة، منفرة	عصير لبني	مبقعة بالأرجواني	قلافة واحدة	مختصرة إلى النصف*	يفاء	کرویة ذات حزوز مفرّضة	محولة	أماكن عقيمة
شوكران سام	البقدونس	عصير أصفر	خالية من البقع	معذومة	সশ্য:	بيضاء	كروية ذات حزوز بيضانية ذات حزوز مفرّضة مالسة*	معمرة	حوافي الماء
شرعطط منقعي	السرفل	عصير استخراجي	خالية من البقع	معذومة	সাপ্ত	بيضاء	متطاولة من دون حزوز	معمّرة	في الماء
شوكران صغير	مغشة	معلوم	القسم البفسجي السفلي، مالس	معلومة	مختصرة إلى النصف*	بيضاء	کروية ذات حزوز مالسة	خزلية	أماكن مزروعة
بقلونس	خاصة	عصير استخراجي	خالية من البقع، مخططة	معدومة	সশুং	صفراء	مستطيلة	محولة	حدائق
سرفل	خاصة	عصير استخراجي	خالية من البقع	معذومة	معذومة	بيضاء	مستطيلة	حولية	حدائق

الورقة المختصرة إلى النصف Dimidiée هي الورقة التي لا تمثل سوى جهة واحدة من النصل.

١٧٦ شِيْح حَفْلِيّ، شْعَال، دْقُفْت، أَرْطَماسِيا الحُقُولِ (``) Field wormwood **(E)** Armoise champêtre, Aurone des champs (F) Feldbeifuss (D) Artemisia campestris, Ssp. Campes-

tris, glutinosa, canescens (S)

نَبات مُعَمَّر من فَصيلَة المُرَكَّبات يَعلو حتى ١٥٠ سم. أوراقُه مُتعاقبة، القاعديَّة مُعنَّقة، العُليا لاطئة ومُقطَّعة إلى سُيور ضَيِّقة. أزهاره كلّها أنبوبيّة، في رُؤيسات بَيضانية أو كُرَوية، عُنقودية التَّجميع. الثَّمرة أكنة خالية من القُنْزُعَة ومن الإكليل الغشائق على رأسها. من هذا النَّبات نُويعات وضُروب مُختلِفة منها العِطريّ جدًّا والدَّبق والأطْحَل... أمَّا شْعَال ودْقُفْت فإسمان تُونُسِيَّان.

الخصائص والاستعمال - يَشتهر هذا النَّبات في تُونس بسبب استعماله كمضادّ للسَّمّ. ولهذه الغاية يُستعمَل مَسحوق الأوراق المُجفَّفة مَوضعيًّا كما يُستعمَل لخصائصه اللائمة خاصة للحُروق. في منطقة سيدى مَخْلُوف يُؤكِّد البَعض على صِحّة هذه الخصائص بينما ينصح البعض الآخر بإضافة الثُّوم إلى المسحوق.

في جَلْما (تُونس) تُؤكّل النّبتة بكاملها شي ي ح في حال لَسْع العَقْرب أو لَدْغ الأفعى. ويَنصح البعض الآخر بالتَّبخير بواسطة النَّبات أو كذلك بنقيعها الَّذي يُنصَح به، إضافة إلى ما تَقدُّم، لمعالجة السُّعال والشُّكَّريِّ وقُرحة المَعِدَة في استعمال داخلي، أمّا من الخارج فهو فَعّال ضِدّ الأكزيما والإصابات الجلديّة.

> ١٧٧ - شِيْح المَغْرِب، شِيْح أراغُون، أرْطَمَاسِيا مَغْربيّة (٢) Barbary wormwood (E) Armoise de Barbarie (F)

Barbarei Beifuss (D) Artemisia cina, Artemisia aragonensis **(S)**

نَبات طبِّي من فَصِيلَة المُركَّبات يُشبه الشُّويلاء A. vulgaris إلى حدٌّ كبير. تُستعمَل رؤوسه المُزهِرة في مراكش نُقاعة تُؤخَذ ضد الزُّكامات، وتَبخيرًا ضد الجُدَري.

أرطماسيا مصدرها كلمة يُونانيّة بمعنى ديانا، شفيعة وحامية العَذاري، وذلك بسبب الاستعمال الرّئيسي للشُّويلاء.

الإنكليزيَّة والألمانيَّة للمؤلِّف.

⁽١) التَّسمية العربيَّة الأولى والرابعة والتَّسمية (٢) كلِّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا الفرنسيَّة

١٧٨ - صَغْتَر أَرَنْبَرْغ، أُورِيْغَانُم أَرَنْبَرْغ'' Ehrenberg organy (E) Origan d'Ehrenberg (F) Ehrenbergdost (D) Origanum Ehrenbergii (S)

نَبات برِّيّ من فَصيلة الشَّفَويَّات، مُعمَّر، زغبي القاعدة، أجرد في بقيّة أجزائه. سوقه بسيطة ومنتصبة تعلو من ٣٠ إلى ٥٠ (٨٠ سم). أوراقه كثيرة الجيوب العِطريّة، منفرجة، من ١٠ إلى ٣٠ ملم. أوراق القاعدة مُعنَّقة، العُليا لاطئة متقابلة. الزُّناد الزُّهريّ قصير السُّنيلة شبه لاطئة، تبوز بحزمات ابتداء من تُلُثِيُّ علم النَّبِتة على أعناق قصيرة، مشكِّلة بذلك شمراخًا من الازهرارات الإبطية المتباعدة، ينتهي بازهرار تاجي مشابه. الأوراق الزَّهريّة صغيرة على قاعدة الازهرار، إبطية وشبه معدومة في الأعلى. السُّنبلة من ١٠ إلى ١٥ ملم. الكأس نظاميّة، خماسيّة الأسنان وكثيرة الجيوب العطرية الحمراء، التّاج أبيض، أشجار من فصيلة الأنّجريات يعرض تدريجيًّا نحو القمة. الأسدية غير

بارزة. يزهر من حزيران إلى تشرين الأوّل في تربة لبنان الحُثّية.

إن هذا الصّعتر هو مُستوطن أي أنه محصور الوجود في لبنان فقط.

الخصائص والاستعمال - في غياب التّحاليل المِخبريّة، من المفيد الاطلاع على خصائص الصّعتر واستعماله بشكل عام، علمًا بأن عددًا من أنواع الصعتر الأجنبية، أكان ذلك في شمال أفريقيا أم في اليونان، يُجمَع ويُستعمل في التَّداوي على غرار الصعتر الشائع. ويذكر بعض الأطباء أن لبعض تلك الأنواع خصائص أقوى من خصائص الصّعتر الشائع الأوروبي. ولا نستبعد أن تكون أنواعنا ممتازة.

١٧٩ - صُقْرَاب غِدِّيّ، جَرُوْمَة غِدِّيَّة (٢) Cécropie glanduleuse, Ambaiva, Imbahyba (F) Cecropia adenopus (S)

١٨٠ - صُقْراب أَبْيَض، جَرُومَة بَيْضاء (٢) Cécropie toute blanche, Colequim, Arbre de paresse (F) Cecropia hololeuca (S)

ذكرنا سابقًا أن الصُّقْراب هو جنس الخُبْزيَّات، وهي أشجار بَرِّيَّة، دَمَّاعة،

⁽٢) التَّسمات العربَّة للمؤلِّف.

تنتج المطّاط. سُوقُها أسطوانيّة فارغة تَعلو من ٣ إلى ١٠ أمتار. يُطلَق في البرازيل على الصُّقْرابِ الغِدِّيِّ وعلى الصُّقْرابِ الأبيض الأسماء المَحلِّيَّة التَّالية: إِمْبَاهِيْبَا، أَمْبَايِيقا، كُولَكِيم، شَجَرة الكَسَل.

أُوراق الصُّقْرابِ الغِدِّيِّ كبيرة، مُسَعَّفَة الفُصوص، مُتعاقبة، عرضُها ٢٠ سم وأكثر، وهي قاتمة اللُّون الأخضر الكامِد على صَفَحاتِها العُليا، أَفْتَح لَونًا ومُوبرة على الصفحات السُّفلي. أزهارها الذَّكريّة في سَنابل أسطوانيّة الشَّكل. فُروعُها عَقداء، مُتَلَوِّية. خشبها طَريّ.

المُركِّبات - تَحتوى قشرة النَّوعَين المذكُورين على ٠,٨٨ بالألف صَقْروبين Cécropine (حَسَب بيكُولْت)، وعلى راتنج، عَفْص؛ وتَحتوي قشرة الصقراب الأبيض، بالإضافة إلى ما تَقدُّم، على ٠,٥٩ بالألف أَمْبَايِين ambaïne.

تُنْسب إلى أوراق الصُّقْرابَيْن خَصائص طبيّة عِلاجية، لم تُحدّد.

١٨١- صُمُوغ رَاتنْجِيَّة résines (F)

الصّموغ الرّاتنجيّة هي مزيجات طبيعيّة بنسب مُختلِفة من الموادّ الصّمغيّة ومن الموادّ الرّاتنجيّة، بالإضافة إلى بعض المواد العُضوية الأخرى التي تَجرُّها معها.

تُنْتِج هذه الصّموغ عمومًا نَباتات تَنمو ص م و في أدفأ مناطق الكُرة الأرضيّة. إن الفصائل التي تُعطى أكبر عدد منها هي فصائل الخَيْمِيَّات، والبُطْمِيَّات؛ ونَذكر كذلك السَّقَمُونيا وصَمْع الجَنْدَم؛ والصّموغ الرّاتنجيّة في الفَربيون وفي العَشْقَة. وتكون هذه الصّموغ في النّباتات مُعلّقة في سَوّاغ مائي أو تكون على شكل مُستحلّب. وهي تَختلِف بذلك عن الرّاتِنْجات التي تكون في النّباتات في محلول شَفّاف من الزَّيت الطيّار. وهي تَنْتَج طُوعيًّا في بعض الأحيان، ولكن الحصول عليها يَتمّ في أكثر الأحيان

> المواصفات والمُركّبات - صُموغ غير قابلة للذُّوبان في الماء أو في الكحول الصِرف، ولكنها تذوب على الساخن في الكحول المائق. كثافتها الوسطى . 1,7

> باسْتِصْماغ الشَّجرة بالحَزِّ والتَّجفيف في

الشَّمس.

تكون، بشكل عام، نسبة الرّاتنج في هذه المواد أقوى بكثير من نسبة الصمغ، ومؤلّفة من دخسترانات Dextranes، ومن غَلاكُتَانات أو عَرَبانات Arabanes، وتَنتمى الموادّ الرّاتنجيّة إلى فئة الرّاتنجات. وتحتوى بعض الصموغ الرّاتنجيّة على نسبة قويّة نوعًا ما من الزَّيت الدُّهنيُّ.

ينصح بعض الفرماكوبيات بتنقية الصموغ الرّاتنجيّة وتكريرها وذلك بحلّها

بواسطة الحرارة والماء، والخمر، والخلّ، وأفضل من ذلك الكحول المائي، وتمريرها مع العَصْر، ومن ثم تبخيرها في حمام مريم.

إن طريقة دستور الأدوية الواردة مع مقال أُشَّق Galbanum هي التَّالية:

صمغ راتنجي مسحوق كحول ٦٠ درجة ٢٠ غ

نَضع الصّمغ الرّاتنجي في دَسْت مَطّليّ بالميناء، نُضيف الكحول، نُسخِّن في حمّام مريم مع تحريك مُتكرّر حتى تَنقسم المادّة تمامًا في السّائل السّاخن وتُشكِّل نوعًا من المُستحلَب. نُمرِّر عندها مع العصر في قماشة دقيقة. نُبخِّر السّائل في حمّام مريم حتى يُسمَك النّتاج بما فيه الكفاية حتى إذا رمينا منه عِدّة نقاط في الماء البارد تُشكِّل كُتلةً صغيرة يمكن بها. نُصبّ الموادّ في وعاء.

نُكرِّر بالطَّريقة ذاتها الأُشَّق أي الحِلْبيْنة وصمغ الدَّوْرَم المَخْزنيّ أي صَمْع النّشادر (دستور ١٩٤٩) وصَمع فيرولا العَجَم المسمّى Sagapenum (دستور ۱۸۸٤).

الحفظ - من المُفضَّل حفظ الصّموغ الرّاتنجيّة بمعزل عن ملامسة الهواء لأنّها تكون كلها عِطريّة. ويكون سحقها في أكثر الأحيان صعبًا جدًّا، إلَّا أنَّه يمكن إنجازه بواسطة البَرْد مع الانتباه إلى سحقها ودَقِّها باستعمال مِدقّة يكون رأسها قليل العرض، وعدم متابعة العمل على الكمِّية عينها لفترة طويلة، ذلك خَوفًا من أن تَتَليَّن بالحرارة الحاصلة. ويجب اعتبار تجفيف هذه المواد المُسبَق في المِحَم على أنّه عمل مُضِرّ. إنّها موادّ مُنَشِّطة بشكل عام: (أطلب أسماءها النّوعية، جلتيت، دَلكُها بين الأصابع من دون أن تلتصق صمغ فيرولا العجم، صمغ الدُّورَم في المعجم الثالث ص ٦٥ رقم ٨٨).

المُستبعد أن يكون رماد خشب الضّال ض ال

ض

الممزوج مع الخل مفيدًا في معالجة لَدْغ الْمُفَاتِ، على غرار رماد خشب العُنّاب، وهو استعمال قديم جدًّا كان قدامى الأطبّاء العَرَب يلجأون إليه. كما أنّه من غير المُستبعد أن تكون ثمار الضّال تحتوي على بعض الأنتراكينون على غرار العُنّاب، أو أن يحتوي مُستخلص خشب الضّال المائيّ على جوهر مُتبلّر هو الحامض الزّيزيفيّ Ziziphique، وعلى عفص هو الحامض الزيزيفُوتانيك. . . غير أن كل ذلك يبقى رهنًا بالتّحليل المخبريّ.

وفي أيّ حال، ذكر عن الضّال أن القُدامى كانوا يقدِّسون شجرته في الزَّمان الغابر وينسبون إلى ثمارها عِدة فضائل نَفسانيّة وصحِّيّة. وذُكر أن نقيعها يفيد الصَّدر ويُقوِّيه. في تونس تُدعى الشَّجرة سِدْرَه ونْبَاق. ويورد الپُروفسور بوكيف M.K. Boukef أن الثمرة تتحلّى بخصائص صَدريّة وأن جذرها الممعوس والمعصور يُعطي سائلًا فعّالًا في معالجة حالات الغُفاءات العَيْنيّة أو الظّليلات العَنْنيّة أو الظّليلات العَنْنيّة أو الظّليلات

الله، عُنّاب بَرِّيّ، سِدْر بَرِّيّ Wild jujub, Lotus tree, Lotus jujub (E)

Jujubier sauvage, Jujubier des lotophages, Lotus des anciens (F) Lotosbaum (D) Zizynhus lotus Rhampus lotus

Zizyphus lotus, Rhamnus lotus, Zyzyphus jujuba (S)

شُجيرة ليفيّة من فَصيلة النَّبقِيّات تَعلو من حوالى المتر إلى المترين، فروعها مُتلوّية، مُزوّات، بَيضاء أو مسودة اللَّون، مَرْطاء. إبرها صلْبَة قويّة. أوراقها مَرْطاء، لا تَتخطَّى ١٥ ملم، مُتطاوِلة أو إهليلجيّة، مُتظمة القاعدة، خفيفة التَّقريض. الزُّنيدات والأزهار مَرْطاء. ثمرتها مأكولة لذيذة الطَّعم تبلغ مَرْطاء. ثمرتها مأكولة لذيذة الطَّعم تبلغ أيلول في الأراضى الصخريّة.

الخصائص والاستعمال - من غير

3

ويُنصَح بطحين الصّويا أو الصوجَة في تغذية المُصابين بداء السُّكَّر بسبب محتواه القويّ على المواد الأزوتيّة.

١٨٤ - طُوْقَرِيُون، طُيُوقَريُون

Germander (E)

Germandrées (F)

Gamander (D)

Teucrium (S)

الطُّوقَرْيُون جنس نَباتات مُعمَّرة أو ليفيّة القاعدة، نادرًا حَوْليّة، من فَصيلة الشَّفَويَّات. كأسُها تكون إمّا مُنتظمة، وإمّا مشرومة وجَرَسيَّة الشَّكل، وإمّا شبه مُحدَّبة ومُنْحنية القاعدة. شَفَة النّاج العُليا قصيرة جدًّا؛ السُّفلى غالبًا بارزة جدًّا، فُصوصها الجانبيّة ضَيِّقة، مَثْنِيّة، والفَص الهامي نام جدًّا، مُستدير أو مُتطاوِل الشَّكل، غالبًا مُقعَّر؛ الأسدية صاعدة، غالبًا بارزة جدًّا، مُتخيية ويُدِينام (مجموعتان). البُزيرات مُنحنيية القاعدة، شَكَلة السَّمرة أو خَشْنة.

يَصدُر عددٌ وافر من أنواع الطُّوقَرْيون في مَخْزَن الأدوية والفرماكوبيات الحديثة، وهي أنواع كانت ولم تزل تُستعمل في الطِّب. كما أنّ لُبنان يَستضيف منها في أرضه لا أقل من ١٥ نوعًا بَرِيًّا، بعضها يَشتهر في التَّداوي، وبعضها الآخر لم يزل يَتلطَّى مُسْتَترًا في ظلال أوديته وسكون يتلطَّى مُسْتَترًا في ظلال أوديته وسكون الجبال. ومن الأنواع التي تَفَرَّدَت بدراسة أحادِية (في مؤلَّفِنا): الأَسْقُورديون المائي، الطُّوقَريُون المَخْزَني، الأَسْقُورديون البرِّي. أمّا المَخْزَني، الأَسْقُورديون البرِّي. أمّا المَخْزَني، الأَسْقُورديون البرِّي. أمّا

القَرْنِيَات، طَحِيْن القَطَانِيَات، طَحِيْن Farines de القَرْنِيَات، طَحِيْن السَّنْفِيَات légumineuses (F)

يُنصَح بإضافة مُختلف أنواع طحين القطانِيّات إلى تَغذية الأولاد الصِّغار بعد شهرهم الثّامن. إن تركيب الأنواع الأساسيّة منها يرد كالتالي:

طحين القرنيّات: فاصولياء، فول، بازيلا، عَدَس، هي أغذية فقيرة نسبيًا بالمواد الدَّسِمة، ولكنّها غَنيّة جدًا بالأزوت، وغنيّة على الأكثر بتركيبات عضويّة مُفَسْفَرَة، خاصّة بالـ لَسِيتينات عضويّة مُفَسْفَرة، خاصّة بالـ لَسِيتينات الذي يكون في هذا الشكل يَتمثّله الذي يكون في هذا الشكل يَتمثّله الجسم جيّدًا بنوع خاص. ولكن المؤسف هو أنها أنواع صَعبة الهضم بعض الشَّيء، حتى ولو كان تحضيرها قد تمّ بالاشتراك مع الخضار المطبوخة.

ويبدو أن طحين العَدَس Ervum lens يُشكِّل ما يُسمِّى: أَرْقْالَنْتا وَارْتُن يُشكِّل ما يُسمِّى: أَرْقْالَنْتا وَارْتُن Ervalenta de Warton وما يُسمِّى Revalescière أو رِيقْالَنْتا بَارِّي، المُبجَّلة جدًّا كمواد مُجدُّدة للقُوَّة ومسهِّلة.

طوق Germandrée de Crète, Polium blanc (F)

Cretischer berglavendel, Ysop Gamander (D)

Teucrium Creticum, Teucrium rosmarinifolium (S)

نَبات مُعمَّر ليفيّ القاعدة فروعه قاسية، طويلة، أنْبُوباتها مُتطاولة، يَعلو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم، أوراقه خضراء اللَّون ومُستمرطة الصَّفحة العُليا، لِبْديّة الصَّفحة العُليا، لِبْديّة الصَّفحة السُّفلي، أوراقه السُّفلي إهليلجيَّة خَطِّية، ضَيِّقة القاعدة، العُليا خَطِّية ضَيِّقة، كُلُها مُدوَّرة الهوامش. إزهراره (يُذكِّر بازهرار نَدى البحر) في عناقيد سُنبليّة الشَّكل المتطاول. الكأس بيضاء لِبْديَّة، قَصيرة الشَّكل الجَرسيّ، بيضاء لِبْديَّة، قَصيرة الشَّكل الجَرسيّ، أسنانُها مُثلَّنة سِنانيَّة، حادة، التّاج أسنانُها مُثلَّنة سِنانيَّة، حوالى مَرتين أطول من الكأس.

ذُكر أنّه يُستعمَل كالطُّوقَريون المَخْزَنيّ. واقتُرح هذا النّوع، باسم سَطاقِس الأناضول^(۱)، ضِدّ الكوليرا الهِنديّة. كما ذُكر أنّه من النَّباتات النّاهضة النّاعِظة.

Germandrée à (۲) طُوْقَرِيُون بَحْرِيّ fleurs en tête, Polium maritime (F) Teucrium capitatum (S)

نَبات طبِّيّ يُستعمَل كالطَّوقَريُون المَخْزَنيّ، أعيد تسجيلُه في الفرماكوبيا الحديثة.

الأنواع الأخرى التي ذُكِرت في المراجع العِلميّة على أنّها تُستعمل في التّداوي في الحالات التي يُستعمل فيها الطُّوقَرْيون المَخْزنيّ ذاتها، فهي التالية:

Yellow طُوْقَرِيُون أَصْفَر، عُشْبَة الطِّحَال germander (E)

Germandrée jaune, Polium, Pouliot Jaune, Germandrée flavescente (F) Gelber Gamander (D)

Teucrium polium, Teucrium aureum, Teucrium flavum (S)

نَبات مُعمَّر لِبْديّ مُبْيَض المظهر أو صُوفِي، لِيفي القاعدة، قصير العَثْكَلَة الهاميّة غالبًا عِذْقيّ. أوراقه لاطئة، مُتطاوِلة، مُنفرِجة، مُفرَّضة، مُلتفَّة الحافة. أزهاره في رؤيسات مُنتصِبة، شبه كُرويَّة أو بَيضاويّة، قصيرة الزِّنادات. قُناباته خَطِّية مِلْوَقيّة، أقصر من الأزهار. الكأس أنبوبيّة الشكل الجَرَسيّ، شبه لاطئة، لِبْديَّة، مُثلَّثة المُحرَسيّ، شبه لاطئة، لِبْديَّة، مُثلَّثة المحل المخبَّأة بالكساء الصُّوفيّ. التّاج أبيض المخارج، بالكاد يتخطّى الكأس. المثابر المنابر الكاد يتخطّى الكأس. المنابر المنابر الكاد يتخطّى الكأس. المنابر الكاد يتخطّى الكأس. المنابر الكاد يوق.

طُوْقَرِيُون إِكْرِيتِيّ، بَقْلَة العَوْف Cretan طُوْقَرِيُون إِكْرِيتِيّ، بَقْلَة العَوْف germander (E)

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسمة للمؤلَّف.

طوق

طُوْقَرِيُون گَوْرَبِيّ، مَارُوم، مَرْمَاخُور Marum Germander (E) Germandrée maritime, Herbe aux chats, Germandrée ambrée, Marum

Katzengamander, Katzenkraut (D) Marum verum, Teucrium marum (S)

جُنِّيَة تَعلو من ٢٠ إلى ٥٠ سم، فروعها مُنتصبة، يَبضاء اللَّونِ اللَّبْديِّ. أوراقها نَيضِونَة الشَّكِلِ، صغدة القدّ، قصدة العُنُق، كاملة، مَلفوفة الأطراف، يَبضاء اللَّهِن، لِنْدِيَّة الصَّفحة السُّفلي. أزهارها تَسجيلُه في الفرماكوبيا الحديثة عام إلى اللُّون الأرجواني، في دَوّارات من ٢ إلى ٤ زهرات على إبط الأوراق. تَرغب بساتين اللَّيمون، والبراري

ذُكِرت على أنها استُعمِلت في الحالات التي يُستعمَل فيها الطُّوقَرْيون المَخْزنيّ

عَرْصَف جَعْدِيّ Herb ivy, Musky buble **(E)**

Ivette musquée, Ive (F) Ivygünsel (D)

Ajugaiva, Teucrium iva (S)

عُشية مُعمَّرة تَعلو نحو ٢٠ سم. أوراقها كاملة مُستطيلة، مُسنَّنة الحاقة. أزهارها أرجُوانيّة اللُّون، عُنقوديّة التَّجميع. أوراقُها وأزهارُها وجميع أجزائها مِسْكِيّة

ذُكر أنّها تُستعمَل استعمال الطُّوقَريُون المَخزنيّ ذاته. وذُكِر أن أطبّاء العَرَب

طُوْقُرِيُونِ جَبَلِيّ Germandrée des montagnes, Polium à feuilles de lavande, Pouliot de montagne, Thym blanc (F)

Teucrium montanum (S)

نَبات مُعَمَّر يَعلو من ٥ إلى ٢٥ سم، سوقُه هزيلة، نائمة، مُخضوضرة. أوراقه خَطِّية، لِبْديّة مُرمدة اللَّون. أزهاره مُصفرّة اللُّون الأبيض، في رؤوس نِصف كُرويَّة. يَرغب الصخور الكلسية.

يُستعمل كالطُّوقَريُون المَخزَنيّ. أعيد 1940

طُوْقَرِيُون كَمَافِيطُوس، عَرْصَف صَنَوْبَرِي، الْكِلسَيّة التُّربة الجافّة الدّافئة. كَمَا فَنْطُهِ سِ (۱) Ground pine, Yellow bugle (E)

> Germandrée ivette, Ivette, Chamépitys (F)

> Gelber Günsel, Ackergamander (D) Teucrium chamæpitys, Ajuga chamæpitys (S)

عُشبَة حَوْليَّة تَعلو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها ثُلاثيّة التّشريح الهُدبيّ. أزهارها صفراء اللُّون سُنبليَّة التَّجميع. وهي عُشبة قريبة جدًّا من عَرْصَف شِيًّا. ذُكرت على أنها تُستعمَل في الحالات التي يُستَعمَل فيها الطُّوقَرْيون المَخْزنيّ ذاتها. وذُكِر أن الأطبّاء العَرَب يَسقون نَقيعها المَغليّ بعد العَرْف المُستَحَبّ الفَوّاح. لَسْعة العَقْرب بأسرع ما يمكن.

⁽١) التَّسمة الأولى للمؤلِّف.

يُوصون باستعمالها ضِدّ الكُوليرا، وبأنّهم يَستعملونها جدًّا ضِدّ أمراضٍ أخرى عديدة.

ا العَوْف Germandrée de Crète, Germandrée Crétoise

Pouliot de Crète, Polium blanc
(F)Cretan germander (E)
Cretischer berglavendel, Ysop-Gamander (D)

Teucrium creticum, Teucrium rosmarinifolium (S)

جُنيبة مُعمَّرة ليفيّة القاعدة من فصيلة الشَّفَوِيَّات تَعلو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم، فروعها خَشنة، طويلة، أنبوباتها فروعها خضراء مُتطاوِلة. أوراقها خضراء ومُستمرطة الصَّفحة العُليا، لِبديّة الصَّفحات السُّفلي، الأوراق الدُّنيا إهليلجيّة الشَّكل الخَطِّي، مَزْمومة العُليا ضَيِّقة الشَّكل الخطي، هوامشها كلُّها ملتفَّة بعض الخطي، هوامشها كلُّها ملتفَّة بعض الشَّيء. إزهراراتها تُذكِّر بازهرار نَدَى

البَحْر، وهي في عناقيد سُنبليّة الشَّكل طوق المُتطاوِل. سُويقة الزَّهرة أقصر من الكأس، مُتعدِّدة الأزهار أحيانًا. الكأس بيضاء اللَّون، لِبديّة، قصيرة الشَّكل الجُريْسيّ، أسنانُها مُثلَّثة الشَّكل السِّنانيّ، حادّة الرأس، أقصر من السِّنانيّ، حادّة الرأس، أقصر من الأنبوب بقليل. التّاج إلى البنفسجيّ الأزرق، أطول من الكأس بحوالي المرّتين. يزهر من نيسان إلى أيلول على المنحدرات الشبه مُحرَّجة للجبال السّاحليّة.

الخصائص والاستعمال – أعيد تسجيل هذا النَّبات في الفرماكوبيا الفرنسية الحديثة عام ١٩٧٥، وجاء عنه في مَخْزَن دُورْقُو L'officine أنّه نُصح به باسم سَطاقِس الأناضُول(١) Stachys أنها تما المعالمة الكوليرا الهندية. أما إدوار غالب فكتب أنها: "عُشبة بَرِّية طبيّة يُقال إنّها من النَّباتات النَّاهِضة النَّاعِظة». يَبقى أن المُركِّبات وطرق الاستعمال لم تزل غير متوفّرة.

⁽١) التَّسمية للمؤلُّف.

- عجينة بالريزورسين

غ	٥									٠.	٠.	٠.		٠.						٠,	بن		ور	ريز
غ	١	٠								٠.	٠.	٠.		٠,				٢	نك	ز	11	ید		أوك
غ	١	٠																					¢	نشا
غ	۲	٠																		• • •			J	زيىـٔ
		4	تي	L	۰	ز!	ک	5	1		ية	٤	J	ج	ال	١,	٠	اخ	٠	م	וע	ل ا	ضا	•

٠٥ غ

١٨٦ - عجائن للاستعمال البيطري Pâtes pour usage Vétérinaire (F)

- عجينة سُؤسَان

أوكسيد الزنك - عجينة أو لَبَن كلس سميك ضد مرض كلورور الزنك ٥ غ

الظلف

نمزج جيّدًا. تستعمل هذه العجينة طازجة لتغطية الجروح المقطبة والمعقّمة. هي تشكل، عندما تجف، قشرة لاصقة تغنى عن استعمال الضمادات.

نفتّت أو نقطّع الكلس الحيّ بطريقة يشكل معها عصيدة أو مهروسًا سميكًا. نجعل العصيدة في علب خشبية نضعها على مدخل الحظيرة أو الزريبة. نمرر الخراف ونجعل أقدامها تغطس في لبن الكلس. إذا كرّرنا هذا الحمام الساخن ثلاث أو أربع مرات، فإنه كان يشفي تعفّن الظلف الحديث.

- عجينة السولفاميد

١٠غ	سُولفاميلاميد
۲۰غ	كربونات الكلسيوم
۲۰غ	أوكسيد الزنك
۲٥ غ	لانولين
۲۵ غ	زيت كبد المُورَة

- عجينة بْلَاسّ الكاوية

شب محروق ع كمَّة كافية حامض سولفوريك

نمزج المساحيق الثلاث. من جهة ثانية، نصهر اللانولين في الزيت ونضيف مزيج المساحيق إلى المادة المصهورة في هاون مُفتَّر.

نحضر عجينة قوامها قوام العسل ونضعها فورًا وبطبقة رقيقة على التهاب رجل الحصان. يجب نزع القرنية التي تزيّن صحن الحافر المريض مسبقًا مع تلافى فيضان الدم. نتابع استعمال هذه العجينة حتى تختفي الأجزاء المريضة.

يمكننا استبدال السولفاميلاميد في هذه التركيبة بأي سولفاميد آخر. كحول ٩٠ درجة كمّيَّة كافية عجي نحضر عجينة للاستعمال الفوري.

- عجينة ليانو الكاوية

انهيدريد زرنيخي (كميات متساوية) كمّيّة مطلوبة مسحوق السابينا أي الأبّهَل ... كمّيّة مطلوبة صمغ عربي وماء كمّيّة كافية

لصنع عجينة نصف رُخوة.

۱۸۷ - عجينة أو مُجَمَّدة الثمار الصدرية Pâte ou gelée pectorale de fruits (F)

	ثمار صدرية.
٠٠٠٠غ	رئة عجل
٢ عدد	أرجل عجل
٦غ	أشنة (خرز)
۰ ۲۵ غ	صمغ عربي

نَغلي المواد الأربعة الأولى في مقدار 1000 غرامًا من الماء حتى إنقاصها إلى الثلثين ﴿، نُمرِّر ونعصر ونصهر الصمغ في السّائل فوق نار خفيفة. من جهة ثانية، نحضٌر:

۱۰۰غ	سکر •
۰۰۰ غ	عسل
١٢٥ غ	عصير التوت
۳۷٥ غ	نقاعة صدرية

نحضر شرابًا سكريًّا مصفًّى نضيف إليه

- عجينة ضد التهاب الرجل كلورور الأثمد

(الانتيموان، الكحل)كمّيّة كافية حامض كلورهيدريك كمّيّة كافية لصنع عجينة رخوة.

- عجينة ضد مرض الظلف (تَعَفَّن الظلف) استات النحاس

خلكمّيّة كافية

نحضر عجينة؛ نضعها على القرح، نضمّدها ولا نرفع الضماد إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام.

- عجينة كانكوان الكاوية

 کلورور الزنك
 ٣٢ غ

 أوكسيد الزنك
 ٨ غ

 طحين قمح
 ٢٤ غ

 ماء مقطر
 ٤ غ

نُقَوْلبها في أسطوانات أو في مخاريط مستدقة الرأس، ونحفظها في زجاجات مقفلة جيّدًا تحتوي كُيَيْسات من الكلس الحي.

عجينة جيدة للقرحات، وقروح الأدوية المُنفَّطة. إنها تُحدث أو تشكّل نَدَبة أو أثر حرق سميك يقع بين اليوم الثامن والعاشر.

- عجينة كاوية ضد التهاب رجل الحصان

ع ج ي

Pâte de gomme arabique dite pâte de guimauve (F)

۱۰۰۰ غ	صمغ عربيّ أبيض
۱۰۰۰ غ	سكر أبيض
۱۰۰۰ غ	ماء مقطر
۱۰۰ غ	ماء زهر البرتقال
. ۱۲ عدد	زلال بيض

دستور أدوية ١٩٠٨. نغسل الصمغ ونُذوِّبه في حمام مريم في الماء؛ نعيد المحلول الصمغيّ إلى النّار في دَست مسطح، ودائمًا في حمام مريم، نُضيف السُّكَّر مع تحريك مستمر حتى قِوام العسل السَّمنك.

في كمية كافية من الماء للحصول على من جهة ثانية، نَخفُق زُلالات البيض تمامًا مع ماء زهر البرتقال، نضيفها بأجزاء إلى العجينة التي نُحرِّكها بقوَّة على نار هادئة، نتابع خفق العجينة حتى إذا ما وضعنا منها على ظهر اليد بواسطة مِلْوَق لا تعد تلتصق به، عندها نصبُّها على طاولة رخام أو في علب مُغطَّاة بالنَّشاء (دستور ۱۹۰۸). نحفظ في مزيج من ٣ أجزاء نشاء وجزء واحد من السُّكُّر.

حُذِفت هذه العجينة من دستور الأدوية بموجب قانون ۲۷ حزیران ۱۹۳۵. کان يُضاف في الماضي ممروث الخبيزة إلى هذه العجينة. أمّا اليوم فلم يعد الكلام حصرًا سوى عن عجينة صمغ كثيفة أو مخفوقة. إقترح شيووايك، وهو صَيدلتي من أنْڤر Anvers، اقترح التَّركيبة أدناه

كحولة الليمون الحامض ١٥ غ عجينة الخبيزة ننقص الكمِّية في حمام مريم طوال ساعة. نُخلِّص المُجمَّدة من القشرة التي تَشكُّلت على وجهها، ونَصبّها في قوالب من الخَزَف الصينيّ أو من التّنك الأبيض. نحصل بذلك على نتاج شفّاف لذيذ المذاق.

١٨٨ - عجينة حشيشة السعال باليانسون Pâte dite Tussilage à l'anis de Lille (F)

۱۸۰ غ	يانسون
۸۰ غ	رجل القِطّ
خ	حشيشة السعال

مقدار ١٠٠٠ غرام من النقيع المغلى الذي نحلّ فيه ما يلي:

٠٠٠٠ غ مستخلص السوس النقى

نمزج ونجانس في حمام مريم، ومن ثم نضيف:

زيت اليانسون الدهني

نصت الكتلة على رخامة مزيتة، نقطّعها إلى سيور صغيرة، نلفّ السيور على شكل أسطوانات، نقسم الأسطوانات إلى قطع صغيرة نجففها في المحم ونحفظها في مكان حاف.

نُمرِّر في قماش دقيق ونَعصُر؛ نترك للراحة؛ نُصفِّق السّائل وهو لم يزل ساخنًا؛ نضيف السُّكِّر ومن ثم المستخلص ذاته محلولًا في قليل من الماء ونُبخُر في حرارة لطيفة، مع تحريك مستمرحتي قوام عجينة جامدة تمامًا؛ نَصُبّ العجينة على الرّخام أو في قوالب مُزَيَّنة قليلًا بزيت الڤازلين؛ عندما تبرد نجفِّفها بورق غير مُصمَّع لكى نزيل الزَّيت القليل الذي علَّق بها، ونحفظها في علبة من التَّنك الأبيض.

تحتوي هذه العجينة حوالي ٢٠,٠٠ غ من مستخلص الأفيون في كل المعام غ (ملحق دستور، ۲۷ حزیران ۱۹۳۵ ودستور .(1947)

لذكرى التاريخ.

١٩١- عَراوَة مَلَكَة المُرُوج Queen of meadows, Meadow-sweet (E) Ulmaire, Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Spirée filipendule, Barbe-de-Chêne, Herbe aux abeilles, Ormière, Pied de boue, Vignette (F) Echtes Mädesüss, Weisenkönigin (D)

Spiraea Ulmaria, Filipendula Ulmaria, Ulmaria palustris (S)

نبات معمَّر من فصيلة الوَرْدِيّات يعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. ساقه قويّة، جامدة، مثلَّمة؛ أوراقه كبيرة، قاتمة اللَّون الأخضر على صفحتها العُليا، بيضاء الصفحة

اختصارًا للعمليّات اليَدويّة الطُّويلة التي والمغسول في حمام مريم. يتطلُّبُها تحضر عجبنة الخيزة:

> صمغ عربى أبيض مسحوق غ ۲۰۰ غ ۲۰۰ غ سكر أبيض مسحوق

زلال بيض ٣ عدد ماء زهر البرتقال ٦٠ غ

نمزج المساحيق، نضيف زلالات البيض المخفوقة جيّدًا مع ماء الزّهر، نخلط الكتلة بعناية، نُسمِّكها بحرارة لطيفة (حوالي ١٠ دقائق) مع تحريكها المستمر، وعندما تصبح العجينة لا تلتصق على ظهر اليد إذا وضعت عليه بواسطة الملوق، نُقطِّعها على لوحات مرشوشة بالنشاء.

Pâte ١٩٠- عجينة مخزنية بالحزاز officinale au lichen (F)

۱۰۰ غ خَرَز الصخور (إيسْلَنْده) ۰۰۰ غ صمغ عربى سكر أبيض ٠٠٤ غ مستخلص أفيون ٢٠٠٠ غ ماء مقطر كمّيّة كافية

دستور أدوية ١٩٣٧. نضع الخَرَز في الماء؛ نُسخِّن حتى الغليان، نرمى هذا السّائل الأوّل الذي يحتوى على كامل الجوهر المُرّ تقريبًا. نغسل الخرز بالماء البارد، ومن ثم نَغليه لمدّة ساعة واحدة في كمِّية من الماء تكفي للحصول على ٦٠٠ غرام من السّائل المغلّى، نُمرِّر مع العصر؛ نُذوّب الصمغ المجروش

السُّفلى، مُركَّبة من ٥ إلى ١٧ وريقة غير متساوية، مسنَّنة، الوريقة النَّهائية ثُلاثية الفصوص، أذَنات في إكليل نصف دائريّ، مسنَّنة؛ الأزهار زِبديّة اللَّون الأبيض، صغيرة القد، في أعذاق غير منتظمة، خماسيّة الكأسيّات، خماسيّة البَتلات المستديرة، أسديتها تَتَخطّاها؛ البَتلات المستديرة، أسديتها تَتَخطّاها؛ البورة بنيَّة اللَّون؛ أرومة عِقْدِيّة، جذر ليفيّ. رائحة وطعم مُستحبّان وعِطريّان.

المُركِّبات - الجذر يحتوي على عفص، زيت دهني. الأزهار تحتوي على مادة ملوِّنة صفراء (سپيرايين، ١٨٤٠)، مادة متبلّرة مشابهة للكافور، زيت دهني مركب على الأكثر من ألدَهيد سالِسيليك، سالِسيلات المتيل، وكمية ضعيفة من الهليوتروپين ومن الوانيلين ضعيفة من الهليوتروپين ومن الوانيلين (١٨٩٢). أملاح معدنية، فيتامين «ث».

الأستير متيل سالسيليك لا يوجد مسبقًا في النَّبات، ولكنّه يحصل بفضل خميرة تعمل على هيتروسيد هو: مُونوتروپيتوسيد أو (مُونوتروپيتين) تركيبة الكيميائي (مُونوتروپيتين) تركيبة الكيميائي لا مُثناء عملية التقطير.

في النَّبات المجفَّف لا يوجد لا هيتروسيد ولا أستير متيل سالسيليك. إن هذا النَّبات، وعلى خلاف الوَرديّات المتقاربة منه، يخلو من اللُّعاب ومن الرُّعاب.

الخصائص - مَقدِرة قويّة مِغليّة مبوّلة للأزهار ومختلف أقسام النَّبات (أطروحة صيدلة، ١٩٣٥). الجذر كان يُستعمل جدًّا كمبوّل وقابض ومضاد للنزلة ومضاد للنزيف. مضاد للتشنج، قابض، مبول، لائم للجرح، معرق، مقوّ، مضاد للالتهاب، منوّم.

الاستعمال – أعيد تسجيل ملكة المروج في الفرماكوبيا عام ١٩٧٥. تستعمل منها الرؤوس المزهرة قبل تفتحها، الأوراق، والجذور. لا يُحفظ النَّبات أكثر من سنة. لا يُغلى بتاتًا لكي لا يتبخَّر الحامض السالسيليكي. تصلُّب الشرايين، الحمام، السلوليت أي التهاب النَّسيج الحَمام، السلوليت أي التهاب النَّسيج الخُلوي، العُدَّة الوَرديّة، الإسهال، البُوال، النقرس، ارتفاع التوتر، الرُمال، البَدانة الشَّحميّة، الأوديما، الجروح، الروماتيزم، الحميراء، الأوربا، استسقاء.

طريقة الاستعمال - نقاعة ٣ أو ٤ ورقات طازجة، أو ملعقة متوسطة من الأزهار المجفَّفة المقطَّعة مع الأوراق في فنجان ماء ساخن (لا يُغلى أبدًا)، يغطى ١٠ دقائق، ويؤخذ منه ٣ إلى ٥ فناجين في اليوم، بين الوجبات. نقاعة الأزهار في النبيذ ضدّ الاستسقاء والآلام الروماتيزمية. كحولتور، ملعقتان صغيرتان في اليوم. صبغة، ١٠ إلى ١٥ نقطة، ٣ أو ٤ مرات في اليوم. نقاعة مبولة تزيل الحامض البولى:

ع ر و

أوراق كشمش أسود ١٠٠ غ عِرْق اللَّهِب المُتَعوِّج، عِرْق اللَّهَب النَّشُويَ اللَّون الأبيضُ

Ipécacuanha ondulé, Ipécacuanha blanc amylacé (F)

Richardsonia brasiliensis (S)

دُعى هكذا بسبب حَلَقاته غير الكاملة وصبغته المُبيضَّة اللُّون، وهو نوع من فصيلة الفُوِّيّات يَندر وجوده في الأسواق ويجب أن يُستبعَد من التَّداوي؛ يحتوي على بقايا قلويد غير الأماتين.

عرْق الذَّهَب المُخَطَّط الصغير (٢) Ipécacuanha strié mineur, Ipéca strié noir (F) Richardia, Manettia ignita (S)

ضَربان مُتميّزان بشكل واضح من عِرْق الذُّهب المُخطُّط: الكبير، وهو لا يحتوى سوى على القليل من الأماتين؛ أمّا الصّغير فهو الأغنى بالأماتين. وهو نوع كان يُعتقد أنّه يَنتمي إلى جنس «ريشارديا»، إلّا أنّ كلُّا من مَاهُوْ وكارتيبه نسباه، عام ١٩٢٧، إلى جنس «مانسا» من فصلة الفُوِيّات.

عرُق الذُّهَب المُخَطَّط الكبر (٢) Ipécacuanha strié majeur, Ipéca gris cendré glycyrrhizé, Ipéca glycyphloea, Ipéca violet (F)

Psychotria emetica (S)

رؤوس ملكة المروج المزهرة ٥٠ غ البنفسج، والفربيون، إلخ. أوراق مُرّان ٥٠ غ ملعقة كبيرة في فنجان ماء غال يغطى ١٠ دقائق، ٣ أو ٤ فناجين يوميًّا. في معالجة التهاب النَّسيج الخَلَويّ، ملعقة كبيرة نسكب فوقها ٢٥٠ غرام ماء غال، نتركها طوال اللَّيل، نشربها عند النهوض. من الخارج: أوراق غضة على الجروح، والحروق، والقرحات. كمشتان في ليتر ماء يُغلى ١٥ دقيقة ويوضع منها ساخنًا على الروماتيزم. وفي كمادات على الجروح والقرحات.

١٩٢ - عُرُوق الذُّهَب

Ipécacuanhas (F)

إلى جانب أنواع عِرْق الذِّهب المَخْزَنيّة التي أوردنا دراساتها في غير مكان، هناك أنواع أخرى مختلفة نوردها كما يلى:

عِرْق ذَهَب القديسة مَرْتا(١)

Ipéca Sainte-Marthe (F)

هو صنف نام جدًّا مهده جزيرة القديسة مرتا.

إن كافة هذه الأنواع يشار إليها في بعض الأحيان باسم عروق ذهب غير حقيقيّة. أمّا بقيّة عُروق الذَّهب غير الحقيقيّة الأخرى فهي جذور أنواع مختلفة من

⁽١) التَّسمة العربَّة للمؤلِّف.

۱۹۳ - عَسَم سَنْدَايِيق^(۱) Combretum, Chigommier (F)

Combretum sundaicum (S)

نبات من قبيلة العَسَمِيَّات وفصيلة الاهْليلَجيَّات يُوجد بكثرة في دولة سيلَنْغُور (شبه الجزيرة الماليزيّة). وهو نبات يستحق تمامًا الاسم الذي أطلق عليه: مُضادّ للأفْيون Anti-opium نظرًا لخصائصه الطبية.

المُركِّبات - نَبات خالِ من أَى قِلُويد، ومن أيّ هيتروسيد؛ وفيما عدا القليل من العَفْص، فلا شيء فيه يُفسِّر مَقدِرته المُضادَّة للسَّمَ.

الخصائص - مُضادّ للأفْيُون.

التحضير - لإعطاء هذا الدُّواء، يَجِب التَّقَيُّد بالقَواعد التَّالية، والتي أشار إليها كلِّ من لوبُوبار وجَنِّغْز: نأخذ ٥٠ غرامًا من النَّبات (سُوق وأوراق) ونَضعُها في وعاء مع أربع ليترات ماء؛ نُغطّى الوعاء ونَضعه على النّار لمدَّة أربع ساعات. نَرفعه بعدها عن النّار، نُصفِّيه ونُعيد وضع الوعاء المكشوف على النّار حتى نُقْصان الماء المُستعمَل منذ البداية إلى ربع الكمِّيّة. نَضع النِّتاج الحاصل في زُجَاجتين «أ» و آب» مُقفلَتَين جيِّدًا نَضعهما في مكان بارد. عند ذلك نَحلّ فى الزُّجاجة «أ» جُرعة الأفيون أو المورفين اليَوميَّة التي اعتاد المريضُ الفرمّاكوبيا عام ١٩٧٥.

(المدمن) على تعاطيها.

طريقة الاستعمال - نُعطى عِدَّة مَرّات في اليوم، حوالي ٧ مرات، مقدار ٣٠ غرامًا من محتوى الزُّجاجة «أ»، ونَضع مكان كل جُرعةِ نأخذها من هذه الزَّجاجة مِقدارَها من النَّقيع المُحتوى في الزُّجاجة «ب» (Combretum pur)؛ وعندما تُصبح هذه الزُّجاجة الأخيرة فارغة، نستعمل عندها فقط المحلول المُخفَّف هكذا، حتّى يَنتهى.

في حال عدم الحصول على النَّتيجة المَرجوَّة بعد هذا العِلاج الأوَّل، نُعاود عِلاجًا ثانيًا، مع تَخفيض مِقدار السَّمّ المُضاف إلى القارورة الأولى.

ملاحظة - نوعٌ آخر من العَسَم (Combretum altum) يُستعمَل في الطبّ باسم Kinkéliba (أطلب الكلمة في المعجم الرّابع ص ١٩٠ رقم ٢٤٥).

١٩٤ - عُصَارَة الخَسّ Lactucarium Lactuca Sativa, Lactuca virosa (S)

عُصارة الخَسِّ هي العصير اللَّبنيِّ الَّذي يحصل من الخَسِّ المَخزَنيِّ أي الخَسِّ البُستاني L. Sativa ومن خَس السَّم أي اللُّبَيُّنة L. Virosa، الَّذي يَحصل بواسطة الحَزّ ويُجفّف في الشَّمس. وهى عُصارة أعيد تَسجيلها في

كان هذا المُستحضر الَّذي يَتطلَّب يدًا

عاملة مُتخصّصة، أكثر ما يُصنع في بروسيا وفي أوفَرْنيه، وفي الماضي: إيرلندة والولايات المتّحدة الأمريكيّة. يكتسب الخَسّ بالزراعة قدًّا عِملاقًا يَصل إلى ٣ أمتار ارتفاعًا، ويبلغ قطرة ٤ سم. نقطع السّاق، في موسم الازهرار، عن بعد ٣٠ سم تقريبًا من رأس النّبات، ومن ثمّ نقطع منه عَرضيًّا شرحة جديدة، كل يوم وحتى شهر أيلول. نضع العُصارة المجموعة في أوعية حيث تجمد؛ نقطعها إلى قوالب صغيرة أو إلى شرائح نُعَرِّضها للشَّمس على قطع من الحصير؛ تَجفّ العُصارة بسرعة، فتخسر بذلك من وزنها حوالي بسرعة، فتخسر بذلك من وزنها حوالي المَنيّت.

وتحصل أثناء التبخير تأكسُدات وظواهر دياستازية أخرى.

المواصفات - تكون عُصارة الخَسّ، من الدّاخل، بُنِّية اللَّون نوعًا ما، مِكسَرها راتنجيّ ومُصفر اللَّون عندما يتمّ التَّجفيف بسرعة؛ وخلافًا لذلك، فيكون اللَّون بنيًّا قاتمًا نوعًا ما. رائحتها قويّة ومُتَميِّزة؛ طعمها ذو مرارة مُفرطة. وهناك بعض التشابه بينها وبين الأفيون، لذلك دعيت أحيانًا باسم «أفيون الخس».

إن مختلف أصناف العُصارة التي توجد في الأسواق تَتَميَّز بأشكالها الخارجيّة التي تُعطى لها أكثر ممّا تَتَميَّز بصفات المادّة ذاتها. فالـ «عُصارات الفرنسيّة»

تَقع في قوالب دائريّة قطرها من ٣ إلى ٦ ع ص ي سم، ووزنها من ١٠ إلى ٣٠ غرامًا؛ «العُصارة الألمانية» تكون في سَكَمات من كُريّات منتظمة نوعًا ما؛ «العُصارة الإنكليزية» تقع في قطع منتظمة الشَّكل، قاتمة اللَّون البُنِّيّ، ترابيّة المظهر.

الخصائص والاستعمال - تَتَمتَّع عُصارة الخَسِّ بخصائص مُهدِّئة. أكثر ما تُعطى في السُّعال، والتَّهيُّج العَصبيّ، وفي الطبّ الولاديّ. تُعطى عُصارة الخَسِّ في بيلولات بمقدار عُصارة الخَسِّ في بيلولات بمقدار أدنى ١٠٠غ إلى ١٠٠غ أو في حُبيبات. تعطى كذلك بالأفضلية بمقدار أدنى على شكل مستخلص كحولي: (١٠٠ إلى على شكل مستخلص كحولي؛ إن هذه إلى ٢٠٠غ للبالغين)، وبمقدار ٢٥ إلى ١٠غ على شكل شراب سُكَّريّ؛ إن هذه الطريقة الأخيرة تبدو الأكثر نفعًا (أطلب شراب عصارة الخس السكري). وتُعطى كذلك على شكل عجينة مَخْزَنيّة بمقدار من إلى ٢٠غ في حالات البرونشيت. تضادّاتها: القِلى.

177

نَبات حَوليّ من فَصِيلة البُّلْسَمينيّات،

⁽١) التَّسميات العربيَّة والتَّسمية الإنكليزيَّة والألمانيَّة للمؤلَّف.

يعلو من ٦٠ إلى ٨٠ سم. أزهاره كبيرة، ذَهبيَّة اللَّون الأصفر. العُصَيفيرة جنس حُقَن شَرجيَّة. نباتات حَوْليّة أو مُعمّرة، تكون مَرْطاء عمومًا، بَحريَّة اللُّون، عُصاريَّة. أوراقها مُتعاقِبة، بسيطة، كاملة، مُعنقة، مُسنَّنة النَّصل. أزهارها فَرديّة أو تَؤُمِيّة. التّاج غير مُنتظم. ثلاث كأسِيّات بَتَلانِيَّة، الخَلفيَّة منها مِهمازِيّة الشَّكل. ثلاث بتكلات. مبيض خُماسي الحُجرات.

> الخصائص - مُبوِّلة، مُنَقِّية، مُضادّة للالتهاب، لائمة للجرح، مُضادّة للبو اسير .

> الاستعمال - بَواسير، قروح مُتَعفِّنة، قُرحات، جروح، رُمال.

طريقة الاستعمال - مسحوق النَّبتة، حَوالي مِلعقتين صغيرتين في اليوم مع العسل أو المُربَّى أو مُذابَة في مَشروبِ ما. نُقاعة ٣٠ غرام نبات مُجفَّف في ليتر ماء غال يُغطَّى نصف ساعة، ٣ فناجين صغيرة يوميًّا. نقيع ٢٠ غرام نبات مُجفَّف في ليتر ماء يُغلى عشر دقائق، يُبرّد، يُصفِّي، ٣ فناجين يوميًّا. صبغة ٢٠ غرام نبات مُجفَّف في ٥٥ غرام كحول نقى و٤٥ غرام ماء لمدّة عشرة أيّام. نُصفِّي ونحفظ في زجاجة مُلوَّنة. يُؤخَذ ٢٠ إلى ٣٠ نقطة، مرتان في اليوم مع قليل من الماء أو مع أيّ شراب. من الخارج، النَّبات المهروس يُوضع كصوقًا على البواسير والقروح والقرحات. كذلك يصلح نقيع النبات

المَغليّ للحالات ذاتها أو يستعمل في

١٩٦ - عقاقير نباتية Espèces (F)

عقاقير للتدخين

داتُورة شائكة، مَريميَّة، بالتَّساوي. في الرَّبُو. (أطلب سجائر).

عقاقير مُبَخِّرة، عقاقير مُدَخِّنة

بنجوان، مُصْطكاء، بخور، حَبّ العرعر، بأوزان متساوية.

هناك طائفة من البديلات، البعض منها معقّد جدًّا، ويبدو، بالحرى، أنه فاسد مَعِيب، إذ إنها تجيز موادًّا عِطريّة صَمغيّة بدلًا من أن تكون راتِنجيّة، وهي مواد، إذا احترقت أو أُحْرَقَت، لا يمكنها إلَّا أن تُعطى رائحة عاطلة تَضرّ في عِطر الموادّ الأخرى. إن تلك العقاقير قد تكون أكثر مُلاءمة إذا ما وُضِعت في كُيِّسات.

عقاقير مُخدِّرة، عقاقير مُنَوِّمة

أوراق مُجفَّفة من سِتّ الحُسن، الشُّوكران، البَنْج، عِنَب الدّيب أو الحُلو مُرّ، تَبْغ بَحريّ اللُّون (١) Nicotiana glauca خشخاش منوّم، ىكميّات مماثلة (١٨٦٦).

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

۱۹۷ - عُنبُوب رُباعِيّ البَتَلات، عُنبُوب عُنبُوب عُنبُوات كُرَويّة حمراء اللَّون، رُباعيّة ع ن ب المَناقِع (۱۹ مُنبُوب رُباعيّة الحُجُرات، مأكولة.

الخصائص - ثماره، الّتي تُسمّى Cranberries كانت مُسجَّلة في دستور القِمام الآسيّ. أعيد آميد آميد مم ثمار القِمام الآسيّ والقِمام الأحمر في الإصدار التّاسع للفَرْماكوبيا الفَرنسيّة عام ١٩٧٥. يُرغَب هذا النَّوع الفَرنسيّة عام ١٩٧٥. يُرغَب هذا النَّوع الأمريكيّة حيث يزرع ويُستقطر من ثماره أوراقه وفُروعه وجُذوره عافِصَة تُستعمَل في الدّباغة. مُلاحظة: وَرد هذا النَّبات في إحدى المَوسوعات العربيّة على أنّه في إحدى المَوسوعات العربيّة على أنّه القِمام الصَّغير أو الشّائع، علمًا بأنّ للقِمام هو من جنس Vaccinium

Cranberry, Bogberry, (۱۹۷ مُنبُّوب رُباعِيّ البَتَلات، عُنبُّوب البَتَلات، عُنبُوب (۲۹۸ المَناقِع ۲۹۸ المَناقِع ۲

جَنْبَة مُعَمَّرة، عَدُوَّة الكلس، لِيفيّة القاعدة من فَصِيلَة الخَلَنْجِيَّات. ساقها نائمة، مُتجَدِّرة، تَطول من ٢٠ إلى ٨٠ سم. أوراقُها صغيرة، بَيضيّة، حادّة الرّأس، بَسيطة، كاملة، دائمة، مُتعاقِبة، خالية من الأَذَنات، طولها نحو ١٠ مم. أزهارها فَرديّة، طويلة السّويقات، بَتَلاتها أربعة مُتَّحدة القاعدة، زاهية اللّون الوَرديّ، مُلْتَفَّة الأطراف نحو الخارج على غِرار سيكلامن صغير. الكأس على غِرار سيكلامن صغير. الكأس رُباعيّة خُماسيّة الفُصوص الأبيدة. الثّمار

غ

Odoriferous (۱) عَافَتْ عَطِر (۱۹۸ agrimony (E)

Aigremoine odorante (F)

Wolliges agremonen (D)

Agrimonia odorata (S)

الغافَث جنس نَباتات مُعَمَّرة، مُنتصبة، من فَصِيلَة الوَرْدِيَّات، يَتَمثَّل في لُبنان بنوعين: الغافَث الغُولانيّ الشَّهير والغافَث العَطِر الَّذي يُضاهيه بالخصائص إذا لم يكن أفضل منه.

الغُولانيّ نبات وحيد السّاق أو ذو سُوق قليلة السَّماكة والخُشُونة. أوراقه ذات وريقات بَيضاويّة، حادّة قليلًا. ثمرته ذات كأس مُثلَّمة حتّى القاعدة تَقريبًا، وعُقْفات مُنتصِبة. عديم الرّائحة.

العَطِر نَبات مُتعدد السّوق الخَشِنة السَّميكة. أوراقه ووُرَيقاته طويلة وحادة. ثمرته ذات كأس غير مُثَلَّمة حتى القاعدة وعَقْفات مُنبسِطة جدًّا. غِدِّي وعِطريّ.

الغافَث العَطِر نَبات مُعَمَّر عديد السّوق، يَعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم، سُوقه سَميكة

(١) التَّسمية العربيَّة والإنكليزيَّة والفرنسيَّة للمؤلِّف.

وخَشِنة جدًّا، قَويّة الزَّغَب، أوراقه ريشيّة التَّركيب، قَويّة الزَّغَب، وُرَيقاتها كبيرة الفَدّ، حادّة، مُزوَّدة بغُدد عِطْريّة. أزهاره أكبر من أزهار الغافَث غُولانيّ. الكؤوس الثَّمريّة غير مُثَلَّمة حتّى القاعدة، تَحمل أوبارًا شائكة ومَعقوفة، مُنسِطة. يُزهر في حُزيران وتموز في الأراضي الصَّوّانيّة، وهو نَبات لُبنانيّ نادر من المُفيد حمايته وتكثيره إذا أمكن.

خصائصه هي خصائص الغافَث غُولانيّ ذاتها إذا لم تكن أفضل منه؛ غير أنّه من الضَّروريّ جدًّا تَصْفِيَة مُستحضراته، من نُقاعة أو نَقيع أو سوى ذلك، تَصفية جيِّدة بالقُماش تَلافيًا للأوبار الّتي تَكسوه في كافّة أقسامه (أطلب غافَث غُولانيّ، المعجم الأوّل، صفحة ١١٩، رقم ١٩٠).

١٩٩- غُبَارُ الطَّلْع، لَقَاح، لَقَح

Pollen (E)

Pollen (F)

Blütenstaub (D)

غُبار الطَّلْع أو عِكْبِر أو صُوَاح. حبَّته هي الجَدَرَة. وهو الغبار الذي ينشأ في المِئْبَر أي في الجزء المهم الأعلى من السَّدَاة في باديات الزَّهْر. كيس اللَّقاح ينشأ في السَّداة ويحتوي على حَبّات اللَّقاح. أنبوب اللَّقاح هو الذي يحصل من استطالة حبَّة اللَّقاح عندما تقع على سِمَة المدقَّة للتَّلقيح. جَدَرَتُه تتكوَّن من

سائل سيتوپلازميّ يحوي على جِبْلَتين تُمثِّلان خَليَّتين، الخليَّة الزاديّة والخليَّة التناسليّة. وقد تختلف الجدرة شكلا وحجمًا ولونًا مع اختلاف الأجناس النَّباتيّة. غير أنّه يغلب فيها الحجم الذريّ والشَّكل البَيضويّ والكُرويّ مع اللّون الأصفر.

المُرَكَّبات - أنزيمات، هرمونات النّمو الجَسَدي، ضروريّات هامّة، ڤيتامينات مختلفة (راجع الجدول).

الخصائص - مُمعدِنة، مُغذّية، مُسكّنة، مُسكّنة، مُوازنة عُضويّة، مُزوِّدة بالحَيويّة، غير سامّة، مساعِدة على النُّمو وإطالة العمر، وقائيّ من التهابات الپروستات، مجدِّدة للفتوَّة «مُشَبْشِبَة»، مقوّية للشيوخ والمتعبين والحَبالى، مزيلة للشموم الجسديّة عامة. (راجع الملاحظة).

الاستعمال - النَّمو الجسديّ، حالات الكسل الهضميّ، التهابات المِعَى، داء العُصَيّات الكولونيّة، إسهال وإمساك (تنظيم الأمعاء)، پروستات، فقر الدّم، حالات الوهن، نرفزة، أرق...

طرق الاستعمال - معالجات تبدأ خاصة من سِنّ الأربعين وتَتَكرَّر مَرَّتين أو ثلاث مَرّات، ولمدّة عشرين يومًا في السَّنة. غبائر الطلع سهلة الوجود في أسواق المنتجات المُتخصصة في الحِمْيات الغذائيّة في أوروبًا، ولكنّها غير شائعة في بلادنا. إن تعاطى

عِلاجات سنويَّة مجدِّدة للشباب من غ ب ا غبائر الطلع تتوازى تمامًا والعِلاجات التي تتمَّ باليخضور أو بالهلام الملكي، خاصة للنساء وللرياضيين.

التركيب الوسطي لغبار الطَّلع (ملغ في الغرام الواحد)، بالقيتامينات:

تِيامين أي أنورين «ب١»: ٨، مُضادّ التهابيّ عَصَبيّ. ريبوفلاڤين «ب٢»: ۱۸. حامض نیکوتینیك «ب۳» أو «پ پ»: ١٥٠، مُضاد للحُصاف أي داء الذِّرَة أي بَرَص إيطالي. پيريدوكسين «ب۲»: ٥، مُسكِّن ومُوازن. حامض بَنْتوتانيك «ب٥»: ٣٠. بيوتين «هـ» «H»: ۰٫۱۰ حامض فولیك «ب۹»: ٥، مضاد لفقر الدّم. لَكْتُوفلاڤين «ب٢» في اللَّبن أي الحَليب: ١,٥ . أَكْزِيْرُوفْتُول أي ڤيتامين «أ» بكثرة: مُضاد لجَفَف العَيْن. ڤيتامين «ب٢»: ١٧، ثمين للتحوُّلات الغذائية. ڤيتامين «ث»: ١٥٠ إلى ٤٥٠، مُضادّ لداء الحَفَر. ڤيتامين «د»: ٤,٠، أي كوليكالْسِيفَارُول، مضادّ للكُساح. توكوفيرول «هـ» «E»: ٠,٢٥، ڤيتامين الخصب والإخصاب. إينوزيتول أو إينوزيت (مجموعة ب): ٣٥، يستخرج من أوراق الجَوز وأوراق المُرّان والفاصوليا الخضراء والبزيلًا. ڤيتامين «ب١٢» أي سِيانوكوبالامين المضاد لفقر الدم.

ملاحظة - يشبه الأخصائيون خصائص خدد حُبوب الطلع الصحية بخصائص غدد

غ ب ي

التذكير عند الأسماك Laitance، إذ إنها بمثابة المَنيّ النباتي الذكريّ. غبار الطلع، كالطين، ليس بالخضار ولا بالفاكهة. ولكنه «غذاء دواء» يصعب إدراجه على أية لائحة من المنتوجات التجارية. وهو يقدّم إلى جسم الإنسان عددًا من العناصر الضروريّة التي تفتقدها التغذية الحديثة في غالب الأحيان. إن هذه العناصر تعمل بنداؤب وتعاون كما جَمَعَتُها حِكمة الطبيعة، وليس باعتمادها بنسب كَيْفيّة، كما هي الحال لعدد كبير من المصنوعات الحديثة. واستطرادًا فإن غبار الطلع لا يمكن تشبيهه بدواء ما. فهو قبل كل شيء، غذاء يقف غِناه فهو قبل كل شيء، غذاء يقف غِناه الكبير حائلًا لاستهلاكه كيفما كان.

Common service غُبَيْراء مَبْذُوْلَة -۲۰۰ tree (E) Sorbier, Cormier, Alisier (F) Echter Speierling (D)

Sorbus domestica (S)

شجرة جميلة قوية الجذع من فصيلة الوُرَدِيّات تعلو نحو ٢٠ مترًا. أغصانها أفقيّة، قويّة. فروعها ذات براعم مَرْطاء ودَبِقة. أوراقها ريشيّة مفردة، مسنّنة، غير مقوَّرة، مَرْطاء الصَّفحة العُليا، لِبْديّة السُّفلي، إزهرارها هَرَميّ الشَّكل، لِبْديّ. أزهارها ذات كأس تتحدّب لِبْديّ. أزهارها ذات كأس تتحدّب أجزاؤها إلى الخارج بعد تَفتُّح الأزهار. ثمرة إجّاصيّة الشَّكل، ٣ سم، خضراء، ومن ثم بنيّة اللَّون عند نضجها، تُعرف

باسم Corme أو alise أي غُبَيْرَة، طعمها سُكّريّ عندما تصبح هَلُّوطَة.

المُرَكِّبات - حامض تفّاحي، حامض لَيْموني، حامض دُردي الخَمْر، پكتين، عفص.

الخصائص - مضادّة للإسهال.

الاستعمال - حالات الإسهال، ديسنتيريا. الغُبَيْرات تحتوي على أعفاص.

طرق الاستعمال - لبّ الثمار، على غرار الأكيدنيا، من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ غرامًا في اليوم. نقيع الثمار أيضًا قابض جدًّا. لحاء الغبيراء غني بالعفص ويمكن استعماله نقيعًا مَغْليًّا.

ملاحظة - يمكن الحصول من الغُبيْرات (الثمار) على «نبيذ الإجاص» اللَّذيذ الطَّعم (Poiré). ولقد ذكر ڤيرجيل في قصيدته الريفيّة الثالثة، أنه كان يُصنع من الغبيرات الحامضة شراب متخمِّر يشبه النبيذ.

Gargarismes (F) غُرور -۲۰۱

غرور مُیَوَّد	التوت أو العسل المورَّد بَحَّة، فقد
ماء مقطرع	الصوت.
يودور البوتاس ٥٫٠ غ	غرور خمري عَقول
صبغة اليود ٤ غ	- جوز العفص ٤ غ
m p+	قشور رمان ٤ غ
غرور زئبقي	ورد أحمر غ غ
سليمانيّ أكّال ٣٠٠ غ	نبيذ أحمر ١٢٥غ
نقيع الشعير ٥٠٠٠ غ	نحضّر نقاعة ونضيف إلى السائل:
عسل مورّد ٢٠ غ	عسل مورّد ٢٠ غ
	حامض سولفوريك كمية كافية
٢٠٢- غُرَيّاء مُصَفْصَف، لاصُوْق	يستعمل للتَّحْميض بطريقة مستحبّة.
مُصَفْصَف Collodion salicylé (F)	
	غرور مُلَيِّن
حامض سالِسيليك ١٠ غ	عسل أبيض ٥٠ غ
أثير مُكَحْلَلكمية كافية	ماء مقطركمية كافية
غريّاء مطّاطي ٩٠,٥ غ	شعير مقشر٥ غ
نرطب الحامض السالِسيليك بواسطة	نَا اللَّهُ
	تعلي الشعير حتى يتفتح في كميه من
عدة نقاط من الأثير المكحلل؛ نضيف	نَغلي الشَّعير حتى يَتفتَّح في كمِّيَّة من الماء تكفي للحصول على حوالى ٢٥٠
عدة نقاط من الأثير المكحلل؛ نضيف العزيّاء ونخض حتى الذوبان الكامل.	-
	الماء تكفي للحصول على حوالى ٢٥٠ غرام من السّائلِ المَغليّ؛ نُمرِّر على
العزيّاء ونخضّ حتى الذوبان الكامل. نحفظ في قارورة مقفلة بعناية.	الماء تكفي للحصول على حوالي ٢٥٠
العزيّاء ونخضّ حتى الذوبان الكامل. نحفظ في قارورة مقفلة بعناية. يستعمل كدواء كاوٍ خفيف على الثَّفَن	الماء تكفي للحصول على حوالى ٢٥٠ غرام من السّائل المَغليّ؛ نُمرِّر على قماشة دقيقة، نُريح السّائل لحظات؛
العزيّاء ونخضّ حتى الذوبان الكامل. نحفظ في قارورة مقفلة بعناية.	الماء تكفي للحصول على حوالى ٢٥٠ غرام من السّائل المَغليّ؛ نُمرِّر على قماشة دقيقة، نُريح السّائل لحظات؛ نُضيف العسل ونكمل بواسطة الماء
العزيّاء ونخضّ حتى الذوبان الكامل. نحفظ في قارورة مقفلة بعناية. يستعمل كدواء كاوٍ خفيف على الثَّفَن	الماء تكفي للحصول على حوالى ٢٥٠ غرام من السّائل المَغليّ؛ نُمرِّر على قماشة دقيقة، نُريح السّائل لحظات؛ نُضيف العسل ونكمل بواسطة الماء للحصول على ٣٠٠ غرام من الغرور (دستور ١٨٨٤).
العزيّاء ونخض حتى الذوبان الكامل. نحفظ في قارورة مقفلة بعناية. يستعمل كدواء كاو خفيف على الثَّفَن والثآليل. فريّاء باليودوفورم	الماء تكفي للحصول على حوالى ٢٥٠ غرام من السّائل المَغليّ؛ نُمرِّر على قماشة دقيقة، نُريح السّائل لحظات؛ نُضيف العسل ونكمل بواسطة الماء للحصول على ٣٠٠ غرام من الغرور (دستور ١٨٨٤).
العزيّاء ونخض حتى الذوبان الكامل. نحفظ في قارورة مقفلة بعناية. يستعمل كدواء كاو خفيف على الثَّفَن والثآليل. فرُيّاء باليودوفورم	الماء تكفي للحصول على حوالى ٢٥٠ غرام من السّائل المَغليّ؛ نُمرِّر على قماشة دقيقة، نُريح السّائل لحظات؛ نُضيف العسل ونكمل بواسطة الماء للحصول على ٣٠٠ غرام من الغرور (دستور ١٨٨٤).
العزيّاء ونخض حتى الذوبان الكامل. نحفظ في قارورة مقفلة بعناية. يستعمل كدواء كاو خفيف على الثَّفَن والثآليل. فريّاء باليودوفورم	الماء تكفي للحصول على حوالى ٢٥٠ غرام من السّائل المَغلق؛ نُمرِّر على قماشة دقيقة، نُريح السّائل لحظات؛ نُضيف العسل ونكمل بواسطة الماء للحصول على ٣٠٠ غرام من الغرور (دستور ١٨٨٤). غرور مُهيِّج ضبغة كينا ٥٠٤ شراب التوت السُّكري

روح حشيشة الملاعق } غ نحلّ ونحفظ في قارورة تقفل جيّدًا .

نقاعة المريمية ١٨٠ غ دواء موضعي مطهّر.

174

غ ر ي

الغسولات هي مُستحضرات مائيّة تكون كحوليّة خفيفة في بعض الأحيان، تحتوي على موادّ علاجيّة مُختلفة، بشكل محلول أو مُعَلَّق، وتُخصَّص لكي توضع على البَشَرة أو على الأغشية المُخاطيّة. وهي لا تختلف عن التَّبخيرات إلَّا بطريقة استعمالها.

يَرد تحديد الغُسولات في الإصدار التَّاسع للفرماكوبيا الفرنسيَّة. بينما يصف كتاب الوصفات الوَطنيّ أستات الرَّصاص القاعدي فقط.

إنَّ التَّركيبات الواردة أدناه هي لذكرى التاريخ .

غسول أستات الرصاص القاعدي، ماء أبيض

ك الرصاص السائل ٢٠ غ	تحت أستان
ف ۹۸۰	ماء عاديّ
	نمزج.

سائل لَبنتي يجب حركه عند الاستعمال (دستور).

استُعمل كمصرّف في الرّضات والكَدْمات والصّاخات والمَلْخات والتواءات المفاصل.

نظام الجدول Régime du tableau C

إن هذه التَّركيبة، التي ذُكرت في دستور أدوية ١٩٦٥، أعيد ذكرها في كتاب الوصفات لعام ١٩٧٤، الذي يشير إلى تفاعلاتها التَّحديديّة، ويُصنّفها كدواء

مُضادّ للكدمة، ومُصرّف. (واستبدل فيه الماء العادي بالماء الشّروب).

غسول غليشرين

وْرَقَ ٢ إلى ٤ غ	بَ
باءناء	4
غليسرين	-

تشقّقات، خدوش، تفسّخات الحلمة، والشفاه، واللسان، والأيدى.

غسول غليسرين مُذَرَّح

روح نشادر عطريّ ١٥ غ غليسرين۸ غ صبغة الذرّاح ٢ إلى ٤ غ ماء ندى البحر المقطر ١٦٠ غ لتنشيط تفريخ الشعر.

غَسُول غُولاند، مستحلب غولاند التجميلي، ليكور غُولاند

المداميني الميافور حوادات
لوز مُرّ ٩٠ غ
ماءماء
سليماني أكَّال ١٨٠٠ غ
ملح نشادرملح نشادر
كحول ١٥٠ غ
ماء كرز غاريا
إنّ دستور ۱۸۸٤ يحذف تحضير هذا
الغسول، وكان دستور ١٨٦٦ يصف ما
یلی: سلیمانی ۱ غرام، ملح نشادر ۱

يوجد في كتب الوصفات مستحضرات مختلفة تتقارب جدًّا من غسول غولاند. نذكر منها:

غرام، مستحلب لوز مرّ ٤٨٠ غرامًا.

°۱ - مستحلب دونكان الزئبقي، الذي يصنع من: لوز مُرّ °٥غ، ماء مقطر ٥٠٠غ، بيكلورور الزئبق ١,٣٠ غ؛

°۲ - مزیج بِیَت لتحضیر الغَسُولات، المحضر من: حامض سیانهیدریك طبی ۸غ، سلیمانی أكّال ۰٫۱غ، مستحلب لوز مرّ ۳۰۰غ؛

۳ - مستحضر سِیْمَرْلِنْغ التجمیلی، المرکب من: لوز حلو ۳۰غ، لوز مُر ۱۵غ، ماء کرز مقطر ۳۰۰غ، بیکلورور الزئبق ۳٫۰غ، صبغة بنجوان ۲۰غ، عصیر حامض ۱۵ غ؛

٤° ماء كَليّدُور، مستحضر إنكليزيّ مُبَرَّأ كغسول غولاند ولكن تركيبته مجهولة.

إن غسول غولاند، الذي سُمّي هكذا من مخترعه، يتمتع في إنكلترة منذ أكثر من مئة سنة بشهرة واسعة جدًّا كدواء وكمستحضر تجميليّ. عندما نريد استعماله نخض القنينة، نبلّل قماشة ونغسل بها الجزء المصاب. في بعض الحالات نترك الكمادة مكانها. أما للنظافة فنخفّفه بالماء.

غسول قلوى

كربونات البوتاسيومم. ٥٠ غ ماء

نذوِّب ونضفى (دستور ١٨٦٦).

غسول مهيِّج (مستشفى مار لويس)

٠ ٨ غ	نشادر سائل
٢٥ غ	دهن تربنتين
١٢٥ غ	كحول مكوفر

فرك وتمسيد فروة الرأس ضد القَرَع. نرفع أحيانًا مقادير النشادر ودهن التربنتين. لم يزل هذا الغسول يوصف حاليًا.

غسول مهيج إنكليزي

 کحول ۹۰ درجة

 خل مقطّر

 خل مقطّر

 ملح نشادر

روماتيزم، شَلَل.

٢٠٤- غَفَث مَثْقُوبِ الوَرَق(١)

Herbe à la fièvre, Herbe parfaite (F) Eupatorium perfoliatum (S)

نَبات من فَصِيلة المُركَّبات يَتَمتَّع بشهرة واسِعة في الولايات المتَّجدة الأمريكيَّة بالخصائص التّالِيَة: مُقوِّية، مُبوِّلة، مُعرِّقة، مُسهِّلة قَويَّة حسب المقادير.

غ ف ث

غ ف ٹ

٢٠٥- غَفَث نَدْغِيّ الوَرَق، مِيكانيا غواكُو، غواكُو، هواكُو^(١)

Guaco, Huaco (E)

Mikanie Guaco, Eupatoire à feuilles
de sarriette, Guaco, Huaco (F)

Eupatorium satureiæfolium (S)

يُطلق اسم غواكو أو هواكو، في أميركا الوسطى والجنوبيّة، وفي الهند الغربيّة، على أنواع مُختلِفة من الغَفَث Eupatorium، وهي أنواع من فصيلة المُركَّبات وقسم ميكانيا، سوقها مُلتفَّة، يستعمل عصارتها سكان البلاد الأصلين (عبيد غرناطة الجديدة، هنود المكسيك) لحماية أنفسهم من لَدْغ الأفاعي السامّة؛ وذلك بإجراء تمسيدات وفرثك بواسطة الجذر المُقطّر في ماء الحياة؛ أو بواسطة العصير الممزوج بالروم. إن هذه الميزة الخاصة بالغواكو، والتي كان أوّل من عَرَّف بها مُوتيس من سانْتافِيْه، قد أكَّدها كلِّ من دوهَمْبُولت وبُونْبلاند، وهما يَعتبران أن الغواكو الحقيقي الذي يَستعمله الهنود هو الميكانيا غواكو .Mikania Guaco Willd وهـو نـوع عارش، يوجد منه في الأسواق خليط من السوق والأوراق والأزهار؛ أمّا الأولى فهي وحدها تقريبًا المُستعملَة في الطبّ. وأنه من الخطأ ما يذكره بعض المراجع من أن الأوراق هي القسم

الوحيد المُستعمَل في الطبّ من ذلك النّبات.

الخصائص والاستعمال - وجد فُوريه في السوق والأوراق مادّة راتنجانيّة مُرَّة تُدعى غواسِيْن Guacine. نُصِح بنقيع القشرة والأوراق في علاجات موضعيّة ضِدّ السّفلِس (قُنْسان غُومَز)، وعلاج نَوعَى خاص ضِدّ الكَلَب (هاوكنغز)، ولمحاربة الكوليرا (شابَرت)؛ وفي معالجة الرّوماتيزم. ونُصِح، للاستعمال الدَّاخِلَىّ، بنقاعة ٢٠ بالألف، وبصبغة كحوليّة من ٥ أجزاء من الروم أو من ماء الحياة مقابل جزء واحد من الساق، وبخليط مُؤَثْيَر؛ ونُصِح، للاستعمال الخارجي، بالصّبغات المُؤثيرة والصّبغات الكحوليّة في تمسيدات وفَرْك، وبالنَّقيع المُركِّز وبعصير النَّبات الطّازج.

إن هذا النبّات قد يكون فعّالًا جدًّا ضِدّ الأكزيما وضِدّ الآكلة والأكال والحُكاك والهَرَشان. مسحوق من غرام واحد إلى أربعة في اليوم. مُستخلص مائع غرام واحد مرة واحدة، أربع غرامات في اليوم. صبغة من ٣ إلى ٩ غرامات في اليوم بمقادير صغيرة تُكرَّر غالبًا.

ملاحظة - تُستبدَل في الأسواق أحيانًا سوق الغواكو بسوق أنواع الأرسْتُولُوخية أو بسوق الپاريرا برافًا. إن النَّباتات القَويّة العِطْر المُستحَبّ التي استُعمِلت على أنّها غواكو تنتمي كلها، حسبما يقول

⁽١) التَّسميات العربيَّة والتَّسمية الفرنسيَّة الثَّانية للمؤلِّف.

غيبورت، إلى جنس أرِسْتُولوخية. وإن النَّبتة التي تُشكِّل حتى اليوم القسم الأكبر من الغواكو التِّجاريّ هي الأرِسْتُولوخية الصَنْجِيّة (١) Aristolochia الزِسْتُولوخية الصَنْجِيّة (cymbifera Mart)، التي تُعرَف في البرازيل باسم Milhomens.

Glucose liquide غلوكوز سائل (F)

الغلوكوز السّائل هو محلول مائيّ مُكرَّر بواسطة د - غلوكوز، ومَلْتوز وسُكَّريات ذات أوزان ذَريّة أعلى، شَنِيظَة Polymères د - غلوكوز، تحصل بتحليل النّشاء الغِذائيّ النَّقيّ تحليلًا مُتحفظًا.

يحتوي الغلوكوز السائل على ٢٥٪ كحد أدنى من السّكاكر المُحلِّلة كيميائية، المُعبَّرة بالغلوكوز اللامائي والمَحسوبة بالنِّسبة للمادّة المُجفَّفة؛ بعد التَّحليل المائي، يحتوي منها على ٧٥٪ كحدٍّ أدنى.

المواصفات - سائل سميك جدًا، يُسْحَبُ خيوطًا بالجَذْب، شَفّاف، عديم اللَّون إلى مُصفر اللَّون الخفيف جدًا، عديم الرّائحة، طعمه سُكَّريّ خفيف. يَذوب في الماء، قليل الذَّوبان جدًا في الكحول.

يُستعمل في تحضير مَعاجين مَخْزَنيّة.

مُولُفوغَيّا كُول سولفُونات البوتاسيوم، سُولُفوغَيّا كول Gaïacol sulfonate de potassium, Sulfogaïacol (F)

 $C_7H_7O_5SK = 242,3.$

غ ي ا

مسحوق بِلُّورِيّ أو بِلُّورات عديمة اللَّون رائحتها رائحة الغيّاكول الخفيفة، طعمه مرّ؛ يَذوب جدًّا في الماء (٥ أجزاء ماء بارد أو جزء واحد ماء غال)، يذوب في ١٥٠ جزء كحول أثيليك؛ لا يذوب في الأثير. يحتوي على ١٦,١٤ من البوتاسيوم الغياكول وعلى ١٦,١٤ من البوتاسيوم بالمئة. يحتوي السولفوغياكول كحد أقصى على بالمئة. يحتوي السولفوغياكول كحد أقصى على بالنسبة للمادة اللّامائية. يمكنه أن يحتوي على نسبة خفيفة جدًّا من ملح بوتاسِيّ.

الاستعمال - شراب سولفوغياكول للسكري.

إن شراب غيّاكول شولفونات البوتاسيوم أو شراب سولفوغياكول بنسبة ٥٪ يوجد في كتاب الوصفات الفرنسيّ الوطني عام ١٩٧٤.

إن السولفوغياكول هو واحد من مُركِّبات عدد كبير جدًّا من المُستحضَرات الصَيدليّة مع الأوكاليپتول والمُطهِّرات التَّنفسيَّة. نَذكُر على سبيل المثال برومْپاكُس، كَمْفُوبنومِين، أوكاليپتين، نيوكوديون، بولموتيول،

إلخ.

⁽١) التَّسمية العربيَّة للمؤلِّف.

غ ي ا

طريقة الاستعمال - أوصى باستعماله ضِدّ السِّلّ بمقادير من ٢ إلى ٦غ في للجرعة، ٢غ لكل ٢٤ ساعة. شـراب شـكّـري، فـي أقـراص أو مضغوطات من ٠,٥٠غ وفي حقن «Gaïacyl» وتتراغياكولات الكلسيوم شَرجيّة. إنه ليس سامًّا ولا يهيِّج «Galcigal» كانت ولم تزل تستعمل في المجاري الهضمية.

مقادير الفرماكوبيا الحديثة

المقادير الاعتيادية للبالغين: ٠,٥٠غ

إن غياكول سولفونات الكلسيوم البلاد الجرمانيّة. إنها أقل عملًا كاويًا من الغياكول.

٢٠٨- فَحْم حَيَوانِيّ مُنَقّى، أَسْوَد حَيَواني مُنَقِّى Charbon animal purifié, Noir animal purifié (F)

فحم حيواني مسحوق (٢٢) ١ كلغ حامض كلورهيدريك مخزني ١ كلغ ع ل ماء مُقطَّ

دستور أدوية ١٩٦٥. ينتج الفحم الحَيواني المُنقى من الفحم الحَيواني المغسول.

نَحلّ الفحم بالماء في إناء أو بَرْنِيَّة سِعَتها ١٠ ليترات. نُضيف الحامض رويدًا رويدًا ونُحرِّك باستمرار. نترك الكل طوال ١٢ ساعة. نُحرِّك من وقت إلى آخر. نترك المزيج يَتركَّد. نُصَفِّق ونغسل بالماء المُقطِّر السّاخن حتى لا يعود ماء الغسيل يُعطى تفاعلًا حامضًا وأن لا يضطرب من جَرّاء محلول من نيترات الفضة NO3Ag. نُسكب على قماش، نُصفّى ونُجفّف. نُسخِّن الموادّ الحاصلة في المِحَم بحوالي درجة ١٥٠ سغ؛ نُمرِّر على منخل حرير ونحفظ في قارورة محكمة.

ملاحظات الكودكس – يُستعمل الفحم

الحيوانيّ المُنقّى في إزالة لَون بعض فحم المُستحضرات العِلاجيّة؛ وتكون قُوّته المُزيلة للَّون أقوى على السّاخن منها على البارد؛ وتكون أشد فعلًا في الليكورات المُعادَلة ممّا تكون عليه في الليكورات القِلويّة. ويَتحلّى أيضًا بخاصَّيَّة تَثبيت مَوادّ مُختلِفة، مثال بعض المُركِّبات المعدِنيّة، والستريكنين، والديجيتالين، إلخ. ولكن كافة هذه المواد بالإضافة إلى المواد الملونة ذاتها، تبقى من دون تفكُّك، فيمكن بالتالى استعادتها من الفحم الحيواني بواسطة حالً ملائم. يُحفَظ الفحم الحيواني المنقى في قارورات مقفلة تلافيًا لامتصاص الرّطوبة والغازات الجويّة .

> الخصائص والاستعمال - كان البروفسور سان جاك أول من استعمل الفحم الحيواني المنقى في الطبّ البشريّ بعد الأبحاث التَّجريبيّة التي قام بها البروفسور كُوشلان. وكان يقوم بذلك في زَرْقات ضمَوريديّة من محلول مُعَلّق من الفحم الحيوانيّ (كربون ضمن الوريد .I.V.C). إن تلك المحاليل المُعلِّقة تعمل كمضادة للعدوى على غرار عدد كبير من المواد الغَروانيّة.

> عام ١٩٣٥ نصح الدكتور مَنَتْرال Ménétrel باستعمال الفحم النَّباتيّ المُفَعّل بدلًا من الحَيوانيّ المُنقّى لأن نَخْلَه الانتقائق كان يُؤدّي إلى فصل

ف رن

الحبوب الزّائدة الحجم عن الحبوب الناقصة الحجم بشكل أسهل، ذلك أن الأولى تُسبِّب السَّدَّات والصِّمامات، والثانية تسبُّ التَّصادُمات.

إن عمل الفحم المضاد للعدوى ضمن الوريد (I.V.C.) يبدو عامًّا جدًّا، ولذلك يُنصح به في حال الإصابات النَّفاسِيَّة، وحالات خَمَج الدم أي تَعفَّنه أو تسمُّمه، وفي حال اعتلالات المفاصل والروماتيزم المفصلي الحاد، وفي الأمراض الجلديّة. كما يُجيز تأثيره المضادّ للسُّمّ Antitoxique استعماله، بالاشتراك مع الستركنين أم لا، في حال التَّسْبيخ البَرْبيتُورِيّ أي الغيبوبة العميقة المتسبّبة عن الأدوية البَرْبيتُورِيَّة. ويُعطى ٧١٠- فُشّاغ الفحم كمضاد للشم مثلاً ، بمقدار ٥ إلى ٣٠ غرامًا عن طريق الفه.

> ٢٠٩- فَرْنُونِيَة طارِدَة للدُّود، رُغْل طارِد Vernonia vermifuge (E) Vernonie vermifuge, Conyze vermifuge (F) Wurmabführendvernonia (D) Vernonia anthelminthica, Conyza anthelminthica, Baccharoides ascaricida (S)

المُرَكِّبات معقودة التَّعريف على اسم البوتاني ڤُرنُون. القرنونية الطاردة للدّود

نَبات معمَّر قويّ يعلو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه متعاقبة، بسيطة، بَيضيّة الشَّكل السِّنانيِّ. رؤيساته عذقيَّة التَّجميع الواسع. أزهاره أنبوبية، خُماسية السيور، ثُنائية الأقلام المتطاولة المِخْرَزيّة الرّأس. أكناته مُزوّات ومقطومة. مهده الهيمالايا.

الخصائص والاستعمال - نبات مُرّ طارد للدود خاصة بثماره. قيل عن أنواع هذا الجنس عامة أن جذورها دافعة للحمّى، مقيئة، طاردة للدود؛ وأن أوراقها وأزهارها تستعمل استعمال الشاي.

Sarsaparilla (E) Salsepareille (F) Stechwinde (D) Smilax (S)

يُتَّفَق على اعتبار قسم الفُشاغ القِشريّ أنّه أكثر فعالية من المَديتُوليوم^(٢) Méditullium. أجود فشاغ هو الذي يكون طعمه أقوى من سواه وأكثر إغشاءً.

المُركِّبات - يحتوي الفُشاغ على بقايا زیت دهنی، نشاء، راتنج، وعلی ٥٪ صابونوسيدات ستيرويدية Stéroïdiques جنس نَباتات مُعمَّرة من فصيلة (هـرمـونـات): الـيـارلـيـن، السميلاصابونين، السَّرْصابونين الذي تشطره الحوامض المعدِنيّة إلى غلوكوز

⁽٢) التَّسمة العربَّة للمؤلِّف.

وإلى سَرْصابوجانين.

الخصائص - يَتحلَّى بخصائص مبوَّلة، فيؤخذ من نقيعه المغلي حوالى ٥٠٠ ملل في اليوم (٥غ لكل ١٠٠ غ)؛ ويُستعمل كمنتٌ في الروماتيزم وأمراض الجلد.

الاستعمال - روماتيزم، أمراض جلدية، رُمال، سفلس.

طریقة الاستعمال – مسحوق من ۳ إلی ۲، مستخلص مائي من ۰٫۰ إلی ۲، مستخلص کحولي من ۰٫۰ إلی ٤؛ مستخلص مائع من ٤ إلی ۱۲؛ شراب بسیط أو مرکّب من ۲۰ إلی ۱۰۰؛ نبیذ بسیط أو مرکّب (دهن مرکّز) من ۲۰ إلی ۱۰۰، صبغة (دستور ۱۹۳۷) من ۰ إلی ۱۰، غرامًا؛ نقیع ۰۰ بالألف.

زهورات تحضر بالنقاعة السّاخنة الطَّويلة الأمد: Digestion.

يشتهر الفشاغ أنّه أفْعَل بكثير وهو غَضّ ممّا إذا كان مُجفَّفًا. لذلك يستعمل في بلاده الأصليّة Per Os، وبنوع خاص في نقيع مغليّ، ضدّ السفلس والأمراض الجلديّة. مستحضر كبير الانتشار في أمريكا باسم "فشاغ بريستول"، هو عبارة عن نقاعة فشاغ مُكَحْلَلَة بعض الشّيء ومشحونة بالحامض الكربونيّ ممّا يجعلها مشروبًا غازيًّا.

لكى يدخل الفشاغ في هذه المستحضرات، أو لكي يُسَلَّم كما هو، يجب أن يُشَق طوليًّا، ومن ثم يُقطع

بالعَرْض. ولكي يسهل شقّه نرشّه ببعض ف ش ا الماء أو ندعه القبو لبعض الوقت. إن أهم أصناف الفشاغ الكاذب هي جذر شعادى الرّمال(۱) Carex arenarial L. الني يُعرف بفشاغ ألمانيا والذي أعيد تسجيله في الإصدار التاسع للفرماكوبيا الفرنسية، وجذر "باهرة كوبا"(۱) Agave cubensis Aralia لعارية العارية المعدد الأرالية العارية الهند(۱) وجذر بَلَخِيَّة الهند(۱) وحتى جذر الوَقُل الخاشع . Chamærops humilis L.

China smilax, وَشَاغَ صِيْنِي -۲۱۱ Chinese root (E) Squine, Smilax de Chine, Salsepareille squine, Esquine, Racine de Chine (F) Chinastechwinde, Chinawurzel (D) Smilax china (S)

نَبات مُعمَّر من فصيلة الزَّبْقيّات. ساقه ليفيَّة قليلة الشَّوك. أوراقه بَيضيّة الشَّكل، قلبيّة القَّكل، قلبيّة القاعدة، مُستدقّة الرّأس، نصلها جامد النَّسيج الأخضر اللّامع، عادم الشَّوك. جذره وتديّ الشَّكل تكتنفه بعض العساقل المستطيلة الحمراء اللون المأكولة. جذوره أو بالحري ريزوماته تصل الأسواق من الصين واليابان، وتقع في قِطَع كبيرة ومتدرِّنة كالبطاطا؛ وتكون في بعض الأحيان متطاولة

⁽١) التَّسميات العربيَّة للمؤلِّف.

ف ص

الشَّكل المسطَّح، بنيَّة اللَّون الخارجيّ، متورِّدة الباطن، ويكون نسيجها تارة راتنجيّ متراصّ وصلب جدًّا، وطورًا خفيف وإسفنجيّ. وهي قِطَع عديمة الرَّائحة وطعمها حِرِّيف.

المُركِّبات - عفص، راتنج، صابونينات.

الخصائص - مُنَقَّ، أعيد تسجيله في الفرماكوبيا عام ١٩٧٦.

الاستعمال - في كل الحالات التي يُستعمل فيها الفُشاغ السَّهْميّ.

طريقة الاستعمال - مستخلص مائي بمقدار ٢٠,٠غ إلى غرامين في اليوم.

٢١٢- فَصّ الحِمار(١)

Donkey-fart (E)

Pet d'âne (F) Eselfurz (D)

Onopordum 1 (S)

جنس نباتات مُحوِلة من أُنبُوبِيَّات الزَّهر وفصيلة المُركَّبات، شائكة جدًّا وغالبًا ما تكون كبيرة القَدّ. رُؤيساتها فرديّة أو عِذْقيّة التَّجميع، ضُرِّيّة، عديدة الأزهار. قُناباتها كاملة تمامًا، مُتراكِبة، شائكة أو مُستدقّة الرّأس. قرصها لحميّ بعض الشَّيء ومُنَخْرَب. التّاج مفتوح. خيوط الأسدية مَرْطاء وحُرّة. الأكنات مَرْطاء، رُباعيّة الزّوايا. القُنْزُعة مُعبِلة، حرائرها خشنة

٢١٣ - فَص الحِمار الحَرْشَفي، أَقْسُون
 حَرْشَفي الشّكل، قَنْدَريس لُبْناني، أَقْسُون
 نَديفي (٢)

Cardoon's shape donkey-fart, Cardoon's shape onopordon, Lebanese donkey-fart (E)

Onopordon carduiforme, Onopordon floconneux, Onopordon du Liban (F) Flockig eselfurz, Libanesisch eselfurz (D)

Onopordum carduiforme, Onopordum libanoticum, Onopordum tel-avivense (S)

نَبات مُحول عَنْكَبوتي الكساء أطحل اللَّون قد يَتَخطّى المتر. ساقه مُنتصِبة، قليلة التَّفرُع الهاميّ، قصيرة الجناح، شائكة على كامل طولها. أوراقه ريشية التَّقسيم إلى شُدفات شائكة جدًّا. قطر رؤيساته من ٣ إلى ٥ سم من دون الأشواك. قُنابات القُلافة لا تَتَخطّى ٥ ملم في عرض قاعدتها، تستطيل إلى شوكة ضييقة يبلغ طولها ٢ سم وأكثر،

أو ريشية. يَتمثَّل هذا الجنس في لُبنان بثلاثة أنواع. من أسماء هذا الجنس: أقْسُون، طُوْبَه، رأس الشَّيخ، شُكاعَى، فَصّ الحمار. الاسم الشَّعبيّ السّوري: قَنْدَريس.

⁽٢) كل التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسمية العربيَّة الأولى والتَّسميات اللَّاتينيَّة.

جدًّا. أشواك القُنايات الدُّنيا مُنيسطة أو مُنحنية نحو الخارج، الأشواك الأخرى مُنتصبة.

٢١٤ - فَص الحِمار الخُرْشُوفي، أَقْسُون خُرْشُوفي الرّأس، قَنْدَرِيْس خُرْشُوقي الرّ أس (١) Donkey fart's artichoke (E) Onopordon à tête d'artichaut, Pet d'âne à tête d'artichaut (F) Eselfurz artischoke (D) Onopordum cynarocephalum (S)

نَبات مُحول أخضر اللَّون دقيق الغدد الدَّبقة. ساقه مُرتفِعة، عِذْقيّة التَّفرع، تعلو من ١,٥ إلى ٢,٥ مترين. فروعه طويلة، تكسوها أجنحة ريشية التَّقسيم ومُزوَّدة بأشواك قوية. أوراقه السُفلي سنانية، فُقاعية الصَّفحات الخشنة، ريشيّة التَّفصيص أو التَّقسيم إلى فصوص قصيرة الشُّوك؛ الأوراق السَّاقِيَّة مقتصرة ولاصقة على السّاق. الرّؤيسات كبيرة القدّ، قطرها ٣,٥ إلى ٥ سم من دون الشُّوك. القُنابات مَرْطاء أو خفيفة الكساء العَنكبوتي، مُتراكِبة، حادة، تبلغ ٥ إلى ٨ ملم في أقصى عرض لها، متطاولة الشَّكل المثَلَّث، تعرض قليلًا بعدها تدريجيًّا إلى رأس حادً، جارح.

(١) كل التَّسميات للمؤلِّف ما عدا اللَّاتينيَّة.

(٢) كل التَّسميات للمؤلِّف ما عدا اللَّاتينيَّة.

مُسطَّحة الصَّفحة الدّاخليّة، حادّة الرّأس ٢١٥- فَص الحِمار المُغايِر الشَّوْك، قَنْدَريس مُغاير الشَّوكْ (٢) donkey's fart, Heterospiny onopordum (E)

Onopordon à épines variées, Pet d'âne à épines variées (F)

Onopordum heteracantha (S)

نَبات مُحول لِبدي الكساء، أطحل اللُّون، قد يعلو أكثر من متر. ساقه بسيطة أو قليلة الفروع، هامشها ضيِّق ودقيق الشُّوك. أوراقه سِنانيّة، ريشيّة التَّقسيم، كثيفة الشُّوك، الأوراق الساقِية مُختَصرة والاصقة على السّاق. رؤيساته كبيرة القَدّ قطرها ٢,٥ إلى ٤ وحتى ٧ سم من دون الأشواك. القُلافة لِبديّة، قُناباتها السُّفلي مُتراكِبة قصيرة الشَّكل المُثلِّث، قصيرة الأشواك، الوسطى مُتطاولة، تخفّ إلى شوكة طويلة، ٢ إلى ٤ سم، منحنية نحو الخارج، القُنابات الأعلى تنتهى بشوكة حادّة.

الخصائص والاستعمال - إن مركبات أنواع فَص الحمار غير متوفّرة، وهي أنواع مأكولة تُعرَف شعبيًا باسم «قَنْدَريس». ولقد أوردت الموسوعة في علوم الطّبيعة أن هذا النّبات «يُقَشّر طريًّا ويؤكل فيدفع التَّشنُّج والكزاز» (جزء أول، ص ١٠٦، رقم ١٨٩١، طبعة ثانية). أما «فص الحمار» فترجمة اسم الجنس عند حولى ثلث طولها السُّفلي، وتخفّ اللّاتيني من ONOS حمار ومن Pet ، PORDUM فص.

٢١٦- فوافُوتْسِي، ثِمار بَيْضاء ف و ا

Voa-Fotsy (E)

Voa-Fotsy (F)

Voa-Fotsy (D)

Aphloia sp. (S)

الفوافوتسي هي أوراق تأتي من أنواع مختلفة من جنس أفلُويا وفصيلة النُّعْضِيَّات، مهدها مدغشقر، وجزر المحيط الهندي وبعض جبال أفريقيا الشُّرقيّة. إن كلمة فوافوتسي هي تعبير مَلْغاشى يعنى «ثمار بيضاء» بسبب العُنَيْبات الصَّغيرة العديدة التي تُغطّي بالملاريا. فروع الشَّجرة في موسم النضج، وهي عُنيبات مأكولة. الشُّجيرات لا تَتَخطّى ٣ أمتار؛ أزهارها صغيرة جدًّا، أوراقها من ٢ إلى ٤ سم، سِنانية، حادة الرأس،

أنواع للتداوي، منها:

مُفَرّضة الحوافي بعض الشيء.

- Aphloia mauritiana Baker (Syn.: Aphloia theæformis Benn., Neumannia theæformis A.Rich. et variété integrifolia Benn.).
- Aphloia madagascariensis Clos
- Aphloia minima Bak.

وهم يفضِّلون الضَّرب الصَّغير الورق، ويستعملون الأوراق النصف مُجفَّفة ذلك أن التَّجفيف يذهب بقسم من الخصائص الطسة .

إلى هذا العقار كلّ من هاكل عام ١٩٠٩، شوڤالييه ودَنْدريو عام ١٩١٠، إلخ. عزل ر. باريس عام ١٩٤٢، من الأوراق تتراهيدروكسي فلاڤون متبلّر، دُعي أَفْلُويْدُول، ونسب إليه جُزئيًا عمل الأوراق. الطبّ الشّعبيّ يَستعمل الأوراق ضدّ إصابات مختلفة: الحَبَن، الاستسقاء، التَّعقيبة وحُرقة البول؟ القشرة قد تكون مقيّئة، ولكن عملها الأساسي هو الحُمّي الصَّفراويّة الدَّمويَّة البَيْلَة، التي يصلها الأطباء عادة

طريقة الاستعمال - يُعطى المريض عدة كبايات في اليوم، وقدر ما يريد، من نقيع ٣٠ إلى ٥٠غ وراق في ليتر ماء؛ يمكن إعطاء النَّقيع ذاته في حقن شُرجيّة، ولكن ينصح بعدم إعطاء الكينين طوال فترة يَبدو أن الملغاشيّين يَستعملون عدّة ، النَّوبة (وإذا لزم الأمر يُسمح بشرب خمر الكنكينا). لهذه المعالجة تأثيرات مُدرّة للصَّفراء، مسهِّلة وتُبدِّل مظهر البول بسرعة ملحوظة. تعطى نقاعة بنسبة ١٠ بالألف، وصبغة يؤخذ منها ٢ إلى ١٠غ، ومستخلص مائع من ١ إلى ٣غ. وبالتعميم، نُصح بمستحضر يدعى أَفْلُوِيْن تشترك فيه الأوراق مع نباتات أخرى، وهو مستحضر يُخصّص لاتقاء الاضطرابات الدورية الدموية أو محاربتها.

African Voacanga, (۱۱) أفريقيا، فواكنْغا Thouarsi's Voacanga (E) Voacanga d'Afrique, Voacanga de Thouarsi (F) Afrikanischer Voacanga, Thouarsische Voacanga (D)

Voacanga africana, Voacanga Thouarsii (S)

نَبات طبِّي من فصيلة الدِّفْلِيَّات مهده غينيا، منه نوعان: الأفريقيّ والثوارسيّ المنفرج. قام بدراسة هذين النَّوعين، وبالوقت ذاته تقريبًا، كلِّ من كوڤوفيليه وغُوتارَل وجانو في فرنسا، عام ١٩٥٥؛ وكلِّ من لابار وجِيلُو في بلجيكا.

المُركِّبات - أشار المؤلفون أعلاه إلى وجود نسبة ١ إلى ٣,٥ بالألف من القِلَويدات التي تمّ الحصول عليها بحالتها المُتبلَّرة، في قشور الجذع والجذور: فواكامِيْن، فواكَنْغِين، فُوبْتُوزِيْن Vobtusine.

الخصائص - كشفت الدراسات الفرماكوديناميّة أنّها قلويدات مُهبّطة للتَّوتُر الشِّريانيّ، وبالإضافة إلى ذلك، إن قِلَويدات فواكنغا أفريقيا هي مُقوِّية قلبيّة بُطَيْنِيّة تعمل مباشرة على عضلة القلب. إن تأثيرات هذه القِلَويدات القلبيّة والدوريّة الدَّمويّة هي مشابهة لتأثيرات المقوِّية للقلب.

(١) التَّسميتان العربيَّتان للمؤلِّف.

۲۱۸ - فُوْل إِنْنِياس، سترِيكْنُوس إِيْنِياس ف و ل St. ignatus bean (E)

Fève de Saint-Ignace, Strychnos ignatier, Vomiquier amer (F) Bittere ignatie, Ignatienbaum (D) Strychnos ignatii, Ignatia amara (S)

جَنْبَة عارشة سَرْعيّة من فصيلة اللُّوغانِيَّات. أوراقها بَيضيَّة الشَّكل مُستدقَّة الطَّرف. أزهارها بيضاء. ثمارها كُرويَّة بحجم البرتقال الصّغير، طولها من ٢ إلى ٣ سم وعرضها ١٥ إلى ٢٠ ملم. الفول غير منتظم ومُشوَّه الشَّكل بسبب الضغط المتبادل بين البزور داخل النَّمرة، وهذا ما يُشكِّل عِدّة وجوه مسطَّحة. وجه النُّمرة قاتم اللُّون النُّنِّيِّ أو كامد اللَّون البُنِّيّ، مُبرغَل المظهر أو دقيق التَّحبُّب، مُرَخَّم ببقع مَرَدُّها إلى الأوبار. على أحد طرفي النَّمرة سُرّة ظاهرة جيِّدًا. أما السُّويداء التي تحيط بجنين نباتي صغير وجالس، فهي قَرْنيّة القِوام، بُنيَّة اللَّون. إذا عولجت الثَّمرة بالماء الغالي الذي ينفخها ويُليِّنها، فإنها تَنثر رائحة تُرابيّة وغير مُستحبَّة، بزورها من ١٠ إلى ١٢، يعلوها زغب هُلْبيّ الشَّكل. إن طعم فول إينياس شديد المرارة وسام الخصائص أكثر من خصائص جوز القيء.

المُركَّبات - يحتوي فول إينياس على ستريكنين، وبروسِين مشتركين مع حامض إينيازوريك؛ تتوزَّع القِلَويدات على كافة خلايا السُّويداء. يُعطى هذا السويداء،

ف و ل

على غرار سُويداء جوز القيئ، بالتَّحليل المائتي مع حامض سولفوريك بنسبة ٣٪، مَنُوز وغَلَكْتُوز. ومن المحتمل وجود مختلف أنواع المَنّانات والغَلَكْتانات ذات الوزن الذريّ المختلف، في البزور. أما لتعيير القِلَويدات في فول إينياس فيتم التَّقيُّد بما جاء عن ذلك في مقال جوز القيء.

إن فول إينياس وجوز القيء يحتويان على الكمِّية ذاتها تقريبًا (٢,٥٠٪) من القِلَويدات العامّة. ولكن فول إينياس هو الأفعل من هذين العقارين لأنّه يُوجد، في مجمل قِلويداته العامة، حوالي مرتان أكثر من الستريكنين مما في قِلَويدات جوز القيء.

الخصائص - إن خصائص فول إينياس واستعمالاته هي ذاتها خصائص واستعمالات جوز القيء والستريكنين. وذكر أنها مُقوِّية، مُشهِّية، هاضمة، وهي ترياق ضِدِّ المنوِّمات البَرْبِيتُوريّة.

الاستعمال - وَهَن، كسل المعدة، سَيلان مَنوي، سَلَس بَول ليلي، شَلَل كُحولي، تسمُّم بالمهدِّئات والمنوِّمات البربيتورية.

طريقة الاستعمال - مسحوق البزور برور إلى ١,٠٠ في أقسراص أو بيلولات؛ المقادير القصوى حسب دستور الأدوية ١٠,١٠غ لجرعة واحدة، ٣٠,٠٠غ لكل ٢٤ ساعة للبالغين. وهو يستعمل فقط لتحضير نقاط بُوميه المرّة (صبغة فول إينياس المركّبة) التي يساوي

الغرام الواحد منها ٥٤ نقطة. المقادير الاعتيادية ١٠,٠غ للجرعة، ٣٠,٠غ لكل ٢٤ مناعة للبالغين. المقادير القصوى ٢٥,٠٠غ لمرة واحدة، ١٩٤٥غ لكل ٢٤ مناعة، حسب دستور ١٩٤٩. المقادير الولادية: من صفر شهر إلى ٣٠ شهرًا، لا يستعمل؛ من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة: ٤ إلى ١٠ نقاط.

سام. - جدول Toxique. - Tableau A

Calabar bean (E) فُوْل كَالابَار - ۲۱۹ Fève de Calabar, Physostigma vénéneux (F)

Kalabarbohne (D)

Physostigma venenosum (S)

نَبات عارش من فَصيلة القَرْنِيَّات الفَراشِيَّة يَنبت في أفريقيا الغربيّة عامّة، وعلى ساحل كالابار في نيجيريا بنوع خاص. ساقه ليفيّة سماكتها ٥ سم تَعلو حتى ١٥ مترًا؛ يتَميَّز هذا النَّبات بسِمَته المُنتفِخة الشَّكل الهلاليّ (الاسم العِلميّ من كلمتين بمعنى نَفَخَ، سِمَة). أوراقُه عريضة، مُتعاقبة، مُثلُثَة، أزهاره فراشيَّة الشَّكل، عُنقوديّة التَّجميع المُتدلّي.

الثَّمرة قَرْن قاتِم اللَّون البُنِّي، طوله من ١٥ إلى ٢٠ سم، يحتوي على ٣ حبوب أو فُولات لَونها كالشوكولاته، طولها من ٢ إلى ١٥ ملم وتزن حوالى ٣ غرامات؛ وهي عديمة الطَّعم، عديمة الرّائحة، سطحها مالس أو قليل التَّحبُّب، لونها بُنِّي شوكولا.

أُعيد تَسجيلها في الفرماكوبيا عام ١٩٧٥ .

هناك ضرب من نوع متقارب جدًّا من فول كالابار تُطلق عليه تسمية: فول كالابار تُطلق عليه تسمية: Physostigma macrocarpum تكون حَبَّه نسبيًّا أقلّ عرضًا وأكثر طولًا. يكون طرف هذه الحبوب المحدَّب مُخْتَرَقًا طُوليًّا بثلم أسود (سُرَّة) بارز جدًّا ومالس جدًّا يبلغ عرضه ٢ ملم. وهو معقوف على شكل مِزراب ومُطرَّز بنوع من النتوء مع شريط وَسَطى رقيق.

ويكون الطَّرف الآخر مستقيمًا تقريبًا. وتبرز على الطَّرف الأكبر حجمًا فجوةٌ صغيرة هي السُّمّ (ثقب البُيْيْضَة النَّباتيّة).

وتتألّف اللّوزة من فلقتين بَيضاويتي اللّون، كبيرتي الحجم، مُحَدَّبَتين مُ مُقَعَّرتين، تبرز فجوة ظاهرة بين سطحيهما البطنيّين. إن هاتين الفلقتين، الطّحينيّتي المظهر، المملوءتين بالنّشاء، هما مندمجتان متماسكتان، لا يمكن حزّهما بالظفر الذي يترك عليهما أثرًا لامعًا فقط. الفُولة الجافة تَطفو على الماء؛ طعمها خفيف، رائحتها معدومة الماء؛ طعمها خفيف، رائحتها معدومة وهي باردة؛ ولكنّها تَنشر، بتأثير الحرارة، رائحة حامزة بعض الشيء.

سام . - جدول Toxique. - Tableau A الخصائص العلاجية - وَصف هذا الفول الدكتور دانيال عام ١٨٤٦ في إنكلترة، ودرسه من النّاحية السَّميّة، عام ١٨٥٥، كريسْتِسُون الذي لاحظ أن عمله يرتكز على شلل القَلْب؛ وكان هذا الفول

يستخدم في مقاطعة كالابار قديمًا كفول تجربة أو امتحان Ordeal bean, Fève d'épreuve يُسمّيه أهل تلك المنطقة شعبيًّا أزارا éséré؛ وكان المُتَّهمون بجريمة يُخضَعون لتجربة قُوَّته السامّة بهدف تقرير براءتهم أو ذنبهم. تحتوي تلك الفولة بالحقيقة على قِلَويد بُنِّي اللَّون الأصفر، عديم الشَّكل، سامّ جدًّا، دعاه كل من جُوْبُشت وهَس فِيزوشتِغْمِين، ودعاه سواهما أزارين الذي اشتهر، كالفول ومستخلصه الكحولي، بخاصة تقليص البؤبؤ. وهو مُعاكس الأتروبين والبلادون. إن تأثيره هذا يَحدُث إذا أعطيناه بالفم أو موضعيًّا. إن طريقة استعماله الموضعيّ الأكثر شيوعًا في الماضى كانت في ما يُسمّى الورق المُكَلْبَر (۱) Papier Calabrisé أو ورق كالابار، وهو مصنوع من ورق بَرْزَاليوس Berzélius المشبع بحلول من مُستخلَص فول كالابار؛ يُقسَّمُ ذلك الورق إلى قِطَع من سم واحد وإلى قطع من أعشار السمّ المربع؛ يحتوي كل سم على ٢ ملغ من المستخلص. إستَبْدَل هارْت الورق بالجيلاتين فصنع منه أقراصًا صغيرة ومَرنة، تُشبه قوالب الأختام الشفّافة، وتنحل أجزاؤها الدَّقيقة بسرعة في العين. غيرالدس استعمل بنجاح قطرة مُركَّبة من جزء واحد مستخلص محلول في ٥ أجزاء غليسرين، نقطة واحدة من

ف و ل

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

ف و ل

هذا المحلول بين الجفنين تكفي للحصول على تَقلُّص البؤبؤ . وحسب روبرتُسُن وغرانييه ، إن وضع هذا الفول على العين يُحدث قِصَر النَّظر Myopie في بداية الأمر ، ومن ثم تقليص البؤبؤ . إن تلك التأثيرات يقضي عليها الأتروبين ، وبطريقة متبادلة ، فإن تأثيرات تلك تلغي تأثيرات هذه .

نُصِح بمسحوق فول كالابار ضِدِّ بالمئة من الرَّقص (مَرض عَصَبيّ)، واستُعمل في الهيوليّات. أميركا بنجاح في حالة تكزُّز صَدْميّ، وني إصابات الجهاز فول كالابار العَصبيّ؛ محلول المستخلص المُغَلْسَر غرام من القاستُعمل بنَجاح أيضًا في التَّخلُجات عند تُخلط أحال الأولاد؛ ويمكن وقف التَّسمُ بواسطة المُقُونَة ana المَقونة وهي طرق الستركنين أو وقف تَخلُجات الكزار وهي طرق بواسطة جرعة مناسبة.

استَخرجَ كلَّ من فِيْه ولُوفَن من فول كالابار قِلَويدًا يَتبلَّر بنسبة ١,٠ إلى ٢,٠ بالمئة، دعياه أزارين. واستخرج منه هَرْناك قلويدين هما فِيزوسٍتِغمين أو أزارين، يذوب في الأثير، ويمتلك عملًا Myotique وكالابارين، لا يذوب، وتكزّزيّ.

وأشار من ناحية أخرى، كلِّ من بولونوفسكي وتِتْزْبَرْغ (١٩١٥) إلى أهمية قِلَويد خاص، جانازارِيْن، يقارب الأزارين ويختلف عنه بذرة واحدة أكثر من الأوكسيجين. وأن الأمر لهو كذلك أيضًا بالنسبة لمشتقات قاعدتين هما: أزارولِين وأزاراتول، جانازارولين

وجانازاراتول. كذلك استخرج هَسَ من هذا الفول ستيرولًا هو الستيغماستيرول، مشابه للفيتوستيرول.

ولقد وجد فرايز الأزارين في نوعين برازيليّين من جنس متقارب هو جنس Dioclea .

يوجد في فول كالابار، إضافة إلى ما تقدم، حوالى ٥٠ بالمئة من النشاء، ٢٥ بالمئة من الأليرون، ٢٠ بالمئة من الهيوليّات.

ونری بنتیجة التحالیل أن ۱۰۰ غرام من فول کالابار تحتوی علی حوالی ۰٫۸۰ غرام من القلویدات.

تُخلط أحيانًا حبوب الكالابار مع حوب المُقُوْنَة Mucuna ومع حبوب نخل الزّيت وهي طرق في الغش يسهل كشفها وتمييزها.

يُستخدم فول كالابار فقط لتحضير الأزارين المستعمل في طبّ العيون لزرق العَين، وذلك على شكل سالسيلات.

أشكال صيدلية ومقادير - مسحوق الحبوب، من ٠,٠٥ إلى ٠,٠٠ ملغ مستخلص؛ ٢ ملغ إلى ٠,٠٠غ صبغة خماسية من ٠,٥٠غ إلى غرام واحد، في عدّة مرّات.

Phénole مينول سُولْفُوريسيني Sulforiciné (F)

من مُشتقّات الفينول الرئيسيّة.

سائل يحصل بحل ٢٠ غرام من الفينول في ٨٠ غرام من سولفوريسينات الصوديوم (بالإضافة إلى هذا المحلول من ٢٠٪ من الفينول، يمكن كذلك تحضير محاليل من ١٠، ٣٠، ٣٠، ٤٠٪). نُصح به في ملامسات ضِد أغشية الدِّفتيريا الكاذبة، بمعدل ٥ أو ٢ مرات في اليوم، وكذلك ضد قُرْحات البلعوم السَّلْية.

سُولْفُوكَرْبُول، أَسَيْتُول (F) Sulfocarbol المؤلفُوكَرْبُول، أَسَيْتُول الرئيسيّة.

حامض سُوزُولِيك؛ حامض أورتوفينول سولفونيك: يتمّ الحصول عليه صناعيًا،

بترك الحامض السولفوريك مع الفينول، على البارد ولمدّة عدّة أسابيع.

إنّه السّائل الشَّرابيّ القوام الأقل كيًّا من الفينول، الّذي يذوب في الماء، والكحول، والغليسرين. وهو يتألَّف على الأكثر من حامض أورتوفينول - سولفونيك مع كميّة صغيرة من مُشتقّات الكحول العادي الأثيريّة (إذا صحّ أن تحضيره الصناعيّ يعتمد إضافة به من الكحول في النّهاية).

استُعمل كمطهِّر، بديلًا عن الفينول، في محلول مائي بنسبة ٢٪، وآخر بنسبة ٥٪.

ف ی ن

٢٢١ - قانَة بُرْتُقاليّة، مَكْلُورَة بُرْتُقاليّة، شَجَرَة القَش Osage orange, Bow-wood tree (E)

Oranger des Osages, Bois d'arc, Maclure (F)

Osagen apfel, Osagedorn (D) Maclura aurantiaca Nutt., Maclura pomifera Schneid, Toxylon pomifera Rafin. (S)

شَجرة جميلة من فصيلة التُّوتِيَّات تعلو من ١٢ إلى ٢٠ مترًا. جذعها المُعمَّر يَتشقَّق. هامتها واسعة. أغصانها فاتحة · اللُّون الرَّمادي، تكسوها أشواك بسبطة وجالسة. أوراقها عابلة، بَيضيّة الشَّكار قَلْبِيّة القاعدة بعض الشّيء، مستدقّة الرَّأْس، مُعَنَّقَة، طولها ٣ إلى ٥ سم، أوروبًا، وهي اليوم في لبنان. البالغة منها مَرْطاء. أزهارها ثُنائية المَسكِن، الذِّكريّة رُباعيّة الأسدية، طولها ٢ إلى ٣,٥ سم، الأنثى في رؤيسات كُرويّة الشَّكل. الثَّمرة ثقيلة، خضراء ومن ثم صفراء فبرتقالية اللُّون عند النضج، حجمها كالبرتقالة، قطرها ٧,٥ إلى ١٢,٥ سم، سطحها غير منتظم الرقعة، تقع عند النُّضج في تشرين الثاني. تزهر في حزيران.

المُركّبات - نسغ لَبَني يسيل من جَرّاء حَزّ الشَّجرة وأغصانها. الأوراق واللَّحاء ولُبّ الثّمار غنيّة بالموادّ الملوّنة الصّفراء، القشرة غَنتة بمادة دباغتة.

الاستعمال - الثّمار مأكولة ولكنّها تخلو من المذاق المُستحب، كان هنود الأوزاج وهم هنود أمريكيون من قبائل البشرات الحمر، يَصبُغون بشراتهم باللُّون الأصفر يواسطة لُت الثِّمار، قشور الشجرة والأغصان كانت تُستخدم في دباغة الجلود وفي استخراج صباغ أصفر. وكان الهنود يصنعون سهامهم من خشب المكلورة.

تصلح المكلورة سياجًا شائكًا دفاعيًا، كما تصلح لزينة الحدائق والطرق والمَنْشِيّات حيث يمكن زرعها منفردة أو متجمِّعة. تتكاثر بالبزور وبتعقبل الجذور. منها ضروب سَرْحة وأخرى مرقّشة الأوراق باللُّون الأبيض. تُزرع سياجًا فى المِسْيسيبي، وتزرع للزّينة في الولايات الشَّرقيَّة، كما تزرع أحيانًا في

٢٢٢- قُبَّريَّة جَمِيْلَة، قَنْبَر جَمِيْل (١) Beautiful corydalis (E) Corydalle belle (F) Schöne Kletternder (D) Corydalis formosa (S)

القُبَّريّة جنس نَباتات حَوليّة أو مُعمَّرة من

(١) كل التَّسمات للمؤلِّف ما عدا اللاتئة.

Corydalis (E) - تُبَرِيَّة جَوْفَاء Corydalle creuse (F) Kletternder (D) Corydalis cava (S)

ق ب ر

نبات عُشبيّ معمّر من فصيلة الشَّاهْتَرَجِيّات، درنته تحترابيَّة جوفاء تُعطي ساقًا بسيطة منتصبة تَعلو حوالى ٣٠ سم. أوراقه ذات شُدْفَة أو شُدفَتين مزدوجة التَّقطيع الرِّيشيّ الثُّلاثيّ. قُناباته بيضويّة كاملة. أزهاره عُنقوديّة التَّجميع المهاميّ، أرجوانيّة اللَّون الوَرْديّ أو بيضاء، مهمازها دائريّ طويل ومُنْحَنِ. كل أقسام النَّبات سامَّة عنيفة.

المُرَكَّبات - عندما تَجفّ الدَّرنة، سُرعان ما تُصبح جَوْفاء، وتَبعث عِطرًا مُخَدِّرًا ويكون طعمها مرَّا وتحتوي على قَلْويدات عديدة، أهمها: كوريدالين، كوريبولين، كوريدين، كوريكاڤين، إيزوكوريبولبين، بولبوكاپنين وهو عنصر مُهَلُوس، زيت طيار، راتنج...

الخصائص - هابِط للجهاز العَصبية المَرْكزيّ، خافِض للتوتَّر الدَّمويّ، يُخفِّف الحركة الاستِداريّة في المِعَى الدَّقيق، مُهَلُوس. البُولْبُوكاپيرين يقضي على، أو يخفِّف الإحساس بالألم، يؤثر على القَلب وعلى التَّنفُّس، يُنشُط الإفراز الدَّمْعِي واللُّعابي.

الاستعمال - إضطرابات عَصبيّة خطيرة، دوخات، رجفات، إصابة فصيلة الشّاهْتَرْجيَّات. أروماتها لِيفيّة أو دَرنيّة. أوراقها مُتعاقِبة خالية من الأذنات، نصلُها كثير التَّقسيم إلى فصوص أو سُيور. إزهرارها عُنقوديِّ أو عِنْقيّ. أزهارها غير منتظمة، كأسيَّتان مُعبِلتان بَتَلانِيَّتان، أربع بَتَلات مُتَّحدة القاعدة، العُليا كبيرة قاعدتها تستطيل بمهماز، ست أسدية ثُنائيّة الباقة (ديادُلْف). الثَّمرة عُليبة عديدة البزور. القُبريّة الجميلة نَوع مُتقارب من القُبريّة الجوفاء.

المُركِّبات - أسُسها الفَعّالة هي: شالِيدُونِيْن أوكالِيدُونِيْن وهو قِلَويد تركيبُه الكيميائيّ C₂₀H₁₉O₅N دواء مُخدِّر أستعمل بديلًا للأدوية الأفْيُونيّة، يُستعمل بديلًا للأدوية الأفْيُونيّة، كُورِيدالِيْن تركيبه الكيميائيّ كُورِيدالِيْن تركيبه الكيميائيّ (أحد قِلَويدات لأفيون): C₁₁H₁₃O₅N، ومادّة تُدعى كالِيدُوكُزَنْتِيْن Chélidoxanthine).

الخصائص - مُقوِّية، مُبوِّلة.

الاستعمال - الجذور والرّيزوم المسحوق في نَقيع مَغليّ أو مُستخلَص.

طريقة الاستعمال – مُستخلص مائع من 0,0 غرام إلى غرامين في اليوم. صبغة الجذور الخماسية $\left(\frac{1}{6}\right)$: من ۲ إلى ٦ غرامات في اليوم.

الأسماء العَربيّة والأجنبيّة هي ترجمة الاسم العلمي Formosus ، Formosa: de belle forme أي جميل الشكل.

ق ر 1

لمعالجة داء باركنسون وداء الشَّلَل -المُرَعِّش، كونها مهدِّئة وكذلك لعملها البحر الأبيض المتوسِّط. المخدِّر المماثل لعمل المورفين.

> طرق الاستعمال - الطبيب فقط: نُقاعة الدرنات أو نقيعها. إنّ تَعاطى نُقاعة القُبَّريَّة بمقادير قَويَة قد تُؤدِّي إلى آلام في الرأس مُشابهة للآلام التي تحدث عن التهاب السَّحايا. وقد تُؤدّي إلى الموت وذلك بإحداث شَلَل قَلْبِيّ أو شَلَل تَنَفَّسِيّ.

> ٢٢٤- قُرّاص غِشائيّ، قُرّاص مُذَنَّب، قراص مُريب Doubtful nettle, Caudate nettle, Membranaceous nettle (E) Ortie douteuse, Ortie à queue, Ortie

Zweifelhaftnessel, Schwanznessel (D) Urtica dubia, Urtica membranacea, Urtica caudata (S)

membraneuse (F)

نَبات حَولتي من فصيلة القُرّاصِيَّات. ساقه تعلو من ٢٠ سم إلى مترين وأكثر، أوراقه بَيضيّة مقطوعة القاعدة، قَويّة وهي مَكسوَّة بوبر حارق مُتفرّق، ومربّعة التَّسَنُّن، أوبارها حارقة مُتفرِّقة، عنقُها المَقْطع، فَرْعاء، مُنتصبة. أوراقه بَيضويّة مساو لطول النَّصل تقريبًا. إزهراراته تطول حتى ١٢ سم، قلبيَّة الشَّكل القاعدي أو مقطوعة، هامشها عميق التَّسنين بأسنان حادّة الرّؤوس، وبأوبار حارقة متفرِّقة. إزهراراته الذَّكريّة عُثكوليَّة الشَّكل، مُتَوأَمة على إنط

دِماغيّة؛ تَمَّ اللَّجوء إلى خصائص القُبَّريَّة بالأرجوانيّ أحيانًا. إزهراره من كانون الثاني إلى أيّار. إنتشاره على سواحل

ملاحظة - قُرَّيص لبناني لم نقع على ذكره في المراجع المتخصّصة بالنّباتات الطبِّيّة، ربما لأنّه ليس من الأنواع الشَّائعة في أوروبًا. وإنَّنا إذ نَستبعِد أن يَخلو هذا النَّوع من مُركِّبات القُرَّاص وخصائصه، فإنّنا نورده بهدف التَّعَرُّف إليه أكثر منه بهدف التداوى به، بانتظار المُعطيات العِلميّة المُرتَقبة التي قد تُوضح الطُّريق. هذا، وإن كافَّة الأسماء الَّتي اقترحناها له إنّما هي ترجمة لأسمائه العِلمية الثَّلاث التي من أصَحِها Dubia أى مُريب. غير مُحدّد.

٢٢٥- قُرَّاص كَاو، قُرَّيْص رُوْمَاني، نَيَات النار Roman nettle (E) Ortie à pilules, Ortie romaine (F) Pillennessel (D) Urtica pilulifera (S)

نَبات حَولي من فصيلة القُرّاصيَّات. ساقُه مُنتصِبة تعلو من ١٠ إلى ١٢٠ سم، مُربَّعة، مُرتخية التَّزَركُش بالأوبار. الذُّكريَّة أطول من الأوراق ولها محور مُفَلْطَح، وهي منبسطة ومُنحنِية، ضَيِّقة جدًّا، مُتَوأَمَة، مُزنَّدة قد تبلغ ١٥ سم. أزهاره بَيضاويَّة الكأسِيّات التي تَصْطبغ

الأوراق العُليا، مُنتصِبة، فَرْعاء، مُرتخِية، أزهارها مجتمعة في جَشُوات مُرتخِية، أزهارها مجتمعة في جَشُوات Glomérules صغيرة عليها بعض الأوبار الحارقة. الإزهرار الأنثويّ في جَشُوات فَرديّة أو مُتَواْمة، قصيرة أو طويلة الزِّناد، ٣ إلى ٥ ملم عند الإزهرار، ١٠ إلى ١٢ ملم عند البلوغ. كأسيّات خضراء، ملم عند البلوغ. كأسيّات خضراء، بيضويّة، غير متساوية، كثيفة التَّزَرْكُش بالأوبار الحارقة.

استُعمِل هذا النَّبات ضِدَّ الإسهال. وأعيد تسجيله في الفرماكوبيا الفرنسية عام ١٩٧٥.

Persicaire douce, (۱) قَرْدَب حُلو –۲۲٦ Pilingre, Renouée persicaire (F) Polygonum persicaria (S)

نبات حَوْلي من فصيلة البَطْباطِيَّات. سوقه منبسطة، صاعدة أو منتصبة، طولها من ١٠ إلى ٢٠ سم، متفرِّعة، مرْطاء، محمرَّة اللَّون غالبًا، عِقدها في العادة قليلة الانتفاخ. أوراقه سِنانيّة أو متطاولة، طولها ٢٥ إلى ٢٦ سم متطاولة، طولها ٢٥٥ إلى ٢١ سم وعرضها ٥،٠ إلى ٣٥٥ سم، أوبارها لاصقة، قصيرة على العُروق التَّحتيّة والحوافي، أحيانًا لِبديّة عَنكبوتيّة من والحوافي، أحيانًا لِبديّة عَنكبوتيّة من تحت، خضراء، غالبًا مبقّعة بالأسود الأرجوانيّ على الصَّفحة العُليا. غُمَيْداته رقيقة وشفّافة، بُنيّة اللَّون، قصيرة، لاصقة الأوبار القصيرة، مقطومة، حافتها طويلة

الأهداب. السُّويقات مفصلية عند رأسها، غير غِدِّية. كأسيّات ٥. أسديّة ٦، نادرًا ٧-٨. أقلام ٢-٣ مُتَّحدة حتى وسطها، سِمَاتها كُرويّة. الأكنات مزدوجة التَّركيب، معظمها عَدَسيّ الشَّكل، أحيانًا تكون مسطَّحة مُحدَّبة أو مثلَّثة الزَّوايا، كلُها سوداء اللَّون، مالسة، ٧٠٥٠

الخصائص والاستعمال - إن أوراق هذا النَّوع، الذي يملك كامل هيئة فلفل الماء وسيماءه P. Hydropyper، تكون معرَّقة باللَّون الأسود، وهو نَبات كان يُعتبر قابضًا ومنظَّفًا. أعيد تسجيله في الفرماكوبيا الفرنسية الحديثة عام ١٩٧٥.

۲۲۷ - قَرْدَب سيبُولْدِي، عَقَيْدَة مُدَبَّبَة (۲۲۷ - Pointed persicaria (E)

Renouée de Sieboldi, Persicaire pointu (F)

Spitzig Knöterich (D)

Polygonum sieboldii, Polygonum cuspidatum (S)

نَبات بَرِّيَ من فصيلة البَطْبَاطِيَّات يطول من ١ إلى ٣ أمتار. سوقه الحولية مستديرة، في باقات واسعة، كثيفة الأشكار، متفرِّعة الرؤوس، فروعها منبسطة ومنحنية. أوراقه من ١٣ × ١٠ سم، بَيضويَّة الشَّكل المستطيل، حادّة الرأس ومقطومة القاعدة. أزهاره في

ق ر د

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

ق ر د

عناقيد إبطيّة، حُزميّة التَّجميع، بيضاء اللَّون. مهده اليابان. منه ضربان: واحد متراصّ الشَّكل يعلو نحو ٦٠ سم، والثاني جميل أوراقه مُوشَّحة بالأبيض والأحمر.

المُركِّبات والخصائص - سحب پَرْكِن، عام ١٨٩٥، من قردب سيبُولْدِي هيتروسيدين من الأمُودِيْن، سُمِّي أحدهما پولِيغُونِيْن.

ولقد قام كل من غوريس وكرِيْتَه بدراسة هذا النبات، وحددا موقع الانتراكينونات في الريزوم، بواسطة مَحلول بوتاسيّ مشعشع جدًّا.

إن الجرعة المسهلة بالنسبة لهذين الباحثين، قد تكون الضعف (بالوزن) بالنسبة لمسحوق الجلهم، ولقد درس مُوران أيضًا، عام ١٩٢٦، أنواعًا مختلفة أخرى، كان أفعلها جذر أنجبار Bistorte

ومن ثم، سحب في السنة ذاتها، كل من بريدال وبَغْوَان، هيتروسيدًا جديدًا من القشرة الطازجة ومن جذر قردب سيبولدي، وبالطريقة البيوكيميائية، أطلقا عليه اسم پُولِيداتوسيد، تركيبه الكيميائي المرجّح 30H₂C₂₀H₂₂O₅, 3OH₂ عند 108-108° سغ، يتحلّل مائيًّا بواسطة الحوامض المخفّفة أو بواسطة الرامنُودياستاز معطيًا بذلك سكرًا متقاربًا من الغلوكوز والبُوليداتوجبنول C₁₄H₁₂O₃.

(۱) قُرْنُوس حَرِيْرِي، قَرَانيا حَرِيرِيَّة (۲۲۸ Silky corneltree, Silky dogwood, Silky dogberry (E)

Cornouiller Soyeux (F)

Seidenhornstrauch, Weichkornelbaum (D)

(راجع القُرْنُوس الملفوف، المادّة التالية).

Cornus Sericea (S)

(۱) الْوُلَبِيَّة (۲۲۹ - الْمُرْنُوس مَلْفُوف، قَرَانِيا لَوُلَبِيَّة (۲۲۹ - ۲۲۹ -

القُرنوس جنس أشجار أو شُجيرات من فصيلة القُرْنُوسِيَّات. أوراقُها متقابلة عمومًا، نادرًا ما تكون نَباتات عُشبيّة. أزهارها خُنثويّة، كأسها ذات نَصل رُباعيّ الأسنان؛ أربع بَتَلات مُصَرَّعة (ذات مصاريع)؛ أربعة أسدية. أسطوانة مِخَدِّيَة الشَّكل. مَبيض ثُنائيّ الحُجُرات، وحيد القلم. الشَّمرة عُنيبة بَيضانيّة أو وحيد القلم. الثَّمرة عُنيبة بَيضانيّة أو مُتطاولة، ثُنائية الحُذور واللُذور.

القُرنوس الملفوف تَشتهر قِشرتُه على أنّها طاردة للحمّى. كذلك تَشتهر قشرة القُرنوس الحريريّ على أنها طاردة للحمّى.

⁽١) كا التَّسمات للمؤلِّف ما عدا اللَّاتينيَّة.

Anone des marais, Corossolier des marais, Corossol des marais (F)
Alligatorapfel, Wasserapfel (D)
Anona palustris (S)

ق ط ر

نَوع من القِشطة يَرغب الأراضي الرَّطبة. ثماره صغيرة القَد قَلبيّة الشَّكل، عاديّة الصِّنف، غَبراء اللَّباب الغزير العُصارة المُعتدلة الحلاوة.

Collyres (F) قُطْرَة، شياف -۲۳۲ Augentropfen (D)

القَطْرات هي أدوية وَصْفِيَّة تُخصَّص لمعالجة إصابات العَينين. إذا نظرنا إليها بشكلٍ عام نرى أنّها قد تكون جافَّة، أو رَخُوةً، أو سائلة، أو غازيّة.

°۱ - القَطْرات الجافّة هي مساحيق دقيقة من الشَّب، الكالومَل، سُولفات الزِّنك، التي تُذَرِّ في العَينين بواسطة أنبوب دقيق. لم تَعُد مُستعملة حاليًّا.

" القَطْرات الرَّخوة هي مَراهم تُسمّى عَينيّة. كان لهذه المُستحضرات عند القدامي، وفي غالب الأحيان، شكل ذنب الجرذ، وكانت تُعطى بواسطة مادّة لاصِقة، بسبب الطَّريقة الخاصّة المُتَّبعة في استعمالها. وكانت القَطْرات الرُّومانيّة القديمة البُنيّة والحمراء التي وُجدت في رايْمس وحُلّلت، على شكل قوالب صغيرة مستطيلة، تَضيق عند طرفها.

٣ - القَطْرات الغازيّة تكون في العادة

Chirimoyas, قِشْطَة شَرِيمُوْلِيا –۲۳۰ Purple-apple (E) Chérimolier, Chirimoyer, Corossol d'Asie (F) Chirimoya, Purpurapfel (D) Anona cherimolia, Anona asiatica (S)

شَجرة صغيرة القدّ من فَصيلة القِشْطِيّات تعلو نحو ٥ أمتار. أوراقها بَيضيَّة، مُويِرة، جميلة اللَّون الأخضر. أزهارها مِحوريّة مُتَدلِّية. بَتَلاتها مستطيلة الشَّكل بَيضاء الصَّفحة العُليا الدّاخليّة، خضراء السُّفلى الخارجيّة. ثمارها Chérimoles اللَّون حجمها حجم البُرتقال. رُمْداء اللَّون حجمها حجم البُرتقال. لبابها عاجيّ المادّة، غزير العُصارة، فوّاح العَرْف المُستحَبّ. إن هذا النَّوع هو الأجود صنفًا، يليه القشطة السَّهْفيّة فالقشطة السَّهْفيّة.

الخصائص - أوراقها وثمارها الخضراء تُعطي نُقاعات مُهدَّنة، مضادة للتضنَج، قابضة ومُضادة للإسهال. بُزورها ولحاؤها طاردة للدّود. نقيع الجذور المَغليّة نُصِح به ضدّ التّوصِيم الحُمِّيّ أي وَجع الجَسَد وتَكَسُّره بسبب الحُمِّي ، كما نُصِح بعصير الأوراق ضِدّ القَمْل. بُزورها المسحوقة استُعمِلت كمبيد للحشرات. إن «قلب الثور» هو نوع متقارب جدًّا من الشريموليا.

Alligator apple, وَشُطَة مَنْقِمِيَّة -۲۳۱ Cork wood (E)

ق ط ر

سوائل طيّارة جدًّا (بَلْسَم فيوراڤَنْتي، سائل النَّشادر)، تُسكَب على راحةِ اليَد ومن ثم تُوضع أمام العَينين، بطريقة تُغطِّيها من دون ملامستها. وهي تَرِد هنا لذكرى التّاريخ.

كَ - القَطْرات السّائلة أو القَطْرات بياضات المُستشة هي سوائل مُحمَّلة، عن طريق المُستشة النُّقاعة أو النَّقيع أو المحلول، بمواة دوليو فَعّالة مُخصَّصة لمحاربة الإصابات غرام؛ العينيّة. وهي المُستحضَرات الوحيدة المسجَّلة في كودكس ١٩٦٥، علمًا بأن قطرة المراهم العَينيّة لم تزل تُستعمل في كثير لَمْبال: ما ورد من الأحيان.

إلى القَطْرات السّائلة المائيّة، يَجب إضافة القطْرات الزّيتيَّة التي أدخلها إلى التَّداوي البروفسور باناس وأحد طُلّابه، ولكنّها قطْرات تُهمَل الآن.

القَطْرات المائية تكون سَوّاغاتُها الاعتيادية إمّا المياه المُقَطَّرة، أو مياه النُقاعات. ومن الواجب تسليم هذه القَطْرات مُعَقِّمة، وتكون عمومًا في أوعية خاصة: زجاجات مُزوَّدة بقطّارات، أمْبُولات، قَطْرات.

ولكي تكون القَطْرة مُعقَّمة في العادة، يُجب أن لا تُستعمل إلّا مَرَّة واحدة. فعندما نفتح الزُّجاجة يُصبح من الصَّعب الحِفاظ على العُقْم، إلّا إذا أضفنا إليها المواد المطهِّرة المسموح بها.

قطرة ألومينيّة أو عَقُولة:

قطرة ألومينيّة - رصاصِيّة، ماء دوقة

۱ غ	۲٥	ماء ورد
۱ غ	۲٥	ماء لسان الحمل
١غ		سولفات ألومينيوم
، غ	٫٥.	أستات الرصاص
		نخض وقت الاستعمال.

قطرة أمونياكية، مسحوق ليسون

٣غ	كلس مُطْفئ
۱ غ	قرفة
٤ غ	ملح أمونياك
۱ غ	كبش قرنفل
۱ غ	فحم نباتي
۲ غ	طين أرمينيا

نخلط أكبر كمِّية مُمكِنة من الكلس مع الفحم ونُدخِل الخليط في قارورة محكمة القفل، بطبقات متعاقبة بواسطة ملح الأمونياك؛ نُغطّي بالموادِّ العِطريّة، نُضيف فوقها أيضًا ما تبقّى من الكلس

المخلوط مع الطّين، ونُضيف أخيرًا بعض نقاطٍ من الماء لترطيب المادّة ونقفل. عند الاستعمال، نفتح القارورة ونمرّرها تحت العينين.

Glass-wool (E) تُطْن مَعْدِنيّ – ۲۳۳ Coton minéral, Coton de verre, Laine de verre, Soie de verre (F)

إن القُطن المَعدِنيّ الّذي يُستعمَل في تصفية السَّوائل في المُختبرات يتألَّف من زُجاج مُنصهِر، مَمْطوط، مسحوب على شكل خيط يَلتَفّ ويَنطوي حول أسطوانة مَعدِنيّة يُصار إلى تحريكها كدولاب المِغْزَل في غَزْل الكتّان. ويبدو أن الرَّجاج البُوهيميّ يَتلاءَم أفضل من أيّ اللَّيْفات تكون دقيقة بقدر ما تكون عليه خيوط الحرير أو خيطان القُطن؛ وهي مُعاومة مَتينة ومُميَّزة جدًّا بليونَتِها وطراوتها الزّائدة المُفرطة.

إن القُطْن المَعدِنيّ أو الصّوف الزُّجاجيّ يُودِّي حَسَناتٍ كبيرة في تَصفية المحاليل الحامضة أو القِلَوِيَّة، حتى المركَّزة منها، ومُختلَف الموادِّ الأخرى، مثال نيترات الفضَّة، والزُّلال، والغُريّاء، وشراب فَهْلِنْغ Fehling، إلخ. إن تصريف السّائل في التّصفِية سريع جدًّا، كما أن القُطْن المَعدِنيّ ليس له سيئة التَّخلّي عن الموادِّ العُضويّة إلى السّائل، كما هي الموادِّ العُضويّة إلى السّائل، كما هي الحال في مصافى الورق أو القماش.

وهو لا يمتص كذلك الجواهر العِطرية للمياه المُقطَّرة والكحولات. يُمكن استعماله إلى ما لا نهاية تقريبًا وذلك بغسله جيِّدًا بالماء الوافر وتجفيفه بالهواء بعد كل عمليّة تصفية.

إستنادًا إلى ملاحظة قديمة، إن بعض أصناف القُطْن المَعدِنيّ يحتوي على سيليكات الرَّصاص، وبإمكانها زَجّ هذا المَعدِن في محاليل التَّصفية المُعدَّة للتَّحليل المِخبريّ. إن هذا الواقع قد يُؤدّي إلى حدوث أخطاء خطيرة.

۱۳۶- قَلُوِیْدات الْخَرْبَق والْخُرْبُوق Alcaloïdes d'helleborus et du veratrum (F)

من القلويدات العديدة التي تستخرج من مختلف أنواع الخربق والخربوق، كجذور وريزومات الخربق الأخضر والخربق الأبيض، وبذور السِّفْدِيل أي حشيشة القَمْل. أكثر ما يستعمل منها إذًا هو مزيج الپروتوڤيراترين "أ» و"ب» المستخرجان من الخربق الأبيض؛ وهما مزيج يستخدم في معالجة ارتفاع الضغط لعمله المُهبِّط لضغط الدَّم، وهو عمل تدريجي وطويل الأمد؛ وهما بالتالي لا يبدِّلان من عمل الأدرينالين الموترِّ للأوعية الدموية والموسِّع العروق الإكليلية.

الخصائص - إن الپروتوڤيراترين «أ» و«ب» هما مضادان للحرارة ومانعان

ق ل و

ق ل ی

للحمّى، يزيدان من جرّاء ذلك عمل المُبَنِّحات العامة؛ إلَّا أنهما يشكلان تداؤبًا سامًّا مع الديجيتالين والكينين.

طريقة الاستعمال - يُعطى مزيج اليروتوڤيراترين «أ» و«ب» بالفم، بمقدار الملّغرام إلى ١,٥ ملغ في اليوم، $(\frac{3}{1})$ مقسَّمة وبعيدًا عن الوجبات؛ ويُعطى تحت الجلد أو ضمن العضل بمقدار ١٠٠ إلى ٤٠٠ ميكرون غرام كل ٤ إلى ٦ ساعات؛ وضمن الوريد من ٦٠ إلى ١٠٠ ميكرون غرام، ومن ثم ٢٠ ميكرون غرام بعد مضي بضع ساعات. إن البروتوڤيراترين قد يحدث اضطرابات مختلفة (هضمية، دَوريّة، قلبيّة، حِسِّيّة قابلة للتَّبَلُّر. ونفسانيّة)، يبطلها الأتروبين والأفدرين. تضادات الاستطباب هي ذبحة الصدر والعجز الكلوى.

> ٢٣٥- قِلْي، قِلِّي، أَشْنَان وقِلُويْدَات، قِلُوانِيّات، أَشْباه قِلَمَ **Alkalies and** Alkaloids (E) Alcalis et Alcaloïdes (F) Alkali und (D)

إنّ الكّلمات الفَرنسيّة والإنكليزيّة والألمانيّة أعلاه مصدرها لُغَتُنا العربيّة حيث أردنا بها الإشارة إلى كَرْبُونات الصوديوم المُستخرَجَة من رَماد عُشْبة سَمِّيناها «قِلْي». بَعد ذلك، أطْلَق الخيميائيُّون اسم قِلْي على ثلاثة عناصر هي البُوتاس، أو القِلْي النَّباتي؛ الصود، بعض مَناطق البلاد التُّركيَّة. أوراقُه

أو القِلْي المَعْدنيّ؛ والنُّشادِر، أي القِلْي الحَيُوانيّ. ومن ثمّ بَعد ذلك أيضًا، وحَوالي أيّام لاڤوازييه، عُرف باسم قِلْي، بالإضافة إلى ما تقدّم، أثربَة قِلَويّة، ألبَريْت (أوكسيد الباريوم)، الكلس، المَغنيزيا، السّترونْتيان (أوكسيد السترونتيوم).

قُسّمت القِلْي قديمًا إلى قسمين: القِلْي المَعْدنيّة، أي التي ذُكِرت أعلاه، والقِلْي النَّباتيَّة أو العُضُويَّة، والتي تُسمَّى أيضًا قِلَوِيْدات وقواعد نَباتيّة. آنّ هذه القِلْي وتلك تَتَّحد مع الحوامِض المُخَفَّفة لكى تُشكِّل أملاحًا، تكون في أكثر الأحيان

إنّ عَمل القِلْي على الأنسِجة الحَيّة هو من أفْعَل الأعمال، نَقِيَّة كانت أو مُركَّزة؛ لذلك، فإنَّها غالبًا ما تُستعمَل من الخارج لِكَيِّ البِّشَرة والقضاء على بعض الأنسجة، لفَتح بَعض الخُراجات، وللقضاء على النّتوءات الفُطريّة. أمّا إذا أُدخِلت الأشنان إلى الجسم، فإنّها سموم عنيفة.

٢٣٦- قِمام جَبَلِيّ Oriental whortleberry, Trebizond tea (E) Airelle de Cappadoce, Thé de Trébizonde (F)

Broussatee (D)

Vaccinium arctostaphylos (S)

قِمام من فَصِيلَة الخَلَنْجيَّات يَكثر في

دائمة، مُتعاقِبة، بَسيطة، نَصْلها جامد الصَّفحة الضَّيِّقة المُسنَّنة الحوافي. أزهاره كأسِيَّة الشَّكْل، إبطيَّة الارتكاز، بيضاء اللَّون، أُحاديَّة أو ثُلاثيَّة التَّجميع. ثماره عُنيْبات عديدة البُزور، حمراء اللَّون، حامِزة وعَقُولَة. أوراقُه طِبِّيَّة تُستعمَل استعمال الشّاي.

مُلاحظة - وَرد هذا النَّبات باسم قِمام ق ن ب المَناقِع في المَوسوعة في عُلوم الطَّبيعة. الاسمان المُقتَرحان أعلاه هُما ترجمة للاسم العلميّ Uliginosum أي Fangeux أي يَرغب الأماكن المُتَوحِّلة أو التُّربيّة الجَبَليّة. أمّا بالنِّسبة للخصائص، فمن المُفيد العودة إلى القِمام الآسيّ والأحمر.

Chanvre (طریقة استعمال) –۲۳۸ (Mode d'usage) (F)

كان القُنَّب الهِنديّ قليل الاستعمال. ولقد جُرَّب ضدّ الجُنون ووَسُواس المرض، كما نَصح البعضُ بمستخلص المائيّ الكحوليّ في بعض إصابات المعدة، بمقدار ٠,٠٥ غرام في اليوم.

إن مقدار ۱,۰ غرام وحتى مقدار ٥,٠ غرام من الحَشِيشِيْن يُؤدِّي إلى التأثيرات ذاتها التي قد يُؤدِّيها مقدار ٢ إلى ٤ غرامات من المُستخلَص الدَّسِم، أو ٢٠ إلى ٠ Dawamesk إلى ٣٠ غرام من الدَّوامِسْك Dawamesk. وهو يُعطى في بيلولات وصبغة وجَروعات وحقن شَرجيَّة، وقد أدِّى بمقدار ٢٠٠٠، غرام إلى تأثيرات شديدة جدًّا.

القُنَّب الهنديّ قَلَّما يُستعمل كما هو، ولكنّه يُدخَّن في بعض البُلدان أو يُلاك على غرار التَّبغ في تركيا ومصر وتونس والجزائر، إما لوحده أو ممزوجًا مع التَّبغ أو مع مواد أخرى. في تركيا هناك مُستحضَر من الحشيشة يُعرف باسم

ر آئربيّ (١٠) قِمام المَوْحِل، قِمام تُرْبيّ (٢٣٧ Cranberry, Mossberry (E)
Airelle des fanges, Airelle des marais,
Canneberge (F)
Moosheldelbeere (D)

Vaccinium uliginosum (S)

جَنْبَة إلفُ الجَبَل Orophile من فَصِيلَة الشَّكُر، تَعلو الخَلَنْجِيَّات، زاحِفة، طويلة الشُّكُر، تَعلو من ٣٠ إلى ٨٠ سم، فُروعها مُستديرة، مَرْطاء، بَحريّة اللَّون. أوراقُها عابلة، مُتعاقِبة، بسيطة، كاملة، مُتعكِسة الشَّكُل البَيْضويّ، بَحريّة اللَّون على صَفحتها الشَّكُل السُفلي. أزهارها في عناقيد صغيرة السُّفلي. أزهارها في عناقيد صغيرة الكأس رُباعيّة خُماسيّة الأسنان. التّاج الكأس رُباعيّة خُماسية الأسنان. التّاج الفُصوص. الأسدية ٨ إلى ١٠. قلم مُترقَّة اللَّون الأسود، عديدة البُزور، مُزرقَة اللَّون الأسود، عديدة البُزور، مأكولة، سُكَّريّة الطَّعم وصالحة للتَّقطير.

⁽١) التَّسميتان العربيَّتان والتَّسمية الفرنسيَّة الأولى للمؤلِّف.

«أسرار» ويُؤخِّذ على شكل شراب سُكِّري الطِّيب ودُهن الورد والمِسْك. تُضاف إليه الموادّ العِطريّة والنّاعِظة، أو يُدَخَّن في مُلَبِّس تزن الواحدة حوالي ٤ غرامات، تُصنع من عجينة الأسرار المُحمَّصة بعض الشيء ومن نُقاعة قويَّة من البُنِّ. أما «مَدْجُون» الجزائريين فهو مزيج من العسل ومسحوق الحشيشة المُحمَّص قليلًا. كما تُحضَّر من العُشبة بالذات نُقاعات ونَقيعات مَغليّة، ومشروبات مُختلفة. إن ماء القُنَّب المُقطِّر هو خال من التأثير المُخَيِّل.

> أما مُستخلَص الحشيشة الدَّسِم عند العرب فيتم الحصول عليه بغلى رؤوس النبات المزهرة الغَضَّة مع الزُّبدة وبعض الماء. نُمرِّر عندما يَتبخُّر الماء وتَتشبُّع الزُّبدة بما يكفى من الجوهر الفَعّال. نحصل على مُستحضر دهاني الشَّكل(١) Unguentiforme ، لاصِـــق، لازِج، مُخضر اللُّون الأصفر، طعمه ورائحته هما طعم الزُّبدة والحشيشة ورائحتها المُغثيان؛ وهو المُستحضَر الأقوى فَعالية الذي يحصل عليه العرب من الحشيشة. مقداره من ٢ إلى ٤ غرامات تُؤخذ على شكل كُرات صغيرة أو في قهوة مرّة. ولكن العرب نادرًا ما يستعملونه بهذا الشَّكل بسبب طعمه الحامز، فيعطونه أشكال المعاجين العسلية والمُعَجّنات والمُلبَّس، ومن ثم يُضيفون إليه الأفاويه، كالقرفة والڤانيليا وجَوز

أمّا ما يُسمّى دَوامِسك أو قهوة مِسْك أو الدُّواء المِسكيّ فهو المستحضر الأساسي من بين المستحضرات المذكورة، وهو مُستخلص دسم يُضاف إليه السُّكَر والفستق واللُّوز والأفاويه التي يجب أن يكون المِسْك واحدًا منها تقيُّدًا بأصل التَّسمية. ويُعْتَقد أن العَرَب يُضيفون إليه الذِّرَّاحِ أحيانًا لكي يجعلوه ناعظًا. وقد تَمَّ الكشف فيه عن وجود جوز القَيْء أيضًا. إن هذا المُستحضر هو ما كان يُطلَق عليه «مُربّى إسكندر دوماس» أو «مُربّي بُودْلير»؛ يُؤخذ بمقدار ٢٠ إلى ٣٠ غرامًا بشكل كُرات أو محلولًا في قهوة عادية. تبرز تأثيراته خلال نصف ساعة إلى ساعة واحدة وتبرز أحيانًا بعد فترة أطول من ذلك بكثير تبعًا لأمزجة الذين ىتعاطونە .

يُطلِق العرب اسم كَيْف أو هَوَى على ذلك النُّوع من الخَبَل الشّهوانيّ الذي تُحدِثه الحشيشة والذي لا علاقة له إطلاقًا بالخَدر الذي يُحدثه الخمر. الحشيشة يجب أن تُؤخّذ على الرّيق. استعمالها الطويل قد يُؤدّى إلى الجنون. في الجزائر يُطلَق اسم كَيْف على النَّبات بحدّ ذاته. أما في أمريكا الشماليّة فقد انتشر تدخين القُنَّب منذ فترة حديثة نسبيًّا حيث أطلقوا عليه اسم ماريجوانا، وهو اسم يَشتَقّ من كلمة مكسيكية تشير إلى مصدر جغرافي.

بالحشيثة حوالي العام ١٩٥٥ في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة بنوع خاص وفي البلدان الأوروبيّة الغَربيّة عامّة، وهو يُستعمل في بلدان جَنوب البحر المتوسط من زمن بعيد. تَتوقَّف تأثيرات الحشيشة على نسبة الرّاتنج؛ بعض الأنواع الأوروبيّة تحتوي منه على ٣٪ وهي بالتالي ليست أكثر خطورة من سِمات الذَّرة الصَّفراء. ولكن الأنواع الهنديّة وأنواع البلدان الحارة قد تحتوى على نسبة ٣٠٪ من الرّاتنج. أما المسؤول في الراتنج ذاته فهو التَّثراهيدروقَنَّابينُول: Tétrahydrocannabinol الذي يُسبّب المَرَح والغِبْطَة، بينما يكون أحد مُتَجازِئَيْه سبب التأثيرات الهَلُوسِيّة: فاستعمال الحشيشة يُؤدِّي إلى «سُكْرِ» تَطَوُّريّ يبدأ بمرحلة من الإثارة المَرحة، فإلى مرحلة خَبَليَّة اخْتِلاطيَّة Confusionnelle (خَبَل واختلاط العَقْل) تُرافقها اضطرابات في التمييز النَّظريّ والسَّمعي، تليها مرحلة من القلق والحصر النَّفسيّ مع تَهيُّج الذاكرة، ومن ثم في النهاية تأتي المرحلة الانهيارية، فالنوم.

كتب بُودلير: عندما يستيقظ «المسافرون» يحتفظون بذكرى، ما رؤوا وما سمعوا. إن الإدمان على الحشيشة يبدو إدمانًا نفسيًّا بنوع خاصّ. ويُخشى معه على الأشخاص الضَّعيفي الشَّخصيّة

إِدْمَانُه وسِمَامَتُه - إنتشر التَّسمُّم من حوادث ذُهانِيّة Psychotiques خطرة ودائمة. بالإضافة إلى ذلك، إن اشتراك الحشيش مع مخدرات أخرى، كالداتورة والكحول والأفيون، قد يُؤدّى إلى الإدمان الفيزيولوجي، وبالتالي إلى الإصابة بالبرونشيت المزمن وإصابات الفم والحنجرة وإلى آلام شقيقيّة وإلى المغص. يُقَدّر الاستهلاك الفرنسي عام ١٩٧٣ من حشيشة الكيف، من ٥ إلى ١٠ أطنان في السنة.

٧٣٩ - قَنْطُريُوْن أَسْمَر، رَأْس الدُّوري Black centaury, Brown rayed knapweed (E)

Jacée, Jacée des prés, barbeau, Tête de moineau, Centaurée jacée, Chevalon, Malon (F)

Weissenflockenblume (D)

Centaurea jacea, Jacea communis (S)

نَبات عُشبت من فَصيلة المُركّبات، يَعلو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. جذرُه وَتَديّ. ساقُه مُربَّعة، مُنتصِبة، مُورقة، مُتفرِّعة، خفيفة الزغب. أوراقُه مُتعاقبة، سِنانِيَّة الشَّكل، مُعنقة أو لاطئة. رُؤيساتُه فَرديّة، هامِيّة الارتكاز. أزهارها أرجوانيّة أو مُتورّدة أو بَيضاء أحيانًا. قُلافاتُها من قنابات عديدة مُتراكِبة. الثَّمرة هي أكنة بيضاء اللُّون. نَبات واسع الانتشار الأوروبي، ولكنه يُفضِّل الأراضي البور والخَرائب وجوانب الطُّرُق.

المُركِّبات - سَنتُورين، مادَّة صِباغِيَّة،

ق ن ط

ق و ی

بُوتاسيوم، عَفْص، لُعاب، مَغنازيوم.

الخصائص - مُقوِّ مُرَّ، نافع للمَعِدة، مُبوِّل، طارد للحُمِّى.

الاستعمال - الجذور. نُقاعة، مُستحضر خَمريّ، صبغة، مُستخلَص سائل، مسحوق، ماء مُقطَّر.

ملاحظة - لم يَزَل هذا النَّبات يُستعمل اليوم في الأرياف الأوروبيَّة لمنافعه الهَضْميَّة، ولكي يُهدِّئ حُمّى الأولاد. السَّنْتُورين هو جَوهر مُرّ فَعّال جدًّا في حالات عُسر الهضم. ماءُ النَّبات المُقطَّر يُستعمل قطرة لمعالجة، التهاب المُلتحمة، على غرار التُرُنْشاه.

(١) الْحَبَل، قُوَيْسَة الخَبِل، عُوَيْسَة الغاب Sauge des bois (F) Salvia Silvestris Salvia sylvestris Hort., = (S. nemorosa var. superba Stapf.) (S)

الفصيلة - شَفَويّات Labiatæ.

الوصف - ترجمة الاسم العلميّ، من Silvester أو Silvester، هي بَرِّي أو خُرجيّ؛ لذلك دعوناها قويسة الغاب. ولقد ورد اسمها «قويسة الجبل» في الموسوعة في علوم الطبيعة. نبات بَرِّيّ مُعمَّر. ساقه زباء، فَرْعاء تعلو من ٢٠ إلى ١٠ سم. أوراقه إهليلجيّة ضيِّقة، نصلها جامد الصفحة المُسنَّنة الخَمليّة البشرة.

أزهاره عُنقوديّة التَّجميع، زرقاء اللَّون، بنفسجيّة المُواج.

الازهرار - حزيران إلى آب (٦-٨). المنبت - الأراضي الجبليّة.

ملاحظة - جاء عنها في الموسوعة في علوم الطبيعة: «منافعها الصحية المِعويّة عديدة ويُقال إنها تُستعمل في علاجات الفالج».

مَشَبَهُ مُشَبَهُ عُشْبَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

نَبَات مُعمَّر من فَصِيلة المركَّبات، يَعلو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. ساقه ليفيّة القاعدة، غليظة، عديدة الفروع المُنتصِبة، المكسوَّة بالزَّغَب. أوراقُه خَمليّة، مُبيضَّة اللَّون، صغيرة، ضَيِّقة، فُصوصُها في ٤ إلى ٢ صغوف متُراصة. أزهارُه ذَهبيّة اللّون الأصفو، أنْبُوبيّة، في رُؤيسات فَرديّة، كُرويّة، هامِيّة الارتكاز. أقراصُها مُشَذَّرة. أكنتُها مُفَلْطَحة، رُباعيّة الزَّوايا، زاويتان منها أكبر من الأخرى. رائحة

النَّبات قَويّة جدًّا. طعمه مُرَّ، حامز وعِطريّ.

المُركِّبات – زيت دُهنيّ، زيت ثابت، راتنج، عَفْص، قِلويد مُرّ.

الخصائص - مُضادِّ للتَّشَنُّج، مُطمِث، مُنشَّط، طارد للدود على غرار حشيشة الشِّفاء والبزور المضادَّة للدُّود Semen وأنواع الأرطماسيا.

الاستعمال - أقصور، صَفَر، تَعَب، حَشَرات، طُفَيليَّات. الرؤوس المُزهرة، البزور، الأوراق قبل الازهرار. أعيد تسجيل القيسون في الإصدار التاسع للفَرماكوبيا الفَرنسيّة عام ١٩٧٤.

طريقة الاستعمال - البزور: يُؤخذ منها مِلعَقة مُتوسِّطة في مقدار فنجان ماء غال يُغطّى عشر دقائق، فنجان واحد كل صباح ولمدَّة أسبوع (عند نقص القمر). يُعاوَد العلاج لفترة ثلاثة أشهر. مسحوق البزور: تُؤخَذ في أقراص من ٠٥٠٠غ، إلى ٨ أقراص في اليوم، أو ٢ إلى ٤

غرامات تُؤخَذ مع العَسَل. الزَّيت الدُّهنيّ: يُؤخَذ منه ٣ إلى ١٠ نقاط في كَبسولات تُؤخذ ٢ أو ٣ مَرَّات في اليوم مع سوائل غزيرة. طارد للدُّود للأولاد: مسحوق بزور القيسون: غرامان، شَراب سُكَّريّ من أزهار الدرّاق: ٣٠ غرامًا، دَواء عَسليّ بسيط Mellite: ٧٠ غرامًا.

مُلاحظة - يَنسب عُلماءُ الاشتقاق مَصدرين مُحتَملَين إلى اسم القيسون، الأوّل من الإيطاليّة Santo سَنْتُو أي مُقدَّس، نظرًا لخصائصه الكبيرة. الثّاني من اليُونانيّة Xanthos زَنْتُوس أي أَصْفَر، تذكيرًا بلون الأزهار.

يحتوي القيسون على ١٠,٠ بالمئة، كنتاج وسَطيّ، من زيتٍ دُهنيّ كثافته ١٠,٥، من مُركِّباته السَّنتُولينون والتَّربينات. القيسون المهروس يُوضع على مكان وَخْز الحشرات، فيعمل فَورًا على تخفيف الألم. كما أنّه يشفي الجروح البسيطة ويلئمها بشكل سريع.

<u>کی</u>

Camphre naturel گافُور طَبِيعي -۲٤۲ (F)

- مُوَاصَفات الكَافُور اليَمِيْن (الطبيعي)
يقع الكافور المكرَّر في قوالب من كيلو
إلى كيلوغرامين؛ ويكون في كتل عديمة
اللَّون، شَفَافة، فَتُوتة، دُهنيَّة الملمَس
الزَّيتيّ، يمكن حَزُّها وتَخْديدها بالظِّفر؛
مِكسرها لامِع، قِوامها بِلَّوري، طعمُها
حار ولاذع، رائحتها شديدة ونَفّاذة؛
ثقل الكافور النَّوعيّ ٢٩٩، عند حرارة
ب ١٠٠ سغ؛ نقطة إنْصهاره ١٧٥ سغ؛
نقطة غليانه ٢٠٤ سغ؛ وهو يتطاير عند
الحرارة العاديّة، ولا يُسحق جيّدًا إلّا إذا
ترطَّب بالكحول، وأفضل منه بالأثير.
الكافور سريع الالتهاب.

إنه قليل الذّوبان بالماء (١/٨٤٠)؛ غير أن الماء يكتسب منه الرائحة والطعم المُكَوفَرَيْن. إن الماء المُشْبَع بحامض الكَرْبونيك يَحلّ من الكافور نسبة أقوى بكثير. وهكذا يكون الحال، وهو أمر مُلفِت، مع الماء الذي نغليها مع الكافور طويلًا. ويُعتقد أن المُستحضر المعروف في إنكلترة باسم Tower's

solution of campher إنما يُحضَّر بهذه الطَّريقة عينها.

إن الكافور الذي يُنثَر على وجه الماء يُعانى من حَرَكات دَوْريّة تُنسَب إلى تَبخُّره المُستمرّ والذي يَتوقَّف بإضافة أصغر قدرٍ ممكن من مادّة دُهنيّة. وهو قابل للذّوبان في ٠,٦٥ جزء من كحول ٩٥ درجة؛ وإذا أَضَفْنا الماء إلى هذا المُذاب أو المحلول فإن الكافور يترسب فيه على شكل مسحوق نَدِيْف (بَلْسَم الكافور magistère de camphre). إن المحلول الكحوليّ الذي يُشحَنُ على السّاخن يَجعل الكافور يَركد على شكل بلّورات جَميلة عندما يبرد. إن الكافور قابل للذُّوبان في جزء واحد من كحول ٩٠ درجة، وفي ٠,٥٧ جزء من الأثير الأثيليك، وفي ٣٣,٠ جزء من الكلوروفورم، وفي ٠,٥٥ جزء من حامض الخَلِيك، و٤ أجزاء من زيت الزيتون، و١,٥٥ من دهن التربَنْتين. وهو بالتّالي ذَوّاب جدًّا في الأسيتون، والبنزان، وذَوّاب في الزّيوت الثّابتة والطيّارة، وفي الموادّ الدُّهنيّة والرّاتنجيّة المُنصهرة، إلخ. وهو يذوب بالغليسرين.

الكافور مُيَامِن: إذا قِيس بحرارة ٢٠ سغ في محلول من الكحول النَّقيّ الصِرْف الحاوي على ١٠ غرامات من الكافور في كل ١٠٠ ملل من المحلول. إن طاقته الدَّوْرية تخفّ مع تخفيف المحلول وتتغيّر مع درجة تَمَيُّه الكحول.

- حِفْظُ الكَافُور

الكافور الطبيعي يجب أن يُحفظ في أوعية مُقفلة.

- إِسْتِعْمَالات الكَافُور

الكافور بمقادير صغيرة، يُنشِّط الأجهزة الوِعائية والعَصَبية مع إثارة نَفسانية (هَذَيان مَرِح) في البداية، ومن ثم يَظهر عمله المُسكِّن والمُخبِّل. إذا أعطي الكافور تحت الجلد، وهذا هو عمله الأساسي، يبدو مُتفوِقًا على الأثير في محاربة الاسترخاء وانحطاط نَسيج القَلْب العَضَليّ. وإذا أعطي بمقادير مُرتفِعة، فإنّه مُهيِّج قَويّ حتى الخطورة (تَخلُّجات يَعقبها حالات شَلَل وسُبات قد يكون مميتًا).

كان يُنسب إلى الكافور مَلكَة تَهدئة بعض التهابات المثانة أو تداركها واتقاؤها، خصوصًا تلك التي تُسبّبها أنواع الذُّرّاح Cantharides؛ كما كان الأطبّاء الممارسون يَرُشّون الأدوية المُنفَّطة ويَذرُّونها به. ونُصح بمسحوق الكافور لضماد القَرْحَة البدائية. فهو بالفعل مطهر خفيف. أما بالنسبة لعمله المُجْفِر الذي يُفقِد شهوة الجماع، فإن ذلك أمر مشكوك فيه جدًّا.

- أَشْكَالُه الصَّيْدَلِيَّة

مسحوق، ماء مُسكّنة، ماء حياة، كحول، بَلْسَم، مَرْهَم الصّابون المُكَوْفَر Opodeldoch، خَلّ، محاليل أثيريّة،

سجائر، مرهم، زيت مُكَوفَر، صبغة كاف اف الأفيون المكوفَرة، مُذابَة زيتية كافورية للمحقفن، ومن شم حَشد من المستحضرات الأخرى المكوفَرة المركَّة.

- مَقَادِيْرُه، جُرْعَاتُه

من ۰,۱۰ غرام إلى غرام واحد على شكل مسحوق، بيلولات أو جَروعات. في حِقن تَحْجلدية (مُذابة زيتية أو أثيرية من جزء من عشرة). يجب أن لا نتخطّى مقدار غرام واحد في اليوم يُعطى في عِدة حِقن. عند الأولاد، يوصف من ۰,۰۱ إلى ۰,۰۲ غرام لكل سنة من العمر.

طَرِيْقَة اسْتِعْمالِه - المقادير المتَّبعة للبالغين، عن طريق تحت الجلد: ٠,١٠ إلى ٠,٢٠ غرام للجرعة وحتى غرام واحد لكل ٢٤ ساعة.

المقادير القصوى: غرام واحد لجرعة واحدة و غرامات لكل ٢٤ ساعة. المقادير الولادية، عن طريق تحت الجلد: من صفر إلى ٣٠ شهرًا: ٥٠,٠ غرام إلى ٢٠ شهرًا إلى ١٥ سنة: ٢٠,٠ إلى ٠,٥٠ غرامًا.

الامتناع عن استعمال الكافور من عمر صفر إلى ٣٠ شهرًا، في معالجة جلدية أو على الأغشية المخاطية التنفسية.

تَضَادًاتُه - أُنْتِي پيرِيْن، كلورال، نَفْتُول، فينول، حامض سالسيليك،

ريزورسين، مَنْتول، سالُول، إلخ. ٢٤٣ كا (الكافور يعطي مع هذه المواد خليطًا سائلًا أو عجينًا).

يَتمتَّع الكافور من جهة ثانية بملكة تمييع عدد كبير من المواد التي يتم خلطها معه: صموغ، راتنجات، صموغ راتنجية، ما عدا صَمْغ الصَّنَوْبر أو الصَّمْغ النَّفْطي، والمُرّ، وراتنج الجَلَبة، كلورال، فينول، نَفْتولات وفينولات أخرى. إن المواد السائلة الحاصلة من اتحاد الكافور مع فينولات، أي الفينولات المُكَوفرة، التي درسها دوسَكَالٌ وأدخلها إلى التَداوي، درسها دوسَكَالٌ وأدخلها إلى التَداوي، هي مُطهِّرات قوية جدًّا، استُعملت ضدّ الذبحات والتَّقيُّحات والإصداءات السَّلِية، إلخ.

إن المحلول الحاصل من حَلّ الكافور في مقدار وزنه من الكحول الصَّرْف (محلول روديني الكافوري) يَتمتَّع بخاصَّة إذابة بعض الموادِّ العِلاجيّة، أَ من اليودوفورم مثلًا. الپيروكْسِلَيْن يَذوب فيه بسهولة: نضيف جزءًا من هذه المادة الى ٤٠ جزءًا من محلول روديني، نحصل على سائل دَعَاه مَرْتِنْدال Camphoïde، "كافوراني"، وهو يترك على الجلد بالتبخير قشرة كامدة، لَدْنَة مَرِنَة وتقاوم الغسيل؛ وهي تذوب بسهولة بحامض سالسيليك، واليود، والريزورسين، والكريزاروبين، واليودوفورم، والتي يمكن بهذه الطريقة استعمالها على يمكن بهذه الطريقة استعمالها على الجلد سهولة.

Cayapona (F) (۱) گَرُوِيَة کُرُوِيَة –۲٤٣ Cayaponia globosa (S)

تُستعمل الثَّمرة، أي يِطِّيخة الكاياپونا، وهو نَبات من فصيلة القَرْعيَّات، في أمريكا الوُسطى والبرازيل في الطبّ البيطريّ على الأخصّ كونها دواء ماسِط. استخرج أَنْدرال من هذه الثَّمرة جوهرًا فعّالًا اسمه كَايَاپُونِيْن Cayaponine، وهو جوهر ذو طاقة مُسهِّلة لا تُضاهى، إذ إن مقدار سِت ملِّغرامات منه فقط تكفي لإحداث برازات وافرة ومَصْليّة جدًّا،

Purging flax, کَتَان مُسْهِل، فَرْق -۲٤٤ Cathartic flax (E)

وذلك من دون ألَم ومن دون مَغْصَات.

Lin purgatif (F)

Purgier-lein, Purgier-Flachs (D)

Linum catharticum (S)

عُشبة مَبذولة شَغْريّة مُعمَّرة من فَصيلة الكَتّانِيَّات تعلو من ١٠ إلى ٢٥ سم. ساقها مخشوشبة فَرْعاء. أوراقها طبيّة مُسْهِلة، السُّفلي منها ضُمِّيّة التَّجميع، الوُسطى والعُليا مُتعاقِبة خطيّة. أزهارها كبيرة القَدّ لونها إلى الصفار التِّبنيّ.

المركبات - وجد Pagenstecher في الكتّان المُسهِل، عام ١٨٤١، مادّة تُدعى لِينِيْن، تقع على شكل بِلَّورات صغيرة حريريّة المظهر، قليلة الذَّوبان

⁽١) التَّسمية العربَّة للمؤلِّف.

في الماء، ذوابة جدًّا في الكحول والأثير. وتحتوي النبتة أيضًا على راتنج وعلى مادّة مُلوِّنة صفراء.

الخصائص والاستعمال - اللّينين هو بالتأكيد من طبيعة هيتروسيديّة. إن خصائصه المسهلة القويّة كانت مدار جدل.

وكان النَّبات يُستعمل في الماضي كمسهل قوي بمقدار ٦ غرامات من المسحوق، وبمقدار ١٥ غرامًا في نقاعة في الماء الغال. أعيد تسجيله إلى الفرماكوبيا عام ١٩٧٥.

القُنْدُس، رُوح إفْراز القُنْدُس، رُوح إفْراز Alcoolat de castoréum, Esprit القُنْدُس de castoréum (F)

كُحُولَة التَّرَبَنْتِيْن المُركَّبَة، بَلْسَم فِيُوراڤَنْتِي، كحولة فِيُوراڤَنْتِي Alcoolat de térébenthine composé, Baume de Fioravanti (F)

٥.,	ترَبُّنتين المُلاز
١	راتِنْج الآلامي
١	أصْطُرَك سائل

 أشق

 ١٠٠

 مُر

 ١٠٠

 عُنيَبات الغار

 ٥٠

 خُولَنْجان

 ٥٠

 زَدْوار

 ٥٠

 قِرْفَة سيلان

 ٥٠

 كُبْش قَرَنْفُل

 ٠٠

 جُوز طِيْب

 ٥٠

 دَقْتَمون أبيض (ورق)

 ٥٠

 كحول ٨٠ درجة

نَسْحَق المواد بشكل خَشِن ونَمْرُثها في الكحول الذي نَضعه في حَمّام مريم أمْبيق لنُعطِّي جوانبه بورق سميك نُثَبِّته بواسطة الصَّمْغ تلافيًا لالتصاق المَواد الرّاتنجية بالمعدن، نُطيِّن جيِّدًا ونَترك الكُلّ في مكان بارد لمدة ٤ أيّام؛ نُضيف التَّربَنْتين، الرّاتنجات والصَّموغ الرّاتنجية، الألْوة والأصطررَك؛ نَترك المَرْث لمدَّة يَومين إضافيَّين ومن ثمّ المَرْث لمدَّة يَومين إضافيَّين ومن ثمّ النتاج (حُذِفت هذه الكحولة من دستور الأدوية بعد العام ١٩٤٩).

المواصفات والاستعمال - سائل صاف، عديم اللَّون، يَضطرب بإضافة نِصف حجمه من الماء المُقَطَّر إليه؛ عياره الكحوليّ عند ١٥° سغ هو ٨٢ إلى ٨٥ درجة؛ فُضالته مَعدومة (دستور ٤٩). استُعمل في الماضي لمعالجة المَغْص

7.7

ك ح و

raifort composé (F)

170	فجل خيّل
077	قِشر بُرتُقال
10.	جَوز طِيب
٤٠٠٠	كحول
1 • • •	ماء
	نُقطِّر ٤٠٠٠ (لندن) .

راجع أيضًا كحولة المِلْعَقيّة المُركّبة (دستور ۱۹۳۷)، الكحولة القديمة المُضادّة للحَفّر (دستور ١٨١٨).

Alcoolat de mélisse composé, Eau de Dardel (F)

17.	 كحولة نغنع بسيطة
١٢.	 كحولة نَدَى البَحر
۹.	كحولة مَريميّة
۸٠	كحولة زُعْتَر بسيطة
٠٢١	كحولة مَلِيسَّة مُركَّبة
	نَمزُج معًا .

هذه الكحولة هي تُبسيط لوصفة كُحول ٨٠ درجة من الوصفة الكَرْمَليِّين، ولكنَّها قَريبة من الوصفة

كُحُولَة نَمْل مُركّبة، ماء الأرْيَحِيّة، ماء الشُّهامَة, Alcoolat de fourmis composé, Eau de magnanimité (F)

YY•	نَمْل أحمر
1.4.	کحول ۸۲ درجة
الكحول لمدَّة ٥ إلى ٦ الجَفاف ونَنْقَع في	

الكلويّ من الدّاخل بمقدار ٥ إلى ٦ نُقاط، ولم يعد بَلْسَم فيوراڤَنْتِي يُستعمَل فجل خَيْل من الدّاخل، بل في تَمسيدات خارجيّة لمُعالجة الرّوماتيزمات أو الكُساح.

كُحولة الفرمبواز، روح الفرمبواز Alcoolat de framboise, Esprit de framboises (F)

فرمواز مُنَظَّف ٣ غ كحول ٧٠ درجة ١٠٠١ غ نَسكُب الكحول على الفرميواز المَهروس، نَتركه ٢٤ ساعة ونُقطِّر غرامًا كحولة المَليسَّة المركَّبة، ماء داردَل واحدًا (أي جزء من أربعة). نُحضِّر مثله كحولة الشَّنْلَك.

كحولة فيوراقنتي Alcoolat de Fioravanti (F)

كُحولة اللَّيمون الحامض، روح قشرة الحامض Alcoolat de citrons, Esprit d'écorce de citrons (F)

قِشر حامِض طازج نَمْرُث لمدّة يَومين، نُقطِّر في حَمَّام مَريم الحقيقيّة إلى حدٍّ كبير. حتى سَخْبِ كُمِّيّة الكحول كلّها (كودكس ١٨٦٦). نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها كحولات البَرْغَمُوت، الكُبّادَة، النَّهِ تُقال وأزهاره.

> كحولة مضادّة لداء الحَفّر، إكسير فجل الخيل المركّب، روح فجل الخيل المركّب Alcoolat antiscorbutique, Elixir de raifort composé, Esprit de

ك ر ف	رائحة مُميَّزة، طعمه حارِق، مَذاقه مَذاق
	قِشر الحامِض، يَضْطرب قليلًا مع حجمه
	من الماء ويَضطرب بشكل بارز بإضافة ٤
	أو ٩ أحجام من الماء إليه.

الاستعمال - لَيموناضة الحامِض المَغنازيّة (دستور ١٩٦٥). شَراب الحامِض اللَّيمونيّ (دستور ١٩٦٥). شَراب كلورهيدروفوسفات الكلسيوم (دستور ١٩٤٩).

Alcoolature كُحُولَتُور البُرْتُقال الحُلُو d'orange douce (F)

نُحَضِّر قُشور البُرتُقال كما فَعَلنا مع قُشور اللَّيمون الحامِض أعلاه.

سائل عنبري اللَّون الأصفر، رائحته مُمَيَّزة، طعمة لاهِب، مَذاقه مَذاق قِشر البُرتُقال، يَضطرب بشكل واضح بإضافة حجم واحد، أربعة أحجام أو تسعة أحجام من الماء إليه.

Mountain parsley كَرَفْس الجَبَل - ٢٤٧ (E)

Athamante Selin persillée, Persil de montagne (F)

Augen Wurz (D)

Athamanta oreoselinum (S)

نَباتان من فَصِيلة الخَيمِيَّات، بُزورهما طِبِّيَّة مُنَشِّطة ومُبوِّلة كانت مُسجَّلة في دستور أدوية ١٨١٨، وأُعيد تَسجيلُهما في الفَرْماكوبيا عام ١٩٧٥؛ النَّباتان هما جَزر الرُّعاة (أطلبه في المعجم الرَّابع ص

الحاصل ما يلي:

نُقَطِّر من جديد حتَّى الجفاف.

يُعطى غِيبُورت تركيبة مُماثلة ولكنّه يَعكُس عمليّة التَّحضير: فيجعل نُقاعة النَّمل في ماء الكحولة العِطريّ.

الخصائص - كحولة قَلْبيّة، نافعة للمَعِدة، مُبوِّلة بمقدار ٤ إلى ٨ غرامات في سائل ملائم من الدَّاخل، وفي فَرْك وتمسيد خارجيّ في حال الشَّلَل وضَعْف المَفاصل. النَّمْل يُكسِب الكحولة الحامِض الخاص به، أي الحامِض النَّمْليّ (فُورميك).

Alcoolature كُحُولَتُور الحامض ٢٤٦ de citron (F)

قِشر حامِض طازج کحول ۸۰ درجة

نَرفع طَبَقة القُشور الخارجيّة الّتي تَحتوي على جيوب زَيتيّة؛ ونَمْرثها في الكحول لمدّة ٨ أيّام، في وعاء مُقْفَل، مع تحريكها من وقت إلى آخر، نُمرَّر مع العَصْر ونُصفِّي (دستور).

المواصفات - سائل مُخضَر اللَّون الأصفر، الأصفر إلى عَنْبرى اللّون الأصفر،

4.4

كرف

ه ه رقسم ۱۱ ، Athamante de Crète (۱۳ والثَّاني هو كَرَفس الجبل، وهو نَبات وهو ضَرب من الجنْسَن. أمَّا الخَيْمِيَّتان عُشبيّ بَرِّي طبِّيّ مُعمَّر مَنبِتُه الجبال فهما: كَرَفْس الماء الضيّق الورق، العالية. ساقُه مُخْشوشِبة تَعلو من ٢٠ وكرفس الماء العريض الورق. إلى ٤٠ سم. أوراقُه مُستطيلة الأعْناق، كثيرة التَّفريض والتَّشريم. أزهارُه صِيْوانيّة ٢٤٩- كَرَفْس الماء الضَّيّق الوَرَق، التَّجميع صغيرة القَدّ وَرديّة اللَّون. بُزُوره كَرَفْس الماء المُنتَصِب، سِيُوم ضَيّق مُنشِّطة ومُدرّة للبول.

> ۲٤٨- كَرَفْس الماء، سِيُوْم^(١) Water Celery (E) Berle (F) Wasser Sellerie (D) Sium (S)

> كَرَفْس الماء أي سِيُوم هو جنس نباتات مائيّة وإلْف الرُّطُوبة من فَصيلة الخَيْميّات. أزهارُها يَبضاء. كأسُها خُماسية الأسنان. بَتَلاتُها بَيضاوية الشَّكل المُنْقِل، مُقوَّرة، نَصِلُها مَلُوي. ثمرتُها بَيضاويّة أو مُتطاوِلة، مَضْغوطة جانِبيًّا. مَريكَرْباتها Méricarpes خُماسيّة الضُّلوع الخَطّية. أوراقُها ريشيّة التّشريح.

خَيْمِيتان من هذا الجنس كانتا مُسجَّلَتين فى دستور أدوية العام ١٨١٨ باسم Berle ، بفضل خصائِصهما المضادَّة لداء الحَفَر والمُدرّة للبول، وأعبد تسجيلهما في الفرماكوبيا الفرنسية بإصدارها التّاسع عام ١٩٧٥. كما يَنتمي إلى هذا الجنس عينه النّبات الصّيني المُسمّى

نَنْزِي (۲) Sium Ninzi أو سِيُوم نَنْزِي (۲)

الوَرَق (٣) Prickly water celery, angustifoliate water celery (E) Berle à feuilles étroites, Berle dressée **(F)** Steifwassersellerie (D) Sium angustifolium, Sium erectum, Sium berula, Berula erecta, Berula

angustifolia (S)

نَبات عُشبي طبِّي مُعمَّر من فَصِيلة الخَيْمِيّات، جذره زاحف، رئديّ. ساقُه محزَّزة، ناسُوريّة، فَرعاء، تَعلو من ٢٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقُه ريشيّة التَّشريح إلى وُرَيقات مُتطاولة، مُشَرَّمة ومِنْشاريّة التَّسْنين. الخَيمات من ٨ إلى ٢٠ شعاعًا، مُعظمها إبطي، صغير، مُزوَّدة ىقُلافَة وقُلَيْفَة جَيِّدة النُّموّ ومُؤَلِّفة من قُنابات عُشيئة، سِنانيّة، غالبًا ما تكون مُسنَّنة أو مُشرَّمة. الثَّمرة صغيرة، بَيضانيّة، ضُلُوعُها خَيطيّة، بارزة في النِّهاية. إزهراره من نيسان إلى أيلول في الحُفَر والأقنية وضفاف الجداول والسّواقي.

⁽٢) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٣) كل التُّسمات للمؤلِّف ما عدا اللَّاتِيَّة.

الخصائص والاستعمال - كان هذا النَّبات مُسجَّلًا في دستور أدوية ١٨١٨ بفضل خصائصه الطبية المُضادَّة لداء الحَفَر والمُدِرَّة للبَوْل، وأُعيد تَسجيلُه في الفرماكوبيا الفرنسية، الإصدار التاسع عام ١٩٧٥.

٢٥٠- كُرْكُم صِبَاغِي، هُرْد، عَقِيد هِنْدِيّ Curcuma, Turmeric, Long rooted curcuma (E)

Curcuma, Curcuma long, Safran des Indes, Souchet des Indes, Racine de Safran, Terra merita (F) Gilberingwer, Gilbwurzel (D) Curcuma longa, Amomum curcuma

(S)

الكُرْكُم الصّباغيّ هو اسم يُطلَق على ريزوم نَبات من فَصِيلة الزَّنْجَبيليَّات يَنبتُ في الهند الشَّرقيّة والصِّين. إن هذه الرِّيزومات تشبه الزَّنْجَبيل بَعض الشَّيء من حيث الشَّكل والرَّائحة، وتختلف عنه بلونها الدّاخليّ الأَصْفَر.

المُواصَفات - تُعْرَض ريزومات الكُركُم في الأسواق عمومًا بشكلَيْن: فتكون تارة دَرَنات بَيْضيّة الشَّكل، بحجم بَيضة الحمامة وأكثر، تكسوها قشرةٌ مُرمَدَّة اللُّون، ومُزيَّنة بِدَمْغاتِ دائريَّة، وأَثْلام غير مُنتظمة، وبَقايا جذور عَرَضيّة، خصائص الكُركُم هي عِطريّة، مُنبِّهة، تَكُونَ غَالِبًا مُقَطِّعة (كُركُم مُستدير أو كُركُم صينيّ)؛ وطورًا تكون الدَّرَنات مُتطاولة الشَّكل، نحيلة الطُّرفين، بحجم حالات عديدة جدًّا.

الأَصْبَعِ الصَّغيرة، ويكون سطحها مُخضَرِّ ك رك اللُّونَ الرَّمادي، مُحَبَّب، مُمرَّك بأثلام عَرَضيَّة عديدة، وعليه بعض النُّتوء التيَّ تُمثِّل البراعم (كُركُم طويل). مِكسَرُها واضح، مُحمَر اللُّون الأَصْفَر، بَرَّاق نوعًا ما، مُمَرَّك بتَنْقيطاتِ ظاهرة جدًّا في القشرة وفي الخشب.

> يُعطى سطحُ مَقطَع الريزوم لونًا أحمر مع نقطة واحدة من محلول البوتاس KOH؛ ويُعطى لَونًا بَنَفْسجيًّا مع نقطة واحدة من حامض سولفوريك ،H₂SO أمّا المسحوق فكون مُحمّر اللُّون الأصفر.

المُركّبات - يَحتوي الكُرْكُم على نشاء، زَيت دُهنتي طَيّار مُفَلْوَر أُو فُلُوريّ، مَوادّ راتِنجيّة، مادّة مُلوّنة تُدعى كُرْكُمين Curcumine، يَتمّ الحُصول عليها بسهولة بواسطة الأثير، خاصّة بعد تَخَلُّصِها من الزَّيت الطَّيّار والمَوادّ الراتنجية بواسطة كبريتور الفحم (سُولْفُور الكَربون). القِلى تُلوِّنها بالأحمر. بالإضافة إلى ما تَقدُّم، لُوحظ وجود سَتُون سَسْكى تَرپينيك تركيبه ، C₁₅H₂₀O يُسدعسى تُسورْمَسارُون . Turmérone

مُبوِّلة. ويُستعمل في الصِّبغة الصَّفراء. خصائصه المُدرَّة للصَّفراء تَثَبَّتت في

117

٢٥١- كَرْلِيْن ذَهَبِي، كَرْلِيْن شائع، وفقًا لما يلي: خَرْشُوف بَرِّيُ Carline thistle, Common Carline (E) Chardon doré, Carline vulgaire (F) Kleine oberwurz (D) Carlina vulgaris (S)

نَبات شائك من فصيلة المُركّبات يَعلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم، أوراقُه شائكة، كبيرة القدّ، شديدة التَّفريض، خَمْلتة الصَّفحة السُّفلي. رؤيساتُه الزَّهريّة ضُرّية، قطرها من ١٠ إلى ١٢ سم. قُلافاتها شائكة. قُنابات القُلافة مُتعدِّدة الصّفوف، الخارجية منها شائكة، الدَّاخليَّة سَرْحَة، رقيقة وشَفَّافة، ذَهبيَّة اللَّون الأصفر، ٧٥٣ - كلُورُور حديديك(٢) تَنبسط غالبًا، وتكون مُهدَّبة الرأس أو بكاملها. زُهيراتها كلها خُنثويّة. الأسدية حُرّة الخبوط. الأكنات أسطوانيّة، مُزَوَّات القاعدة، حريريّة، سُرَّتها قاعديّة. ملح لامائي الخصائص والاستعمال - يُقال إنه من نُحضِّره كما يلى: النَّباتات الطبِّيَّة التي تفيد إفادة الحرشف سَسْكي أوكسيد الحديد كمية مطلوبة والأرضى شوكى (إدوار غالب). وجاء عنه في أحد المراجع الفرنسيّة العلميّة أنه نبات كان يحظى بشهرة واسعة في الجفاف. معالجة الأمراض الطاعُونِيّة والوَبائِيّة. جذره لم يزل يُستعمل في يومنا أحيانًا كمقو للخيل.

۲۰۲- كلُورُودِيْن Chlorodyne (F)

دواء شعبيّ في إنكلترة، كان يتركّب

(١) التَّسمية العربيَّة الأولى للمؤلِّف والنَّانية لإدوار

٦٠ ملل	كلوروفورم
٦٠ ملل	كحول
١٢٥ ملل	دِبس شَونْدَر
ائع ١٥ غ	مستخلص السوس الم
, ۲,٥	كلورهيدرات المورفين
٤٠,٠٦	سولفات الأتروبين
۰٫۵۰ غ	دهن النعنع
١٨ ملل ١٨ ملل	حامض سيانهيدريك
۱٫۲٥ غ	صَّمْغ الكُثيراء
، ۳۰۰ ملل	ماء مقطَّر، كمية تكفي

ferrique, Perchlorure de fer, Muriate de fer (F)

Sel anhydre (F)

حامض كلورهبدريك كمية كافية نُذوِّب ونُبخِّر في حَمَّام مريم حتى

ملح يَتبلَّر في صُفَيْحات بنفسجيَّة اللَّون، سمراء المُواج الذَّهبي. وهو مَيُوع جدًّا. وكانت ميوعته، التي تَتَشكِّل من امتصاصه للرطوبة الجوِّيّة، يُشار إليها في الماضي باسم زيت المرّيخ. وهو يذوب جدًّا بالماء، يذوب بالكحول وحتى في الأثير.

⁽٢) التَّسمة للمؤلِّف.

Soluté كلورور حديديك محلول officinal de Chlorure ferrique, Chlorure de fer hémostatique, Liqueur du Dr Pravaz (F)

من أسمائه: مُذابة كلورور الحديد الرَّقوء، المَخْزَنيّة، كلورور الحديد الرَّقوء، كلورور الحديد اللَّقوء، كلورور الحديد السّائل، مشروب الدكتور پراڤاز الرّوحي، . . . كان دستور أدوية ١٨٨٤ يُحضَّره وفقًا لما يتبع:

نُعالج ١٠٠٠ غرام من خُراطة الحديد بواسطة ٣٠٠٠ غرام حامض كلورهيدريك مَخْزَنيّ، تُخفَّف في مقدار مَرَّتين حجمها من الماء؛ نُحرِّك من وقت لآخر حتى يتوقَّف انبعاث الغاز؛ نجعل عندئذٍ

الپروتوكلورور الحاصل يُسجِّل ١,١٠
بالمكثاف؛ نتركه يتركّد؛ نُصفَّق؛ نَضع
المحلول في مجموعة من أوعية وُولف
Woulf، نمرِّر فیها مجری من الکلور
المغسول، حتّى لا تعد تعطي بقايا من
لون أزرق پروسِيَا بواسطة السِّيَانور
الأحمر. نَضمٌ عندها مجموع السائل؛
نُضيف بحذر وبتحريك مستمرّ، محلولًا
من الكلورور الحديديّ Ferreux حتى
تختفي تمامًا أيَّة رائحة كانت (مع تلافي
زيادة من الكلورور الحديديّ بالوقت
ذاته). ومن ثم يُعاد محلول كلورور
الحديديك Ferrique إلى كثافة ١,٢٦
بإضافة كمّية كافية من الماء المُقطَّر.

بومِيه	كثافة المحاليل الحاصلة	ماء مُقطَّر		مَحلول مَخْزَنتي
٥٢°	تعطي محلولًا كثافته ١,٢١	٥ غرام	+	۲۰ غرام
۰۲۰	تعطيّ محلولًا كثافته ١,١٦	۱۰ غرام	+	۲۰ غرام
°10	تعطيّ محلولًا كثافته ١,١١	۲۰ غرام	+	۲۰ غوام
°1•	تعطيّ محلولًا كثافته ١,٠٧	٤٠ غرام	+	۲۰ غرام

بواسطة هذا المحلول المَخزنيّ، يُمكننا تفاعله حامض مع دَوّار المحلول، غير الحصول بسرعة على محاليل مختلفة قابل للفساد في الهواء أو في الضوء، التَّركيز، وذلك بتحضير الأمزجة التّالية: وهو يحلّ الهيدروكسيد الحديديك مُتلوِّنًا

مواصفات المُذابَة المَخزَنيّة - يحتوي محلول پركلورور الحديد المَخزنيّ بشكل محسوس، وفي ١٠٠ جزء، ٢٦ جزءًا من پركلورور الحديد الذي يُفترض أنّه لامائيّ، أي ٩ بالمئة من الحديد. وهو يشكّل مشروبًا روحيًّا صافيًّا، محمر اللَّون البُنِّي، طعمه عَقول جدًّا، كثافته ١,٢٦،

تفاعله حامض مع دَوّار المحلول، غير قابل للفساد في الهواء أو في الضوء، وهو يحلّ الهيدروكسيد الحديديك مُتلوّنًا باللَّون البُنِّيّ تحت تأثير الحرارة، فيصبح لونُه أقتم على أثر تَبدُّد الكلورور الحديدك المحلول.

الخصائص والاستعمال - إستُعمِل جدًّا في الماضي كدواء رقوء داخليّ، وخاصة خارجيّ، وهو في يومنا يُهمل أكثر فأكثر. فهو بالواقع، وفي الاستعمالات الخارجيّة،

717

ك ل و

ك م ا

Alchémille couronnée, Alchémille à diadème (F)

Diadem Sinau, Diadem frauenmantel, Beumkränzensinau (D)

Alchemilla diademata (S)

نَبات مُعَمَّر مَحصور الوجود في لُبنان من فَصِيلَة الوَرْدِيّات. سُوقه مُنتصِبة فصاعدة تَعلو من ١٠ إلى ١٥ سم، قاعدتها كثيفة الهُلْبِ بأوبار مُتَفرَّقة في قسمها العُلويّ. الأوراق القاعدية شبه كلوية الشُّخُل، مَرْطاء الصَّفحة العُليا، هُلْبيّة الصَّفحة الشفلي، عرضها ٣ إلى ٤,٥ سم، وطولها أقل من عرضها، وهي مُشَرَّحة حتى ثَلثها إلى ٧-٩ فُصوص، كلّ فَص منها مُشَرَّم بدوره إلى ٦-٧ أسنان من كلّ جهة، وهي أسنان قَلَمِيّة الشَّكْل، قليلة الاتِّجاه نَحو الوَسَط. الأوراق السّاقية صغيرة، نصف مُستديرة، خُماستة الفُصوص غير الكاملة. الأزهار قصيرة السُّونِقات، مَرْطاء تمامًا. النَّمرة بَيضاويّة، قُرْبيّة الشَّكْل.

Break كَمَالِيَّة البَرِّ، كَمَالِيَة الحُقُول (۲) stone, Colic wort, Persley piert (E) Alchémille des champs, Perce-pierre des champs (F)

Feld sinau, Feld frauenmantel, Steinbrech (D)

Alchemilla arvensis, Aphanes arvensis (S)

نُبَيْتَة حَوليَّة من فَصِيلَة الوَرْدِيَّات شُوقها

يُحدِث في غالب الأحيان نَدَبات وآثارًا للحروق، ويمكنه إحداث سَدَّات وهَمامات مُميتة؛ وأكثر من ذلك، فإنّه شبه عديم الفَعالية من الدّاخل. وهو يُستعمل لتحضير سيترات الحديد النُشادريّ، وسَسْكى أوكسيد الحديد المُميّة.

مستحضرات مختلفة من الكلورور الحديديك:

- يُحضَّر تحت اسم «رقوء الحقيبة» قطع من الصّوفان المُنتخب والمُجفَّف سلفًا، يتم تشرّبها بالبركلورور. ويكفي للاستعمال بوضع صوفانة على الإصبع أو على الفتحة الدامية، وضغطها لمدة الدامية والاحتفاظ فيها بواسطة رباط.

- وحسب بيازًا، فإن كلورور الصوديوم قد يُخفِّف التأثيرات المثيرة لپركلورور الحديد؛ ومن هنا المستحضرات المُسمَّاة كلورور الحديد والصوديوم، كالتركيبة التالية:

محلول اليركلورور المتعادل

إن هذا السائل يسجِّل ٢٠ درجة بومِيه.

''کمالِیَّة مُتَوَّجَة ، کَمالِیَّة مُکَلَّلَة'' Diadem lady's mantle, Crowned lady's mantle (E)

⁽٢) التَّسمة العربَّة للمؤلِّف.

خَيطيّة الشَّكُل تَطول من ٤ إلى ٦ سم، وهي بالكاد هُلْبِيّة. أوراقها القاعديّة مُسوَّقة، مُتَصَبِّعة، سريعًا ما تَذوي. الأوراق السّاقيّة السُّفلى مُسوَّقة بوضوح، مُؤذَّنة، عُنقها من ٢ إلى ٣ مم، ونصلها من ٤ إلى ٥ مم، مِرْوَحيّ الشَّكُل، شبه كلويّ الشَّكُل. أزهارها في جَشُوات صغيرة جدًّا، أنبوب كأسها جُريسيّ الشَّكُل.

الخصائص - قيل عن كافّة أنواع الكَماليّة إنّها تَتَحلّى بالخواصّ الطبّيّة وإنّها شابِقة وتُؤتِّر أغشية البَكَارة فتفيد اللَّواتي فَقَدْن كَيْنَهُنَّ (أطلب كمالية مَبذولة لمزيد من التّفاصيل في المعجم الأوّل ص ٣٢٧ رقم ٢٤١).

۱۵۵- الكَنْكِيْنا وتَركيبها الكيميائي Quinquinas et leur composition chimique (F)

إن تركيب الكنكينا الكيميائي هام جدًا؛ وهو مُعقَّد ويختلف من نوع إلى آخر. إن الجواهر الخاصة الموجودة في قشور الكينا هي القِلَويدات التّالية: سينكونين ومُتجازِيْه السينكونيدين (كينيدين الألمان)؛ كينين ومتجازِيْه الكينيدين (كونكينين هَسّ).

هناك علائق بين هذه القِلَويدات الأربع تُبيِّنها تركيباتُها الكيميائيَّة. كان ب.أ. جُوْمَس B.A. Jomes أوَّل مَن استخرج من الكنكينا مادّة أطلق عليها اسم

سينكونين، ولكن مَن اكتشف الكينين والسينكونين وعَرَّف بهذه القِلَويدات كان كلّ من پَلاتييه وكاڤَنتُو، عام ١٨٢٠. وقد تمّ الحصول على السينكونيدين، وهو الاسم الذي أطلقه عليه پاستور عام ١٨٤٠، بفضل وينكلَر، عام ١٨٤٧، الذي أطلق عليه اسم كينيدين، بتركيب كيميائيّ أطلق عليه اسم كينيدين، بتركيب كيميائيّ أطلق عليه اسم كينيدين، بتركيب بلّورات لامائيّة تذوب في ١٩٠ جزء أثير، وفي ١٦٠ جزء كحول.

عام ۱۸۳۳، أطلق اسم كينيدين على قلويد تركيبه C₂₀H₂₉N₂O₂ درسه پاستور عام ۱۸۵۳ وبيّن مشابهته لما دُعي بيتا- كينين. وهو قلويد يوجد في كنكينات پيتايو على الأكثر.

من القِلَويدات الأخرى: هيدروسينكونيدين، هيدروسينكونيدين، كوپرايين، سينكونامين، هيدروكينين، هيدروكينين، هيدروكينيدين، إلخ (أي ما مجموعه ٢٥ قلويدًا عُزلت من قشور الكنكينا).

السينكونامين 196,4 السينكونامين 10-296,4 الذي اكتشفه أرْنُود Arnaud عام ١٨٨١، مفيد بتكوينه الذي يتقارب من اليُوهِمْبِيْن ومن الستركنين من جهة، ويتقارب من السينكونين والكينين من جهة ثانية.

الكينامين $C_{19}H_{24}N_2O_2$ اكتشفه هَسّ عام ۱۸۷۲ في الكنكينا الحمراء . Succirubra . وهو شبه عديم الذوبان في الماء، يذوب في الكحول (۱۰۰ جزء)،

كنك

كنك

وفي الأثير (٥٠ جزءًا)، وفي البنزين، إن هذه المحاليل لا تعطي تَلَايُوكينين Thalléioquinine

الپاریسِیْن الذی تمّ اکتشافه فی قشرة Buena hexandra Pohl.=Cascarilla ، ثمّ اکتشافه ثانیة فی hexandra Pohl. (C16H18N2O ترکیبه ۱۳۰۵) ینصهر عند ۱۳۰ سنځ؛ وهو خامل فی الضوء المُسْتَقْطَب.

إن الأسماء: أريسين ، C22H26N2O4 سينكوڤاتين، كُوسْكُونِين، پَلْتُوشِين، قَرْطاجِيْن، بسودوكينين، هي أسماء أُطلِقَت على قلّويدات مستخرجة من بعض القشور المنخفضة الجودة، مثال قشور سينكونه پَلاتيية الزغبية (١) أو كنكينا پَلاتيية الزغبية (١) Cinchona كنكينا پَلاتيية الزغبية (١) pubescens vahl, Var. Pelletierana wedd.

الكسينيسين C₂₀H₂₄O₂N₂، لم يوجدا والسينتُونيسِين C₁₉H₂₂N₂O، لم يوجدا بحالة طبيعيّة في الكنكينات، ولكن باستور حصل عليهما بإخضاع الكينين والسينكونين لعمل الحرارة في شروط معيَّة.

الكينويدين هو مزيج من مختلف قِلَويدات الكنكينا.

السينكوجانين وجده دَسْتُوش في فُضالات كنكينات رَماديّة.

الكينيك الذي اكتشفه هوفمان عام ، 1۷۹۰ متركيب كيميائي ، 1۷۹۵ وهو في بِلَّورات مَوْشُوريّة عديمة اللَّون وشفّافة، كبيرة، لا تفسد في الهواء، تذوب في ۲٫۵ جزء من الماء وفي الكحول، وتنصهر عند ۱۲۲° سغ.

كذلك نجد في قشور الكينا الحامض

Por کنکیننا کولُومْبیا الصفراء، کنکیننا Quinquinas Jaunes de پیتَایُو (۲) Colombie, Quinquina Pitayo (F) Cinchona pitayonsis (S)

نوع من الكنكينا الصَّفراء، الفقيرة

المظهر، ولكنها غنية بالكينين، إن

البيتايو الرقيق يعطي حتى ٤٠ غرامًا من سولفات الكينين في الكيلوغرام الواحد. من ضروب الكنكينا الصفراء نذكر أيضًا القشور المختلفة التي تنتج من شجرة سينتُكُونَه رُمْحِيّة الوَرق (٣) Cinchona (التي تختلف لونًا وقدًا ودقة في النسيج. أعيد تسجيل هذا النوع، كما سينكونه بيتايو، في الفرماكوبيا بإصدارها التاسع عام الفرماكوبيا بإصدارها التاسع عام

١٩٧٤. يكون معظم هذه الضروب

برتقالي الصبغة، ويكون بعضها أصفر

اللون، ويعضها الآخر أحمر اللون

تقريبًا. بعضها يكون ملفوفًا، بعضها

الآخر مُقَوسًا، الأكبر حجمًا يكون

⁽٣) التَّسميتان العربيَّتان لِلمؤلِّف.

⁽٣) التَّسمية العربيَّة للمؤلِّف.

⁽١) التَّسميتان العربيَّتان للمؤلِّف.

مسطّحًا .

ك و ث

الأصناف الرئيسية هي كاليزايا سائتا في (١٠ Calisaya de Santa-Fé التي تعطي من ٣٠ إلى ٣١ غرامًا من سولفات الكينين في الكيلو الواحد؛ كنكينا مُوتِيس البرتقالية اللون الأصفر، من ٢٥ إلى ٣٠ غرامًا من سولفات الكينين في الكيلو الواحد؛ الكنكينا القرطاجية الليفية، من الواحد؛ الكنكينا القرطاجية الليفية، من وأخيرًا، هناك كنكينا متقاربة جدًّا من وأخيرًا، هناك كنكينا متقاربة جدًّا من السينكونه الرمحية الورق، هي كَنْكِيْنا الكِينِيدِيْنِ (١٠) التي تعطى من ١٤ إلى ١٥ الكينيد.

إن گنكينا ماراكايبُو، أو گنكينا قلبِية السورَق (٢) Cinchona Cordifolia Mutis التي تصل من غرناطة الجديدة يجب أن يستبعدها الصيادلة ومصانع سولفات الكينين. تحتوي بنوع خاص على سينكونيدين وعلى ٢ إلى ٣ أجزاء من سولفات الكينين.

غرامًا من الكينيدين بالألف.

إن هذه الأنواع الثلاثة الأخيرة التي تأتي من غرناطة الجديدة، تشترك فيما بينها ببعض المواصفات التي تميّزها بوضوح عن الكاليزايا: نسيج قسمها الخارجيّ فلينيّ بدل أن يكون ليفيًا، وعلى سطحها الخارجيّ قِطع صُفَيحات رقيقة، لامعة، طُلْقِيّة أو مِيكِيّة المظهر رقيقة، لامعة، طُلْقِيّة أو مِيكِيّة المظهر Micacé، توجد هنا وهناك؛ وتختلف

(١) التَّسمية العربيَّة للمؤلِّف.
 (٢) التَّسميتان العربيَّتان للمؤلَّف.

دقة الألياف حسب جودة القشور: فتكون خشنة جدًّا في الماراكايبو، وقد تصبح هذه الألياف في الضروب الجيدة من كنكينا بيتايو أو الرمحية الورق، تصبح مفكّكة وذرورة بقدر ما تكون عليه في الكاليزايا.

۲۵۷ - كَوْثَلُ الكَاشُو، أَطْمَاطُ الكَاشُو، Areca-palm, Betel-nut تانْبُول، فُوفَل palm (E)

Arec ou Aréquier, Noisette d'Inde (F) Arekapalme, Pinangpalme (D)

Areca faufel, Areca catechu (S)

شَجَرة هندوماليزيّة من فَصِيلَة النَّخْلِيَّات. ساقُها وَحيدة تَعلو من ١٠ إلى ٢٠ مترًا، ضعيفة القُطر، خالية من الأوراق على مُعظم طولها. أوراقها إكليليّة التَّجميع المُفَرَّق، طولها من متر إلى مترين، عديدة الشُّويكات، عريضة، طَرِيّة، غير مُنتظِمة التَّسنين الطَّرَفيّ. تُعطي هذه الشَّجرة ما يُسمّى Noix d'arec، أي جَوز الكَوْثَل أو جَوْز الأطْمَاط (٣).

جَوْزَةُ الكَوْئُل - ثَمرة كَوْئُل الكاشو، وهي بزرة صُلْبَة وثَقيلة، كُرَويّة، بَيضانيّة أو مَخروطيّة نوعًا ما. يَبلغ طولها من ٢ إلى ٥ سم. بُرتُقاليّة أو حمراء اللَّون. مُسطَّحة القاعدة المَبْعُوجة الوسط حَيث يُوجد باقة ليفيّة صغيرة، هي بقايا علائق البزرة إلى غلاف الشّمرة. سَطحها

⁽٣) التَّسمة العربيَّة للمؤلِّف.

ك و ث

الخارجيّ شبكيّ الشّكل المُعَرَّق، قِرْفيّ اللَّون البُنِّيّ. غلافها الخارجيّ الرَّقيق يَدخل في تَنْية عميقة في نسيج البزرة، ويَبرز على المَقْطَع كلون بُنِّيّ على أرضيّة مُبْيَضَّة لكامل الكُتلة الشَّمريّة. رائحة البزرة زبديّة عند كسرها. طعمها قابض عَقُول خفيف المرارة. إنّ البزرة المُسمّاة «جَوزة الكَوْثَل»، والمُستخرَج المُسمّى «كاشو» أعيد إدراجهما في الفَرْماكوبيا الحديثة.

المُرَكِّبات - إذا طُحنت جَوزة الكَوثل مع الكلس الحاصل من قُشور المَحار ومع التَّنْبُول تُعطي عِلكًا يُستعمَل جدًّا عند الهندوس والأندوشينيّين والملازيّين.

جَدَّد جانز Jahns، سنة ۱۸۹۱، أربع قِلْویدات في جَوزة الکوثل وهي: أریکُولِیْن (۱) arécoline، أریکاییْن arécaïne (وهو الذي عُرف فیما بعد علی أنّه مُماثل للتّالي)، أریکاییدیْن arécaïdine، غُوڤاسِین guvacine، وکان جانز قد أشار إلی وجود کُولِیْن.

واكتُشف في الجوزة فيما بعد arécolidine (١٠) الأريكوليديُنن (١٥) الأريكوليدزوغوڤاسِين (١٥) guvacine والغوڤاكولين guvaco-Line. وهي تحتوي أيضًا على ٥٠ إلى ٦٠ بالمئة من المَنّان mannanes أي ما تركيبه: $(C_6H_{10}O_5)$ الّتي تُعطي المَنُّوز

بالتَّحليل الماثيّ، ومن مَوادِّ الغالَكْتان (۱) galactanes التي تُعطي الغَلَكْتُوز بالتَّحليل المائيّ، وعلى كُولِين، وعَلَى كُولِين، وعَلَى كُولِين، وعَلَى الموادِّ الدُّهنيّة، وعلى مادّة مُلوَّئة.

أبْسَط تركيب كيميائي هو للغُوڤاسِين: $C_6H_9O_2N$ وهـــو حــامِــف هيدرونيكوتينيكي؛ أما الغُوڤاكولين فهو الأشتير المَتيليكي للغوڤاسين؛ كذلك الأريكولِيْن: $C_8H_{13}O_2N$ هو الأشتير المتيليكي للأريكاييدِين. أمّا المُركِّبات الفَعّالة الأساسيّة فهي الأريكولين والأريكايين.

الخصائص والاستعمال - لجوزة الكَوْثَل استعمالات مُهمّة في الطّبّ البيطريّ؛ وهي فَعّالة لمعالجة الدُّودة الوحيدة Ténia عند الكَلْب بمقدار ٤ إلى ٦ غرامات من مَسحوقها الحديث الطّازج.

وتُستعمَل جَوزة الكَوْثَل في بلاد مصدرها كدواء طارد للدود عند الخَيْل والبَقَريَّات، وكدواء مُضاد للإسهال عند الإنسان، إلخ.

كما تُعطي الجوزات مع الماء السّاخن مُستخلَصًا مائيًا طالما اعتُبر وكأنّه الكاشو الخالي من الكاتَشين؛ ولقد عُرف بالتّالي أنَّه ليس خالٍ منه تمامًا.

وتُستعمَل الجوزات أيضًا لاستخراج الأريكولِيْن (دراسته الأُحادِيّة مستقلَّة).

۲۵۸ - كُوْكَا، كُوْكَه، خُوْكا

Coca, Spadic busch (E)

Coca, Khoka, Hachich des péruviens, Hachich des mexicains (F)

Cocastrauch (D)

Erythroxylum Coca, E.C. var. bolivianum, E.C. var. novo-granatense, E.C. var. spruceanum (S)

الكوكا هي الورقة المُجفَّفة من شَجرة الكوكا وهي شُجرة صغيرة من فصيلة الكُوكِيّات مهدها البيرو وتُزرع منذ عهدٍ قريبِ في بوليفيا وجاوا وسيلان. ورقة الكوكا كاملة، قصيرة العُنق، بَيضويّة الشَّكل، حادة أو مُنفرجة، رقيقة النَّصل، طولها حتى ٦ سم وعرضها ٣ سم، دقيقة العُروق الشَّبكيّة مع عرق وَسَطَىّ بارز، على جانبيه خَطَّان مُنحنيان يَمتدّان من القاعدة إلى الرّأس. طعم الورقة مُرّ، يُحدِث بعد مضى فترة من الزمن إحساسًا بالتَّخدير.

كتميَّز كوكا بوليڤيا Var. Bolivianum عن كوكا البيرو Var. Novo-granatense بأوراق أكبر ويخطِّين جانبيِّين أكثر بروزًا؛ وهي أغنى بالكوكايين. زُرعت الكوكا منذ حوالي ٧٠ عامًا في أمريكا الجنوبيّة من جهة، وفي سيلان وجاوا من جهة ثانية. كوكا جاوا هي ضرب صغير الأوراق الستى تُنسسب إلى Var. Spruceanum، وهي أغنى بالقِلَويدات من كوكا أمريكا.

ك و ك أَكْغُونينيّة Ecgoniques أهمّها الكوكاييني المُياسِر أي البَنْزُويلِ مَتِيلِ أَكْغُونِينِ ؟ مُعدَّل القِلُويدات الوَسَطيّ فيها ٢ بالمئة.

> بالإضافة إلى ذلك نَجد في أوراق الكوكا هِغْرِينَيْنِ اثنينِ هما قاعدتان سائلتان تُجَرّان بالبخار المائي، سِينَّامِيل كوكايين، إيزاتروييل كوكايين، بَنْزُويل أَكْغُونِين، تروكْسِلِّين أَلْفًا وبيتًا، القليل من الشَّمع والزَّيت الدُّهنيّ والعَفْص وحامض الكوكاتانيك. تَنتمي كل هذه القِلَويدات، ما عدا الهغرينين، إلى قِلُويدات البَاذِنجانيّات الموسّعة لبؤبؤ العين.

إن كوكا جافًا الفقيرة بالكوكايين، والغَنيَّة بالسِّينَّامِيل كوكايين، تحتوي على قلوید خاص بها: تروپاکوکایین؛ وهی تُستعمل لتحضير الكوكايين الصّناعيّ (دستور).

الحفظ - تَفقد أوراق الكوكا نسبتَها بالقِلَويدات رويدًا رويدًا، ممّا يوجب حفظها في مكان جاف وتجديد مَخزونها كلّما أمكن ذلك.

مُنخَبِّل . - جدول - Stupéfiant. Tableau B

الاستعمال - كانت الكوكا شائعة الاستعمال في أمريكا الجنوبية منذ أبعد الأزمنة، كذلك في بوليڤيا، البيرو، المكسيك، على شكل عَلُوك يُلطِّف الجوع. وهي دواء تَوْفيري على غرار تحتوي أوراق الكوكا على عدَّة مُركِّبات القهوة والشاي وسواهما. تُستعمل

719

الكوكا في نُقاعة، مسحوق، سجائر، فَردِيَّة أو مزدوجة أو ثُلاثيَّة، تُحيطُها بيلولات، مستخلص، مستخلص مائع، إكسير، شراب، صبغة، نبيذ. إستعمالها الأكثر شيوعًا هو نقاعة الأوراق بالماء بنسبة ٥ إلى ١٠ غرامات في ليتر ماء غال. كل هذه المُستحضرات لم تعد مذكورة في كودكس ١٩٦٥ ولا في كودكس ١٩٧٢. المسحوق والمُستخلَص المائع والصّبغة والنَّبيذ كانت مُسجَّلة في دستور ١٩٤٩. مقادير المسحوق القُصوى هي غرام واحد للجرعة الواحدة، ٨ غرامات لكل ٢٤ ساعة (دستور).

> ٢٥٩- كَوْكُبِيَّة كَبِيْرَة، هَرْقَل Larger astrantia, Master wort (E) Astrance majeure, Grande astrance, Radiaire, Sanicle de montagne, Sanicle femelle (F) Grosse sterndolde, Meisterwurzel (D) Astrantia major (S)

نَبات عُشبي مُعَمَّر من فصيلة الخَيْمِيَّات يعلو حَوالي المتر. ريزومه ليفي، أسود اللُّون، عِطرتي الرَّائحة، يُعطى ساقًا قَويَّة، مُنتصِبَة، مالِسة، عطريّة، قَليلة التَّفَرُّع. أُوراقُه القاعِديَّة، مُرَكَّبة، تَحضن السّاق بعنقها الطُّويل. وهي راحِيَّة التَّفْصيص إلى ٥ أو ٧ فُصوص بَيضيَّة الشَّكُل المُتطاول، مُستدِقَّة الرَّأسِ. الأوراق العُليا صغيرة، بسيطة، لاطئة. الأزهار صغيرة القَدّ، بيضاء اللُّون في خَيماتٍ

قلافة واسعة مؤلَّفة من قنابات كبيرة، رَقِّيَة الرُّقْعَة، وَردية اللَّون الباهت. الثَّمرة هي أكنة خشنة الملمس.

المُركّبات - مَوادٌ صِباغِيَّة، أملاح مَعدِنيَّة، عُنصر مُسهِّل قَويٌ، عَفْص، راتنج، زيت دُهني يُنشِط الشَّهيَّة ويُسهِّل إفرازات العصارة المعويّة.

الخصائص - نافع للمعِدة، مُنشِّط للشُّهيَّة، مُدِرّ للبَوْل، مُنَقِّ، مُسهِّل قَويّ.

الاستعمال - في نُقاعة، نَقيع، أو مسحوق. الجذر هو حامز ومُرّ الطُّعْم، اشتهر كمسهِّل قويّ في كودكس ١٨١٨. أُعيد تسجيلُه في فرماكوبيا ١٩٧٥.

طريقة الاستعمال - نقيع مِلعقة من الجذر المجفَّف المفروم في مقدار كوب من الماء الغالي، يُغطّى لبعض الوقت، يُبَرَّد، يُصفِّي، ويُؤخَذ دُفعة واحدة. إن الأقسام الهوائيّة هي مُدرَّة خفيفة للبَوْل، يُؤخذ منها ٤٠ إلى ٥٠ غرامًا من النَّبات المُجفِّف المُقطِّع في ليتر ماء غال يُغطِّي نصف ساعة. يُؤخذ منه حَوالى أربع فناجين في اليوم.

ملاحظة - الكَوْكَبيّة الكبيرة غنية بالأزهار الصَّيفيّة، تَصلُح تمامًا لتزيين الحدائق الصَّخرية، وترغب جيدًا التربة الطِّينيَّة الكِلسيّة. تكثيرها يُسهل بالبزور أو بفسخ الأرومة. وهي بالتالي تصلح تمامًا لتشكيل الباقات الزُّهريّة الجافّة.

کی ن Kino d'Australie (F)

ينتج من الأوكاليبتُوس الرَّاتِنْجِيّ (۱): Eucalyptus resinifera وهمو شَمجرة كبيرة من فصيلة الآسِيّات، قشرتها ليفيّة، دائمة. أوراقها سِنانيّة. مِظلّاتها من ٥ إلى ١٠ زهرات. جِراؤها متوسّط القَدّ، بَيضانيّة إلى نصف دائريّة الشّكل.

Kino de la (۱) کِیْنُو الجَمَایِئِك – کِیْنُو الجَمَایِئِك – الجَمَایِئِك – Jamaïque (F)

يَنتج من الكُوكُولُوب المُعَنْقَد (۱): Coccoloba Uvifera الندي يُسمّى كذلك وِدْن الفِيْل، عِنَب الشَّطّ، من فصيلة البَطْبَاطِيّات، دعاه إدوار غالب: كُكْلُوب كِيْنُو.

إن كلّ هذه الأصناف من الكينو لها خصائص كينو المَلبار ذاتها.

يَصل من سُومَطْرة مع الغَمبير المكَعّب، غمبير آخر قوامه قِوام المستخلص، غَني جدًّا بالعَفْص الصِّباغيّ، يَصنعه أهل البلاد الدَّاخليّون وأهل شمالها.

ويُصنع نوع من المستخلص أو الكينو من نوع من السَّنْط القَزِم الذي ينبت في أفريقيا الجَنوبيّة، بزوره أو فولاته التي يرغبها جدًّا أرْوَس القُطْب، فتدعى لذلك فُول الأرْوَس Fèves d'Elan.

كذلك تُستعمل الكوكبيّة في الطّبّ البيطريّ لزيادة شَهيَّة الطروش. إن كلّ أُقسام النَّبات هي سامَّة خفيفة، ممّا يُوجب الحذر عند استعمالها المنزليّ.

۰۲۹ کِیْنُو Kinos (F)

لقد أوردنا في دراسة سابقة مُواصفات نُوعين من الكينو، هما: كينو غَمْبير أنكاريا، وكينوتوز مَلَبار. أمّا أصناف الكينو الأخرى فهي التّالية:

Kino de (١) كِيْنُو أَفْرِيقْيَا ، كِيْنُو أَفْرِيقْيَا - كِيْنُو غَمْبِيا ، كِيْنُو أَفْرِيقْيَا

ينتج من التُوز القُنْفُذِيّ (۱):

Pterocarpus erinaceus

من الكينو له صفات مماثلة لكينو الهند

الّذي يَنتج من تُوز مَلَبار، من حيث

ذَوَابيّته ومن حيث خصائصه الكيميائيّة.

Kino du (١) كِيْنُو البُوْتِيَّة، كِيْنُو البَنْغَال – كِيْنُو البُوْتِيَّة، كِيْنُو البَنْغَال – Bengale (F)

ويُسمّى أيضًا كينو پاتاس Patas أو پُولاس Pulas، الّذي يَنتج من بُوْتِيَّة اللَّكَ: Butea frondosa، من فصيلة القَرْنِيَّات.

- كِيْنُو بُوْتَانِي بَايْ، كِيْنُو أَسْتِراليا(١)

إڭريتي في المعجم الثّالث ص ١٩٧ رقم . (YOA

٢٦٢ - لزقة Emplâtre (F)

لزقة حجر التوتيا، لزقة حجر سُلماني (سيليكات الزنك الطبيعي)

٦٠ غ	حجر توتيا
۱۰۰ غ	شمع نباتي
٥٠٠ غ	لزقة راتنجية

يفضّل بعض الأطباء هذه اللزقة على اللزقة الرصاصية الأساس، لكى توضع على القروح الحيَّة.

نحصل على هذه اللزقة بمدّ كتلة لاصقة على قماشة مؤلّفة من ٣٠ جزء مرهم (مَرُوخ) مُشمّع لاصق، ١٠ أجزاء

١غ	كلورور زئبقي
٢ غ	كلورور الأمونيوم .
١٥	شمع أبيض
۴۰ غ	ألامي منقًى

تستعمل هذه اللزقة بدلًا عن لزقة ڤِيغُو.

٢٦١- لاذَن قُوَّيْسِيِّ الوَرَق Sage-leaved⁽¹⁾ rockrose (E)

Ciste à feuilles de sauge (F)

Salbeiblatt cistrose (D)

Cistus salviifolius (S)

جَنْهَ ليفية مُعمَّرة من فصلة اللّاذَنتات تَعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم، فَرْعاء من قاعدتها. سُوقُها وفُروعُها زغبيَّة سُرِعان لزقة بالكالومِل (زئبق حُلُو) ما تَخشوشب. أوراقُها بَبضاويّة الشَّكل الإهليلجيّ أو بَيضاويّة، أوبارها نَجميّة الشَّكل على الصَّفحَتين. أعناقها غير منسطة القاعدة. سَنَماتها جانبة الارتكاز مؤلَّفة من ١ إلى ٣ زهرات كالومِل، ٣ أجزاء زيت خروع. بيضاء يَبلغ قُطرها ٢ إلى ٤ سم. لزقة كلورو - زئبقية الكأسيّات واضحة الشَّكل القَلبيّ عند قاعدتها، خضراء اللُّون، مُزيَّنة بأوبار نَجميّة قصرة، الثلاثة الخارجيّة منها أعرض، تَستُر الاثنتين الأخريين. القَلَم قصير جدًّا أو غير موجود. الثَّمرة عُلسة لاصقة الزغب.

الخصائص والاستعمال (اطلب لاذَن

٢٦٣- لِسان الحَمَلِ القَرْنِيّ، قَرْن الأَيّل، لاصف Buck's-horn plantain, Star of earth (E)

Plantain corne de cerf, Coronope (F) Hirschorn wegerich (D)

Plantago coronopus (S)

نَبات حَولي إلى مُعمّر من فصيلة الحَمَلِيَّات يعلو من ١٥ إلى ٢٠ سم، لاصق أرغبي. أوراقه مُتطاوِلة سِنانيّة طولها ٨ إلى ١٠ (١٢) سم، عرضها ١ إلى ٢ سم، ريشية التَّسنين أو ريشية التَّحزيم، فصوصها خطِّيّة أو سِنانيّة. سُويقاته الزَّهريّة صاعدة، تَتَخطّى الأوراق أم لا، طولها ٥ إلى ٨ سم. سَنابله أسطوانية حَصْرًا. قُناباته بَيضاوية، حادة أو مُستدِقَّة الرّاس، ضيِّقة الحوافي، قصيرة الهلب اللاصق. الكأسيات الأمامية إهليلجية طولها ٢ إلى ٣ ملم، مهدَّنة الحافة، الكأستات الخلفية أطول منها بقليل. أنبوب التّاج زغبيّ. فصوص النَّصل بَيضاويَّة سِنانيَّة، مُستدقَّة الطَّرَف. العُلَيْبة بيضاويّة، حجراتها ثُنائيّة الحُجَيْرات الوحيدة البزرة. بزوره بَيضاويّة مُتطاولة، مُسطَّحة، مُتحدِّبة الوجهين.

من هذا النُّوع في لبنان ضربان أو نويعان.

لسان الحمل التي تذكر في مراجع طب جذره وتديّ كثير الجُذيرات. أوراقه الأعشاب إلى جانب لسان الحمل الكبير قاعديّة خُمّية التَّجميع على الأرض،

الفَتيّة الغضَّة تُؤكل، مثل أوراقها، في ل س ا السَّلطات. جاء عنه في «الموسوعة في علوم الطّبيعة»: «منافعه الطبّية منافع رفاقه إلّا أن مادّته الجوهرية أقلّ فعالية».

> ملاحظة - الأيّل جنس حيوانات برّية عاشية لَبُونة مجترّة من الأيايل: Cervinés وفصيلة الأَيْليَّات Cervidés، قرونها متشعّبة حَوليّة الانسلاخ. قيل إنه مولع بأكل الحيات يطلبها حيث وجدها وربما لسعته فتسيل دموعه إلى نقرتين تحت محاجر عينيه يدخل الإصبع فيهما فتتجمَّد تلك الدموع وتصير كالشَّمع فيُتَّخذ ترياقًا لسمّ الحيّات وهو البادزهر الحيواني وأجوده الأصفر. أما قرن الأيل فمادّة طبّية، يُبرش أو يُحرق أو يُقطّر، وهو يُعطى ما يسمّى بزيت دِيْبًل، ومواد أخرى متعدِّدة. عدم إشراكه مع النَّبات الذي يحمل اسمه.

٢٦٤- لِسَانُ الحَمَلِ المُتَوسِّط، مَصَّاصَة Medium plantain, Hoary صَغِيْرَة plantain, Lamb's tongue (E) Plantain moyen, Plantain bâtard, Langue d'agneau (F) Mittlerer wegerich (D) Plantago media (S)

نَبات بَرِّي عُشبي معمَّر من فصيلة الخصائص والاستعمال - هو من أنواع الحَمَلِيَّات يعلو من ١٠ إلى ٥٠ سم. والمتوسِّط والسِّنانيّ أو الصَّغير. أوراقه عريضة الشَّكل البَّيضويّ الإهليلجيّ،

ل س ا

بارزة. الشِّمراخ منتصب أو صاعد بعض الشَّىء، أسطوانتي الشَّكل، ينتهي بسُنبلة غليظة أسطوانيّة. الكأس من ٤ كأسيات ملتحمة، فصوصها عريضة الشَّكل إلتهاب الوريد (فلابيت). البَيضويّ ومزوَّدة بالأوبار. التاج يبلغ ٤ ملم طولًا، أبيض اللُّون، قِمعيُّ الشُّكُل. الأسدية ٤، منابرها بنفسجية اللُّون وحوالى ٥ مَرّات أطول من التّاج. الثَّمرة جَرُو ثُنائتي الحُجرات، بزورها إهليلجيّة، مزوّات. النَّبات بكامله مغطّى ببعض الأوبار المتفرِّقة.

> المُركِّبات - أوكُوبيْن، عفص، بكتين، حوامض، صابونين، صمغ، أملاح معدنية، كبريت.

الخصائص - منق للدم، منق للرئتين، منقّ للمعدة، قابض، مليّن، ملطف، مصرّف، شاف للجرح، لائم، مقشع، مبول، مضاد لأمراض العين، يزيد خثورية الدم Coagulabilité.

الاستعمال الداخلي - ضعف عام، هزال، تأخّر نموّ الأولاد (يعتبره البعض بمثابة زيت كَبد الموريه)، نزيفات مائع ٢ إلى ٣ غ في اليوم. (رُعاف، رحم، نفث الدم...)، المزاج النزفي، سِل، برونشيت مزمن، التهاب البلعوم، إلتهاب الحنجرة، التهابات الكلية، إسهالات، إمساك، ديسنتريا، سيلان المهبل.

> الاستعمال الخارجي - إلتهابات الملتحمة، الرَّمد، التهاب الجفون، قروح، جروح، قرحات الساق،

كاملة النَّصل، يَخطُّها ٥ إلى ٩ عروق إلتهابات اللُّئَّة، قُوبات، حَبِّ الشَّباب، أمراض جلديّة قِشريّة، رُحام (إلتهاب الرِّحِم عقب الولادات)، وخرز الحشرات، لدغ الأفاعي، رُعاف،

طريقة الاستعمال الداخلي - نقاعة، نقيع، مرث، ماء مقطر، شراب سُكّري، مستخلص رخو، مستخلص مائع، سلطة. . . المرث أو النقاعة أو النقيع في غرغرات ومَضمضات للفّم في إلتهاب الحنجرة والبلعوم والعُصابات السُّنِّية، غسيل العين المتكرّر في التهاب العين، حقن أو غسيل فَرْجِيّ في سَيَلان المهبل. مرث ٣٠ إلى ٦٠ غرام ورق في ليتر ماء يغلى دقيقة واحدة، يغطى طوال الليل، ويشرب خلال ٢٤ ساعة. نقاعة ١٠٠ غرام من الورق في ليتر ماء غال يغطى عشر دقائق، ويؤخّذ منه إلى ٤ فناجين في اليوم. عصير النبات الغض من ٤٠ إلى ١٠٠ غرام في حالات نَفْث الدّم وسيلان المهبل. مستخلص رخو ١ إلى ٢ غ في اليوم في بيلولات. مستخلص

طريقة الاستعمال الخارجي - الأوراق الغضّة المهروسة هي ضماد ممتاز على الجروح، وقرحات الساق، ولدغ الأفاعي. وهي من أشهر النَّباتات كدواء طارئ للجرح. الأوراق المهروسة يُفرك بها وخز الحشرات كالنَّحل والزُّنانير والبرغش... وتؤكل مع السَّلطات فتيَّة غَضّة. وهي أوراق أعيد تسجيلها في

الفرماكوبيا الفرنسية لعام ١٩٧٥ إلى جانب أوراق لسان الحمل السِّنانيّ والكبير.

مختلف - جَروع ضدّ الإسهال:

مستخلص لسان الحمل الرَّخو ١٠ غ غليسّرين ٤٠ غ ماء، كمية تكفي لمقدار ٢٠٠ ملل يؤخذ منه ٢ إلى ٤ ملاعق كبيرة في

مرهم ضد حب الشباب:

اليوم.

م ۲۹۰ - لَصُوْقَات مِن وَرَق، كِمَادَات مِن وَرَق Cataplasmes en feuilles, Sinapismes en feuilles (F)

قدّم كلٌ من بُوغّيُو، عام ١٨٦٥، ورِيغُولُو، عام ١٨٦٧، شكلًا جديدًا ومفيدًا جدَّا من اللّصوقات، بأسماء لزقة بوغّيو الخردليّة، لزقة ريغولّو الخردليّة، وسُجِّل هذا الشَّكل في دستور الأدوية باسم لزقة خردليّة من وَرَق، أو ورقة مُخرْدَلة، أو ورقة خردل.

يَتطلَّب تحضير هذه اللَّصوقات شرطين لنجاحه: ١° - استعمال طحين خردل خالٍ من أيَّة مادَّة دُهنيّة؛ ٢° - وضع سائل لاصتي دَبِق لا يحتوي على ماء، ولا كحول، ولا راتنج، ولا مادَّة دُهنيّة أو لاصقة Emplastiqué.

تَتم إِزالة الزَّيت من مسحوق الخردل بواسطة الكَبْس القَويِّ وغَسله بواسطة كبريتور الفحم أو بواسطة روح النَّفْط أي البنزين. أما السّائل الدَّبِق فهو من محلول لا إلى ٥ أجزاء من المطاط، في ١٠٠ جزء من مزيج كبريتور الفحم والبنزين.

نمد طبقة سَوِيّة مُتناسقة من السّائل الدَّبِق على الورقة، بواسطة أداة مصنوعة كما تُصنع أداة صنع اللَّصْقات المُشَمَّعة Sparadrapier. وبقدر ما تَتَقدَّم الورقة المُغطَّاة بالبرنيق نحو خارج الأداة المذكورة، نُحرِّك فوقها منخلاً يحتوي على مسحوق خردل مُزال زيته والذي يُمْسِك بلزوجة السّائل ويمرّ بين أسطوانتين أو لَفِيفَتَيْن، فيصبح بذلك مُثبَّنًا على الورقة بعد تبخير السوائل الطيّارة في حرارة المِحَمّ.

ومن الطّبيعي ضرورة توفيق حركات المنخل وتنظيمها تبعًا لتقدّم الورقة في الآلة وبالدقّة المطلوبة.

تُقطَّع الوَرقة بعد ذلك إلى قطع بالقياسات المرغوبة.

هذه اللَّزقات الخردليَّة يجب أن تعطي كحد أدنى ٠,٠١٢ غرامًا من الألَّيْل - سَنَاڤول لكل ١٠٠ سنتمتر مربِّع، وتحفظ بمعزل عن الرَّطوبة.

Mucilage (F) لُعاب –۲٦٦

لعاب الحلزون

770

ل ع ا

٤ عدد

حلزون مفروم ک

ماء

٠١٢ غ هيدرات أوكسيد البيشموث ١ إلى ٤ غ ۰,۱۰ غ ٢٧غ مستخلص البلَّادون ماء زهر البرتقال ٨ غ شراب المورفين السُّكري ٣٠ غ بملعقة كبيرة من ساعتين إلى ساعتين، في آلام المعدة.

۲٦٧ ليكور Liqueur (F)

١٢٥ غ ۲۰ غ حامض سيتريك ماء غال ١٠٠٠ غ ننقع في الحرارة لمدّة ٢٤ ساعة، نُصفّي

٦ إلى ٢٤ نقطة في اليوم.

ليكور كوشكن

٤ غ ملح نشادر ١٥ غ ماءماء من الدَّاخل، ضِدَّ الصَّرْع والسُّفْلِس؛ من الخارج، في ضماد القرحات الزُّهَريّة .

ليكور هُؤُلتُن

۷٥ غ أفيون ٠٣ غ حامض أستيك مركز ماء مقطر ٢٧٥ غ

ننقع في حرارة لطيفة لمدّة ٤ أيّام، نُمرِّر؛ ٤ نقاط تمثل ٠,٠٥ أفيون.

نخفق بشدّة طوال ربع ساعة، نمرّر لعاب الصمغ العربي ونضيف:

شراب الشكر

لعاب الصمغ العربي، لُعاب عربي

صمغ عربي مسحوق ۱۰۰ غ ماء مقطر

نهرس المسحوق مع الماء في هاون رُخاميّ حتى الحصول على سائل ليكور بُورتر متجانس. دستور ۱۹٦٥. يشير دستور أفيون الأدوية إلى صنع لعاب صمغ الكثيراء أثناء تحضير أقراص النعنع وأقراص القرمز (۱۹۳۷) كذلك عند تحضير اللُّعوق الزَّيتيُّ.

لعاب صمغ الكُثَيراء

۹۰ غ ماء مقطر بارد

نَضع الصمغ الكامل والمُنظَّف مع الماء في وعاء من الفَخّار أو الخَزَف الصّينيّ؛ عندما يَنتفخ جيِّدًا، نُمرِّر مع العصر القويّ في قماشة مُتراصة النَّسيج. نَجمع اللَّعاب في هاون رُخاميّ ونخفقه لکي نجعله متجانسًا (دستور ١٩٦٥).

يُستعمل صمغ الكثيراء، مسحوقًا أو بشكل لعاب يُحضَّر في وقته، في تحضير مختلف الأقراص المَخزَنبة (باستثناء أقراص النعنع والقرمز) وفي تحضير اللُّعُوق الأبيض.

الكحول العِطْرِيّ يَتركَّب من: دهن له ي ك ليمون حامض ٣٠غ، دهن نعنع ٢٥غ، دهن خزامى ٢٥غ، دهن نيرولي ٢٠غ، دهن لوز مرّ ٢٠غ، دهن قرفة ١٠غ، كحول ٨٥ درجة ٨٠٠ غرام.

ليكور وقائي ضدّ السفلس			
شب متبلّر 💮 🔹	۰٥	١	غ
سولفات الحديد	• •	١	غ
سولفات النحاس	• •	١	غ
كحول عطرتي	٠	٦	غ
ماء شائع	• •	١	غ

7

Matico (۱) مَاتِیْکُو، مَاتِیْکَا (۲۹۸ مَاتِیْکُو، مَاتِیْکُو

Matico (F)

Pipper angustifolium, Pipper elongatum, Pipper camphoriferum (S)

تَحصل أوراق الماتيكو من عدّة أنواع من فصيلة الفِلْفِليَّات تنبت في أمريكا الجنوبيّة: پيرو، برازيل، فنزويلا، كولومبيا، كوبا، وهي تامول ضيِّق الورق، تامول مُتطاوِل^(۲)، وتامول الكافور^(۲)، إلخ. أَذْخَل دورڤو هذا العقّار إلى المادّة الطبيّة الفرنسيّة عام المعرض الدّولي الذي أقيم ذلك العام في لندن.

ولكي نُميِّز الماتيكو، نَذكر أنّه أوراق طويلة، عروقها بارزة جدًّا، طولها من ٥ إلى ٢٠ سم وعرضها ٣ إلى ٤ سم، رائحتها رائحة الكبابَة والنَّعنع على السواء، طعمها حامز ومُرّ، تحتوي على دُهْن خفيف اللَّون المُخضر، يَنقلب إلى اللَّون المُصفر تحت تأثير الضّوء، وعلى جوهر مُرّ خاص يُدعى مَاتِسِيْن. وَجد فيه

مَاركُوت، إضافة إلى ذلك، حامضًا متبلّرًا هو حامض أرتانيك، وعَفْص، وراتنج، ويخضور، ومادّة مُلوّنة، وأملاح، إلخ.

يَصل الماتيكو إلى أوروبا في خُزمات ونة الواحدة حوالى ١٠ كيلوغرامات، مرصوصة بقوة في جلود أو بالات صغيرة Surons مُغلَّفة بجلد ثور أو بقر يكون شعره إلى الدّاخل. دخل الماتيكو الى فرنسا أوّل الأمر على أنّه مُضاد للنزيف. في البيرو يُطلق عليه أيضًا اسم المغشبة الجُندي، نظرًا لخصائصه العَقُولة القابضة والشّافية على الجروح والقروح. في إنكلترة دخل الماتيكو في الممارسات الطبّية لعدد كبير من الأطبّاء لوقف السّيلانات البيضاء من أيّ نوع الخ.) والسّيلانات البيضاء من أيّ نوع الخ.) والسّيلانات الدّموية على السواء، وكعقّار قابض.

إستنادًا إلى أبحاث قام بها عدد من العُلماء، تمّ التَّعرُّف إلى نوعين من الماتيكو في الأسواق، مُتميِّزين تمامًا عن بعضهما، النَّوع الأوّل الذي يقابل التامول المُتطاوِل هو α-Cordulatum والنَّوع الثاني هو β, Ossanum ويقابل التامول الضيِّق الورق.

وكان النَّوع الثّاني يُغذِّي تجارة العقاقير لفترة طويلة، ولكن الأول أصبح فيما بعد النَّوع الوحيد المُستعمل تقريبًا. أوراق هذا الأخير هي أعرض بكثير من أوراق النَّوع الآخر، أقل طولًا، وتكون بشرة

⁽١) التَّــميتان العربيَّتان لِلمؤلِّف.

⁽٢) التَّسمية العربيَّة للمؤلِّف.

نَصلها العُلبا مُرَقِّشة وخَشِنة.

تختلف نسبة الزّيت الدُهني وتركيبه بشكل بارز تبعًا للمصدر البوتانيكي. تحتوي الأوراق على ٣ إلى ٦٪ من الزَّيت الدُّهنيّ الذي يحتوي على أزارون، وعلى مَتيل أوجينول، وسَسْكى تريانات، وأيبُول يُشبه أبيول الشُّبْث. إن وجود كافور الماتيكو والبورنيول لم يتم الحصول عليهما في كافّة الأنواع البوتانيكية؛ أمّا كافور الماتيكو الذي اكتشفه فلوكيجر يبدو أنّه كان كحولًا $C_{15}H_{26}O$ ترکیبه تربانیکی، ترکیبه (التركيب العام ذاته الذي لكافور شاي المروج: Ledum).

استُعمل بنجاح بارز ماء الماتيكو المُقطِّر في زَرْقات، مُضافًا إليه كمِّيَّة ضئيلة من ملح قابض.

وُضع زَيت الماتيكو الدُّهنيّ في شكل أقراص بالغلوتين، بالاشتراك مع بلسم كوباهو. وهو الذي يمتلك خاصّية إبطال رائحة الكوبا هو وجعله أفضل احتمالًا.

طريقة الاستعمال - يمكن استعمال الماتيكو على شكل مسحوق من ٢ إلى ٤ غ؛ ومستخلص كحولى ٠,٢٠ إلى ٠,٦٠ غرامًا في اليوم؛ صبغة ﴿، من ٤ المُركِّبات - البزور تَحتوي على زَيت إلى ٨ غرامات؛ زهورات ١٠ إلى ٢٠ غرامًا في ليتر ماء؛ شراب سُكِّري ٢٠ إلى ٦٠ غرام؛ بيلولات؛ ماء ماتيكو مقطر، إلخ.

٢٦٩– مَازَرْيُون، دَفْنَة سَامَّة، أَثُم، زَيْتُوْن الأرض Mezereon, Dwarf laurel, Spurge olive (E)

Bois gentil, Daphné mézéréon, Bois de garou, Bois joli, Daphné joli bois, Bois d'oreilles (F)

Echter seidelbast, kellerhals (D) Daphne mezereum, Thymelœa prœcox, Thymelœa mezereum, Mezereum officinal (S)

جُنَيْبَة بَرِيّة صَغيرة من فَصيلة المازَرْيُونِيَّات، تَعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقُها لِيفِيّة، مُتَلَوّية، رَمادِيّة اللَّحاء المُرَقَّشِ. فُروعُها مُنتصبَة، مُرمَدَّة اللُّون، زَغِبَة. الجذر ليفيّ. أوراقُها كامِلة، مُعبلة، مُهدَّبة، مُتعاقبة، الهامِية منها خاصَّة، طُولُها من ٤ إلى ١٠ سم، وعَرضُها من واحد إلى ثلاث سنتمرات، سِنانيَّة الشَّكل المُنْعَكِس، تبرز في نهاية الإزهرار. الأزهار في ضُمّات صغيرة، إبطية الارتكاز، عديدة جدًّا، لاطئة، عِطريَّة، تبرز خلال شباط وآذار. غِلاف الزَّهرة وَرديّ إلى أُرجوانيّ اللَّون، زَغِب. ثمارها عُنيبات زاهية اللُّون الأحمر، وحيدة البزرة. نَبات غير لُبنانيّ، لَدينا من جنسه نَوعان بَرِّيّان.

شُخميّ ليس له أيّ استعمال. أوراقُها مُسهِّلة قَويّة. عُنيباتُها، من ٥ إلى ١٥، هي كذلك مُسهِّلة قَويَّة. قُشورُها، وهي القسم المُستعمَل، تَحتوي على سُكَّر،

ماز

شَمْع، زَيت، لُعاب، حامض تُفّاحيّ، مادَّة مُلوِّنة صَفراء، هيتروسيد يُدعى دَفْنَايين أَو دَفْنِين، راتِنج حامِز جدًّا يُدعى مازارايين (٧ إلى ٨٪). إن المازارايين هو الَّذي يُكسِبُ النَّباتَ مُجَمَّدة الخبز خَصائصه المُنَفِّطة، وعلى الأرجح أنه

أيضًا هو الَّذي لا يَسمحُ باستعمال

النَّبات إلَّا كمنَفِّط ومُبَثِّر خارجيّ:

. Épispastique

الخصائص - مُهيِّج ومُثير، مُحمِّر نبيذ إسبانيا للبَشَرة، مُنَفِّط، مُسَهِّل قَوي ماسِط، مُبوِّل، مُعرِّق (حسب المقادير). المقادير المرتَفِعة تجعله سُمًّا. الدَّفْنين هو عنصر يُؤَدِّي إلى الهَلْوَسَة أيضًا.

الاستعمال - نَقيع، صِبغة، مُستحضر يُحضّر من: شَحمي. نادرًا ما يُستعمَل المازريون بسبب خطورته. إن مراهمه ودُهونه يجب أن لا تُعطى إلّا بإشرافٍ طِبِّي. أعراض التَّسَمُّم بثماره تَظهرُ حُروقًا في الحَلْق، استفراغات، نزيف. الاتّصال فورًا بالطَّبب.

غالبًا ما يُستعمل المازريون من الخارج، ولكن دائمًا بإشراف طبِّي، وذلك بتحضير مَروخ منه يُهدِّئ أوجاعَ الرُّوماتيزم، أو لَزْقَاتِ مُنَفِّطَة، فَعَالة جَدًّا، تُحدِثُ على البَشَرة احمرارًا ونَفْطاتٍ عديدة. غراء سمكه عَ ويُستعمل المازريون في الطِّبِّ التَّجانُسيّ نَعلى طحلب كورسيكا لمدّة ساعة في معالجة بعض الأمراض الجلديّة واحدة في كمّية كافية من الماء حتى والتهاباتها. إن بعض الطيور التي تأكل ثمار المازريون لا تَتَسَمَّم.

۲۷۰- مُجمَّدات، خثيرات Jelly (E) Gelées (F) Gelee (D)

غ	١٨٠		******		بِسْكَت	خبز مُ
غ	٣٠٠	•				ماء
	: : د		, : , ; ;	ءة ما حد	ا ملّق ساء	1::

إلى كل ٢٧٠ غرامًا من السائل:

2,1	لبيد إسبات
۸ غ	ماء القرفة
ل ١٥ غ	عصير حامض
٥٤ غ	سکر

إن ما يسمّى La Panade عند الإنكليز

۱۸۰ غ	خبز شيلم مُحمّص
٨ غ	قشر حامض
۲غ	قرفة
۶۷۲۰ غ	نبيذ أبيض
في .	نطبخ ومن ثمّ نص

مُجَمَّدة طُحْلُب كورسيكا

طحلب كورسيكا ٠٣٠ غ سكر أبيض ٦٠ غ ٦٠ غ نبيذ أبيض

الحصول على حوالي ٢٠٠ غرامًا من السّائل، نُمرِّر، نَعصُر، نُضيف إلى

السّائل الموادّ الأخرى (غراء السّمك المُلَيَّن في الماء)، نَطبُخ حتى قِوام مناسب، نُمرّر ونُبرِّد. لمقدار ١٢٥ غرامًا مُجمَّدة (١٨٨٤).

بيرال يُحضِّر هذه المُجمَّدة بواسطة شراب طحلب كورسيكا السُّكَّريّ، ١٨٠ غرامًا؛ مُجمَّدة كحوليّة من غراء السَّمك ٩٠ غرامًا؛ نُنْقِص حتى ٢٥٠ غرامًا. بالإمكان كذلك تحضير هذه المُجمَّدة بواسطة مَلْتُوت طحلب كورسيكا السُّكَّريّ.

إن مُجمَّدة مَرْسَلِيني الطَّاردة للدَّود تحتوي بالإضافة إلى ذلك على السَّرْخَس الذَّكر، ومُستخلَص السَّرخس الذَّكر المُؤثْيَر. يُستبدَل السُّكَّر بشراب التَّوت السُّكَريّ.

Édulcorants (مُحَلِّ) -۲۷۱ (F)

إن الإحساس بالمُسكَّر، أي الحُلُو، ينتج عن عدد كبير من المُركّبات الكيماويّة الطبيعيّة أو الاصطناعيّة المصدر التي تمتلك مقدِرات مُسكِّرة تختلف نوعًا وكمَّا.

إن التَّحْلِيات تستخدم لأغراض شتى:
- لتحلية وتخفيف (حِدَّة) بعض الصفات الطَّعْمِيَّة الذَّوْقِيَّة للأطعمة أو للمشروبات؛

- لخصائصها المغذية (السُّكِّر على

أنواعه)؛

- للحاجات العِلاجيّة أو الوقائيّة: في داء السُّكِّر، في الحِمْيات المنخفضة الكالوريات أو الحُريْرات (سَكَارِيْن، سيكُلامات، أسْبارْتام،...)، لصنع السكاكر والحلويات غير لـCariogènes (سوربيتول، كزيليتول...)، في غذاء الحِمْية: حِمْيات منقصة للموادّ السكريّة (فركتوز، سوربيتول)، لإرضاع المواليد الجدد (لكتوز)؛

- لحاجات فنية، كدواء مُرطُب (غليسرول، سوربيتول...)، مواد ملوَّنة (كراميلة)، مواد مُبَعْثِرة أو مُذَرِّية أو مُشَتَّة، مواد حالّة لإضافات وتكميلات أخرى (غَلوكوز، لكتوز، سكّاروز، غليسرول، سوربيتول).

إن أهم المُحَلِّيات المستعملة حاليًّا أو التي لم تزل قيد الأبحاث يمكن تجميعها في خمس فصائل منها ثلاث تتعلّق بمركبات قد تكون طبيعيّة المصدر، والفصيلتان الباقيتان تتعلّقان بمركبات نصف اصطناعيّة أو اصطناعيّة.

- ۱ سکاکر.
- ٢ كثيري الكحول.
- ٣ مركبات طبيعية غير سكرية.
- ٤ مُحلِّيات نصف اصطناعية.
 - ٥ مُحلِّيات اصطناعية.

هناك تشكيلة كاملة من المركبات الطبيعية غير السكّرية هي اليوم موضع

م ح ل

٢٧٢- مرّة الثَّوْر، صَفْراء الثَّوْر Bile, Gall (E) Fiel de bœuf, Bile de bœuf, Amer de bœuf (F) Galle (D) Fellis bovis (S)

المِرّة سائل مُخضَرّ اللُّون الأصفر، أو مُسُودٌ اللَّون، دَبق، رائحته خاصّة وطعمه مُرّ وغير مُستحبّ. يُوجد في مرارة البَقرة والثور. نُؤخِّر إنحلاله وفساده بإضافة الأستير أستيك إليه.

كثافة المرّة المتوسطة ١,٠٢. وهي تحتوي بنوع خاص على تُوروشُولات وعلى غليكوشُولات الصوديوم، وعلى كولسترول، وعلى موادّ دَسِمة، وموادّ مُلوِّنة، وعلى هَيُولينات وأملاح مَعدِنيّة. تفاعلها قِلَويّ. وهذا ما يفسّر لماذا تكون المِرّة صالحة لإزالة الشَّحم، وهو استعمال يَتمّ اللَّجوء إليه غالبًا.

كان يُستعمل في الماضي مستخلص مِرّة النُّورِ أو صفراء النُّورِ، مِرَّة مُكَثَّفَة؛ وهي مِرّة كان يَتمّ الحصول عليها بتَقْب مرارات الثور الحديثة، وأخذ السائل الذي يسيل منها على شاش رقيق وتبخيره في حمام مريم مع تحريكه المستمرّ حتى قوام المستخلص الجامد (دستور ١٨٨٤). إن هذا المستخلص الخام أخلى مكانه إلى مستحضرين جديدين مُنَقَّيَن مُكرَّرين.

أبحاث في عدد من البلدان. إن أوراق «الظِلَم الرَّبُودِي» (۱) Stevia rebaudiana مُسجّلة في الفرماكوبيا الفرنسيّة إلى جانب نباتات طبّيّة أخرى. والظِلَم هو نبات من فصيلة المركبات تتحلّى أوراقه بطعم سُكريّ بارز جدًّا. حتى إن الـ ستافيوسيد Stevioside قد تمّ تصنيعه في مؤسسات غير فرنسية . كما أن هناك مزيج من اللكتوز ومن السَّكَّاروز، بطعم السوس، يباع في اليابان بحرية تامّة.

من المُحلِّيات النصف اصطناعية، نِيُوهَسْپارِيديْن دِيهيدْرُوشَليكُون: وهو مُحَلِّ مشتقٌ من بِيُوفلافُونُوييد نِيوهَسْپاريْدِيْن اللَّيمونة الهندية: Citrus decumana = C. maxima . وهو يُحضر اصطناعيًّا استنادًا إلى النّارِنْجين الذي يُعْزَل من قشور الليمون الهندي المرّة جدًّا. إنه مُسَكِّر ألفَ مرّة أكثر من السكَّاروز. ولقد أوصِي باستعماله في المشروبات الخالية من الكحول، والألبان الرائبة المنخفضة الحُرَيْرات، والأطعمة الحِمْييَّة .

وبالرغم من أن الدراسات السِّمامِيّة المتوسطة والطويلة الأمد التي تمت حتى اليوم توصّلت إلى نتائج ملائمة، غير أن المجلس الأعلى للصحة العامّة فى فرنسا قد رأى من الحذر عدم إبداء رأى مؤيد لاستعماله في التغذية.

777

⁽١) التَّسمة للمؤلِّف.

مستخلص صفراء الثور Extrait de bile de bœuf (F)

Extractum fellis bovis (S)

مِرّة الثورمِرّة الثور
كحول ٩٠ درجة
كحول ۷۰ درجة
خصائصه ومقاديره - مُرّ، نافع للمعدة،
مدرّ للصفراء. مقاديره: ٠٥٠ غرام إلى
غرام واحد في اليوم، في بيلولات
مُقَّ تَنَةً .

مستخلص صفراء الثور المُنَقّى المُجفّف، أملاح صَفراوية Extrait de bile de bœuf purifié et desséché (F)

نُحضِّر مُستخلَص المِرَّة المُكرَّر المُجفَّف كما نُحضِّر مُستخلَص مِرّة الثُّور، ولكن قبل تقطير الكحول في آخر طريقة الاستعمال – المقادير الاعتيادية العمليّة، نعالج المحلول الكحولي بواسطة مزيج من ٥ غرامات من الفحم المُفَعَّل وه غرامات من تراب دَعَاك Terre à foulon لكل ١٠٠ ملل من المحلول الكحولي. نُحرِّك لمدّة ساعة، ومن ثمّ نترك للرّاحة طوال ٤٨ ساعة في قارورة مُقفَلة، نُمرِّر على مِصفاة من الورق مع استعمال قمع مُغطّى. نركّز السّائل الصافى تحت ضغط مُخفّف وبحرارة أقل من ٤٠° سغ حتى قِوام العجينة السَّميكة. تُمدُّد هذه العجينة على ألواح، وتُجفَّف في مِحَمّ خال من الضغط نُسخّنه حتى ٤٠° سغ.

يُسْحق النّاتج الجافّ، ويُمرَّر المسحوق

فی منخل رقم ۲٤، ویُحفظ فی قارورات م ر ه مقفلة جيِّدًا ومَطْلِيّة بالبرافين (دستور .(1989

> إن مستخلص المِرّة المُكرّر والمجفّف هو مزيج بنسب مختلفة من غليكوشولات الصوديوم ومن توروشولات الصوديوم ومن أملاح صَفراويّة أخرى؛ وهو يقع في مسحوق فاتح اللُّون الأصفر، إسترطابي، مُعَطِّس، طعمه قليل الحلاوة ومن ثمّ مُرّ؛ إن هذا المسحوق ذَوّاب جدًّا في الماء ويُعطى محلولًا Aphrogène؛ وأغْبَش بعض الشِّيء.

> يحتوى مُستخلَص المِرّة على ٤٥ إلى ٥٥٪ من الحوامض الصَّفراويّة الحرّة والمشتركة المُعبَّرة بالحامض الكُولِيك . Ac. cholique

> للبالغين عن طريق الفم: ١٠,١٠غ لجرعة واحدة، ٣٠,٠غ لكلّ ٢٤ ساعة.

۲۷۳- مَرْهُم Pommade (F)

مرهم أُثْرُجِيّ، مَرُوخ أُثْرُجِيّ، مَرُوخ ضدّ

۸۰ غ حامض نیتریك ۱٫۳۹ نحل على البارد ونسكب في مزيج منصهر ونصف بارد (۳۵) من: شحم خنزير ٤٠٠ غ

زيت زيتون ٤٠٠ غ

لذكري التاريخ.

نحوِّك لكى نحصل على مزيج تام، وعندما يبدأ المرهم بالتَّجمُّد، نصبّه في قوالب من الورق (دستور ۱۹۰۸). نُقسِّم الكتلة إلى مُربَّعات صغيرة قبل التَّربد الكامل.

استُعمل هذا المرهم تمسيدًا ضدّ القُوبات وبنوع خاص ضِدّ الجرب. زيت زيتون وهو يُحدِث التلعُّب بمقادير قوية جدًّا.

يجب تجديده في غالب الأحيان مُجَفِّف للقرحات. إن مرهم كِرْكَنْد للحؤول دون حفظه السّيِّئ. وفي رأي بَكّ، من بروكسل، أن سبب التغييرات التي تطرأ على تركيب المرهم الأترجى مرهم بوري اليودي ولونه هو بنوع خاص تَعرُّضه لملامسة الهواء ممّا يسبّب في اختفاء الحامض النيتريك السريع؛ ولكى نحفظه لأطول مدّة ممكنة، يجب أن نصبّه إما في أوعية من البورسلين محكمة القفل، وإما في قارورات صغيرة سوداء اللَّون واسعة مرهم الخلود أو المُخلَّدة العنق العريض تقفل فور تعبئتها بواسطة الزجاج المحفوف.

مرهم أصفر (الأخ قُووم)

شمع أصفر ٧٥ غ
زیت وردي ۱۵۰ غ
کافور ۳۰غ
مستخلص السُّكُب (ملح رصاص) ٤٥ غ
يُمَد على قماشة توضع على القرح
السَّرطاني بعد استعمال «كاوي قُوْوم»،
وبالتالي عندما تقع أيضًا قطعة الغاريقون
التي توضع مباشرة بعده لذكري التاريخ.

مَرْهَم بُوتَ الشَّمْعِي (Cérat de Pott (F ۰۰۰ غ مَرْ تَك ٠٠٤ غ خَلَ صابون ÷ ۲0 ٠

نسخّن حتى اختفاء الرطوبة مع تحريك مستمر، ومن ثم نضيف:

۰۰۰ غ ۰۰۰ غ شمع أصفر

الشمعيّ ليس إلّا شكلًا من مرهم بُت.

۰٫۵۰ غ	يود
كمّيَّة كافية لحلَّه	كزيلول
ه غ	ڤازلين

لذكرى التاريخ.

غ	٣	عصير مخلّدة
غ	۲	شحم خنزير
غ	٤	زيت لوز حلوبب

مرهم دوتوكسيد الزئبق المكوفر

۲ غ		 	بيوكسيد الزئبق
٤ غ	•	 	شحم خنزير
ه غ		 •	كافور

تركيبة بيَتّ تحتوي على كمّية أقلّ من الكافور.

مظاهر سفلسية جلدية مصحوبة التي توضع مباشرة بعده لذكرى التاريخ. بالحكاك. لذكرى التاريخ.

م ر ھ	مرهم ضدّ الشَّرَث (بروك)	مرهم سيترات الكينا
,	·	سيترات كينا
		شحم خنزير ٤ غ
	حامض سيتريك ٠,٥٠ غ	في تمسيدات تحت الإبطين ضدّ
	راسب أبيض ٢٠,٨٠ غ	الحميات المقلعة.
	صبغة المسك	
	مرهم ضدّ الشَّرَث (كنُولْزَر)	مَرْهَم شَمْعِي بالمُورْفِين Cérat morphiné (F)
	أفيون ١٠ غ	كلورهيدرات المورفين
	كافوره غ	مرهم شمعتي أبيض ٢٠ غ
	كربونات الأمّونيوم	نذوّب المورفين في كمّيّة ضئيلة من
	أستات الرصاص ٥ غ	الماء، ومن ثمّ نمزج جَيّدًا.
	شحم خنزير ٣٠غ	مَرْهَم شَمْعِي مُؤَفْيَن
	مرهم ضدّ الشَّرَث (مَايَت)	مستخلص أفيون ١ غ
	شحم خنزير ٣٠ غ	مستخلص أفيون اغ ماء مقطّرا غ
	شب محروق ٥غ	
	يودور البوتاس متبلّر۲ غ	نحلّ المستخلص في الماء ونمزج مع
	لودانم روسو ۲ غ	
	مرهم وردي ٥ غ	قرحات وتقرّحات مؤلمة.
	مرهم ضدّ القَرَع (بورياس)	مرهم صَاقِل
	وَدَك	حامض پيروغَلِّيك٩ غ
	شحم خنزير ١٥٠ غ	حامض سالسيليك ٤ غ
	سولفات الزنك ٣٠غ	زیت کبریتی ۱۰ غ
	تمسيدتان في اليوم بما يوازي حجم	قطران ١٠ غ
		صابون أسود٢غ
		لانولين ١٠ غ
	فحم خشب مسحوق ٢٦ غ	
740	كبريت مصعَّد	تركيبة قريبة من مرهم بروك.

	: . • 651	
مرهم غُونُدريت، مرهم نشادري، كاوِ		
نشادري، منفِّط نشادري		
وَدَكَ خَرُوفَ١٠ غ	شحم خنزير	
شحم خنزير ١٠ غ	مرهم ضدّ القَرَع (بِيْنَل)	
نسيِّل في قارورة عريضة الفتحة.	راسب أحمر ١٠ غ	
نضيف:	كربونات صوديوم جاف ١٥ غ	
نشادر سائل ۹۹٫۹۰۲۰	سولفات الزنك ٦ غ	
نقفل القارورة، ونخضّها في الماء	توتياء Tuthie ع غ	
البارد بقوّة حتى تبرد (دستور ١٨٨٤).	كبريت ١٥ غ	
إن تركيبة غوندريت الحقيقيّة هي	شحم خنزير ١٢٥ غ	
التّالية: شحم ٣٢غ؛ زيت لوز ٢غ؛	ندهن الأجزاء المريضة بهذا المرهم	
نسيِّل جزئيًّا ونضيف: نشادر سائل عند	مساء ونغسلها في اليوم التالي بماء	
۲۵° سغ، ۱۷غ؛ ومن ثم نخضّ حتّی	الصابون الساخن.	
التبريد. يجب تلافي إضافة النَّشادر إلى		
•	_	
الشَّحم السّاخن جدًّا.	مرهم ضدّ القَرَع (ماهون)	
الشَّحم السَّاخن جدًّا.	كلس مطفئ ٤ غ	
الشَّحم السَّاخن جدًّا. استُعمل هذا المرهم بطبقات من ٢ إلى ٥ ملم لكي يَكُوي الجلد، في بعض		
الشَّحم السَّاخن جدًّا. استُعمل هذا المرهم بطبقات من ٢ إلى	كلس مطفئ ٤ غ	
الشَّحم السَّاخن جدًّا. استُعمل هذا المرهم بطبقات من ٢ إلى ٥ ملم لكي يَكُوي الجلد، في بعض	کلس مطفئ 3 غ کربونات صودیوم ۲ غ شحم خنزیر ۳۰ غ	
الشَّحم السَاخن جدًّا. استُعمل هذا المرهم بطبقات من ٢ إلى ملم لكي يَكُوي الجلد، في بعض الإصابات الدِّماغيّة بنوع خاص. يجب	كلس مطفئ	
الشَّحم السّاخن جدًّا. استُعمل هذا المرهم بطبقات من ٢ إلى ملم لكي يَكُوي الجلد، في بعض الإصابات الدِّماغيّة بنوع خاص. يجب أن يُغطّى برفادة سميكة لكي تركِّز عمله؛ فالمرهم هذا لا يعدو كونه مُحمِّرًا للبشرة إذا فركت به في الهواء الطلق. وهو	كلس مطفئ	
الشَّحم الساخن جدًّا. استُعمل هذا المرهم بطبقات من ٢ إلى ملم لكي يَكُوي الجلد، في بعض الإصابات الدِّماغيّة بنوع خاص. يجب أن يُغطّى برفادة سميكة لكي تركِّز عمله؛ فالمرهم هذا لا يعدو كونه مُحمِّرًا للبشرة	كلس مطفئ	
الشَّحم السّاخن جدًّا. استُعمل هذا المرهم بطبقات من ٢ إلى ملم لكي يَكُوي الجلد، في بعض الإصابات الدِّماغيّة بنوع خاص. يجب أن يُغطّى برفادة سميكة لكي تركِّز عمله؛ فالمرهم هذا لا يعدو كونه مُحمِّرًا للبشرة إذا فركت به في الهواء الطلق. وهو	كلس مطفئ	
الشَّحم السّاخن جدًّا. استُعمل هذا المرهم بطبقات من ٢ إلى ملم لكي يَكُوي الجلد، في بعض الإصابات الدِّماغيّة بنوع خاص. يجب أن يُغطّى برفادة سميكة لكي تركِّز عمله؛ فالمرهم هذا لا يعدو كونه مُحمِّرًا للبشرة إذا فركت به في الهواء الطلق. وهو يحدث مع الرفادة السميكة تلفظًا خلال	كلس مطفئ	
الشَّحم السّاخن جدًّا. استُعمل هذا المرهم بطبقات من ٢ إلى ملم لكي يَكُوي الجلد، في بعض الإصابات الدِّماغيّة بنوع خاص. يجب أن يُغطّى برفادة سميكة لكي تركِّز عمله؛ فالمرهم هذا لا يعدو كونه مُحمِّرًا للبشرة إذا فركت به في الهواء الطلق. وهو يحدث مع الرفادة السميكة تلفظًا خلال يحدث مع الرفادة السميكة تلفظًا خلال	كلس مطفئ	
الشَّحم الساخن جدًّا. استُعمل هذا المرهم بطبقات من ٢ إلى ملم لكي يَكُوي الجلد، في بعض الإصابات الدِّماغيّة بنوع خاص. يجب أن يُغطّى برفادة سميكة لكي تركِّز عمله؛ فالمرهم هذا لا يعدو كونه مُحمِّرًا للبشرة إذا فركت به في الهواء الطلق. وهو يحدث مع الرفادة السميكة تلفظًا خلال يحدث مع الرفادة السميكة تلفظًا خلال حوالى نصف ساعة. يوضع في بعض الأحيان بهدف تطبيق الطَّريقة الماصّة للحرارة. وهي طريقة	كلس مطفئ	
الشَّحم الساخن جدًّا. استُعمل هذا المرهم بطبقات من ٢ إلى ملم لكي يَكُوي الجلد، في بعض الإصابات الدِّماغيّة بنوع خاص. يجب أن يُغطّى برفادة سميكة لكي تركِّز عمله؛ فالمرهم هذا لا يعدو كونه مُحمِّرًا للبشرة فالمرهم هذا لا يعدو كونه مُحمِّرًا للبشرة إذا فركت به في الهواء الطلق. وهو يحدث مع الرفادة السميكة تلفظًا خلال يحدث مع الرفادة السميكة تلفظًا خلال عدل دوالى نصف ساعة.	كلس مطفئ	
الشَّحم الساخن جدًّا. استُعمل هذا المرهم بطبقات من ٢ إلى ملم لكي يَكُوي الجلد، في بعض الإصابات الدِّماغيّة بنوع خاص. يجب أن يُغطّى برفادة سميكة لكي تركِّز عمله؛ فالمرهم هذا لا يعدو كونه مُحمِّرًا للبشرة إذا فركت به في الهواء الطلق. وهو يحدث مع الرفادة السميكة تلفظًا خلال يحدث مع الرفادة السميكة تلفظًا خلال حوالى نصف ساعة. يوضع في بعض الأحيان بهدف تطبيق الطَّريقة الماصّة للحرارة. وهي طريقة	كلس مطفئ	747

مع الوقت، لكي يشكِّل صابونًا، وبالتَّالي بسرعة كبيرة، فلا نُحضِّره إلَّا عند مره يجب عدم تحضيره إلّا عند الحاجة.

> عدّل البعض تركيبة هذا المرهم كما يتبع: شحم بنزويني ١٠غ. زيت لوز ٥غ. نشادر سائل ١٥غ. وحتى إنه في ضماد الحروق. اقترح استبدالها بمزيج من الصلصال إذا أضفنا إلى المقدار أعلاه غرامًا (كمية مطلوبة) ومن النشادر (كمية كافية) نحفظها في قارورات جيّدة القفل.

مرهم قطران (غیلیوت)

	شحم خنزیر ۵۰ غ
۱۰ په کهي ۱۳۰۰ تار الأخرى.	تحت كربونات الصوديوم ٢ إلى ٤ غ
	زيت الكاد۲ إلى ٤ غ
مَرهم يَتلوَّن القليل من حا	قطران ٢ إلى ٤ غ
الفليل من حا. يودور البوتاسي	ضد أكزيما اليدين. يستبدل بعض
يودور البوناحي	الأطبّاء زيت الكاد والقطران بزيت
مرهم منغانيز	القطران الثقيل وبعدة نقاط من دهن ملح

مرهم كاو

البارود الجاوي.

شحم خنزير۸غ
شب۱ غ
سَبينة مسحوقة١ غ
كالومُل١غ
للقضاء على النابِتَات أو النامِيَات.

مرهم كربونات الرصاص، مروخ الرازي الأبيض

۱۰غ	كربونات رصاص
۰٥ غ	شحم خنزير بَنْزوينيّ
±:::	دستدر ۱۸۸۶ ان هذا الم

الحاجة. عدد كبير من كتب الوصفات يَنصح بمرهم الشَّمع الخالي من الماء سَوّاغًا له.

واحدًا من الكافور المسحوق مع قليل من الزَّيت، نحصل على المروخ الأبيض المكوفر المذكور في فرماكوبيا بَتاڤيا، بولونيا، همبورغ، وعلى المرهم الإلهتي المذكور في بعض الفرماكوبيات الأخرى.

مَرهم يَتلوَّن بالأصفر الجميل بملامسة القليل من حامض الأستيك ومن محلول يودور البوتاسيوم.

بيوكسيد منغانيز وشحم خنزير (بالتساوي). في القرع، والجرب، والقوبات.

مرهم اليود

١غ		يود
۱٥ غ	ن زير د	شحم خ
١غ		أو: يود
۲۶ غ	نزير	شحم خ
غاق	مرهم الأخير يعطى لإخ	إن ال
	الجدرية. لذكرى التاريخ.	البَثْرات

مرهم يودور الرصاص

١٨٨٤. إن هذا المرهم يَزْنخ يودور رصاص

كحول ٨٠ درجة ٤٥ غ	شحم بنزويني ٩٠ غ	م د و
تركيبة أخرى يطلق عليها في بعض	دستور أدوية ١٩٣٧ . مُذيب ومصرِّف.	
الفرماكوبيات اسم مروخ صابونيّ مركّب:	مرهم يودور الكبريت	
صابون أبيض	يودور كبريت۱ غ شحم بنزوين <i>ي</i> ۲۰	
روح ندی البحر ١٣٥ غ	دستور أدوية ١٨٦٦. نعالج اليودور بقليل من الكحول ونمزجه مع الشحم.	
في تركيبة أخرى نجد بالإضافة إلى ما تقدّم، دهن الزعتر والنشادر المحلول.	يستعمل في الإصابات الجلدية. مرهم يودوفورم	
مروخ صابوني مكوفر، صابونولة (١) الكافور، صبغة الصابون المكوفرة، بلسم	يودوفورم مسمَّق ١٠ غ ڤازلين ٩٠ غ	
الصابون (F) Saponulé	نحضّر مرهمًا بواسطة الهرس والدقّ	
صبغة صابون ٥٠ غ	(دستور ۱۹۳۷). لذكرى التاريخ.	
زیت لوز حلو ٥ غ کحول مکوفر ٤٥ غ	مرهم يودوفورم (غلوير)	
دستور ۱۸۸٤ .	يودوفورم ٢ إلى ٤ غ مرهم شمعي بسيط ٣٠	
مروخ صابونيّ هيدروسولفوريّ، مرهم هيدروسولفوريّ	في تمسيدات ضد عدة إصابات عَصِيّة في البشرة، البَرَص، الحَصَف، الأكزيما	
زیت خشخاش منوم ۲۰۰۰ غ صابون أبیض	المزمنة .	
سولفور البوتاس الجاف المسحوق	Onguent, دهان ۲۷۶ – ۲۷۶ Liniment (F)	
زيت الزعتر الطيار ٨غ		
مقدار ٣٠غ في فركات ضدّ الجَرَب.	مروخ صابونتي	
(١) التَّسمية للمؤلِّف.	صبغة صابون ه ع زيت لوز حلو ٥ غ	747

نسخّن في حمام مريم الصابون الدقيق بقدر الإمكان، مع ٥٠ غرام ماء مع تحريك حتى الحصول على التجانس التام؛ نضيف الزيت على مهل، ومن ثم سولفور البوتاس مع الهرس والتحريك حتى المزج الكامل. إن هذا المروخ موتح مهيّج يجب أن يحضر عند الحاجة فقط لأنه سريع التلف في الهواء.

مروخ مبول ١٠غ ديجيتال ماء غال ننقع في الماء الغالي، نمرّر ونضيف: ٠٣٠ غ دهن التربنتين .. د غ مستخلص إشقيلخلص إشقيل ۲ عدد صفار بیض تركسة أخرى: صبغة إشقيل

في تمسيدات على الخَثْلَة (ما بين السُّرة والعانة) وداخل الفخذين، ضِدّ الاستسقاء. إن مروخ شميدت المبوّل يحتوي زيادة على ما تقدّم التبغ البَحريّ اللُّون.

صبغة سورنجان ١٢ غ زيت مكوفر ٢٤ غ نشادر سائل ت

صبغة ديجيتال

مروخ مُسَكَّب، بلسم عالمي، زبدة السَّكْب، صابون للحمى القوية ومصرّف

مستخلص ملح الرصاص (سَكْب) ١ جزء زيت زيتون ٢ جزء

غرامًا	٤٠	بلسم فيوراقانتِي
غرامًا	10	كحول مكوفر
غرامًا	٤٠	زيت لوز
غرامًا	o	نشادر

حالات شَلَل، حالات روماتيزم، غنغرينة (دستور أدوية ١٨٦٦).

۲۷۵ - مَزيج، مَزيجات Mixture (E) Mixture (F) Mixtur (D)

مزيج برازيلي

۶ ۱۲

۹۰ غ	كوباهو
۳۰ غ	صفار بیض
٣٠	شراب صمغ
٨ غ	كحول زعفران
٠٠٠	ماء
	11

ضد التعقيبة.

مزیج برازیلی (لوپیر)

بالترينتين المكرر.

٢٦٠ غ	كوباهو مُسَمَّك
١٢٥ غ	بلسم مكّة
ولي ١ غ	مستخلص زعفران بيا
استبدال بلسم مكة	يقترح بُوشاردا ا

م ز ي

٠١١٢ غ سكر مسحوق خشن نخض المزيج حتى يذوب السكر في الماء العالق بالهيدرات بكامله.

مزيج مُكوفَر

كافور ٢ غ
ماء ٣٩٣ غ
كحول ٤ غ
نمرّر. البعض يضيف ١٥ غرامًا من
السكر.

مزيج مُكوفَر مغنازي

كافور ٥,٠ غ
ماء
كربونات المغنازيومكربونات المغنازيوم
ندقّ الكافور ونهرسه مع الكربونات،
ومن ثمّ نضيف الماء رويدًا رويدًا. في
الاستيفياء الأوريك أي البولي Diathèse.

Emulsions (F)

مستحلب بالكلوروفورم

كلوروفورم صِرف۲ غ
زیت لوز مُحلو۸ غ
صمغ عربي مسحوق ٤ غ
شراب زهر البرتقال السكري ٣٠ غ
ماء مقطّر
at the man title of the same

كان دَانسي ينصح بهذه الطريقة لإعطاء الكلوروفورم من الداخل. نحضّر كذلك بالطريقة ذاتها «مستحلب بالبروموفورم».

مزيج دُردي ناري، نقاط طاردة الحمّى، نضيف رويدًا: صبغة طاردة الحتى

۱۸ غ	روح الأنجليك
۱۲ غ	سائل دردي ناري Pyrotartrique . ٥
۱۵ غ	حامض سولفوريك
تى.	غير ناجع، معرّق، طارد للح
	استعمل هذاً المزيج ضدّ الكوليرا.

مزيج ضُرَاسِي إنكليزي

غ	٣	٠		 				 			. ,						٠	٠,			تر	j	مر	ده
غ	٨								 												-	رر	افو	ک
								ã	يا			ل	ء	7	; :	بد	_	.1	•	1	لمة	2	:	

مزيج مسهل قوي

18 غ	مَنّ دموع مَنّ دموع
١٠ غ	ثمار السَّنَا
} غ	دردي حامض البوتاسيوم.
	كزبرة، زبيب، خنشار،
۲ غ	من کل واحد
۴۲۰ غ	ماء
المالمالما	1412:1 1::

نغلى حتى إنقاص ١٩٠، يؤخذ صباحًا على الريق.

مزيج المغنازيا المُمَيَّهَة

مغنازيا محروقة خفيفة
نغلي في مقدار ٢٠ مرة وزنها من الماء
حتى التميُّه الكامل، نرميها على قماشة،
نتركها لكي تجفّ، نعصرها بقوّة شديدة
بواسطة مكبس جيد. تُمزج كتلة الهيدرات
الحاصلة في هاون رخامي مع كمية كافية
من الماء حتى يزن المجموع ٩٠٠ غرامًا ؛

إن مزيج الصمغ النشادري أو الحليب النشادري ومزيج أو حليب الحلتيت يحضّران من ٨ غرامات من الواحد أو من الآخر من هذه الصموغ الراتنجية ومن ٢٥٠ غرام ماء.

مستخرج، تصنیف -۲۷۷ Extraits, Classification المُسْتَخْلَصات des extractions (F)

يميّز دستور أدوية ١٩٦٥ أربع أصناف من المستخلصات:

°۱ - المستخلصات السائلة (مستخلصات مائعة)؛

٢° - المستخلصات الرخوة التي يكون
 لها قِوام العَسل السميك والتي تحتوي
 على حوالى ٢٠ بالمئة من الماء؛

٣ - المستخلصات الجامدة التي لا تسيل (تَنْصَبٌ) وتحتوي ١٢ إلى ١٥ بالمئة من الماء؛

3° - المستخلصات الجافة، التي يمكننا سحقها والتي لا تحتوي على الماء بالمرة تقريبًا، ولكنها تكون استرطابيَّة جدًّا.

الفرماكوبيا تجعل المستخلصات في ثلاث أصناف تحدّدها كما يلى:

۱° - مستخلصات سائلة أو

مستخلصات مائعة تُحضّر عمومًا مست باستِنْزاف العقارات بواسطة عملِيَّتي حَلْحَلَة متتاليتين ومن ثم بتركيز المحلول الثاني الحاصل. يُمزج المحلولان بعد ذلك بطريقة تعطي مستخلصًا يكون وزنه مقابلٌ تمامًا لوزن العقار الجافّ المستعمل.

°۲ - المستخلصات الجافّة الضعيفة المضمون بالماء؛ وهي مستخلصات تكون ذَرُورِيَّة وسهلة التَّذَرُر Pulvérulables . وهي غالبًا استرطابية.

°۳ - المستخلصات المسمّاة رخوة أو جامدة ذات قِوام متوسّط وسميك نوعًا ما .

من المستخلصات المسجّلة في الفرماكوبيا الحديثة:

°۱ - أحد عشر مستخلصًا مائعًا هي مستخلصات الزعرور، البُلْدُس أي شجرة الكبد، العَسَم، الغرنداليا، الهِدْرَسْتُس، عِرْق الذَّهب، النَّبْق، الكولا، الآلاميّة، الكينا الحمراء، والأُفْلُوس.

°۲ - مستخلصان جامدان أو رَخوان هما: مستخلص النَّبْق الجامد، مستخلص الجنطيانة الرخو.

٣° – مستخلصات جافّة هي: مستخلص الكولا، وجوز القيء، والرّاتانيا.

نجد في حينه طريقة التحضير الخاصة بكل منها.

137

م س ت

او کحولیّة أو Extraits alcooliques ou hydro-palcooliques (F)

Extrait de gentiane الجنطيانا (F)

نُحضِّره كمستخلص الكَسْكارا.

مُستخلص رَخو مُحمر اللَّون البُنِّيّ، رائحته عِطريّة وطعمه مُرّ جدًّا. غرام واحد من المُستخلَص يذوب في ٥ ملل كحول ٦٠ بالمئة.

Extrait de مستخلص الجنطيانا المُثبَّنَة gentiane stabilisée (F)

جذر الجنطبانا المثبت

نَبلُل مسحوق الجنطيانا بشكل سَوِي بواسطة ٥٠٠ غرام كحول. بعد ساعتين من البَلّ في وعاء مُقفَل، نَضع الكُتلة في رَاوُوق. نُضيف الكحول وفقًا لقواعد التأشين ونتركه مَمْروثًا لمدّة ٤٨ ساعة. نتابع العمليّة كما هو مذكور في مستخلص الكشكارا، ولكن عدم تركيز السّائل المُصفّى إلّا حتى قوام المستخلص الرّخو.

المواصفات - مُستخلَص فاتح اللَّون البُنِّي، طعمه مُرَّ، يُعطي مع كحول ٦٠ درجة مُذابَة شبه صافية. وهو يحتوي على جَنْطِيُوپيكرِيْن Gentiopicrine

(جَنْطيوپيكروسيد)، وعلى جَنْطِيَانوز وجنْطيوپيكروسيد)، وعلى جَنْطِيَانوز Gcntianose وهما تختفيان بسرعة أثناء التَّجفيف، الأولى منهما هي نافعة للمعِدة بنوع خاص وطاردة للحُمّى. ولهذا السَّبب فإن تحضير مُستخلص الجنطيانا المثبَّتة قد سُجِّل في دستور الأدوية.

نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها مُستخلَص النَّاردين المُثَبَّة، دستور ١٩٦٥.

Extrait مستخلص زهرة العُطاس d'arnica (F)

نَجعل الأَرْنيكا في مسحوق نِصْف دقيق؛ نُبلًله بمقدار ٥٠٠ غرام من الكحول المطلوب؛ نُكدِّسه بشكل ملائم بين حاجِزين في أسطوانة من قصدير؛ بعد ١٢ ساعة، نغسل المسحوق بما بقي من الكحول؛ عندما تخترق آخر دفعة من الكحول المسحوق، نترك هذا الأخير مُغطَّى بطبقة من الماء، ونُوقف العملية عندما يسقط في السّوائل الأولى عندما يسقط في السّوائل الأولى نُقطِّر الصِّبغات الكحولية في حمّام مريم التَّبخير في حمّام مريم التَّبخير في حمّام مريم حتى قوام المستخلص (١٨٣٧).

الخصائص والاستعمال - مُنشَّط الجهاز العَصبيّ ومُهيِّج يُستعمل في

الشَّلَل المَثانِيِّ بمقادير من ٠,٠٥ إلى ،١٠٠ غرام في اليوم.

يُستعمل بحذر، فقد يحدث غثيانات، وتَقيّوءات، وإغماءات.

نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها مُستخلَص جذر البَقْس، وجذر الخَرْبَق الأسود، وجذر الجلاب الحقيقي.

مستخلص القنّب الهندي chanvre indien (F)

قنّب مسحوق نصف دقیق (منخل ۲٦) کحول ۹۰ درجة ۲۰۰۰ غ

نعمل كما هو مطلوب في مستخلص البلادون. عندما ينتهي التأشين، نُصفي السائل الحاصل قبل تقطير الكحول. بعد التَّقطير، نُركِّز الفُضالة من دون تصفيتها مسبقًا، بحرارة أدنى من ٥٠° سغ وتحت ضغط مخفَّف حتى قِوام المستخلص الجامد.

المواصفات - نحصل على نتاج قاتم اللَّون الأخضر، رائحته خاصّة وغير عاديّة، يذوب في كحول ٩٠ درجة. إن محلول غرام واحد من هذا المستخلص في ٥ ملل كحول ٩٠ درجة يُعطي اضطرابًا لَبَنيًّا مخضرًّا قويًّا بإضافة حجم مماثل من الماء (دستور ١٩٤٩).

إن تحضير هذا المستخلص يختلف كثيرًا حسب الفرماكوبيات؛ وكان دستور

الأدوية، عام ١٨٨٤، يحتوي على تركيبة م س ت مستخلص رخو يحضر بكحول ٦٠ درجة.

Stupéfiant. - B مُخَبِّل. جدول Tableau B

إستعمل كمخدّر ومزيل للألم ضدّ الآلام المعويّة.

مقاديره القصوى: ۰,۰٥غ لجرعة واحدة؛ ۰,۱۰غ لكل ٢٤ ساعة (للبالغين).

ملاحظة - مرسوم فرنسي رقم ٣٢٤١٥ تاريخ ٢٧ آذار ١٩٥٣: مَنْع استيراد وتصدير وإنتاج وتجارة واستعمال القنّب الهندي في مستحضرات تحتوي منه أو تُصنَّع منه.

مستخلص الكَبَابَة (Extrait de cubèbe (F)

مسحوق كَبَابة (منخل ٢٦) ١٠٠٠ غ كحول ٩٥ درجة أثير مصحَّح

نستنزف مسحوق الكبّابة في آلة تقطير، مع الأثير أوّلًا، ومن ثم بالكحول. تُقطّر الصّبغتين مُنفصِلتين كلّ على حدة مع أخذ الحيطات الضّرورية؛ نُبخّر في حمّام مريم الفُضالة الكحوليّة؛ نُضيف إليها المُستخلص المُؤثير. إن ألف غرام من مسحوق الكبابة تعطي حوالي ٢٠٠ غرام مستخلص زيتيّ - راتنجيّ (دستور مستخلص زيتيّ - راتنجيّ (دستور).

المواصفات - مستخلص قاتم اللَّون

م س ت

البُنِّيّ، نِصف سائل، غير متجانس، رائحته عِطريّة، لا يذوب في الماء. يَتلوَّن بالأحمر الأرجوانيّ إذا أضيف إليه حامض سولفوريك مُركَّز (تفاعل كوبايِيْن). نَخضه أثناء الاستعمال لنجعله متجانسًا (دستور ١٩٠٨).

الخصائص والاستعمال - يُستعمل كمنشّط، مُدِرّ للصَّفراء وفي التَّعقيبة، في برشامات تحتوي على ٠,٧٥ غرام.

إن مُستخلّص پوش الكحوليّ من الكَبابة يَتمثّل في صِبغة من الـ "كُوبان": Cubène تُحضَّر بمعالجة مسحوق الكبابة بالنَّقل بواسطة كحول ٥٦ درجة بكميّة مناسبة للحصول على وزن مستخلص سائل يُساوي وزن المسحوق المستعمل.

مستخلص الكولا (Extrait de Kola (F) حبوب الكولا المسحوقة بدقة

نُبلِّل سَوِيًّا مسحوق الكولا بواسطة ٥٠٠ غرام كحول ٦٠ درجة، وبعد مضي ساعتين من البَلِّ في وعاء مقفل، نضعه في راوُوق؛ نُضيف الكحول وفقًا لقواعد التَأشين، ونتركه ممرونًا طوال ٢٤ ساعة.

نُباشر التَّأشين مع ما بقي من الكحول اللازم، على أن نضع جانبًا أوَّل ١٠٠٠ غرام تحصل منه العمليّة. نُقطِّر السّوائل

لكي نسحب منها الكحول ولا نضيف الألف غرام الموضوعة جانبًا إلّا في نهاية العمليّة، ومن ثمّ نُركِّز في حمّام مريم حتى الحصول على قِوام المُستخلَص الجامد بحرارة أدنى من ٥٠ سغ وتحت ضغط مخفّف.

يمكن للمستخلص أن يُصبح مُحبَّبًا أثناء التَّبخير؛ ففي هذه الحالة، وعندما يكتسِب المستخلص القوام الرِّخو، نُضيف إليه حوالى ثمن $(\frac{1}{h})$ وزنه كحول مرجة، نمزج جيِّدًا ونُنهي العَملِيّة كما ورد أعلاه.

المواصفات - مستخلص كَسْتنيّ اللَّون. إذا حُلّ في مقدار ١٠ مرّات وزنه من الماء المُقطَّر، يُعطي مُذابَة عَكِرة جدًّا، تَتَحوَّل بعد التَّصفية، إلى لون مُحمَر على بعض الكثافة. إن لون مُحمَر على بعض الكثافة. إن الجامد يجب أن تحتوي على الأقل ٥ الجامد يجب أن تحتوي على الأقل ٥ غرامات كافيين حُرّ ومُركَّب، يُقدَّر بالكافين اللّامائي.

الاستعمال - يُستخدم مُستخلَص الكولا السُّكَّري الجامد لتحضير مَلْتوت الكولا السُّكَّري المحبَّب، بينما يُحضَّر إكسير الكولا (دستور ١٩٣٧) بواسطة المستخلص المائم.

تتقارب من ٢٠,٦٠غ من المُستخلَص، م س ت توزن بدقة. مُستخلص الكينا الصّفراء يجب أن يحتوى كحد أدنى على ١٢٪ من القِلُويدات العامّة.

> الخصائص والاستعمال - يُوصف هذا المُستخلَص الطارد للحمّي بنوع خاصّ، في بيلولات أو جَروعات بعيار ١ إلى ٤غ عند البالغ وبعيار ٥٠,٠٥غ إلى ٠,١٠غ لكلّ سنة من العمر للولد. وفي حال غياب المواصفات المطلوبة، يُعطى مستخلص الكينا الحمراء المائي (دستور).

مستخلص الآلامية المائع Extrait fluide de passiflore (F)

أطلب مُستخلَص الزّعرور المائع. فُضالة جافّة: ١٠ إلى ١٦٪ (دستور .(1970

مستخلص الغرنداليا المائع fluide de grindelia (F)

نُستعمِل رؤوس الغرنداليا المُزهِرة في مسحوق نصف دقیق (منخل ۲٦)، وكحول ٧٥ درجة ونُنجز العمليَّة كما هو مذكور في الزَّعرور بترطيب المسحوق بواسطة ٥٠٠ غرام كحول ٧٥ درجة وإيصال الوزن إلى ١٠٠٠ غرام بواسطة كحول ۷۵ درجة.

فُضالة جافّة: ١٥ إلى ٢٠٪.

المواصفات - سائل مُخضر اللُّون البُنِّي، راتنجي، رائحته عِطريَّة، طعمه مُرّ جدًّا. إذا أضيف إليه ١٠ أحجام من

مستخلص الكينا الصفراء Ex. de quinquina Jaune, Ex. alcoolique de quinquina (F)

كَنْكَيْنَا صَفْرَاء فِي مُسْحُوقَ دقيق (٢٤)دقيق كحول ٦٠ درجة نُرطُب مسحوق الكينا بشكل سَويَ بواسطة ٥٠٠ غرام كحول. نُتابع العَمليّة كما هو مذكور لمستخلص الكسكارا، ولكن عندما يبلغ المستخلص قوام العَسَل، نُكمِل التَّجفيف في المِحَمَّ من دون تخطّی ۵۰° سغ، بطریقة نحصل معها على مستخلص جاف.

المواصفات - مُستخلَص محمر اللَّون البُنِّي، طعمه مرّ جدًّا وعِطريّ خفيف، يُعطى مع الماء مُذابة مُعتكِرة. وهو يذوب بكامله تقريبًا في كحول ٦٠ درجة؛ المذابة تكون مُحمرَّة اللَّون، وإذا خُفَّفَت في ٤ إلى ٥ مرّات حجمها من الماء المُقطِّر، فإنّها تُعطى بعد التَّصفية، سائلًا، إذا تَحَمَّض بعض الشيء، يترسب بوفرة كبيرة بواسطة زئبقى يودور البوتاس المتعادل (دستور .(1989

تعيير القلويدات العامّة - نعمل تمامًا كما ذُكر في دراسة مستخلص الكينا الحمراء، مع استعمال كمِّيّة تَجريبيَّة

۲۸۰ مستخلصات مائية Extraits aqueux (F)

مستخلص أفيون عام Extrait total d'opium (F)

يَتَأَلُّف مُستخلَص الأفيون العامّ بشكل جَوهريّ من كلورهيدراتات قِلُويدات الأفيون.

يَتمّ تقدير المورفين في المسحوق الحاصل. مُستخلّص الأفيون العامّ يجب أن يحتوي على ٥٠٪ من المورفين اللَّامائيّ، أي ٦٦٪ من الكلورهيدرات. وفي حال يكون المسحوق الحاصل لا يحتوي على هذا العيار، نحله في ٣,٥٠٠ ليتر من الماء المُقطِّر ونضيف الكمِّية الضَّروريّة من كلورهيدرات المورفين لكى نحصل على العيار المطلوب. نترك السائل يرتاح عِدّة أيّام ونُصفِّي. نُقطِّر السّائل في ضغط منخفض حتى الحصول على فُضالة جافّة. نُسحَق هذه الفُضالة وننخلها في منخل ٣٢. نحصل هكذا على حوالي ١٨٠ غرامًا من مستخلص الأفيون العامّ. في حال كان عيار النِّتاج الحاصل أعلى ممّا يجب من المورفين، نحلّه في مُستخلّص عام للحفظ.

المواصفات والاستعمال - يقع مستخلص الأفيون العام في مسحوق مُرْمَدٌ اللُّون الأصفر، يذوب بكامله في مقدار ٢٠ مرّة وزنه من الماء البارد. م س ت الماء، يُعطى اضطرابًا مُبْيَض اللَّون (دستور ۱۹۲۵).

الخصائص والاستعمال - مُضاد للتَّشنُّج يُستعمل بمقادير اعتياديّة من ٠,٥٠ غرام إلى غرام واحد للجرعة الواحدة، ومن غرام واحد إلى ٤غ لكل ٢٤ ساعة (للبالغين).

(غرام واحد يساوي ٥٦ نقطة).

مقادير الفرماكوبيا الاعتيادية للبالغين عن طريق الفم: ٠,٥٠غ إلى غرام واحد لجرعة واحدة، ومن غرام واحد إلى ٤غ لكلّ ٢٤ ساعة.

مستخلص الفَرَنْدَل المائع Extrait fluide de salicaire (F)

رُؤوس فَرَنْدَل مُزهِرة في مسحوق دقيق

كحول ٤٥ درجةكمية كافية

نُحضّر كما هو مكتوب في مُستخلَص الزُّعرور المائع.

سائل بُنِّي اللَّون الاحمر يَضطرب بإضافة ١٠ أجزاء من الماء (دستور .(1970

فُضالة جافّة: ٨ إلى ١٢٪.

يستعمل كدواء ممضاد للإسهال بمقدار ٠٠,٥٠غ إلى ٢ غرام في اليوم.

مستخلص الفشاغ المائع Extrait fluide de salsepareille (F)

مستخلص الأفيون العامّ يجب أن يحتوي على ٥٠٪ من المورفين القاعدة وعلى ٣٠٪ من قِلَوِيدات الأفيون غير المورفين. إن هذا المُستخلَص، المؤلَّف بشكل أساسيّ من كلورهيدراتات قِلَويدات الأفيون، كان يُستعمل على شكل مُذابة مزروقة، عيارها سنتغرام واحد في كلّ مللتر، أي ٥ ملغ من المورفين.

مُسخَسبُسل. جسدول - Stupéfiant. Tableau B

طريقة الاستعمال - مقاديره الاعتيادية عن طريق الفم: ٢٠,٠٥غ إلى ٢٠,٠٥غ. لجرعة واحدة للبالغين. المقادير القصوى للبالغين عن طريق الفم، للجرعة الواحدة: ٢٤,٠٤غ، ولكل ٢٤ ساعة: ١٠,٠٠غمام.

Extrait de مستخلص الخشخاش المنوِّم pavot (F)

مستخلصات محسوبة في مستخلصات من ١٠٪ من المورفين.

تؤخذ في برشامات، مضغوطات، بيلولات، تحاميل.

جدول: Tableau B

Extrait brut السوس الخام de réglisse (F)

إن المادة التّجاريّة التي تُسمّى، عن غير وجه حقّ، عصير السّوس، هي مُستخلَص مائيّ مُجفَّف من جذر السّوس تُوجد ممزوجة معه أملاح تُرابِيّة مصدرها الماء

الشائع الذي يُستخدم في تحضيره وكذلك مَوادَّ المُستخلَص التي أفسدتها الحرارة. نجد فيه غالبًا موادَّ مُضافة كالسُّكَّر، والنَّشاء، إلخ. (١٩٦٥).

المواصفات - يكون، إمّا في مسحوق، أو في كِتَل، وإمّا في قضبان أسطوانيّة الشَّكل مُفَلطَحة من أحد طَرفَيْها، وإمّا على شكل كُريّات. وهو أسود اللَّون وكَسُور، مكسره لامع. يمكن سحقه في هاون. طعمه مُسكَّر، أحيانًا يكون حامزًا بعض الشَّيء. وهو لا يذوب بكامله في الماء؛ محاليله المُصَفّاة تُرغي بالخض وتترسّب بالحوامض.

التركيب والاستعمال - مُستخلَص السّوس المَخْزَنيّ الخام يجب أن يحتوي على ١٠٪ كحدٌ أدنى من الغليسيريزِيْن النُشادريّ المُعيَّر هكذا.

يدخل في تحضير عجينة السوس المَخْزَنيّة، وفي عجينة السوس المَخْزَنيّة بالقطران، وفي بلسم طولو (دستور ١٩٦٥).

۲۸۱ مُسَهِّلات، مُلَيِّنات البَطْن Laxatifs (F)

من فعل Laxare اللاتينيّ، بمعنى أرْخَى، حَلَّ. وهُنا: أسْهَل، لَيَّن البَطن. إن الإمساك هو أكثر الاضطرابات الهَضميَّة شيوعًا، وهو يُصيب امرأة من ثلاثة، ورجلًا من سبع

م س ھ

رجال، ويكون ذلك في المدن بنوع قوامها وتسهِّل إخراجها. خاص. الإمساك هو مرض البُلدان الغنية.

> تنتمى الأدوية المُستعمَلة في معالجة الإمساك إلى ٤ مجموعات تبعًا لطريقة عملها.

- عمل میکانیکی
- زيت الپرافين: مُزَيِّت، مُزَلِّق لا يُمْتَص .
- صموغ ولُعابات: تزيد حجم وتَمييه الموادّ البرازيّة عن طريق امتصاص الماء.
 - عمل مهيج

إطلاق الحركة الاستدارية اللولبية وإفراط الإفراز اللَّعابيِّ. إنَّها المسهِّلات القويّة Purgatifs.

- مسهلات قوية مِلْجية.
 - أنتراكينونات.
- فينول فتالايين (فينولفتالايين).
- عمل منشط الحركة الانعكاسية التَّخْفِيْفِية Exonérateur التَّخْفِيْفِية
 - تحاميل.
- حُقَن صغيرة، ميكرو حُقَن (١١) -Micro . lavements
- عمل مُدِرّ الصَّفراء، مُفرز الصَّفراء أو تَناضُحِيِّ تَنَافُذِيِّ Osmotique .

إن المسهّلات هي أدوية تُسرّع العبور المِعَويّ الأمْعائق وتُكسِب الكتلةُ البرازيّة

من الملائم تمييز المُسهّلات عن المُسهِّلات القويّة التي تُؤدّي إلى تفريغ عنيف للمواد الموجودة في المعي الغليظ. وحتى إذا تَصرَّف المُسهِّل القوى الذي يُؤخذ بكمِّيات ضعيفة، كدواء مسهِّل فقط، فإنَّ تقنيّات عمله تبقى مختلفة. المُسهِّل يجب أن لا يحدث مغصات، ولا إسهال، ويجب أن يكون تأثيره ميكانيكيًّا وأن لا يَتدخُّل بالمواد النَّزْلِيّة Cathartiques أو الأنْتراكينونيكية التي يكون لها عمل مُدِرّ للصَّفراء أو عمل Diastique.

وهي: الموادّ الغَنيّة بالسلّولوز كنُخالة القمح (ملعقة صغيرة في نهاية الوجبات، إمّا في مُحبّبات أو في بسكوت)؛ اللّعابات: أغار أغار، ١٠ إلى ٣٠ غرامًا في اليوم ممزوجة مع حساء الخضار، ومع الحليب، ومع المُربَّيات، تُؤخذ مساء خلال الوجبات؛ بزور الكَتَّان والخردل الأبيض، مِلعقتان إلى ٤ ملاعق كبيرة كلّ يوم، تؤخذ إمّا صباحًا أو مساء، بزر قطوناء، ١ إلى ٣ ملاعق صغيرة في اليوم؛ المُسهّلات المُسَكِّرة المُخصَّصة للأولاد بنوع خاص: العسل، ٢٠ إلى ٥٠ غرامًا، المَنّ، ٥ إلى ١٠ غرامات، الغليسرين (مهيِّج قليلًا) مِلعقة أو ملعقتان صغيرتان في اللّيتر، أو تحاميل من ٧٥,٠غ إلى غرام واحد، لُبِّ الثمار: لُبِّ سَنْط العَنْبَر (٤

إلى ٨ غ)، تمر هندي (٥ إلى ١٠ غ)؛ الحَوْخ الكبريت المغسول (٥ إلى ١٠ غ). الحَوْخ المحقف في كمپوت، شراب زهر الدراق السُّكِريّ (ملعقة صغيرة أو كبيرة). (أطلب لُعاب في المعجم الخامس ٢١٥ رقم ٢٣٥).

إن زيت الفازلين يزيد ميوعة محتوى الأمعاء، بمقدار ملعقة أو ملعقتين كبيرتين صباحًا ومساءً أو خلال الوجبات طوال عدّة أيّام، يكرّر لعدّة فترات من ١٥ يومًا تفصلها مراحل من فترات من ١٥ يومًا تفصلها الطّويل يُحدِث حالات من عُسر الهضم ويحلّ الكاروتين ويمنع امتصاصه، وقد يَحدُث عن ذلك ظواهر نقص بالڤيتامينات التي المواد الدَّسمة (A.D.E.K.). عن المواد الدَّسمة (A.D.E.K.). إلى المجازفة بالنَّر الشَّرْجِيّ، أو الرَّشْح الشَّرجيّ، أو الرَّشْح الشَّرجيّ، أو الرَّشْح الشَّرجيّ.

زيت الزَّيتون، من ١٠ إلى ٤٠ غرامًا بالفم، صباحًا أو خلال وجبة وفي حقنة شَرجيّة من ٨٠ إلى ١٥٠ غرامًا تعطى مساء.

اللَّعابات تزيد حجم البراز. غير صالحة في إصابات الأنبوب الهضمي التضييقِيّة، وقد تُحدِث إحساسًا بتطبُّل البطن.

يَجب ألّا يُستعمَل المُسهِّل بانتظام. ويجب الامتناع عنه في حال البواسير، وفي حال التهاب المستقيم. من النضروري أن نعرف، أن ابتلاع المُسهِّلات، في عدد من الحالات،

أكان ذلك عن طريق الفم أو الشَّرْج، يَجب الامتناع عنه، واتباع طريقة غذائية ملائمة، ونَمَط حياتي نشيط. وهذا ما قد يمنع حصول الإمساك. كما أن الحمية العذائية تُعدَّل، فتشارك فيها الخضروات، والعسل، والخوخ المحقف (مثلًا). إن استعمال المسهّلات يُؤدّي إلى الإدمان، وفيما المسهّلات يُؤدّي إلى الإدمان، وفيما عدا بعض التَّركيبات، فإن التَّهيتُج المعويّ قد يصبح معها مزمنًا.

Alcool: مَشْرُوبات كحولِيّة -۲۸۲ Spiritueux (F)

بالإضافة إلى الكُحول والرُّوم، نُورِد بعض السّوائل الكُحوليّة التِّجاريّة المُختلِفة الّتي تَستعملها الصَّيدليّة في بعض الأحيان. وهي سَوائل تَشتهر بأسماء مُختلِفة، حسب المَوادّ التي تَتُج عنها، أو حسب دَرَجات تركيزها. أهمُها ما يلي:

أراك، راك، سُمْشُو (Arach, Rack (F)

سائل كُحوليّ تجاري تستعمله الصَّيدليّة في بعض الأحيان ويَحصل في الهند الشَّرقيّة من الرزّ المُتَخمِّر (مع إضافة الكاشو إليه) أو يَحصل من عصير القَصَب مع إضافة قِشرة عِطْرِيّة. وهو مَشروب يَدعوه الصِّينيُّون «سُمْشو». Sumchou.

م ش ر

م ش ر جن وویشکی Gin et Whisky (F)

يَتم الحُصول عليهما في بريطانيا وهولُّنْدة وبلجيكا من سوائل ثُفْل الشُّعير وحُثالته المُتخمِّرة، ومن بَقيَّة الحبوب، مع أو من دون عِنَبيّات العَرْعَر. وهما يحتويان على ٥٢ بالمئة من الكحول.

Kirsch, Kirsch-Wasser (F) کیرش

مَشروب كُحولتي يُصنَع في سويسرا وألمانيا، ويأتى أفضلُه من «الغابة السوداء، في القُوج، ويَنْتُج عن تَقطير عصير كَرَز الطُّيْرِ أي الكَرَز البَرِّيّ ومن عَصير الكَرَز الأسود المُتخمّر، وإجراء التَّقطير على النَّوَى. يَدين الكبوش برائحة اللُّوز المُرّ إلى الحامض اليروسِّيْك أي السِّيانْهيدريك. إذا خُفُّف الكيرش فيُصبح كُحولة الكَرَز الأسود في الفَرْ ماكوبيا الألمانية.

ماءُ الحَياة، كُونياك، قِنْدِيْد، بَاذَق Brandy (E) Eau-de-vie, Cognac (F) Spiritus vini (S) Branntwein (D)

ماء الحياة هو الكُونياك، اسم المِنْطَقة الفرنسيّة التي تُنْتِج أشهر أصنافه، وهو سائل كُحولي يَحصل من تَقطير النَّبيذ باستثناء أيّ سائل كُحولتي آخر. يجب أن لا يحتوي على أقل من ٤٥ بالمئة ولا على أكثر من ٥٥ بالمئة من حجمه من الكُحول الأثيليكي.

المواصفات - سائل باهت اللُّون العَنْبريّ الأصفر، يَدين بلونه إلى البَراميل التي يُحْفَظ فيها. رائحته مُمَيَّزة وتَفاعله حامِض. ولكى نَتَأكَّد من جُودته نَقوم بالتَّجربة التَّالية: نُبَخِّر عند ١٠٠° سغ وحتّى ثبات الوزن، مِقدار ٢٠ ملل ماء الحياة في وعاء تَبخير مُعَيِّر؛ الفُضالة يَجِب أَن لا تكون أكثر من ٠,٥ بالمئة.

الخصائص والاستعمال - إذا أعطى الكُونياك بجرعات مُعتدِلة، فإنّه يُستعمَل كدواء مُقَوِّ عامَّ ومُنشِّط في مُقاومة ظواهر الوَهْن وضَعْف الحَيويّة أو انحطاط القُوى، كما يُستعمَل أيضًا كغذاء مساعِد.

ماراسْكِي زَارا (Marasquin de Zara (F) ماراسْكِي

إنّ الماراسُكيُّ الذي يُنتّج في دَلْماسِيا من تَخمير الخَوْخ والدُرَّاق، ليس سوى

ملاحظة – إنّ كُحول وماء حَيَاة البَطاطا والحُبوب تَحتوي كلُّها على زَيت طيّار مُحْتَرً، يُكسبها طعمًا ورائحة خاصَّين، كما يُكسِبها خَصائص سامّة. ولقد تَمّ التَّوصُّل في صِناعَة هذه الكُحول إلى نَزْع هذه المادة العِطْريّة بطريقة يَتمّ معها الحصول على كحول ليست له سوى رائحته النَّوعيَّة؛ وهو يُدعى الكُحول الطُّيِّبِ المَذاقِ. إنَّ كلِّ المَشروبات الكُحوليّة هي إذًا بحاجة لأن تَتَنقّي من ذلك الزَّيت الذي يُصار إلى فَصْلِه بتكريره في آلات صناعية كبيرة.

مع ا	صمغ عربيطين أرمينيا ٩٠ غ	Opiate (E) معاجين الأفيون - ٢٨٣ Opiats (F)						
	يؤخذ في الديسنتيريا. يعطي البعض، باسم معجون أفيون مضاد للديسنتيريا بَلْسَمي، التركيبة ذاتها يضيف إليها ٦٠ غرامًا من بلسم لوكاتَللّي.	معجون أفيون طارد للحتى (بورجوا) سولفات الحديد ٢٠ غ مستخلص الكينا ٢٠ غ كينا حمراء مسحوقة ٢٥ غ سولفات الكينا ٨ غ						
	معجون أفيون منظّف أسنان بالفحم (بَرْييه)	مستخلص العرعركمّية كافية						
	فحم صفصاف فحم حيواني مغسول ١٠٠ غ حامض مجفّف مع كبشي قرنفل ٣٠ غ	يؤخذ منه صباحًا ومساء قبل الوجبات بقدر البندقة في قليل من الخبز الفطير أو مع ملعقة من الحساء.						
	شب محروق ۱۰ غ	معجون أفيون مضادّ للتعقيبة (بايران)						
	كربونات المغنازيوم ١٠ غ	کوباهو ۳۰غ						
	سولفات الكينا ٥ غ	مغنازيا محروقة ٣غ						
	بلسم الپيرو	كبابة مسحوقة						
	نمزج الكل بشكل جيّد.	دهن الفرقهمعجون أفيون مضادّ للتعقيبة (دِيْدَاي)						
	معجون أفيون منظّف أسنان بقرن الأيّل	كوباهو ٢١غ						
	المحروق	كبابة ١٨ غ						
	قرن أيّل محروق ١٢٥ غ	جَلَب (جَلَبة)٣غ						
	كريم الطرطير (درديات) 63 غ	صمغ نقاط ۱٫۰ غ						
	شب محروق ۲ غ	شراب الورد الجوري السكري . كمّية كافية						
	قرمز ١٥ غ	يؤخذ منه مرتان في اليوم.						
	سوسَن ٣٠غ	معجون أفيون مضاة للديسنتيريا						
	عَسَل ٦٢٥ غ							
701	دهن النعنع أو القرنفل ٤٠ نقطة							

۲۸٤ معجون عَسَلي ۲۸۶

Conserve مُعَلِّبات، محفوظات (E) (E) Conserves, Electuaires simples, Saccharolés mous (F) Konserve (D)

معلّبات النباتات الغضّة

مُعَلّب المِلْعَقِيّة

أوراق ملعقيّة ١ جزء سكر ٣ أجزاء

نَهرس المادَّتَين في الهاون لكي نَجعل مِنهرس المادَّتين في الهاون لكي نَجعل مِنهرَشة Pulpoire في مُنْخُل شَعْر رقم ٢ (كودكس ١٨٨٤).

نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها مُعَلَّبات:

حُمّاض العيد، القُرَّة، نَفَل الماء، بَقْلَة الملوك، أزهار الدرّاق والبنفسج، وكافَّة النَّاتات الغَضَّة.

مُعَلَّب الكرز الغازي

أوراق كرز غازي غضّة ١ جزءان سكر ٢ جزءان نُحضِّر وفقًا للطَّريقة المُتَّبعة في مُعَلَّب الملعقبَّة. كما نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها

مُعَلَّبات أوراق الأنواع التّالية:

أَبْسَنْت. زُوفا. قَرَنْفُل. فَرْفَارة. شيح. خشخاش منثور. برتقال. مَلْيسة. فَيْجَن. خُبَّيْزَة. فاوانيا. عَرْعَر. أَبْهَل. عِنْبَيّة.

كَفْنَهَ .

مُعلّب مُضادّ لداء الحَفَر

مِلعَقِيَّة (حشيشة الملاعق)، قرَّة العين، نَفَل الماء، عصير فجل الخيل، عصير

	معجون عَسَليّ طارد للدودة الوحيدة
۱ غ	مستخلص (جوز العَفْص)
۷ غ	معجون السَّنا العسليِّ
عند	يؤخذ ٦٠ غرامًا في ٤ جرعات،
	المساء.

معجون عَسَلتي مضادّ للبواسير

١٠٠٠ غ	مَنّ دموعمنّ
١٠غ	سولفات البوتاسيوم
۱۰غ	ليترات البوتاسيوم
۱۰ غ	كبريت مُمَيَّه
كمّية كافية	عسل أبيض
١ غرامًا في اليوم.	يؤخذ من ٨ إلى ٥

معجون عَسَلى مضادّ للتعقيبة

۰٥ غ		كوباهو
غ		دهن النعنع
ه٠,٠ غ	المورفين	هيدروكلورات
كافية لتسع مقادير	كمية	كسبة لوز حلو
ير في اليوم.	ئلاث مقاد	يؤخذ منها ث

معجون عَسَلي مضادّ للقوباء

غ	٠,١	سليماني أكَّالُ٥
غ	10	سولفات الأئتي موان
	١٥	راتنج الغاياك
غ	٣٠	مستخلص الشاهترج
فية	، کا	شراب قشور البرتقال السكري كمي

النارَنْجَة (أبو صفير)، بكمِّيّات مُتساوية، وكمِّيَّة كافية من السُّكَّر.

مُعلّبات النباتات الجافّة المسحوقة

مُعلّب الورد الأحمر

ورد أحمر مسحوق ١٠ غرامات ماء الورد ٢٠ غ الورد مسحوق عليسرين مخزني ٢ غرامات غليسرين مخزني تخل مسحوق الورد في الماء، ونتركه فيه لمدة ساعتين، عندها نُضيف السُّكِر والغليسَّرين ونَجعل من الكلِّ مزيجًا متجانسًا.

إن هذا المستحضر هو أقلّ لذَّة بكثير من مُستحضر كُتُب الوصفات القديمة: نَدُقّ في هاون بتلات الورد الغضّة مع ٣ أجزاء من السكّر ونضيف كمّية كافية من ماء الورد.

۲۸۶- مُغَلْسَرَة، مُغَلْسَرات (Glycérés (F

مُغَلْسَرَة بالكلورور الزئبقي، مُذَابَة الكلورور الزئبقي، مُذَابَة الكلورور الزئبقي المُغَلْسَرَة كلورور زئبقي ٢ غ كحول ٩٠ درجة ٢٠ غ غليسرين

سامة (دستور ۱۹۰۸) - استعمال لغليشرولة الكلوروفورم: بيطرى.

مُغَلّْسَرَة بكلورور الزنك:

كلورور الزنكاغ غليسرين عليسرين

نُحضَّر بالطَّريقة ذاتها غليسرولات بيكلورور الزَّئِق، كلورور الأَنْتي موان، سيانور البوتاسيوم، اليودور الزَّئِبقيّ، الحامض الزَّرنيخيك (۱) Arsénieux، الحامض الزَّرنيخيك (۱) أرسينيات البوتاسيوم، زرنيخات الصوديوم، البوتاس الكاوي، المورفين، سولفات المورفين، الأتروپين، الأتروپين، الناردين، البروسين.

مُغَلِّسَرَة الغُرَيّاء:

غُرِيّاء ٢ أجزاء غليسرين ٨ أجزاء ضدّ الشرث، والخَصَر والحروق.

مُغَلْسَرَة الكلوروفورم:

كلوروفورم ٢٠ غ غليسًرين إنكليزي ٢٠ غ إذا استبدَلْنا نِصف كمِّية الكلوروفورم بصبغة الزَّعفران، نَحصل على الغليسَرولة المُضادّة لحكَّة الأسنان الأوّل الشَّديدة. عِدّة نقاط في فَركات على اللَّتَين لكي نستبدل شراب الأسنان الشُّكري. وقد أعطى كارِّيه التَّركيبة التّالية لغليسرولة الكلوروفورم:

غ	۲	•	كلوروفورم
غ	٤	٥	غليسرين غليسرين
غ	۲	•	كحول

١٠٠ غ (١) التَّسمية للمؤلِّف.

م غ ل

إستنادًا إلى الدكتور موردوك، إن والمَغْنُولية التَّمينة (١): M. Preciosa, الغليشرين هو أفضل سَوَّاغ لاستعمال الكلوروفورم الدّاخليّ.

إلخ. بزورها طاردة للحُتى وأزهارها عِطْريَّة تُستخدم في صناعة العطور.

۲۸۸- مُغوّلات Alcoolés (F)

مُغَوِّل الحامض السُّولْفُوريك، ماء رابَل، نِقاط حامضة مُقَوِّية، حامض سُولْفُوريك مُلَطَّف Alcoolé d'acide sulfurique, Eau de Rabel, Gouttes acides toniques, Acide sulfurique dulcifié (F)

حامِض سُولفوريك مَخْزنتي١٠٠ کُحول ۹۰ درجة ۳۰۰ خَشْخاش مَنْثُور

نَمزُج على مهل بسكب الحامض فوق الكحول؛ نُضيف بَتَلات الخَشْخاش إلى المزيج بعد أن يبرد؛ نَمْرُث الكلّ لمدّة ٤ أيّام؛ نُصفّى. (كودكس ١٩٣٧).

خطر - الجدول Dangereux - Tableau C

الخصائص - قايض، مُطهِّر، رَقُوء. غرام واحد من الدّاخل في مقدار ١٢٥ غرام ماء؛ استُعمل هذا المُغوَّل أحيانًا وهو مُشَعْشَع جدًّا في زَرْقات؛ ويُستعمَل كذلك أحيانًا لوقف سَيلان الدم الذي يَتَسبُّب عن وَخْز العَلَقِ. يُحضُّر منه أيضًا شراب رَابَل.

تَذكُر الفَرْماكوبيات الألمانية مُستحضَرَين مُماثلين للكحول السولفُوريك، هما:

°۱ - إكسير دِيبًل الحامِض المُركَّب من

١٨٧- مَغْنُولية بَحْرِيّة اللَّون Magnolier glauque, Magnolier de Virginie (F) Magnolia glauca, Magnolia virginiana **(S)**

جَنْبَة من فصيلة المَغْنُولِيَّات تعلو من ٣ إلى ٥ أمتار. أوراقها نصف مُعبلة، بيضيّة الشَّكل المُتطاول، فاتحة اللُّون الأخضر على صفحة النَّصل العُليا، بَحريّة اللُّون على الصَّفحة السُّفلي. أزهارها بنضاء قطرها من ٨ إلى ١٠ سم، رائحتها مُستحبَّة حدًّا.

لحاؤها الذي يَتقارب من لحاء السَّاصَفراء، نُصِح به كعقّار مُعرِّق قَويّ في حالات الرّوماتيزم وكطارد للحُمّي. خشبها يُدعى «خشب القديسة لوسيّة».

أنواع أخرى طبيّة:

مَغْنُولية كُوبُس^(١) M. Kobus، شجرة مهدها اليابان يبلغ ارتفاعها ٢٠ مترًا، حملها شبه هرمتي الشَّكل، أوراقها مُعبلة، أِزهارها ناصعة اللُّون الأبيض. أوراقها وفروعها تُعطى زَيتًا دُهنيًّا يُدعى «دهن الكوبوشي»، وهو يحتوي على سيترال، أنيتول، مَتيل شافيكول، إلخ.

المَغْنُولِية العَذْبَة (١) M. Suaveolens،

حامِض سُولفوريك ٣٠، كحول ١٥٠. نُلوِّن هذا المزيج بواسطة ٨ من الزَّغفَران ومثله من القِرْمِز الحَيَوانيّ.

°۲ - إكسير هالَّر الحامِض أو ليكور هالَّر الحامِض المُركَّب من الحامِض والكحول بالتساوي. إنَّ ماء رابَل تقع إذًا في وسط هَذين المُستحضَرَين، بالنِّسبة لقُوَّتهما.

- ٢٨٩ مُغَوّل النَّفْتالين، صِبْغة النَّفْتالين Alcoolé de naphtaline (F)

نَهْتالِين ماء حَياة ٥٨ درجة **٣٠**

نُذَوِّب. إقتُرِح هذا المُغَوِّل لكي يَحلَّ مَحلَّ ماء الحياة المُكَوفَر. كذلك لاستبدال الكحول المُكَوفَر تَمَ اقتراح الكحول النَّفْتالين ٣٠، كحول الكحول النَّفْتالينيّ: نَفْتالين ٣٠، كحول ٣٦ درجة ١٠٠٠.

Alcoolé مُغَوَّل الفوسفور، كحول مُفَسْفَر de phosphore (F)

فوسفور ٩٠ كحول ٩٠ درجة تُشَخَق مَعًا بهدوء، نُصَفِّق .

مُغَوّل البوتاس، مُذابة البوتاس الكُحوليّة Alcoolé de potasse (F)

مُغَوّل البوتاس الكَربُوناتِيّ، صِبغة مِلْح الدُّرْدِيّ، مذابة كربونات البوتاسيوم الكُحوليّة Alcoolé de potasse carbonatée (F)

> نَحْرُق الملح بقوّة في مِذْوَب، نَصُبُه في هاوَن ساخِن، نَسحُه بسرعة ونسكُب الكحول فوق المسحوق وهو لم يزل ساخنًا.

-۲۹۰ مِلَاط الطَّبَرْخَى، قَرْن اصطناعي (بيطري) Mastica à la Gutta percha, (حسطري) Corne artificielle (F)

غوتا بَرْخا ٢ جزء صَمْع أمونياك ١ جزء نُسخِّن في حمّام مريم الطَّبَرْخى وصَمْع الأمونياك المُقسَّم إلى أدق ما يمكن حتى اللَّيونة الكافية ونصنع مزيجًا جيّد التَّجانس. في الصَّيف نَستعمِل أجزاء متساوية من المادَّتين.

يُستعمل هذا المِلاط لإصلاح الفُتْحات والنُّغرات في أقدام الخيل وللحَدِّ من مساوئ الأقدام السيَّئة التكوين.

صمغ الأمونياك هو صمغ نَبات من فصيلة الخَيْمِيَّات ينبت في العجم.

م ل ا

م ل ع

Fetish banana, Lucky banana (E) Bananier fétiche (F) Fetischbanane, Glücksbringerbanane **(D)**

Musa religiosa (S)

نَبات بَرِّي إفريقي من فَصِيلة المَوْزيّات مَهدُه المناطق الاستوائية. أرومتُه مُعِقّة. ساقُه تَعلو حوالي ١٠ أمتار. حَمْلُه أقصر وأكثف من حَمْل مَوز الحَبَشة. أوراقُه المُضَلِّع تحت القِشرة. فُروعه المُعمَّرة أكثر انتصابًا وجمودًا، كبيرة القَدّ، مُزوَّاة قَليلًا، مَلْساء ومَرْطاء؛ الفُروع مُتدلِّية الأطراف. نَصلُها جامِد الصَّفحة المالسة، يَحري اللَّون الأخضر. كِباسَتُه كبيرة القدّ، ناريّة القُنابات، أرجوانيّة الطُرْطُب. ثمارُه دقيقة، مُستطيلة، ناشِفة، لا تؤكل. ي

الاستعمال - يُنصح بهذا النوع لزرع

banana, Indian banana (E) Bananier de Chine, Bananier d'Inde **(F)**

Chinesischbanane, Indischbanane **(D)**

Musa Sinensis (S)

نَبات عُشيق مُعمَّر من فَصِيلة المَوْزيّات. وقيل عن مختلف أنواع الملعى إنَّها أرومتُه مُعِقَّة. ساقُه تَعلو من ٤ إلى ٨ تَحتوي على عُصارة حامِزة ومُنفِّطة، أمتار. أوراقُه إهْليلجيّة الشَّكل، مُتوسِّطة القَدّ، مُنفرجة الانتشاب. نَصلُها فارش الصَّفحة المُّنبسِطة العديمة الالتواء، لَونُه

 ٢٩١ - مَلْعَى عَنَمِي، مَرْعان، حَبْل مِسْكِي ٢٩٢ - مَوْز السَّعْد، مَوْز الفَأْل Clématite à vrilles, Clématite toujours verte (F) Clematis cirrhosa (S)Evergreen clematis (E) Einfachblättrige waldrebe (D)

نَبات مُعمَّر ليفيّ عارش من فصيلة الحَوْذانِيَّات يَبلغ ١٠ أمتار. جذعه مُغطِّى بِقِرُفِ Rhytidome رَمادي اللَّون البُنِّي؛ وهو ليفي، خشبه قَوي التَّثْليم الحولية مَرْطاء أو خفيفة الزغب فوق العِقَد. أوراقه مُتقابلة، مُعنَّقة، خضراء، زغبة في فَتاوتها، ومن ثمّ مُستَمْرَطة. النَّصل بسيط، مُسنَّن أو مُفرَّض كبير الأسنان، بَيضوى إلى بَيضوي الشَّكل المستطيل، قَلْبِيّ القاعدة. أزهاره كبيرة أَجَمات قَويَّة تُقاوم عَمَل الرِّياح. قطرها من ٢٫٥ إلى ١٠ سم، فَرديّة أو من ٢ إلى ٤. كأسيّاتها من ٤ إلى ٥ - ٣٩٣ مَوْرَ الصِّيْن، مَوْرَ الهِنْد Chinese ذات ٣ عروق مُتفرِّعة، زغبة حريريّة من الخارج. إزهراره من تشرين الأوّل إلى شياط.

> المركّبات والخصائص - ذُكر أن عُصارة أوراق هذا النّبات قليلة المادّة القِلَويّة السّامّة لكنَّها حِرّيفة تَحرُق الجلد.

وإنها كانت تُستعمل ضِدّ السَّرطان. ولكنَّها اليوم غير مُستعمَلة.

إلى الخضار الباهت. كِباسَتُه عديدة ماء أكَّال، هيدرولة زئيقية كلسية الأمشاط. ثماره ضخمة قصيرة مأكولة سليماني أكّال \$ و ع متوسِّطة الصِّنْف.

> الاستعمال - (راجع مُوزة في المعجم الخامس ص ٢٥٠ رقم ٢٦٥).

٢٩٤- مَوْزِ اليابان، مَوْزِ بَاسْجُو Japanese banana, Basjoo banana (E) Bananier basjoo, Bananier japonais **(F)** Japanisch banane (D)

Musa basjoo, Musa japonica (S)

نَبات عُشبي مُتَشجّر مُعمّر من فَصيلة المَوْزيّات يَعلو من ٢ إلى } أمتار. أوراقُه تَطول من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم وتَعرض من ٥٠ إلى ٨٠ سم. مَهدُه اليابان. نَصْل أوراقه جامد الصَّفحة النَّاعِمةِ العابقةِ اللَّونِ الأخضرِ. أرومَتُه مُعِقَّة Dragonnant. ساقُه حَمراء اللَّون. كِنَاسَتُه مُنعقِفة مُتَدلِّبة عديدة الأمشاط. قُناباتُه أرجوانيّة. طُرْطُبه مَخروطيّ الشَّكل، بَنفسجي اللُّون. ثمارُه مأكولة مُستحبَّة الطُّعم مُعتدِلة الغَلاظة والطُّول.

المركّبات والخصائص - (أطلب مَوْزَة في المعجم الخامس ص ٢٥٠ رقم . (770

٢٩٥- مياه عِلاجيّة مختلفة Eaux minérales (F)

٤ ١٢٠ ماء كلس

نحلّ الملح في مقدار ١٠ غرامات ماء مقطّر ونمزج الكل.

نحرّك قبل الاستعمال (دستور ١٨٨٤).

الاستعمال - لوسبونات للقرحات الزُّهَريَّة وللقضاء على الهوام.

ماء برومُوفُورميّ

بروموفورم ٤ غ ٤١٠٠٠ غ ماء مقطّ

نحفظه في قارورات مقفلة جيّدًا من الزجاج الملوَّن.

ماء بنّي اللَّون (وَرْلُومُونْت)

غ	١	•			 	 	 							رق	بۇ
غ	٥			 	 		 		ζ		1	ں	لص	ىتخ	میر
غ	١	٨	٠		 	 	 	زة	نبيا	الخ	-	ور	جذ	ح -	نقي

الاستعمال - كمادات على إصابات العينين الحادة.

ماء خُزامَي سميث

دهن الخُزامي (اللّاوَنْده) ٠٦٠ غ صبغة العنبر ۰۰۰ غ ماء كولونيا ٠١٠٠٠ غ كحول

يشير بعض المؤلّفات باسم «ماء الخزامي الإنكليزي» إلى المستحضر

م ي ا

YOV

م ی ا

· 11-11

	المالي .
۰ ۷۵۰	كحول منقّى
۴۷٥غ	ماء الورد
٤	دهن البرغموت
٠٠٠ غ	عنبر رماديّ
١٥ غ	دهن الخزامي
۲ غ	نشادر سائل
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مسك
۳۰ غ	أزهار الخزامي
ل على كيلو واحد من	نقطّر حتى الحصو

ماء رَماديّ اللّون

النتاج.

۸ غ	زئبق
٠٢ غ	حامض نيتريك
	نحلّ ونضيف:

عصير بقلة الخطاطيف ونقيع الأرستولوخيا بالتساوي ٢٧٥ غرام.

نصفّي. ماء كان يستعمل في الماضي في لوسيونات للقرحات الزُّهَريّة.

ماء غرِنْدَل الأكّال، ليكور زئبقي مكوفر سليماني أكّال ٢ غ كافور ٤ غ كافور ٤ غ كحول ٤٠٠٠ غ

الاستعمال - القضاء على السَّعْدَانات Condylomes ، وهي أورام قنبيطيّة قرب الشرج وأعضاء التناسل.

ا ماء غُولارد، ماء أبيض، ماء نباتي كُرة نانسي

معدنتي، ماء زُحَل

۲۰ غ	تحت أستات الرصاص السائل
۹۰۰ غ	ماء النهر
۸۰غ	كحولة شافية للجرح
	نمزج.

في تبخيرات، لوسيونات، ولصوقات، كدواء مجفّف ومصرّف.

إذا استبدلنا الكحول بماء الحياة المكوفر، نحصل على ماء غولارد المكوفر. إن دستور أدوية ١٩٤٩ لم يحتفظ إلّا بالماء الأبيض البسيط: Aqua plumbi (تحت أستات الرصاص السائل ٢٠ غرامًا؛ ماء عادي ٩٨٠ غرامًا). أطلب مُذابَة أستات الرصاص القاعدية (دستور ١٩٦٥).

نخض وقت الاستعمال.

إن ليكور تحت أستات الرصاص المحلول الذي يستعمله الصيادلة الإنكليز، يتركّب من ٤ غرامات أستات الرصاص السائل، ٥٠٠ غرام ماء مقطّر، ٤ غرامات كحول.

الماء الأبيض المكوفر يحضر من: ماء حياة مكوفر ٨٠غ ماء أبيض، كمية تكفي لمقدار ١ ل صبغة پاناما ٢٠ نقطة

ملاحظة - عدم الإشراك مع ما يسمّى نقاط غَلَارد البيضاء.

ماء الكُرَة كُرة نانْسى ١ (عدد)

ماء غال ٢٠٠٠ غ ماء م ي ا نترك الكُرة في الماء الغال بضعة دقائق. للحصول على ليتر من النقيع المغلي. الماء المخبّز المحضر بواسطة شواية خبز محمّص يعطى مشروبًا ألَّذ يكون

ماء مُسَكِّن، ماء نشادري مُكَوْفَر

مقويًا خفيفًا. يؤخذ بكبّايات.

رقم ۱ رقم ۲ رقم ۳ ۲۰ ۸۰ ۲۰ نشادر سائل ١٠غ كحول مكوفر ١٠ ١. ٠٦٠غ ملح بحري 7. ٦. ٠٠٠٠ ١٠٠٠ غ

نذوِّب الكل على البارد. نخض كل مرّة ماء مُبارَك (شَاريتيه)، جروع مقيِّئ نريد الاستعمال. لكي نتلافى تشكيل حُبيبات الكافور، نصح لاليو بمزج مقتى مقتى وخض المحلول المالح مع النشادر ٢٥٠غ أوّلًا، ثمّ إضافة الكحول المكوفر، ومن ثمّ الماء، وذلك مع التحريك المستمرّ.

الخصائص والاستعمال - يخصص الماء المسكّن القوي، رقم ٣، للأشخاص ذوى البشرة القاسية والجاسِئة الخشنة أو للحيوانات؛ الماء المسكّن المتوسّط، رقم ٢، يصلح في 7,0 غ حال وخز الحيوانات السامة؛ أما الماء ٥,٠ غ المسكّن رقم ١، فهو الماء الذي كان رَسْيَايْل Raspail يستعمله عمومًا، وكان إن هذه التركيبة تصلح تمامًا لحاجات حتى يحلُّه بالماء للأشخاص ذوي مبحث أمراض الأذن والأنف والحنجرة. البشرات الحسّاسة جدًّا.

يمكن تعطيره إذا أردنا.

٦٠غ إعتمد دستور أدوية ١٩٤٩ تركيبة

الاستعمال - من الخارج على الكدمات؛ من الداخل، في اليَرَقان وسَيَلان المهبل.

ماء مُبارَك

غ	١	٥		٠.	٠.		 				٠.						ىو	ار	فر	<u>ا</u>	ساء	
غ	٣	٠	,			. ,											 		ں	س	سو	d
غ	٣	•	٠	•			 					 ٠.					 J	٠,	کل		باء	•
									,													

نمرّر بعد يومين من النقع.

مستحضر يتقارب من ماء كلس اماء شائع كُرْمَايْكل.

للرشامين

يعطى على دفعتين، تفصلهما ساعة، في حال مَغْص الرسامين (عِلاج شاریته).

ماء مُتَأْكُسِج مُبَوْرَق

مستحضر فورى لوقته؛ نحل على البارد:

حامض بوريك بَوْرَق في ماء مُتَأْكُسِج مخزنيفي ماء مُتَأْكُسِج

ماء مُخَبَّز

خبز قمح

709

م ی ا

متقاربة من التركيبة رقم ١، ولكنّه حدّدها كبش قرنفل ٨غ المسكّن بتذويب ٥٣ غرام كلورور دهن النعنع الصوديوم العادي في ٨٨٥ غرام ماء مقطّر، ومن ثمّ بسكب ٩ غرامات كحول مكوفر، ونضيف، بعد الخضّ صبغة العنبر القوى، ٥٣ غرام نشادر سائل عادى.

وقت الاستعمال.

نظام الجدول C.

الخصائص والاستعمال - ضدّ كبش قرنفل الشقيقة، الاحتقانات والحميات الدّماغية، الإصابات الروماتيزمية. نضع بأديان هذا الماء في كمادات على المكان المؤلم في الرأس، مع الانتباه إلى أن لا يسيل منه في العينين. يقول المؤلّف إن تأثيره سريع دهن نعنع . جدًّا. ويستعمل أيضًا في لوسيونات كحول ٥٠٠ وتمسيدات ولصوقات، إلخ.

> ولقد تمَّ اقتراح تحضير ماء مسكِّن مُنَفْتَل يستبدل فيه الكحول المكوفر بالكحول المُنَفْتَانِ.

> > تركيبته هي التالية:

غ	٣	٠	نشادر سائل
غ	٣	•	كحول منفتل
غ	۲	٠	ملح بحريملح
غ	۲	٠	ماء

نمزج.

ماء منظف أسنان

أطلب كذلك: إكسيرات منظفة أسنان. ٠٣٠غ يانسون

كماء مقطّر. نحصل على هذا الماء قرفة٨غ ٤١,٢ قندید٥٧٨ غ

نمرث لمدّة ٨ أيّام، نصفّى ونضيف: ع غ

منظّف أسنان مستعمل جدًّا. بعض نحفظ في قارورة مقفلة بعناية. نخض المؤلِّفين يضيف إليه ٢ غرام قرمز، ١٥ غرام كينا حمراء.

تركيبة أخرى:

قر فة ۲٥ غ دُردِيّات حامض البوتاسيوم ۲٥ غ ۲٥ غ ٠٠٠٨ غ

نجرش الأفاويه ونضعها في الكحول، كذلك نضع الزيت الطيّار. من جهة أخرى، ندقّ القرمز مع درديات حامض البوتاسيوم وقليل من الماء؛ نضيف هذا الخليط إلى الأوّل؛ نترك الكلّ معًا عشرة أيّام ونصفّي.

٢٩٦- ماه معدنة اصطناعية **Eaux** minérales artificielles (F)

ماء غازی بسیط Eau gazeuse simple, Solution aqueuse de gaz carbonique **(F)**

إن استعمال الماء الغازي البسيط هو

استعمال عادي متكرّر. نحصل عليه بتشبيع الماء بحامض الكربونيك تحت ضغط قدره ٧ جَوِّيّات. نستعمله عندما لا نتوخى إلّا العمل المنشّط الخاصّ الموائد باسم «ماء سَلْتز» الذي لا يصلح

بهذا الغاز. إنّ هذا الماء هو بالذات الماء الغازي الذي يُقَدُّم يوميًّا إلى له البتة. وهو ما يصلح كسَوّاغ لمعظم المياه المعدنية الأخرى المُفْتَعَلة اصطناعيًا. ويمكنه أن يستخدم كذلك كسوّاغ لطائفة من المواد العِلاجية الغريبة عن المياه المعدنية.

ماء غازي مُحَلّى، لَيْمُوناضة غازيّة Eau gazeuse édulcorée, Limonade gazeuse **(F)**

۰۸ غ شراب حامض سکّری ماء غازي زجاجة

نحصل على نتاج ممتاز بالطريقة التالية (حسب سُوبايْران):

°۱ - قشور برتقالة غضّة١٢ عدد ١ل کحول ۳۳ درجة

نمرث لمدّة ٨ أيّام ومن ثمّ نُصفِّق.

۱ جزء ۲° - حامض ليموني ماء ١ جزء

نذوِّب.

۳° - صبغة البرتقال أعلاه ۲۰ سنتل محلول الحامض أعلاه ٢٠ سنتل شراب سکّری بسیط ۱۰ ل

يحرص الصناعيون على تحضير الليموناضة الغازيّة وفقًا لحاجاتهم، ذلك أنها سيّئة الحفظ، إلّا إذا أضيفت إليها موادّ حافظة مسموحة.

نمزج للحصول على شراب.

نحضر كذلك ليموناضات بواسطة شرابات سكّرية من الليمون (حامض)، الكشمش، الفرمبواز، الخَلّ، الرمّان.

لتحضير الليموناضات بالكِيْرش، أو الرّوم، أو الكونياك، نمزج ليترين من الشراب السكّري الحامض مع ليتر واحد من الكيرش، أو الروم، أو الكونياك، نستعمل ١٤٠ غرامًا من هذا المزيج في زجاجة ماء غازى. الشراب السكّري الحامض نحصل عليه من ٥٠ كلغ من السكر، ٢٨ كلغ من الماء، ١٦٥٠ كلغ من حامض السيتريك، ومن ٠,٥٠٠ كلغ من الصمغ المذوَّب في مقدار وزنه من الماء.

ماء غازي مُنتَرج، ماء غازي بـ پروتوكسيد الأزوت Eau gazeuse azotée, Eau gazeuse au protoxyde d'azote (F)

إن هذا الماء، الذي يُحضّر على غرار الماء الغازي البسيط، هو محلول مُشبَع من پروتوكسيد الأزوت تحت ضغط ٥ إلى ٦ جَوِّيّات، أي إنه يحوى ٥ إلى ٦ أحجام من هذا الغاز. وهو، مثله، يمتلك طعمًا سُكِّريًّا مُحسوسًا.

۲۹۷ - مَیْسَم، مَیَاسِم، یَافُوْخ (E)

Cautère, Fonticules, Fontanelles (F) Ätzmittel, Brennung (D)

المَيْسَم هو الحديدة أو الآلة أو الأداة التي يُوسَم بها أثر الوَسْم أي الكَيّ. إن المياسم تَخلَّت عن دورها منذ زمن بعيد إلى خُرّاج التَّشِيت Abcès de fixation. أما المقال التالي عنها فهو من باب الاستدلال والتَّوْثيق. فالمياسِم هي جروح صغيرة هدفها إحداث تَقَيَّح مُصَرِّف في مكانِ ما والمحافظة عليه.

تُجرى المياسم على الرَّقَبة في إصابات العينين، وفي أعلى الجمجمة Vertex في إصابات المخ، وعلى الذراع في إصابات الصَّدر، وعلى الفخذ أو فوق الرّكبة في إصابات البطن، مع تلافي مجاورة وَتَرِ (طرف عضلة) أو عظمٍ أو وعاء دمويّ كبير أو عصب ما، مُجاورة كبيرة. ولكي نُحدِث الميسم نجعل في الجلد أحيانًا ثَنْية نَشقُّها بالمِبْضَع ونُدخِل في الشقّ حَبّة الميسم رويدًا رويدًا. ونبدأ أحيانًا أخرى بإحداث نَفْطة نحوّلها إلى ميسم بإدخال حبَّةٍ في وسطها على مهل. وفي أكثر الأحيان نُحدِث الميسم بواسطة مادَّة كاوية. في هذه الحالة نَقصّ قطعة لَصْقَة مُشَمَّعة قطرها من ٤ إلى ٦ سم ونجعل فى وسطها تقويرة مستديرة على قدر الجرح الذي نريد إحداثه؛ نضع اللَّصْفَة المُشمَّعة على الجلد؛ نضع حَبَّة

حَجَر الميسم في التّقويرة حيث نُثبّتها بقطعة أخرى من اللَّصقة المُشَمَّعة Sparadrap .

إن استعمال حَجَر الميسم Pierre à cautère أهمل اليوم بشكل كامل تقريبًا لكى يَحلّ محلّه مسحوق ڤيينًا الأقلّ منه تَلَيُّنَّا وانسيالًا. ومهما يكن من أمر، نرفع الأداة التي وضعناها بعد مرور ١٠ إلى ٣٠ دقيقة؛ نَشق الجُرح على شكل صليب بواسطة المِبْضع أو سكّين حادً؛ نَرْفع البَضْعات الأربعة ومن ثمّ نضع مَيْسَمًا مكانها (البعض ينتظر حتّى تقع النَّدَبات لوحدها، ممّا يستوجب من ٥ إلى ٦ أيّام). عندما يدخل الميسم مكانه نبدأ بالتضميد: فنضع فوق الميسم أوَّلًا قطعة من الورق أو من التفتة المُبَرِّدة؛ نُثَبِّت الكل بضماد من القماش أو أفضل من ذلك، نُثبّته بواسطة صفيحة مَيْسَم Plaque à cautères أو بواسطة رَبطة ذراع مطّاطيّة، من التَّنك أو من الخَشَب المُلَبِّس. إن وسائل الضماد الجيّدة تسهّل العناية بالجرح كثيرًا. نغيّر الميسم كل ٢٤ ساعة بشكل عام.

إذا التهب الميسم نطرد الالتهاب بواسطة لَصُوقات، وإذا أحدث حَكّة وكان محيطه ينزّ دمّا نغسل المحيط بالماء الأبيض (أي ماء غُولارد: أطلبه). إذا أنْتَن نستخدم ضمادات كلورورية أو ضمادات من ميسم من الفحم؛ ومن ثم نتلف النتوءات

. infernale

إذا لم يعمل الميسم بالإمكان تنشيطه

والانتفاخات الدهنيّة التي قد تتشكّل غالبًا بتغليف حَبَّته بالمرهم المهيِّج أو المنفّط م ي س حول الميسم بواسطة الشُّبّ المحروق أو (كمرهم الخردل مثلًا) أو بمرهم بواسطة حَجَر جهنّم أي حَجَر الكّي Pierre البازيليكُم وإمّا باستعمال حَبّة ميسم مُسَيِّلَة للقَيْح.

۲۹۸ - نَخْلُ مَلَكِي Royal wine palm (E) Palmier royal, Oréodoxe royal (F) Königspalme (D) Oreodoxa regia (S)

شجرة معمّرة من فصيلة النَّخليّات. ساقها هزيلة، مغزليَّة الشكل، تعلو حوالى ١٥ مترًا. أوراقها إكليليَّة التَّجميع الهامي، خفيفة التَّقَوُّس، طولها من متر إلى متر ونصف، شُدفاتها ضيّقة، طويلة الرأس المستدق، لامعة اللُّون الأخضر، طولها ٣٠ سم. أعناق الأوراق مُغمِّدة، سَرْحَة. الأزهار وحيدة المسكن. مبيض ثلاثى الخُدور.

- ٢٩٩ نشاء البطاطا - ٢٩٩ de terre (F) Amylum solani (S)

tuberosum، تحضيره بسيط جدًّا. نبرش الدَّرنات ونُقطِّع اللَّبِّ في الماء ونَضع ميكرون، ولها سُرَّة مَرْكَزيَّة قليلة البُروز، الكلّ في منخل؛ يحمل الماء النّشا معه وهي مُجرَّدة من الخُطوط المُتراكِزة. عندما يمرّ بالمنخل؛ نترك للراحة، نُصفِّق وتَكشِف في الضَّوء المُسْتَقْطَب بوضوح ونغسل الرّاب النَّشويّ حتّى يُصبح أبيض اللُّون تمامًا. نَسْتَنْضبه على القماش، ومن السُّرَّة.

ثمّ نُجفُّفه في الهواء الطلق أو في المِحَمّ. يَتَأَلُّف نَشَا البطاطا من حبَّات مُنعزِلة، بيضانيّة الشَّكل بمعظمها، مع طبقات مُتراكِزة واضحة جدًّا وطرف ضيّق يُظهر سُرّة مُنحرفة المركز. وتكون تلك الحبّات النَّموذجيَّة مُترافِقة مع حبّات أخرى أصغر منها، مستديرة الشَّكل أو مبتورة، تلتحم فيما بينها أزواجًا أو ثُلاثًا، وتكون طبقاتها المُتراكِزة أقل وضوحًا. يختلف طول الحيّات من ١٥ إلى ١١٠ ميكرونات.

يُمثِّل هذا النّشاء صفات نشا القمح الكيميائية، ولكنه يُعطى صمغًا خفيفًا Empois أكثر شَفافيّة وأقلّ ميوعة. وهي تعطى في الضوء المُسْتَقْطَب ظاهرة الصَّليب الجديد الوَقتى Croix nova الواضحة تمامًا.

يُحضَّر من هذا النشاء عَصيدات مُغَذِّية ويُستعمل كذلك في لَصُوقات.

٣٠٠- نَشَاءُ الرزّ Amidon de riz (F) Amylum oryzae (S)

يُستخرَج من بُرَّة الرِّز Oryza sativa من فَصِيلَة النَّجِيلِيَّاتِ. يظهر هذا النَّشاء تَحت نَشاء يُستخرج من دَرَنات Solanum المِجهر على شكل حُبوب صَفّاحِيّة بسيطة أو نادرًا مُرَكَّبة، عَرضها من ٢ إلى ١٠ عن ظاهِرة الصَّليب الأسود المُركَّز على

- (أطلب: نشاءات مَخْزَنيّة في المعجم الثاني ص ٢٧٩ رقم ٣٤٢).

Red clover, نَفَلُ المُرُوح، نَفَل بَنفُسَحِيّ، Red clover, تَفَلُ المُرُوح، رَطْبَة برُسِيم أَحْمَر، رَطْبَة Meadow clover, Purple clover (E)
Trèfle des prés, Trèfle rouge, Trèfle violet, Trèfle commun, Triolet, Tramène, Lucotte (F)
Klee, Roteklee, Wiesenklee, Rotod-kopfklee (D)
Trifolium pratense (S)

نَبات عُشبي مُعمَّر، مُستمرط أو لاصِق الهُلْب، من فَصيلة القَرْنِيَّات، له أَرُومة كثيفة وضُمّة من الأوراق القاعِديّة. ساقه مُنتصبة، مُزَوّات، أو صاعدة، تَعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أُذَيْناتُها غِشائية، بَيضاوية الشَّكل، تَنتهى فجأة إلى عرفٍ قَصير شائك. أوراقُه بَيضاويّة أو مُستطيلة الشَّكل، العُليا منها حادَّة، الباقية مُنفرجة، وهي ثُلاثيّة الأقسام، مُتعاقبة، وريقاتها ذات بقعة بَيضاء اللَّون، سَهْميَّة الشَّكل المُميَّز. رُؤيساته الزَّهريّة هاميَّة الارتكاز، نصف كُرويَّة أو بَيضاويَّة، مُقَلَّفة بزوج من الأوراق، تَنْحَسِر أحيانًا إلى أُذَيناتها، طولها وعرضها من ٢ إلى ٢,٥ سم. الكأس خَيطيَّة الأسنان. التّاج أرجوانتي اللُّون الوَرديّ .

المُركِّبات - مَوادَّ عَفْصِيَّة، غلوكُوسيدات، حَوامِض عُضْويَّة، مَوادَّ مُلوِّنة.

الخصائص - صَدريَّة، نافِعة للمَعِدة. الاستعمال - الرُّؤيسات المزهِرة: برونشيت، شُعال، بَحَح وتَلَف الصَّوت، إسهال، حَمَّامات خارجيَّة، أمراض جلديَّة.

طريقة الاستعمال - نُقاعة من ستّ ملاعق صغيرة من الأزهار في ليتر ماء يُغلى قليلًا ويُغطَّى عشر دقائق. يُصفَّى ويُؤخَذ بكامله خلال النَّهار. يدخل نَفَل المروج في تركيب مَخاليط نافعة للصَّدر ونافعة للمَعِدة؛ وهي بالإضافة إلى ذلك، ذات عمل مُصلِح للطَّعم والرّائحة. حَمّامات خارجيّة ولُبْخات مُرَطَّبة من النُقاعة لمعالجة الأمراض الجلديّة. نَبات مِغشَرى هام جدًّا.

Gouttes (F) نقاط -٣٠٢

نقاط روسِيَّة مضادّة للكوليرا:

في حالات التبريد وخفوت النبص بتأثير الكوليرا. المقدار هو ١٥، ٢٠ أو ٢٥ نقطة في كباية صغيرة من الخمر الجيد. نكرّر هذا المقدار من نصف ساعة إلى نصف ساعة حتى حصول ردّ الفعل.

ن ق ا

نقاط طاردة للدود: روم الغيّاك مستخلص قشرة الجوزة الخضراء ٨ غ يود ماء القرفة ١٠٠ غ يودور البوتاسيوم مئة نقطة في اليوم. لُودانُم سِيدِنْهَام تؤخذ نقاطًا. صبغة بزور السورنجان ٤ غ

تَمَّ استعماله كمضادّ للذَّبحة، وطارد للدود، ونافع للمَعِدَة، ومُضادّ للكَلّب: Antilyssique. دُعي قنطريون أزرق، Tertianaria، بسبب خصائصه الطاردة للحُمّى التي كانت تُنسب إليه. في الهند يُستعمل ضِدّ الأطام (أي اضطراب البَيْلة) و ضدّ التَّعقسة .

إستخرج منه العالمان كاديت وغاسيكورت عام ١٨٢٤، هيتروسيدًا مُوًّا دُعي سكُوتَلارين الذي وُجد أيضًا في عدّة أنواع أخرى من الجنس عينه كالتَّالَى C21H18O2؛ وهو يَتَحلُّل مائيًّا إلى سكوتلارايين وإلى حامض غلىكورونىك.

الهُرْبُون الهنْدِي (٣) Scutellaria indica L. هو نبات مُعمّر من فصيلة الشَّفُويّات، في ضمّات كثيفة تعلو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أزهاره لازوردية اللُّون، سُنبليّة التَّجميع الطُّويل الهاميّ الإرتكاز. مهده اليابان والصين، حيث يُستعمل كطارد للحُمّى. إسمه المحلّى Curanga.

ه ۳۰۰ هِنْدَبِ Pissenlit bessarabique $(F)^{(4)}$

Taraxacum bessarabicum (S)

نَياتِ مُعمَّر هزيل من فصيلة المُركَّبات، وَبْره متفرِّق النُّمو يبرز خاصة تحت

٣٠٣- هُباب، دُخْنَة، سُخام Noir de fumée (F)

أسود الدُّخان هو مادّة تَحصل من حرق الفُضالات الرّاتنجيّة غير المُستعمَلة، نَلتقطها ونجمعها بواسطة قماش خشن والذي عُرف تركيبه الكيميائي فيما بعد نفلشه فوق الموقد.

> ٣٠٤- هُرْبُون مُقَلْنَس، دَرَقَة مُقَلْنَسَة (١) Skull cap (E) Scutellaire galériculée, Herbe judaïque, Toque (F) Scutellaria galericulata (S)

> نَبات جوانب الحُفر والخنادق المائتة في عِدّة مناطق أوروبّية، من فصيلة الشُّفُويَّات. رائحته ثوميّة خفيفة، طعمه مرّ، تفاعله الكيميائي حامض.

> الهُرْبُون الجَانِبيّ الوَرَق (٢٠) Scutellaria laterifolia 1.

> نبات الولايات المتّحدة الأمريكية وكندا حيث يشتهر فيها كدواء مضمون ضدّ الكَلَب.

777

هند

⁽٣) التَّسمية العربيَّة للمؤلُّف.

⁽٤) التَّسمة الفرنسيَّة للمؤلِّف.

⁽١) التَّسمِيتان العربيَّتان والتَّسمية الفرنسيَّة الأولى

⁽٢) التَّسمة للمؤلِّف.

الرَّؤيس، أوراقه عَمليًّا مَرُّطاء، لَحميَّة إلى أورويًّا. وهو النَّبات الذي يُطلِّق بعض الشَّيء، قليلة التَّفصيص. على قشرته اسم هوانغ نان التي مُجِّدَت فصوصها ضيِّقة الشَّكل المثلَّث. قُنابات القُلافة ضيِّقة، مخطَّطة باللَّون البُنِّي المحمر. أزهاره ذهبيّة اللُّون الأصفر، أرجوانيّة اللُّون الأحمر من الخارج. أكناته رَماديّة اللُّون البُنِّي، شَوكيّة نُحو رأسها. يزهر في الخريف في الأتربة القليلة الملوحة، من ٧٠٠ إلى ٢٥٠٠ متراً.

هِنْدَبِ أَسْمَانِيُّ (١) Pissenlit assemani **(F)**

Taraxacum assemanii (S)

نَبات مُعمَّر من فصيلة المُرَكَّبات موبر في قاعدته فقط. أوراقه ضيّقة الشَّكل السِّنائي البيضاوي، أسنانها حادة؛ فصوصها كبيرة القَدّ. القُنابات القُلافيّة الخارجيّة قاتمة اللُّون البُنّي إلى الأسود، فاتحة الحافة. أزهاره باهتة اللُّون الأصفر. الأكنات باهتة اللَّون الأصفر. يزهر في الصيف، في المواقع الرطبة، خاصة في الأتربة الكلسية، من ٧٠٠ إلى ٣٠٠٠ مترًا.

هُوَانْغ نَان، ستريكْنُوس غُلْطَارِي (٢) Hoang-Nan (F) Strychnos Gaultheriana (S)

نَبات سامّ جدًّا من فَصِيلة اللُّوغانِيَّات، أَدخَلَه المُرْسَلُون عام ١٨٧٧ من تُونُكن

كدواء للكلّب والبَرَص وبعض الأمراض الجلديَّة. وكان يُقال إنَّه لا يُستعمل من تلك القشرة سوى الغُبار المُحَمر اللَّون الذي يُغَطِّيها (وهو أُشْنَة)، وهو مزيج من الشُّبّ ومن رَهْج الغار أي الزَّرنيخ الأحمر Réalgar. القشرة الخارجية تكون مَغْراء اللُّون الأحمر، ونادرًا ما تكون مُسودّة اللُّون الرَّماديّ. مكسرها واضح، يُظهر خَطًّا مُبيَضِّ اللَّون، تَتميَّز به قشرة شَجرة جوز القَي ع Strychnos Nux-Vomica التي تمتلك كافّة مواصفاتها تقريبًا، باستثناء عناصرها المُتَخَشِّبة النَّادرة التي تكون في حُزَمِها اللِّفيَّة النَّجَبيَّة.

المُركِّبات - أَظهر التَّحليل الكيميائي أن الهوانان يَحتوي على قِلُويدات جَوز القَيء ذاتها وبالنِّسب عينها تقريبًا، وهي ٥٪ من الستركنين والبروسين.

الخصائص - مُقوِّية عَصبيَّة وعَضَليَّة، هاضمة، ناعِظة، مُزيلة للألم.

الاستعمال - نُقاهات، كسل المَعِدة، عجز جنسي، رُوماتيزم، آلام الأعصاب.

طريقة الاستعمال - من الدّاخل: مُسحوق بمقدار ٠,٠٥ إلى ٠,٢٠ غرامًا في اليوم، في أقراص من ٠,٠٥ غرامًا للقرص الواحد. مُستخلَص مائي كُحوليّ بمقدار ٢٠,٠٠ إلى ٥,٠٥ غرامًا في اليوم.

⁽١) التَّسمية العربيَّة والفرنسيَّة للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسمتان العربَّتان للمؤلِّف.

خَليط مُشَهِّ: صِبغة هُوانان ٤٤، صبغة جُنْجُل ٦غ، صِبغة نَفَل الماء ٥غ، صبغة الشُّوكة المُبارَكة ٥غ، كُحولتور عُشبة

الشُّفاء ١٠غ؛ يُؤخَذ من هذا المزيج ٣٠ نقطة مع قليل من الماء، قبل الوجبتَين

الرَّنستَّيْنِ.

من الخارج: تُستعمل صبغة الهوانان في مَرُوخ وتَمسيدات مَوضِعيّة. مُستخلص القشرة الكُحولي يكون بُرتقاليّ اللَّون الأصفر، مُرّ الطَّعم جدًّا، يذوب في الماء. مَحلولُه يعطى كافَّة التَّفاعُلات الكيميائية التي تُشير إلى وجود القِلُويدات. من جهةِ أخرى، دكَّت التَّجارب التي أُجريت على الحيوانات أن مستخلص الهوانان يَعمل بالطريقة ذاتها التي يعمل بها البروسين والستريكنين.

٣٠٦- هُوْرا البرازيل، أَسَّاكُو^(١) Bresilian Sandbox (E) Sablier du Brésil, Hure du Brésil (F) Brasilianisch Sandbücksenbaum (D)

Hura brasiliensis (S)

شَجرة من جنس هُورا وفصيلة الفَرْبِيُونِيَّات يُطلِق عليها البرازيليون اسم Assacou «أسّاكُو»، تحتوى بدورها أيضًا على عُصارة كاوية يستخدمها أهل يارا الأصليون، لمعالجة البَرَص، من بين الأمراض الأخرى التي يستخدمونها في

(١) كا التَّسميات للمؤلِّف ما عدا اللَّاتينيَّة.

معالجتها أيضًا.

قشرة الأسّاكُو صلبة، سميكة، مُرمدة اللُّون، عديمة الرّائحة، بالكاد حامزة الطعم، أعطيت، على شكل مستخلص، بمقدار ۰,۰۱ إلى ٠,٠٥ غرامًا، وعلى شكل نقاعة، في معالجة البَرَص. بمقادير مرتفعة تصبح مقيئة ومسهلة قوية.

(أطلب كذلك هورا مُفَرقِعَة في المعجم السّادس ص ٢٤٩ رقم ٣٠١).

٣٠٧- هِيلُونيا هيلونيا صَفْراء، كارُولينا(٢) Hélonias Jaune (F) Helonia dioica, Chamælirium carolinianum (S)

عُشبة مُعمَّرة ذات ريزوم أمْرَط من فصيلة الزَّنْبَقِيَّات تَنبِت في مناقع أميركا الشِّماليّة. أوراقها جَذرية دائمة، مُغَمِّدة، سِنانيّة حادة. أزهارها سُنبليّة التَّجميع الكثيف فوق شِمراخ مُنتصِب يعلو نحو ٣٠ سم. غلاف الزُّهرة دائمًا، مُتورِّد اللُّون. الأسدية ستة، الأقلام ثلاثة. التَّمرة عُلَيبة بَيضانية الشَّكل، ثُلاثيَّة الحُجُرات المتاعدة.

الخصائص والاستعمال - ريزوم الهيلونيا الصَّفراء دَرَني يحتوي على صابونِيْن. وهو يَتمتَّع بخصائص مُبوِّلة وطاردة للدّود، ولكنّه أكثر ما يُستعمل كعقّار مُقوِّ في التَّريَّة أي سَيَلان المَهْبِل،

⁽٢) التَّسميتان العربيَّتان للمؤلِّف.

وفي انقطاع الطُّمْث، وعُسُر الطُّمْث، جزءًا من الأثير. والسَّيلان المَنَوي، وكسل الأعضاء التَّناسُليَّة .

وهو يُستعمل أحيانًا لغش عِرْق الذَّهَب. طريقة الاستعمال - مسحوق الرّيزوم، من ٣ إلى ٦ غرامات، مَرّة أو مَرّتين في اليوم؛ مُستخلَص مائع، من غرام واحد الملح ثابتًا بشكل جيّد عند ١٠٠° سغ إلى ٥ غرامات؛ صبغة كحوليّة، من ٢ إلى ٨ غرامات في اليوم.

> ٣٠٨- هيُوسِيَامِين (سولفات) Hyoscyamine (Sulfate d') (F)

 $(C_{17}H_{23}O_3N)2$, H_2SO_4 $2H_2O=713$.

يَقع سولفات الهيوسيامين في إبر بَيضاء اللُّون دقيقة، مُتَزَهِّرة، تنصهر عند ٢٠٦° سغ (ملح لامائيّ) تذوب في ٠,٥ جزء من الماء عند ١٥° سغ، ٤,٥ أجزاء كحول ٩٠ وتحت الجلد. درجة، وفي ٤٢ جزء كحول صرف، ٢٣٠٠ من الكلوروفورم، وفي ٢٥٠٠

يحتوي على ٨١,١٨ من الهيوسيامين، ١٣,٧٦ حامض سولفوريك، وعلى ٥,٠٦ من ماء التبلّر.

وهو مُياسِر.

في محلول مائي متعادل، يكون هذا (الانتباه إلى استعمال كباية متعادلة تمامًا). طعمه مرّ. يعطى تفاعلات الهيوسيامين المتميزة وتفاعلات السولفاتات.

طريقة استعماله - مقاديره الاعتياديّة عن طريق الفم أو تحت الجلد: ٢٠ الملغ للجرعة الواحدة، بم الملغ لكل ٢٤ ساعة عند البالغ.مقاديره القصوى: أطلب هيوسيامين، عن طريق الفم

سامٌ. - جدول Toxique. - Tableau A

العُليا إهليلجيّة سنانيّة أو بَيضاويّة ون ك مُتطاولة، مُخفَّفة الطَّرفين، كلُّها قصيرة الهُدْب الدّقيق الصلب على الحوافي. سُويقات إبطيّة، تساوى أو تتخطّى الأوراق. فصوص الكأس خَطِّيَّة سِنانيَّة، حادة، قصيرة الهُدب الصَّغير على الحافّة، مَرّتان أقصر من الأنبوب التاجيّ. جرَابيات متوأمة، مُقوّسة، دقيقة التَّخطيط، ملساء. يزهر من آذار إلى نيسان في الأراضي الصَّخريّة والأماكن الحرجبّة.

> الخصائص والاستعمال - ذُكر أنّه من الأنواع المُستعملة في التَّداوي الشَّعبيّ إلى جانب الونكا الكبيرة والصّغيرة وسواهما، خاصة في منطقة أوروبا الشُّرقية.

٣٠٩- وِنْكَا عُشْبِيَّة، عِنَاقِيَة عُشْبِيَّة، قَضَاب مُسَطِّح (١) **Herbaceous** periwinkle (E) Pervenche herbacée (F)

Grasartig sinngrün (D)

Vinca herbacea (S)

نَبات عُشبي مُعمَّر من فصيلة الدِّفْلِيَّات. سوقه كلُّها نائمة أو مُرْتَدَّة على الأرض، غير مُتجذّرة، طولها من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراقه قصيرة الأعناق، السُّفلي بَيضاويّة،

⁽١) التَّسميتان العربيَّتان والتَّسمية الإنكليزيَّة

حتّى الهَذَيان الغاضب العنيف.

ي

ملاحظة - ورد اسم الفصيلة «مَللابِيَات» Malpighiacées في الموسوعة في علوم الطّبيعة، وهو اسم اقترحه إدوار غالب.

(۱۷ - يَاجَه، آيا وَاسْكا، كابِي -۳۱۰ Yagé, Ayahuasca, Caapi (F) Banisteria caapi (S)

اليَاجَة نبات عارش في أحراج أمريكا الجنوبية من فصيلة المَلْبِغِيَّات (٢)، وهي فصيلة أجناسها ٥٠ وأنواعها ٢٠٠ معظمها من نباتات المناطق الاستوائية الأمريكية. جميعها أشجار وشجيرات وجَنْبات. أوراقها متقابلة معنَّقة بسيطة أو مركَّبة. أزهارها خماسية البتلات، عنقودية التَّجميع، صفراء اللَّون أو بيضاء أو حمراء. ثمارها عُلَيبات عديدة البزور.

جنس نباتات مُعايِشَة مُلازِمَة، غير طُفيليّة، من فصيلة السَّحُلبِيّات، ذات دُرينات كاذبة مزدوجة الأوراق. أوراقها واسعة، متموِّجة، عناقيدها الزَّهريّة مُتدلِّية، شحيحة الزهر. زهرتها كبيرة تعتبر واحدة من أغرب أنواع السَّحُلبيّات بشكلها. تزرع في سِلال مُعَلِّقة، في سماد من طُحُلُب المناقع والخنشار. أما اليوهيمُب المُعايِش فشَجرة تنبت في الغابون، وأواسط الكونغو، والكامرون الغابون، وأواسط الكونغو، والكامرون حيث يطلق عليها اسم Yumbehoa أو بالسِّنديان، طبيّة سامّة يندرج قلويدها في الجدول A، أدخِلت قشرتها عام ١٨٩٦ إلى الخزانة الطبيّة الأوروبيّة.

المُركِّبات - إستُخرِج من الياجَة قِلَويد بِلَّوري يُدعى ياجايين أو تَلاپاتِيْن، يماثل الحَرْمِيْن الموجود في الحَرْمَل أي غَلْقَة الذَّئب.

الخصائص والاستعمال - يُحضِّر أهل البلاد الأصليّون من الياجَة مشروبات تحدث اضطرابات مَرثيّة ملوَّنة، ومن ثمّ لا تناسقًا مُحرِّكًا، وتَهيُّجًا عنيفًا قد يصل

المُركِّبات - في القشرة ٤ قلويدات على

(١) التَّسميات العربيَّة للمؤلَّف. (٢) التَّسمية العربيَّة للمؤلِّف.

التَّسِمة العربيّة للمؤلّف. (٣) التَّسِمتان العربيّان للمؤلّف.

الأقل، أهمّها اليُوهِمْبِيْن. إستخرج كارَّر من ماء تبلير اليوهمبين قلويدًا دعاه كُورِينَتْنَايِيْن، وهو مزيج من ٣ قلويدات فصلها العلماء إلى كُورِيْنَتْثِيدِيْن أي أَلْفا يوهمِبين، كُورِيْنَنْشايين، كُوري - نَشاييدين؛ القلويدان الأخيران لهما نواة أساسية مختلفة عن نواة اليوهميين.

الاستعمال - أهل البلاد الأصليون يستعملون نقيع القشرة كطارد للنوم يستعملون كناعظ. Somnifuge وبنوع خاص كناعظ. القشرة فعّالة ضدّ الاضطرابات الحيضيّة. وهي ليست سامّة. تُستعمل في صبغة بمقدار ١ إلى ٣غ في جَرُوع، أو خليط؛ في مستخلص مائع، بمقدار أو خليط؛ في مستخلص مائع، بمقدار ٥٠٣٠غ إلى غرامًا واحد؛ مستخلص

مائي كحولي من ١٠,١٠ إلى ٢٠,١٠ غرام. وهي مستحضرات تؤخذ في العجز الجنسيّ والبرود الجنسيّ، وشحّ الطَّمث وعسره، وارتفاع التَّوتُّر الشِّريانيّ، مرض Raynaud، شَرَث، خَصَر، إمساك مزمن. ملاحظة - إن النَّوع يُوهِمْب تريلًازِي (١) Pausinystalia Trillesii من فصيلة الفُوِّيَّات الذي ينبت في الكونغو حيث

يُطلِق عليه الزّنوج اسم Endun، هو نوع يختلف قليلًا عن اليوهمب المُعايش؛ تحتوي قشرته على قلويد يعتقد بعض الكيميائيين أنّه مماثل لليوهِمْبين.

ی و ه

مَلاحِق/ Appendices مَلاحِق

**V	الفصائل النَّباتيَّة	-	١
	عربيّ – فرنسيّ – لاتينيّ – إنجليزيّ		
۲۸۰	المُركِّبات الكيميائيَّة في النَّباتات	-	۲
	فرنسيّ- عربيّ		
۳٠٤	الوَصْفات الطِّبِّيَّة	-	٣
	فرنسيّ - إنجليزيّ - عربيّ		

١ - الفَصائِلُ النَّباتيَّة

عَرَبِيّ - فَرَنْسيّ - لاتِينيّ - إنجُليزيّ

Araliacées (F) Araliaceæ (SE)	أرَالِيًّات
Ulmacées (F) Ulmaceæ (SE)	أَنْجُرِيَّات
Combrétacées (F) Combretaceæ (SE)	إِهْلِيْلُجِيَّات
Solanacées (F) Solanaceæ (SE)	باذِنْجانِيًّات
Sterculiacées (F) Sterculiaceæ (SE)	بِرازِیَّات
Bérbéridacées (F) Berberidaceæ (SE)	؞ ؠؘڒؠؘڕيسِيَّات
Polygonacées (F) Polygonaceæ (SE)	بَطْباًطِيًّات
Anacardiacées (F) Anacardiaceæ (SE)	بُطْمِيًّات
Balsaminacées (F) Balsaminaceæ (SE)	بَلْسَمِيْنِيَّات
Typhacées (F) Typhaceæ (SE)	<u>بُ</u> وْطِيَّات
Moracées (F) Moraceæ (SE)	تُوْتِيًّا ت
Borraginacées (F) Borraginaceæ (SE)	حِمْحِمِيًّات
Plantaginacées (F) Plantaginaceæ (SE)	حَمَلِيًّات
Renonculacées (F) Ranunculaceæ (SE)	حَوْدَانِيًّات
Malvacées (F) Malvaceæ (SE)	خُبَّازِیَّات
Artocarpées (F) Artocarpæ (E)	خُبْزِيًّات
Papavéracées (F) Papaveraceæ (SE)	خَشْخاشِيًّات
Ericacées (F) Ericacæ (E)	خَلَنْجِيًّات
Caprifoliacées (F) Caprifoliaceæ (SE)	خَمانِيًّات
Scrofulariacées (F) Scrofulariaceæ (SE)	خَنازِيْرِيًّات
Ombellifères (F) Umbelliferæ (SE)	خَيْمِيَّا َت
Dipsacées (F) Dipsaceæ (SE)	دِبْساسِیَّات

YVV

Apocynacées (F) Apocynaceæ (SE)	دِفْلِيًّات	
Plombaginacées (F) Plombaginaceæ (SE)	َ ۔ رَصاصِبًات	
Aristolochiacées (F) Aristolochiaceæ (SE)	زَراوَنْدِيَّات زَراوَنْدِيَّات	
Liliacées (F) Liliaceæ (SE)	زَنْيَقِيًّات زَنْيَقِيًّات	
Zingibéracées (F) Zingiberaceæ (SE)	ر زَنْجَبِيْلِيًّات	
	رد. بربیو زَیْتُونِیَّات	
Oléacées (F) Oleaceæ (SE)	ڔيتوپيات زَيْزَفُوْنِيَّات	
Tiliacées (F) Tiliaceæ (SE)	رير نوبيات سابَنْدِيّات	
Sapindacées (F) Sapindaceæ (SE)	سنېديات سېپجاليًات، هي لُوْغانِيًّات	
Loganiacées (F) Loganiaceæ (SE)		
Orchidacées (F) Orchidaceæ (SE)	<u>سَحْلَبِيَّات</u> 	
Atriplicées (F) Atripliceæ (SE)	سَرْمَقِيًّات	
Cupressinées (F)	سَرْوِیَّات: سبط صَنَوْبَرِیَّات سُعْدِیَّات	
Cypéracées (F) Cyperaceæ (SE)	سُغْدِیّات	
Cupulifères (F)	سِنْدِيانِيَّات، هي البَلُوْطِيَّات	
Colchicacées (F) Colchicaceæ (SE)	سُوْرَنْجانِيَّات	
Césalpinacées (F) Cesalpineæ (SE)	سِيْزالْبِيْنِيَّات	
Fumariacées (F) Fumariaceæ (SE)	شاهَتْرَجِيَّات	
Labiées (F) Labiatæ (SE)	شَفَوِيًّات	
Renonculacées, Anemonées (F)	شُقَّارِيَّات: سبط شَقِيْقِيَّات	
Cactacées (F) Cactaceæ (SE)	صَبّارِيَّات	
Asclépiadacées (F) Asclepiadaceæ (SE)	صُفْلابِيًّات	
Crucifères (F) Cruciferæ (SE)	صَلِيْبِيًّات	
Ulmacées (F) Ulmaceæ (SE)	صَلِيْبِيَّات غارْغاجِيَّات ِ: هي الأَنْجُرِيَّات	
Hyménoptéroïdes (F)	غِشائِيَّات الأَجْنِحَة	
Euphorbiacées (F) Euphorbiaceæ (SE)	فَرْبِيُوٰنِيَّات	
Pipéracées (F) Piperacæ (SE)	قِلْفِٰلِيًّات	
Urticacées (F) Urticaceæ (SE)	قُرَّاصِيًّات	
Cucurbitacées (F) Cucurbitaceæ (SE)	قَرْعِيَّات	
Cornacées (F) Cornaceæ (SE)	قُرْنُوْسِيَّات	777
	- / •	

Légumineuses (F) Leguminosæ (SE)	قَرْنِيًّات
Anonacées (F) Anonaceæ (SE)	 قِشْطِيًّات
Légumineuses (F) Leguminosæ (SE)	قَطانِيًّات، هي القَرْنِيَّات
Aracées (F) Araceæ (SE)	فُ لْقاسِيًّات
Ménispermacées (F) Menispermaceæ (SE)	قَمَرِيَّات
Erythroxylacées (F) Erythroxylaceæ (SE)	كُوْكِيًّات
Cistacées (F) Cistaceæ (SE)	لاذَنِيَّات
Loganiacées (F) Loganiaceæ (SE)	لُوْغانِيًّات
Thyméléacées (F) Thymeleaceæ (SE)	مازَرْيُونِيَّات
Crassulacées (F) Crassulaceæ (SE)	مُخَلَّدات
Composées (F) Compositæ (SE)	مُرَكَّبات
Orthoptères (F) Orthoptera (SE)	مُسْتَقِيْماتُ الأَجْنِحَة
Magnoliacées (F) Magnoliaceæ (SE)	مَغْنُوْلِيَّات
Malpighiacées (F)	مَلابِيًّات ^(۱)
Malpighiacées (F) Malpighiaceæ (SE)	مَلْبِيْغِيًّات (٢)
Musacées (F) Musaceæ (SE)	مَوْزِيَّات
Rhamnacées (F) Rhamnaceæ (SE)	نَبْقِيًّات
Graminées (F) Graminaceæ (SE)	نَجِيْلِيَّات
Palmacées (F) Palmaceæ (SE)	نَخُلِيًّات
Flacourtiacées (F) Flacourtiaceæ (SE)	نُعْضِيَّات
Rosacées (F) Rosaceæ (SE)	وَر ْدِيًّات

⁽١) التَّسمية لإدوار غالب. (٢) التَّسمية للمُؤلِّف.

٢- المُركِّباتُ الكيميائيَّة في النَّبَاتات

فرنسيّ - عربيّ

1- Acaroïde, Acroïde

- أكارُويد، أَكْرُوْيد

نَعْت تَعريفي يُطلَق على راتنج يَتمّ الحصول عليه من نَبات من الغال الجَنوبيَّة الجديدة، اسمه العِلميّ Xanthorrhaea arborea. يَقع في قطع بُنِّيّة اللَّون الأحمر، تُستخدَم في صُنع شَمع الأختام ومِلاط غُولاز.

- أسارِيْن -

اسم يُطلق على غلوبُولين يُستخرَج من زَيت أخضر اللَّون يُحضَّر من بزور القَيْقَبِ السُّكَّريِّ Acer saccharinum، أو القَيْقَبِ الأبيض.

3- Acer saccharinum (Sirop)

- قَيْقَب أَبْيَض (شراب الـ)

سائل مزيج يُستخرج من النّسغ السُّكَّريّ في القَيْقَب الأبيض، وهو يحتوي على ٣ إلى ٥ بالمئة من السَّكَاروز.

4- Acétylvanillone

- أَسَتِيل قَانِيلُون

جسم كيميائيّ تركيبُه C9H10O3 يُستخرَج من جُذور الخَوْشان القُنَّبِيّ C9H10O3 يُستخرَج من جُذور الخَوْشان القُنَّبِيّ cannabinum ، مُرادفُه: أَيُوسِينين.

– أَكُوشي – أَكُوشي

راتِنْج سائل يَتمّ الحُصول عليه من حزوز تَجري في لحاء لُبايَة تُدعى Protium . وهو تَجميليّ، ويُستعمَل في مُعالَجة القروح.

- أَكْرِيفُولِين – أَكْرِيفُولِين – أَكْرِيفُولِين

قلوید ترکیبُه الکیمیائیّ $C_{16}H_{23}O_2N$ یُعزَل من الخُدْرِیَّة أو رِجْل الذِّئب Lycopodium acrifolium

- أَدْهَا تُودِيّ - أَدْهَا تُودِيّ - أَدْهَا تُودِيّ

نَعْت تَعريفيّ يُطلَق على حامض مُختلِط مع قلويد يُدعى Vasicine، ويوجد في أوراق الأَدْهاتُودَة Adhatoda vasica الهنديَّة.

8- Adlumidine – أَذْلُمِيدِيْن –

قلويد مُتبلِّر تركيبه الكيميائيّ $C_{19}H_{15}O_6N$ ، يُستخرَج من الأقسام الهَوائيّة للأَدْلَم الشَّمعيّ (١) . Adlumia cirrhosa

- أَذْلُمِيْن - أَذْلُمِيْن - أَذْلُمِيْن

قلويد يُستخرَج من الأَدْلَم الشَّمعيّ (١)، النَّوع الوَحيد المعروف من هذا الجنس. تركيبه الكيميائي C₂₁H₂₁O₆N. مرادف الاسم العلميّ أعلاه هو Adlumia fungosa.

10- Aegicérine – آجِيسارِيْن

اسم تَعريفيّ يُطلَق على صابونين غير مُحدَّد، تركيبه الكيميائيّ هو $C_{22}H_{30}O_4(OH)_6$. Aegiceras majus (١)، يُستخرَج من الآءَة الكبيرة

11- Ageratum (ess.) – غَوْلَان (دُهن الـ)

اسم يُطلَق على عِدَّة زيوت دُهنيَّة تحصل من تقطير الغَوْلان الطِّباقيِّ Ageratum . conyzoides

- أَغُونِيادِيْن – أَغُونِيادِيْن

غلوكوسيد يحتوي على مجموعة مِيتُوكْسي، تركيبه $C_{30}H_{40}O_{18}$ ، يُستخرَج من البلُومارية السِّنانِيَّة $\binom{(1)}{2}$: Plumeria lancifolia .

13- Ail (ess.) – ثُوْم (دُهن)

زيت دُهنيّ يُستخرَج من فصوص الثوم Allium sativum، وهو برائحة الثّوم المُميَّزة. يَتألَّف هذا الزَّيت من مزيج من سُولفور الألَّيْل ومن سُولْفُورات $C_{10}H_{10}S_2$.

- ثُوم (صبغة) – ثُوم (صبغة)

صبغة النَّوم هي سائل عَنبريّ اللَّون الأصفر، له رائحة الثوم، يتمّ الحصول عليه من مَرْث دُرَينات النَّوم في كحول بنسبة ٦٪، لمُدَّة عشرة أيّام.

(١) التَّسمية للمُؤلِّف.

زيت دُهنيّ يُستخرَج من ثوم الدُّبّ Allium ursinum، وهو سائل قاتم اللَّون البُنِّيّ وله رائحة الثُّوم. يحتوي على سُولفور الڤِينيل بنوع خاصّ.

- أَجَاسِين – أَجَاسِين – أَجَاسِين

اسم يُطلَق على مادَّة تركيبها الكيميائيّ $C_{34}H_{46}O_9N_2.2H_2O$ تُستخرَج من عائق الحدائق Delphinium ajacis .

- أَجَاكُونين – أَجَاكُونين

قلويد يُستخرَج من بزور عاثق الحدائق، تركيبه الكيميائيّ C₁₇H₂₉O₂N.

الاجتاب 18- Alcaloïde – قِلَوِيْد

اسم جِنْسيّ يُطلَق على بَعض الموادّ العُضويَّة المُنتُرَجَة التي تُعْزَل من نباتات عديدة، وتَتحلّى بخصائص قاعِدِيَّة، وهي ذات نَشاط فيزيولوجيّ شديد، وتُعطي تَفاعُلاتٍ مُشتَرَكة مع بعض الكواشِف المُسمَّاة «كواشِف القِلويدات». تركيب القِلويدات يكون مُعقَّدًا جدًّا بشكل عامّ، ولم يَتِمّ الاصطناع إلّا للبعض منها.

- فِصَّة، بِرْسِيم (صابُونين الـ) – فِصَّة، بِرْسِيم (صابُونين الـ)

صابُونين يستخرَج من الفِصَّة Medicago sativa. تركيبه الكيميائيّ C₂₇H₃₇O₁₆N. وهو وَسيط بين الصابُونينات الحَقيقيَّة وبين القِلَويدات.

20- Alkermès - قِرْمِزِيَّة

اسم يُطلَق على دَواء عَسَليّ يُحضَّر من القِرْمِز الحَيوانيّ، كان يُستعمَل في الماضي كدواء نافع للمعدة. كذلك يُطلق على شراب رُوحيّ Liqueur أساسُه قرفة سيلان، الإيْكَر، حَبُّ المِسْك، كبش القرنفل، قشر جوز الطِّيب، ماء الورد، مُستخلَص الياسَمين ونُقاعة السَّوْسَن. مُرادِفه: قِرْمِز مَخْزَنيّ Kermès officinal.

- بَارُوسْمَة أَنيقة (١) (دُهن) (دُهن) - بَارُوسْمَة أَنيقة (١) (دُهن)

زيت دُهنيّ يُستخرج من أوراق البارُوسْمَة الأنيقة (١)، ويحتوي على د - سيترونيلّال، مَتيل هَپْتانُون، د - مَنْتُون، د - سيترنيلُول، وعلى حامِض سِيترونَلْيك.

زيت دُهنيّ في أوراق الباروسمة الجميلة المُجفَّفة. يحتوي على أشتراغول، مِيرسان، أستات الميرسانيل، شاڤيكول.

- بَان، يُسْر (زيت) Ben, Béhen (huile)

سائل عديم اللَّون يُستخرَج من اليُسر العَربيّ (١) Moringa arabica. يحتوي على فيتوسْتارُول، غليسَّريدات زَيتيَّة ونَخليَّة وشَمْعيَّة وبانِيَّة. أمَّا صَمْغ البان فهو صمغ مُتقارِب من الكُثيراء ويَتمَّ الحصول عليه من البان المُسمَّى Moringa pterygosperma.

- تَامُول، تَنْبُل (دُهن) - تَامُول، تَنْبُل (دُهن)

زيت دُهنيّ برائحة الكريوزوت والشّاي، يُستخرج من أوراق التّامُول Piper زيت دُهنيّ برائحة الكريوزوت والشّاي، يُستخرج من أوراق التّامُول، أليّل betel يحتوي على شاڤيباتُول، شاڤيكول، كادينان، مَتيل - أوجينول، أليّل پيروكاتيشول، كاريوفيلان.

- بِيقُوسِيْن - Sicucine - بِيقُوسِيْن

. Corydalis aurea (١١) يُعزَل من القُبَّريَّة الذَّهبيَّة ($C_{20}H_{19}NO_7$ يُعزَل من القُبَّريَّة الذَّهبيَّة

- بِيكُوكُولِّين – Sicuculline

Dicentra : أَنُسِيَّةُ الْبُرْنُسِيَّةُ $C_{20}H_{17}O_6N$ مَادِّةً البُرْنُسِيَّةً $C_{20}H_{17}O_6N$ مادّة كيميائيَّة وركيبُها . cucullaria

- بَتُولا ، بَتُولَة ، سَنْدَر - بَتُولا ، بَتُولَة ، سَنْدَر

- خَشَب الد: خَشَب يَشْتَعِل بَتَوهَّج يُستعمَل لصنع أعواد الثَّقاب. - قشرة الد: قشرة دابغة تُستعمَل في تَصنيع الجلد المُسمّى الجِلْد الرُّوسيّ. - دُهن بَراعم الد: سائل أصفر اللَّون يُستخرَج من البَّتُولا البَيضاء Betula alba. يحتوي على باتُولُول بنوع خاصّ. - دُهن قشرة الد: هو دُهن البَّتُولا. - عُصَارة الد: هو نسخ البَّتُولا، يُستعمل لصنع مَشروبات رُوحيّة كُحوليَّة، أو لاستخراج السُّكَروز منه.

- تَزْبِيل^(۱)، تَرْوِيث (۱)

التَّرْبيل عَمليَّة تَرتكز على بَلِّ قماشَة مُخَضَّبة (مَصبوغة) في حَمَّام من الزِّبْل بهدف تَثبيت المادَّة الكيميائيَّة، المُستعمَلة في تثبيت اللَّون أو الصِّبغة، بشكل أَصْلَب وأَمتن.

(١) التَّسمية للمُؤلِّف.

– زِبْل، رَوْث –

هو براز الحيوانات المُجتَرَّة. يُستعمَل في مَنْعِ المُرَسِّخات اللَّونِيَّة من الذَّوَبان.

- مُكَوْفَر - مُكَوْفَر - مُكَوْفَر - مُكَوْفَر

نَعت تَعريفيّ يُطلَق على كلّ ما يَتحلّى بخصائص الكافور، أو كلّ ما يحتوي منه. كحول مُكَوفَر. زيت مُكَوفَر. الماء المُكَوفَر هو الماء الذي يحتوي على حوالي واحد بالألف من الكافور.

- گَنَدِیْن – گَنَدِیْن

اسم يُطلَق على مادَّة كيميائيَّة تَركيبُها C₂₀H₂₁O₄N، تُستخرَج من نبات القُبَّرِيَّة البَحوفاء أو الدَّرنِيَّة Corydalis tuberosa ومن نبات هِدْرَسْتِس كَنَدا^(۱) - Hydrastis . canadensis

- گنالِين – گنالِين –

اسم يُطلَق على مادَّة كيميائيَّة تَركيبُها $C_4H_{10}O_3N_2$ ، تُستخرَج من نبات القُنْفُول السَّيْفي Canavalia ensiformis .

- گرَميلَّة – گرَميلَّة

اسم يُطلَق على مادَّة بُنيَّة اللَّون، مُميَّزة الرّائحة، غير قابلة للتَّخَمُّر، يَتمّ الحصول عليها بتسخين السُّكَّروز عند ١٩٠ درجة تقريبًا. الكَرَميلَّة تَحتوي خاصَّة على كَرَميلان عليها بتسخين السُّكَّروز عند ١٩٠ درجة تقريبًا. الكَرَميلَة تَحتوي خاصَّة على كَرَميلان (C₂₄H₂₆O₁₃ (line) كَرَميلَن (C₃₆H₄₈O₂₄ (lène)، كَرَميلَن (c₁₂H₁₈O₉ (lane) من هذه المادَّة.

- كَرَبَّة (زيت الم) 34- Carapa (huile)

– كَرَيِّن – كَرَيِّن – كَرَيِّن

اسم يُطلَق على راتنج أصفر اللَّون، يُستخرَج من الكَرَبَّة المُنتصِبة، تركيبه الكيميائي C10H28O4.

- هال صَغير (دُهن) – هال صَغير (دُهن) – هال صَغير (دُهن)

زيت دُهنيّ يُستخرج من بزور الحَبْهان أي الهال الصَّغير Elettaria زيت دُهنيّ التي تحتوي منه على ٣,٥ إلى ٤,٥ بالمئة. ويَتألَّف الزَّيت من سِينايُول، تَرپينان، لِيمُونان، تَرْبِينايُول، دِيبَنْتان.

- كَرْدُول – كَرْدُول

مادَّة كيميائيَّة تَركيبُها C₁₅H₂₇,C₆H₃(OH)، تُستخرَج من لَبَن (حِلْباب) الأكاجُو أي البَلاذُر الغَربيّ Anacardium occidentale، وهو زيت مُنَفِّط ومُصفَرّ اللَّون.

- گَرْلِيْن نَجْميّ (۱) (دهن) - گَرْلِيْن نَجْميّ (۱) دهن)

زَيت دُهنيّ يُستخرَج من جذور الكَرْلين النَّجميّ Carlina acaulis، يحتوي على أوكسيد الكَرْلين، كَرْلينان، حامض نَخليّ. أوكسيد الكَرْلِيْن: مادَّة تركيبُها الكيميائيّ أوكسيد الكَرْلِيْن: مادَّة تركيبُها الكيميائيّ (Cirsium acaulis (۲)، تُستخرَج من زيت جذور القُصْوان النَّجْميّ (۲)،

39- Carmédicine – گَرْمَدِيسِيْن

اسم يُطلَق على جَوهر يُستخرَج من القُرْطُم الصُّوفي Carthamus lanatus وهو على الأرْجَح مُماثِل الكُنيسِين أو السَّنتُورين الموجود في نبات الشَّوكَة المُباركة: Cnicus benedictus.

40- Carnauba (cire de) – نَقُوس (شَمْع الـ)

كُتلة مُخضَرَّة اللَّون الأصفر يَتم الحصول عليها من نَخْلَة نَقُوس الشَّمع^(۲) . Copernica cerifera . مادَّة أُوَّلِيَّة تُستخدَم لصناعة مَراهِم الأَّخْذِيَة .

- گَرْبایِیْن – گَرْبایِیْن

قِلُوید یُستخرَج من البَباظ الزِّراعيّ Carica papaya، ترکیبُه الکیمیائيّ $C_{14}H_{25}O_2N$. وهو دَواء مُقوِّ للقَلْب.

⁽١) التَّسمية لإدوار غالب.

⁽٢) التَّسمية للمُؤلِّف.

زيت يُستخرَج من بزور القَرْطَم الصِّباغيِّ Carthamus tinctorius. يحتوي على الحوامض التّالية: مِيرِسْتيك، پُلْمِتيك، ستياريك، أراشيديك، لينوساريك، أولاييك، لينولانيك. لينولانيك.

- كَراوِيا (دهن) – كَراوِيا (دهن)

زیت دُهنی یُستخرَج من بزور الکَراویا Carum carvi. یحتوی علی کَرْڤان، دیهیدروکَرْڤون، دیهیدروکَرْڤایول، د – لیمونان، وعلی ۵۰ إلی ۲۰ بالمئة من الکَرْڤُون.

- كَرِيُوفِيلِّين – كَرِيُوفِيلِّين – كَرِيُوفِيلِّين

اسم يُطلَق على جوهر مُرّ، تَركيبُه الكيميائيّ 3، C₃₀H₄₈O، برائحة المَنْثور السَّنويّ (Quarantaine ، يُستخرَج من كبش القرنفل.

- كروتُن عَنْبَرِيّ (دُهن) - كروتُن عَنْبَرِيّ (دُهن)

زَيت دُهنيّ يُستخرَج من قُشور الكروتُن العَنْبَريّ Croton eluteria. يحتوي على أوجينول، سيمان، وانيلال، حامض عَنْبريّ.

- دَفْنُوسيد، دَفْنِين - كَفْنُوسيد، دَفْنِين

اسم يُطلَق على هَكْزُوسِيد يُستخرج من الكَرْدَمانَة Garou، تركيبُه الكيميائيّ (C₁₅H₁₆O₉)، يَتْأَلَّف من غلوكُوسيد - ٧ هيدروكُسي - ٨ كُومارِين، يَنْشَطِر بالتَّحليل المائيّ إلى غلوكُوز وإلى دَفْناتِين.

- دَرْمُوس – دَرْمُوس – دَرْمُوس

اسم يُطلَق في المَغرِب على تَسَمَّم تُسبَّبه الأطعِمة الغَنِيَّة بالفلوور. مُرادِفه Fluorose

- دَرْوِيْنِيَة خُزمِيَّة (دهن) (دهن) - دَرْوِيْنِيَة خُزمِيَّة اللهِ (عنيَة اللهِ عنه اللهُ عنه اللهِ عنه عنه اللهُ عنه اللهِ عنه عنه عنه عنه عنه اللهِ عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه

اسم يُطلَق على زيت دُهنيّ يُستخرج من الدَّرْوينية المذكورة، يحتوي على أستات الجيرانيل، جيرانيول، حامض أستيك.

- دَرْوِينِيَّة طُقْسُوسِيَّة الوَرَق^(۱) (دهن) 49- Darwinia taxifolia (ess.)

اسم زيت دُهنتي يُستخرج من هذا النَّبات. يحتوي على ل - بينان، لينالول.

- داتِسينُوسيد – داتِسينُوسيد

اسم غلوكوسيد تَركيبُه C₂₁H₂₄O₁₁.2H₂O يُستخرَج من وَرَق دَاتِيسْكَة قُنّابِيَّة Datisca cannabina ويُمكِن انشطاره إلى رامْنُوز وإلى داتِساتِين أو داتِسِين.

51- Décantation – تَصْفِيق –

اسم يُطلَق على عَمليَّة سريعة لإجراء تَحليل فَوريِّ يَسمح بفَصْل سائلين غير قابِلَين للمزج، أو لفَصْل مادَّة صُلبة عن سائل ما Décantage.

52- Delphinoïdine – دَلْفِينُويدِيْن

اسم يُطلَق على قِلويد تركيبُه الكيميائيّ C₂₅H₄₂O₄N يُستخرَج من بزور العائق الجَبَليّ Delphinium staphysagria .

- دَلْتَالِيْن – دَلْتَالِيْن – دَلْتَالِيْن

اسم قِلَوید تَرکیبُه الکیمیائیّ $C_{21}H_{33}NO$ یُستخرَج من العائق الغَرْبیّ (۱) . Delphinium occidental

- دَوْرَم^(۲)، أَشْق (دُهن) - دَوْرَم^(۲)، أَشْق (دُهن)

اسم يُطلَق على زيت دُهنيّ يُستخرَج من حُلْباب دَوْرَم الأمُونياك (١٠ من عُلْباب مَوْرَم الأمُونياك. ammoniacum ، سائل أصفر اللَّون، رائحته خاصَّة. مُرادِفه دُهن صمغ الأمُونياك.

55- Echine – أُخْبِيْن –

قِلَويد يُستخرج من الأُخْيُون المَعروف أي حشيشة الأَفْعَى Echium vulgare.

- أُخِيتامِين – أُخِيتامِين

قِلَوید یُستخرَج من قشور الألْستُونِیَة Alstonia scholaris، تَركیبُه الكیمیائيّ $C_{22}H_{28}O_4N_2$

57- Echitamidine – أُخِيتَامِيديْن

مادَّة كيميائيَّة تُستخرَج من قشور الألْستُونِيَة الجَميلة (١) Alstonia spectabilis تَركسُها ٢٠٠٥- C₂₀H₂₆O₃N₂.

⁽١) التَّسمية للمُؤلِّف.

⁽٢) التَّسمية لإدوار غالب.

58- Echitéine – أُخِيتَايِيْن –

اسم يُطلَق على إِبَر أو بِلَّور يُستخرَج من قشور الأَلْستُونِية Alstonia scholaris، تَركيبُها الكيميائيّ C42H70O2.

59- Echiténine – أَخِيتَانِيْن –

إسم يُطلَق على قِلَويد تَركيبُه الكيميائيّ C₂₀H₂₇O₄N، يُستخرج من قشور الأنْستُونِيّة Alstonia scholaris.

60- Éléococca (huile d') – أَنْيُوكُوكًا (زيت)

زيت الأليوكوكا يُستخرَج من بزور الأرْطَس القَلْبِيّ (١٠) Aleurites cordata، وهو زيت يُستخدَم كمادَّة حالَّة في صِناعة الوَرنيش. مُرادِفه: زيت الصِّين، خَشَب الزَّيت.

- لُبّ، دَقِيْق – لُبّ، دَقِيْق

اسم جِنسيّ عامّ يُطلَق على مَوادّ مُؤلَّفة من حُبوب نشاء يَتمّ الحصول عليها من الجذور والرِّيزومات أو من دَرَنات نَباتات مُختلِفة، مِثال دقيق الموز أو دقيق البطاطا.

62- Ficaria (ess.) – فِيكاريا (دُهن)

زيت دُهنيّ يُستخرَج من عُشبة البَواسير Ficaria ranunculoides، وهو سائل قاتم اللَّون البُنِّيّ برائحة التَّبغ. يحتوي على حامض پَلْمِتيك وفِيكاريك.

63- Franguloside – جَلْهُم (غلوكوسيد)

غلوڭوسىد يُوجَد في قُشور الجَلْهَم Rhamnus frangula، وفي قشور نَبْق پُورشيانا دَمْنُوز Rhamnus frangula، تركيبُه الكيميائي $C_{21}H_{20}O_9 + 1H_2O$ ، يَتَحلَّل مائيًّا إلى رَمْنُوز وإلى فرانْغُولا – أمُودِين.

- فَوْقَسِيْن – فَوْقَسِيْن

قِلَويد تركيبُه الكيميائي C15H12O3N2، يُستخرَج من أنواع الفَوْقَس Varechs.

- غالِينُوسيّ – غالِينُوسيّ

نَعت تَعريفيّ يُطلَق على أَدْوية تُستخرَج من النَّباتات. أو يُقال عن طريقة غالِينُوس في تحضير الأدوية. أو يُطلَق على قسم من الأبحاث الصَّيدلانيَّة التي تَتعلَّق بتحضير الأدوية وطريقة عَرْضِها.

66- Galipine, Galipidine

اسم يُطلَق على قِلَويد يُستخرَج من قشور قُسْبَارِيَّة الحُمَّى Cusparia febrifuga، تركيبُه الكيميائق C₂₁H₂₁O₃N.

- غاليبُول – غاليبُول

اسم يُطلَق على سائل ذَكيّ الرّائحة، تركيبُه الكيميائيّ C₁₅H₂₆O، يُستخرَج من دُهن الثّخُوط المَخْزَنيّ Angusture.

- عَفْصَة ، جَوْزَة العَفْص - عَفْصَة ، جَوْزَة العَفْص

اسم يَدُلِّ على نتوءات وزَوائد مَرَضِيَّة، دابِغَة، على أوراق السَّنْدِيان عامَّة أو فروعه الفَتِيَّة، يُسبِّها وَخْزُ حشرة من فصيلة الآبِرات Cynips quercus folii (آبِرَة الأوراق)؛ تُستعمَل كمادَّة أوَّلِيَّة لصنع الأغفاص وأنواع الحبر على اختلافها. إنّ عَفْصَة حَلَب، البَصْرَة، الصِّين، اليابان، هَنغاريا، كنوپَرْن، إلخ، هي نتوءات تبرز على أشجار مُختلِفة وتكون غَنيَّة نسبيًّا بالعَفْص.

69- Gardenia – غَرْدِينِيَة

اسم يُطلَق على عِطرِ اصطناعيّ أساسُه التَّرْبِينايُول. دُهْن الـ هو زيت دُهنيّ سائل، باهت اللَّون الأصفر، يتمّ الحصول عليه من حِلْباب الغردينية الصَّمْغِيَّة (١) Gardenia lucida ومن حِلْباب الغَرْدِينيَة اللَّامِعَة (١) Gardenia gummifera. يحتوي هذا الزَّيت على لِينالُول، تَرْبِينايُول، أستات الستيرُولِيل، أَثْرَانِيلات المَتيل. زَيتُ الـ - زيت يُستخرَج من بزور الغَرْدينية الصَّمغِيَّة والغَرْدينية اللَّامِعة. يحتوي على حوامض: ستياريك، يَلْميتيك، أولاييك، دِيهيدروكُسي ستياريك.

- غلُوسِين - علُوسِين - علُوسِين

اسم قِلويد المامِيثا الصَّفراء أو الخَشْخاش المُقَرَّن Glaucium flavum، يحتوي على أثير البُولْدين الدِّيماتيليِّ، تركيبُه الكيميائيِّ C₂₁H₂₅O₄N.

- جانِين العَشْقَة - T1- Hédéragénine

اسم يُطلَق على تريْتَرْپان تركيبُه الكيميائيّ ،C₃₀H₄₈O، يُعزَل من نبات العَشْقَة المبذولة Hedera helix ومن الرِّيْتَة أي شَجَر الصّابُون Sapindus أي Hedera helix .

(١) التَّسمية للمُؤلِّف.

- غلوكوسيد العَشْقَة

72- Hédéraglucoside

اسم يُطلَق على غلوكوسيد يُستخرَج من العَشْقَة المبذولة، تركيبه الكيميائيّ . C₃₂H₅₄O₁₁

73- Hedyotine – هَذْيُوتِيْن

قِلَوید یُستخرَج من جذور هَدْیُوتِیس سَرَنْدِیب Hedyotis auricularia، ترکیبُه الکیمیائی C16H22O3N2.

74- Hélianthique – هَلْيَانْتِيّ –

نَعْت تَعريفيّ يُطلَق على حامض تَركيبُه الكيميائيّ ،C₁₄H₉O₈ يُستخرَج من بزور دَوَّارِ الشَّمسِ Helianthus annuus .

75- Hendaye (Liqueur)

اسم يُطلَق على مشروب يُعطَّر بزيوت دُهنيَّة عِطريَّة من اليانسون، الكزبرة، اللَّوز المُرّ، الأنجليك، الهال، الحامض، البرتقال، ونُقاعة السَّوْسَن.

76- Henné - چنّة

اسم يُطلَق على مسحوق أوراق مُجَفَّفة من شُجيرة الحِنَّة Lawsonia alba، يُستعمَل في صَبْغ الشَّعْر والحرير والجلود.

- هِيدْرَانْجِين، إِدْرانْجِين - 77- Hydrangine

اسم غلوكوسيد تركيبُه الكيميائيّ $C_{34}H_{25}O_{11}$ ، يُستخرَج من الأيدُرانجِيَة المُتَشَجِّرة (۱) Hydrangea arborescens (۱)، أي الأرْطَنْسِيَة .

- باسِيَّة (زُبُدَة ال) – اسِیَّة (زُبُدَة ال)

مادَّة صلبَة صفراء اللَّون برائحة الكاكاو، تُستخرَج من بزور الباسِيَّة الطَّويلة الوَرَق Bassia longifolia . وهي زُبْدة غالبًا ما تُغَشّ بزيتٍ آخر.

- ستارُول الجراد – magostérol

اسم يُطلَق على ستارول حَيَوانيّ يُستخرَج من الجراد، يُرجَّح أن يكون مُماثلًا إلى لستارول يُوجَد في دودة الحرير، تركيبُه الكيميائيّ ٢₂₇H₄₆O.

اسم يُشار به إلى تحويل مادَّةِ ما إلى عجينة.

- أَنْكَرْنَاتِينَ - 81- Incarnatine

Trifolium اسم يُطلَق على غلوكوسيد يُستخرَج من أزهار النَّفَل القِرْمِزيّ $C_{21}H_{20}O_{12}$. $3H_2O$ تركيبُه الكيميائيّ $C_{21}H_{20}O_{12}$.

- أَنْداكُونِين - 82- indaconine

اسم يُطلَق على قِلَويد يُستخرَج من الأكُونيت، تَركيبُه C27H47NO9.

- أَنْسُولِيْن – أَنْسُولِيْن – أَنْسُولِيْن

اسم يُطلَق على هُرمون وعلى مُتَعدِّد الأمين Polypeptide مُنْقِص للسُّكَّر، يُوجَد في البنكرياس أي الغُدَّة الحُلْوَة. تَحليل الأنسولين المائتي يُعطي ما يلي: تِيروزين ١٢٪، سِسْتِيْن ٢١٪، حامض غلوتاميك ٢١٪، لُوْسِيْن ٣٠٪، أَرْجِينين ٣٪، هِسْتِدين ٨٪، لِيزين ٢٪.

- إيريدِين – إيريدِين –

اسم يُطلَق على عِطر اصطناعيّ (مُسَجَّل) برائحة البَنَفْسَج. ويُطلَق على مادَّة كيميائيَّة تُستخرَج من سَوْسَن فلورَنْسَه أي السَّوْسَن الأبيض Iris florentina، وهي غلوكوسيد السَّوْسَن.

485- Jambosine

قلويد يُستخرَج من قشور تُفّاح الوَرْد أي الجَنْبُوزَة Eugenia jambos تركيبُه الكيميائي C₁₀H₁₅O₃N .

86- Japaconitine – جابا کُونِیتِین

اسم يُطلَق على قِلويدين مُتَجازِئين تركيبهما الكيميائيّ C34H47O11N، يُستخرَجان من أنواع الأكُونيت.

- ياسمينين – ياسمينين

اسم يُطلَق على غلوكوسيد يُستخرَج من أوراق الياسمين الأصفر Jasminum . fructicans

- جَتْرُوفِين – جَتْرُوفِين

قلويد تركيبُه الكيميائيّ C₁₄H₂₀O₆N يُستخرَج من قشر الجَتْرُوفَة القُطنيَّة الوَرَق^(۱)

(١) التَّــمية للمُؤلِّف.

. Jatropha gossypifolia

زيت سائل أخضر اللَّون يُستخرج من بزور الجُوليانا النَّسائيَّة أي زهرة المساء الجملة Hesperis matronalis.

- كَرِيْتُه (زُبدة) 89- Karité (beurre)

اسم يُطلَق على مادَّة دَسمة برائحة المَطّاط، تُستخرَج من جَوز الكَرِيْتَه وبزورها . Butyrospermum parkii

- كابُوك، قابُوق - كابُوك، قابُوق

اسم يُطلَق على زَغَبٍ يُشكِّل لِبْدَة تكْسُو ثمار الكابُوك Eryodendron اسم يُطلَق على زَغَبٍ يُشكِّل لِبْدَة تكْسُو ثمار الكابُوك anfractuosum ونباتات أخرى من فصيلة الزَّغَبِيَّات. يُستعمَل هذا الزَّغَب لقابليَّته للعَوم ولكَتامَتِه للحرارة.

- كابُوك، قابُوق (زيت) 91- Kapok, Capock (huile)

اسم يُطلَق على زيت أصفر اللَّون، رائحته مُستحبَّة يُستخرَج من شجرتين: الكابوك المُخْتَلِف السَّطْح (١) Eryodendron anfractucosum وزَغَبِيَّة المالابار (١) Bombax malabarium . استعمال الزَّيتَين ينحصر في صناعة الصّابون.

92- Kawala (huile de) – كاوالا (زيت الـ)

زَيت دَسِم مُخضَرَّ اللَّون الأصفر يُستخرَج من بزور الآراك أي الكَباث Salvadora رَيت دَسِم مُخضَرَّ اللَّون الأصفر يُستخرَج من بزور الآراك أي الكَباث persica . يحتوي على حوامض: كَبْرِيليك، كَبْرِيك، لُورِيك، مِيرِيسْتِيك، أولاييك، لينولاييك. مُرادِفه زيت خاكان Khakan .

93- Kaya (huile de) – کایا (زیت ال

اسم يُطلَق على زيت يُستخرَج من بزور طَوْلَق الجَوْز Torreya nucifera. يحتوي على حامِض ستياريك وحامِض لينُولاييك.

- لڭتُوزِينُوز – لڭتُوزِينُوز

اسم يُطلق على هُولُوسِيد يُوجَد في جذور نَباتات مُختلِفة من فصيلة القرنفليّات، تركيبُه الكيميائيّ C36H62O31.H2O.

- لَكْتُوسِيْن – Dُكْتُوسِيْن – Dُكْتُوسِيْن

96- Ladaniolلاذنيول

. $C_{17}H_{30}O$ تركيبُه الكيميائي Cistus creticus تركيبُه الكيميائي كحول يُستخرَج من اللّادَن الإكريتي

97- Lallemantia (huile de)

اسم يُطلَق على زيت مُجَفِّف جدًّا، يُستخرَج من بزور الحُلَيَّاء الأيبريَّة . Lallemantia iberica

- لامِيْن - 98- Lamine

اسم يُطلَق على قِلويد يُستخرَج من اللّاميون الأبيض Lamium album.

- لاثِيرِين، جُلْبانِين – لاثِيرِين، جُلْبانِين

اسم يُطلق على جوهر مُرّ وسامٌ يُستخرَج من الجُلْبان المُستدق الورق (۱) . Lathyrus angustifolius

- لُورُولاييك – لُورُولاييك

نَعت تعريفي يُشير إلى حامض غير مُشْبَع، تركيبُه C₁₂H₂₂O₂، يُستخرَج من أبيض البال من الحوت الأبيض.

ا مَنْديُومِيين – مَنْديُومِيين – مَنْديُومِيين

اسم يُطلَق على غلوكوسيد بِلُّوريّ أبيض اللَّون، يُستخرَج من أوراق المَنيهوت المُرّ Manihot utilissima .

102- Mangostine – مَنْغُوسْتِين

اسم خضاب أصفر اللَّون، تركيبُه الكيميائيّ C₂₃H₂₄O₆ يُوجَد في جَنْدَم مَنْغُسْتان أو جَوْز الجَنْدَم Garcinia mangostana.

انیسُوبا – مانیسُوبا

اسم يُطلَق على مَطّاط خام يُباع على شَكل سُيور، ومُكَتَّل في كُرات رائحتها

(١) التَّسمية للمُؤلِّف.

- خُلَتاء (زبت اله)

مُغْثِيَة ، يَتمّ الحصول عليه من مَنيهُوت غلازيوف Manihot Glaziovii .

- مَنْيُوك — مَنْيُول — مِنْيُول — مَنْيُول — مَنْيُول — مَنْيُول — مَنْيُول — مَنْيُول — مِنْيُول — مُنْيُول — مِنْيُول — مِنْيُول — مِنْيُول — مِنْيُول — مِنْيُول — مِنْيُولُ — مِنْ

اسم يُطلَق على لُبّ دقيق يَحصل من المَنيهُوت المُرّ (أعلاه) ومن المَنيهوت الحُلو Manihot aipi .

- مَنّ ، تَرَنْجَبِيْن – مَنّ ، تَرَنْجَبِيْن

اسم كان الخيميائيّون يُطلقونه على المادَّة الأرضِيَّة. المَن السَّماويّ كان مادَّة الحجر الفَلْسَفيّ، ومن الزَّئبَق كان المُصَعَّد الذي يَحصل من الرَّاسب (زِئبق مُصَعَّد الذي يَحصل من الرَّاسب (زِئبق مُصَعَّد Sublimé). أمّا اليوم فكلمة مَن تُشير إلى نُتُوحات نَباتيَّة مُختلِفة، سُكَّريَّة الطَّعم، تُستعمَل كمواد مُحَلِّية، أو مُسهلة. مَنُّ العبرانِيِّين مرَدُّه إلى حَزاز مأكول Lecanora.

- مارُوتي (زيت الـ) – مارُوتي (زيت الـ)

اسم يُطلَق على مادَّة مُصفرَّة اللَّون الأبيض، برائحة الكاكاو، تُستخرَج من بزور العَصْرَة السامَّة Hydnocarpus venenata. يحتوي على حامِض شُولْمُوغرِيك، وهِيدنُوكَرْبيك.

– مَرُّوْبِينِ – مَرُّوْبِينِ – مَرُّوْبِينِ

إسم يُطلَق على مادّة كيميائيَّة تركيبُها $C_{30}H_{43}O_{6}$ ، وهي الجَوهر المُرّ في الفَراسِيون الأبيض Marrubium vulgare .

- بَلْقَاء (دُهْن) – بَلْقَاء (دُهْن) – بَلْقَاء (دُهْن)

زَيت دُهنيّ سائل، مُصفر اللَّون، عِطريّ الرّائحة الخاصَّة، يُستخرَج من البَلْقاء المَعْقُوفَة (١) Melaleuca uncinata . يحتوى على سينايول، د- يينان، أنْسِينَايُول.

- مِلانِين، قُتامِين

اسم جِنسيّ يُطلَق على خضابات سوداء اللَّون تُوجَد في البَشَرة. إن تركيب الميلانين الكيميائي C₈H₅O₃N.

- مَلِيسَّة (دُهن) – مَلِيسَّة (دُهن)

سائل باهت اللَّون الأصفر، برائحة اللَّيمون الحامض، يُستخرَج من أوراق

المليسَّة Melissa officinalis. وهو مزيج من د- پينان، دِيپَنْتَان، سِتْرال، سيترونيلَّال. مُرادِف: زيت البَلْسَم.

- نَعْنَع (دُهن) – نَعْنَع (دُهن)

زيت دُهنيّ يُستخرج من مُختلِف أنواع النَّعنع، وبخاصَّة من النَّعْنَع المُفَلْفَل Mentha piperita . يحتوي على مَثْتُول (أي كافور النَّعنع) (٤٠ إلى ٤٠٪)، مَثْتُون، أستات المَثْنِل، د- بينان، فَلَّنْدران، إلخ.

- مُورَه (زیت کَبِد الـ) – مُورَه (زیت کَبِد الـ)

اسم يُطلَق على زيت باهت اللَّون الأصفر إلى اللَّون الأصفر البُنِّي، يُستخرج من كَبِد الغادُس أي المُورَة Gadus morrhua. يحتوي على حامِض پَلْميتيك ٤٪، جاكُوريك ٢٠٪، تيراپيك ٢٠٪، پَلْميتُوليك، غادُولاييك، بْتُومايين، تريماتيل أمين، فيتامين «أ» و «D3».

- آس (دُهن) – آس (دُهن)

اسم يُطلَق على سائل عديم اللَّون أو مُصفر اللَّون، رائحته عِطريّة، يُستخرَج من ثمار الفِلْفِل المَخْزَنيِّ (٦٠ إلى ٨٠٪)، مَتِيل أوجينُول، سينايُول، ميرتانُول، فَلَنْدران، كَمْفان، إلخ.

- آس (زیت) – آس (زیت)

زَيت عَذْبِ الرَّائحة، طعمه مُمَيَّز، يُستخرَج من الآس Myrtus communis. يحتوي على حامض مِيرِسْتيك، پُلْميتيك، أولاييك، لِينولاييك.

- نُولِي (صمغ) 115- Nauli (gomme)

صمغ النُّولي هو راتنج زيتيّ (أوليوراتنج) يَسيل من شجرة الكَناريوم الشَّائع^(۱) . يُعطى زيتًا دُهنيًّا برائحة اليانسون.

- نَرُقَال (بَلْسَم) – نَرُقَال (بَلْسَم)

بَلْسَم نرڤال هو مرهم يُوصى به ضدّ الآلام الروماتيزميّة، أساسه نخاع الثَّور، زيت الخَشخاش المُنوِّم وزبدة جوز الطيب.

اسم يُطلَق على سائل مُماثل لدهن الكاجيبُوت، يُستخرَج من أوراق البَلْقاء الخَضراء الزَّهر (١) Melaleuca viridiflora . يحتوي على أَلْفا د - پينان، سينايُول، أَلْفا تَربِينايُول، أَسْتَرأسَتيك، أَسْتَربُوتيريك.

- نِيكُولِين – الله Nicoline

اسم يُطلَق على مادَّة تُستخرَج، في غينيا، من نَبات من القَرنيّات: غُبَيْدَة شَقْراء (١) . Lonchocarpus rufescens

- نيكُوتَلِّين – Nicotelline

اسم يُطلَق على قلويد صلب تركيبه C10H8N2 يُستخرَج من التبغ.

- نیکُوتیامِین – نیکُوتیامِین

اسم يُطلَق على مادَّة صلبة يَتم الحصول عليها من جرّاء تقطير أوراق التَّبغ الخضراء في الماء. مُرادِف: كافور التَّبغ.

- نیکُوتین، نیکُوتیمین – کا Nicotime, Nicotimine

اسم يُطلَق على قِلويد سائل تركيبه الكيميائيّ $C_{10}H_{14}N_2$ يُستخرَج من التَّبغ . Nicotiana tabacum

- خُرَّم (دُهن الـ) – - خُرَّم (دُهن الـ)

زَيت دُهنيّ رائحته غير مُستحبَّة يُستخرَج من بزور خُرَّم الحنْطَة Agrostemma . githago

- شُوْنِيز دِمشقى (دهن) – شُوْنِيز دِمشقى (دهن) – شُوْنِيز دِمشقى (دهن)

زَيت دُهني ذو تَفَلُور (استشعاع) أزرق، يُستخرَج من بزور الشُّونيز الدُّمشقيّ . Nigella damascena . من مُركِّباته الأساسيَّة: دَماسانِين.

124- Nigelle cultivée (huile) – شُونيز زراعي (زيت) – شُونيز زراعي (زيت)

زيت يُستخرَج من بزور الشُّونيز الزِّراعيِّ Nigella sativa أي حَبَّة البَرَكة أو الحَبَّة السَّوداء.

زیت دُهنی سائل، رائحته أفاویهیَّة (مُفَوَّهَة)، یُستخرَج من أوراق شجرة البُنْدُق . Corylus avellana . یحتوی علی حامض یَلْمیتیك وعلی یَرافِین.

- أولايُورَازِين - أولايُورَازِين - أولايُورَازِين

اسم يُطلَق على مادَّة طَبيعيَّة يكون قِوامها رَخُوًا (صمغ الصَّنوبر) أو مائعًا (تَربَنْتين البندقيَّة)، طَبيعتُها راتنجيَّة، تفرزها أنواعٌ نباتيَّة مُختلِفة عند حَزِّ أنسِجتها بشكل عميقٍ نوعًا ما.

- أولاييك – أولاييك

نَعت تَعريفيّ يُطلَق على حامِض تركيبه الكيميائيّ C₁₈H₃₄O₂.

- زَيْتُون (زيت) 128- Olive (huile d')

زَيت يُستخرَج من ثمار شجرة الزَّيتون Olea europæa. أصنافُه: صِرْف Vierge رَيت يُستخرَج من ثمار شجرة الزَّيتون Accinaire . أمُتاز، فائق الجودة Surfine، صافِ Fine، جَيِّد، عاديِّ Ordinaire، مُوقِد d'infect. . de ressence . مُنْتِن، عَفِن d'infect، زيت الكُسْب أي «الجفْت»:

الصَّنفان الأَوَّلان يُخَصَّصان للتَّغْذِية. الأصناف الأخرى تذهب إلى مَعامِل الصَّابون. زيت الزَّيتون غير مُجَفِّف. يحتوي على حامض أولاييك ٧٢ إلى ٨٤٪، لِينُولاييك، مِيريسْتيك، پَلْميتيك، ستياريك، أراشيديك. غير مُتَصَبِّن ٠,٨ إلى ١,٤٪.

- زَيتُون (زيت أَنْوِيَة الـ) - كَيتُون (زيت أَنْوِيَة الـ)

زَيت يُستخرَج من اللَّوزات الموجودة داخل أنْوية ثمار الزَّيتون. يحتوي على حامض يَلْميتيك، ستياريك، أولاييك، لينولاييك.

- أوليڤِيل – أوليڤِيل – أوليڤِيل

مادَّة تُستخرَج من راتنج الزَّيتونَة، تركيبها الكيميائيّ C₂₀H₂₄O_{7.}

- أونُوسارِين – أونُوسارِين

اسم يُطلَق على جَوهر مُتبلِّر تركيبه الكيميائيّ C₁₂H₂₀O، يُستخرَج من جذور الشِّبْرق Ononis spinosa .

- أونُوسارول، أونُوكُول - 132- Onocérol, Onocol

اسم يُطلَق على فيتوستارول يُوجَد في الشُّبْرق، تركيبه C26H44O2.

– أُونُونِين – أُونُونِين – أُونُونِين

اسم يُطلَق على غلوكوسيد تركيبه الكيميائي ،C₂₅H₂₆O₁₁ يُستخرَج من الشَّبْرِق. يُمكِن انشطاره إلى أونُوسْيين وإلى حامِض فُورميك.

- بارابُقْسِیْن – Parabuxine

اسم يُطلَق على قِلَويد يُستخرَج من قشور البَقْس، إلى جانب البُقْسِين.

- پایْتِیْن – 135- Paytine

اسم يُطلق على قِلويد يُستخرَج من قشور الكَنكينا البَيضاء في Payta، تركيبه الكيميائي C21H24N2O.

- ل- بيغانِيْن، ڤازِيِسيْن - ل- بيغانِيْن، ڤازِيسيْن

اسم يُطلَق على قِلويد يُستعمَل في الطِّبّ، تركيبه الكيميائيّ C_{I1}H₁₂ON₂. يُستخرَج من نبات ينتشر في منطقة الهرمل، أي الحِرْمِل Peganum harmala.

- پيلَرْغُونيدُول – Pélargonidol

أَعْلُوكُونَ يُوجَد في الغُرْنُوق أي الجيرانيوم Pelargonium zonale.

- پَلُوتِيْن – عَلُوتِيْن – عَلَوْتِيْن

قِلوید نَبات البَیُّوت Echinocactus williamsii، ترکیبُه الکیمیائی C₁₃H₁₉O₃N. نَبات مَکسیکیِّ مُقَدَّس. إنَّ لَوْك قِطع صغیرة منه تُؤدِّي إلى هَلُوساتٍ مَرْئیَّة مُستَغْربَة.

- يَئْسِئْن – 139- Pepsine

اسم يُطلَق على أَنْبَخانَة اكتشفها Schwann عام ١٨٣٦، بإمكانها تحليل الهَيُولينات تحليلًا مائيًا إلى زُلالُوز وإلى مُتَعدِّدات الأمين Polypeptides.

- أَهُوكَاتِيَّة أَمْرِيكَيَّة (دهن) - أَهُوكَاتِيَّة أَمْرِيكَيَّة (دهن)

دُهن سائل مُصفَرّ اللَّون الأخضر يُستخرَج من أوراق الأبوكادو الأمريكيّ^(۱)، طعمه كطعم الطَّرخون. يحتوى على مَتيل شاڤيكول، أَلْفا د - بينان، برافين.

زَيت دُهنيّ يُستخرَج من الأبوكادو الزُّغبيّ (١)، يحتوي على حامض بُوتيريك،

أستيرات الحوامض التّالية: بُوتيريك، ڤالريك، أونَنْتيك، وعلى د- كافور، سينايُول، بُورنايُول، أَلْدَهيد فُورميك.

- بَقْدُونس – بَقْدُونس – بَقْدُونس

(زُبدة اله) راسب جيلاتينيّ يحتوي على أبْيُول، ويحصل من تَبخير مُستَخلصات البقدونس الكُحوليَّة Petroselinum sativum. (كافور اله) هو الأبْيُول. (دُهن ثمار اله) هو زَيت دُهنيّ يحتوي على أبْيُول، حامض پَلْميتيك، مِيريْستِسين. (دُهن عُشبة اله) سائل مُصفَرّ اللَّون الأخضر براثحة البقدونس.

- حَشيشةُ القُرْعان (دهن) - حَشيشةُ القُرْعان (دهن)

زَيت دُهنيّ يُستخرَج من جذور النَّبات Petasites officinalis.

- نارَنْج، أَبُو صفير (دهن) - نارَنْج، أَبُو صفير (دهن)

دُهن أبو صفير سائل مُصفر اللَّون، يُستخرَج من أوراق وفروع اللَّيمون المُرّ، أي أبو صفير Citrus bigaradia. يحتوي على بيرُّول، فُورفُورال، بيتا - بينان، كَمفان، د- دينَّتان، ليمونان، نارول، جيرانيول، ل- لينالول.

- ليمون حامِض (دُهن) – ليمون حامِض (دُهن)

زَيت دُهنيّ سائل يُستخرَج من فروع وأوراق وثمار اللَّيمون الحامِض الفَجّة غير النّاضجة Citrus medica . يحتوي على كَمْفان، ليمونان، لِينالُول، سيترال، جيرانيول.

- بُرْتُقَال، بُرْدُقان (دُهن) 146- Petit grain Portugal (ess.)

زَيت دُهنيّ يُستخرَج من فروع خضراء وثمار شجرة البُرتقال Citrus aurantium.

- پاتُونُوسيد - پاتُونُوسيد - عاتُونُوسيد

اسم يُطلَق على أنْتُوسيانُوسيد يُستخرَج من أزهار البَتُونيه. تحليلُه المائيّ في مُحيط حامِض يُحرِّر ذَرَّتَي غلوكوز وذَرَّة واحدة باتُونيدول.

بُوسيدانِين بُوسيدانِين

اسم يُطلَق على مادَّة كيميائيَّة سامَّة للأسماك، تركيبها ،C₁₅H₁₄O، تُستخرَج من جذور بَقْلَة الرَّئيس المَخْزَنيَّة Peucedanum officinalis .

149- Peuplier (ess. des bourgeons) (العم الـ) – حَوْر (دهن بَراعم الـ)

زَيت دُهنيّ سائل، باهت اللَّون الأصفر إلى فاتح اللَّون البنِّيّ، رائحته مُستحبَّة.

799

يحتوي على ألُّفا - كاريوفيلَّان، بَرافين.

- فَرُبِيتِيْن – فَرُبِيتِيْن –

غلوكوسيد تركيبه الكيميائيّ مي دريه الكيميائيّ مي درور أثمان النّيل أو حَبّ النّيل Ipomea hederacea .

- فَرْماكُوبِيا – فَرْماكُوبِيا

اسم يُشير إلى كتاب رَسْميّ يَذكُر طريقة تحضير الأدوية وتركيبها وخَصائصها والتَّجارِب التي أُجْرِيَت عليها واستعمالاتها المَخْزَنيَّة.

- فازیْن –

اسم يُطلَق على أغْلُوتينِيْن سامٌ يُوجد في الصُّويا أو الصُّوْجَة.

- فاصُول – bid-153- Phasol

اسم قِلُويد يُستخرَج من حبوب الفاصُوليا Phaseolus vulgaris.

رازیانَة (دُهن) 154- Phellandre (ess.)

اسم يُطلَق على سائل عديم اللَّون إلى خَمريّ اللَّون الأصفر، يُستخرَج من ثمار الرّازيانَة المائيَّة Enanthe phellandrium.

- فايُوراتِين - 155- Phéorétine

مسحوق أصفر اللَّون يُستخرَج من جذور الرَّاوَنْد Rheum، تركيبُه الكيميائي .C14H8O7

- فِلِّيرُ وسيد – Phillyroside

غلوكوسيد تركيبُه الكيميائيّ C₂₇H₃₄O₁₁ يَتمّ الحصول عليه من قشور الشُّخص العريض الوَرَق Phillyrea latifolia . مُرادِف فِلَيرين.

- فُقْمَة، عِجْل البَحْر (زيت) - فُقْمَة، عِجْل البَحْر (زيت)

زيت مُتفاوِت التَّركيب يُستخرَج من وَدَك أنواع مُختلِفة من الفُقْمَة، مِثال Phoca groenlandica, vitulina

- فِيزالِين – Physaline

اسم مادَّة مُرَّة تُستخرَج من الكاكَنْج Physalis alkekengi، تركيبُها الكيميائيّ . $C_{72}H_{116}O_4$

٣..

- گَتْش – گَتْش

اسم يُطلَق على ماء حَياة (كونياك) يَحصل من جَرّاء تَخمُّر بعض أنواع الخوخ. (جاء في قاموس المنهل عن كلمة كُتْش: إنّه نوع من ثمار الإتجاس).

160- Quillaïque, Quillajique

- كِلَّاجِيّ

نعت تَعريفيّ يُطلَق على حامِض يُشكِّل صابُوجانين يُوجَد في قشور الكِلَّاجَة أو الكِلَّايا، تركيبُه الكيميائيّ C30H46O5.

161- Quillayasapotoxine

- كِلَاجة (صابُونين - السَّام)

اسم يُطلَق على صابُونُوسيد يُستخرَج من الكِلَّاجَة، تركيبُه C₁₇H₂₆O_{10.}

162- Rancidité

- زَناخَة^(١)

اسم يُطلَق على ظاهِرة فَساد الموادّ الدُّهنيَّة (الشَّحميَّة)، إمَّا عن طريق الجراثيم الموجودة في الهواء، أو عن طريق التَّأْكسُد الذَّاتيّ: تَشكيل مَتيل سَاتُونات، وألْدَهِيد Nonylique.

163- Rasamala (ess.)

- گناريُوم (دُهن)

اسم زَيت دُهنيّ يُستخرَج من بَلْسَم الكَناريُوم الصَّغير الثَّمار (١٠) Canarium من تَقطير الثَّمار الله يَحصل على سَسْكي تَرْپانات. دُهن خَشَب الد: زَيت دُهنيّ يَحصل من تَقطير الرَّازامالا الآتية من الهند، يَقع في كُتَلٍ مُتبلِّرة، بُنيَّة اللَّون، برائحة القرفة والرَّاوَنْد. تَنْصهِر عند ٣٠ إلى ٤٠ درجة.

- رُوبازِيْد – رُوبازِيْد – رُوبازِيْد

اسم يُطلَق على قِلَويد حالٌ للأَدْرِينالين، ومُسكِّن للجهاز العَصَبيّ الوُدِّيّ، يُستخرِج من أوراق عُود الحَيَّة المَدّاد^(١) Rauwolfia serpentina.

- رُوْوُلْسِيْن – رُوْوُلْسِيْن – رُوْوُلْسِيْن

قِلُوید ترکیبُه الکیمیائتی C21H26O3N2، یُستخرَج من أوراق عُود الحَیَّة المَدَّاد، وهو مُتَجازئ الیُوهِمْبین.

⁽١) التَّسمة للمؤلِّف.

زَيت دُهنيّ سائل يُستخرَج من أزهار ملكة المُروج Spiræa ulmaria، يحتوي على ألْدَهيدسالِسيليك، سالِسيلات المَتِيل، بَقايا پِئبَّرُونال وبَقايا وانيلّال.

- رَزَرْپِیْن – رَزَرْپِیْن – رَزَرْپِیْن

اسم يُطلَق على قِلويد تركيبُه الكيميائيّ C22H40O9N2، يُستخرَج من عُود الحَيّة المَدّاد؛ وهو مُنْقِص للتَّوتُّر الشِّرْيانيّ ومُسَكِّن.

- خُزام (دُهن) 168- Réséda (ess.)

زَيْت دُهنيّ مُصفَرّ اللَّون البُنِّيّ، مُستَحبّ الرّائحة، يُستخرَج من خُزام الصَّبَّاغِين .- Reseda luteola. يحتوي على فَنيل أتِيلامين، فَنيل أتِيلُوريا، فَرْنَازُول، كَمْفان، د- يينان.

- نَبْق (مُسْهِل الـ)، رَمْنُوكَتَرْتِيْن – نَبْق (مُسْهِل الـ)، رَمْنُوكَتَرْتِيْن

Rhamnus اسم يُطلَق على جَوهر مُرّ ومُسْهِل، يُوجَد في عُنيبات النَّبق المُسْهِل $C_{27}H_{30}O_{14}$. cathartica

- سَمْبُوكُوسيد – سَمْبُوكُوسيد

اسم يُطلَق على أنْتُوسيانُوسيد يُوجد في قشور البَيْلسان Sambucus nigra. تحليله المائيّ الحامِض يُحرِّر ذَرّة من الغلوكوز، ذَرَّة من الرَّمْنُوز، وذَرَّة من السِّيانيدُول.

- سَنْدُرَك – عَنْدُرَك – الله علام – الله على الله على – الله على الله عل

هو الاسم الفَرنسيّ القديم الذي كان يُطلَق على الزَّرنيخ الأحمر Réalgar. وكذلك راتنج السَّنْدَرك، أي التُويا العِقْدِيَّة Thuya articulata. دُهن خَشَب ال: سائل بُنِّيّ اللَّون الأحمر، يُستخرَج من خشب السَّنْدَرُوس الرُّباعيّ Callitris quadrivalvis. يحتوي على كَرْقُكْرُول، تِيمُول هيدروكينُون، تِيموكينون. دُهن راتنج الم: سائل ذَهبيّ اللَّون الأصفر، يَتم الحصول عليه من جَرّاء تقطير السَّنْدَروس الرُّباعيّ. يحتوي على الفا د - بينان، وعلى ديتَرْپان.

- دَمُ الْأَخَوَيْن - - دَمُ الْأَخَوَيْن

سم يُطلَق على راتنج يُستخرَج من ثمار أنواع مُختلِفة من النَّخُل في الهند وأمريكا الجنوبيَّة وجزر الكناري. أصنافه تقع في شكل قُضبان، أو زَيتونيَّة الشَّكل، أو طُلْمِيَّة، الصِّنف الأخير يُستخرَج بواسطة بخار الماء، ويكون شديد اللَّون الأحمر، سُكّريِّ

الطَّعم. يُستعمَل دم الأخوين في تلوين الدِّهانات والوَرنيش ووَرْنيش الحَفْر الزِّنْكيّ (بالزِّنْكيّ (بالزِّنْكوغراف)، إلخ.

– صِنْدَل – 173- Santal

اسم يُطلَق على خشب أحمر اللَّون، شديد الصَّلابَة، يُوجَد في الأسواق إمّا في نُجارة أو مسحوقًا اسمه سَنْتالين Santaline أي صَنْدَل مسحوق. دُهن خَشَب الد: سائل باهت اللَّون الأصفر، رائحته خفيفة ولكنَّها دائمة، يُستخرَج من خَشَب الصَّنْدَل الأبيض Santalum . يحتوي على أكثر من ٩٠٪ سَنْتَالُول، سَنْتان، سَنْتانُون، سَنْتالال، حامِض سَنْتاليك (صَنْدلق)، سَنْتَلان أَلْهَا وبيتا، إلخ.

- سَنْتُونِين – سَنْتُونِين

اسم يُطلَق على مُشْتَقَين مُتَجازِتَين تركيبهما الكيميائيّ $C_{15}H_{18}O_3$ ، وهما الجوهر الفَعّال في ما يُسمّى سَمَن كُونْترا Semencontra الموجود في الأرطماسيا البَحرِيَّة Artemisia maritima .

- تَتُوب (قشر الـ) 175- Sapin (écorce)

قشر التَّنُّوب استُعمِل أحيانًا في دباغة الجلود. زَيت اله: سائل فاتح اللَّون البُنِّيّ الأصفر، يُستخرَج من حبوب التَّنُّوب المُشْطيّ Abies pectinata.

- أبيسَة بَيْضاء (۱) (دُهن أكراز) (- أبيسَة بَيْضاء (۱۲۰ (دُهن أكراز) (- أبيسَة بَيْضاء (۱۳۰ (دُهن أكراز) (دُهن أكراز)

سائل عديم اللَّون، رائحته بلسميَّة تُذكِّر برائحة البرتقال واللَّيمون الحامِض، يُستخرَج من أكراز الأبيسة البيضاء Abies alba. يحتوي على أَلْفا ل - بينان، ل- ليمونان، بورنايول.

- أَبِيْسَة حَمراء (١٠) (دُهن إبر ال) – أَبِيْسَة حَمراء (١٠) (دُهن إبر ال)

زيت دهنيّ سائل، عديم اللَّون، مُستحَبّ الرّائحة، يُستخرَج من إبر خضراء من الأبيسة السّامِية (١٠ فَلَّنْدران، لـ فَلَّنْدران، دينتّان، أستات البورنيل، كادينان.

- نَدْغ بُستانیّ (دُهن) 178- Sariette des jardins (ess.)

زیت دُهنیّ یُستخرَج من النَّدغ Satureia hortensis، یحتوی علی کَرْفَکُرول، پ-سِیمان، تَرْپان واحد. زیت نَدْغ الجَبَل Satureia montana یحتوی علی کَرْفُکُرول، تَرْیانات.

(١) التَّمه لادوار غالب.

٣- الوَصْفات الطِّبِّيَّة

فرنسيّ - إنجليزيّ - عَرَبيّ

1- Métrites (F) Metritis (E)

رُحام، الْتِهابُ الرَّحِم

راجع تَرِيَّة (في هذا المُلحَق) Voir Pertes blanches

2- Métrorragies (F) Metrorrhagia (E)

نَزْفٌ رَحِمِي، ذَنَن الرَّحِم

راجع نَزْف، إدماء وافِر (في المُعجَم السادس، صفحة ٢٨٨) Voir Hémorragies

3- Migraines (F) Migraine, Hemicrania (E)

شَقِيْقَة، أَلَمُ نِصْفِ الرَّأْس

4.8

الاستشارة الطِّبِيَّة ضروريَّة. - شُقَار الفصح، حبق، بابونج، قنّب هِنديّ، خزامی، مردكوش (نقاعة ۲۰ غرامًا في نصف ليتر ماء غالي)، مَليسَّة (۱۰ غرامات في نصف ليتر)، برتقال (أزهار وأوراق، ۱۰غرامات في نصف ليتر)، ندى البحر (۱۰غرامات في نصف ليتر)، ندى البحر (۱۰غرامات في نصف ليتر)، ندى البحر (۱۰غرامات في نصف ليتر)، زعتر مَدِّاد (٥ غرامات)، زيزفون (٥ غرامات)، زعتر (٥ غرامات)، غرامات)، فيرونيكا، رعي الحمام.

- ملفوف، فول، بصل، فرفحین، لوز، کرز، درّاق.
- بالإضافة إلى ذلك: حمّامات أرجل بواسطة ١٠٠ غرام طحين الخردل في الماء الساخن. شرائح ليمون حامض على الصُّدغين. قهوة باردة. لَصُوقات من أوراق الملفوف على الجبهة أو على الصُّدغين. ٥ غرامات من مسحوق الناردين مع بعض العسل.
- وَصْفَاتَ قديمة: إِبريق من الفخّار مملوء بالماء الغالي حتّى ثلثيه. نضيف إليه كوبًا من الخَلّ. نعرِّض الوجه للبخار مدَّة ٥ إلى ١٥ دقيقة. نُجفِّف الوجه. ننام بمعزل عن أيّ مجرّى هوائيّ.
- تَداوٍ مَعْدِنيّ : Métallothérapie : نضع وعاءً نُحاسيًّا على الجبهة لمدَّة ٥ إلى ١٠ دقائق.

- نلف الرَّأس بمنشفة إِسفنجيَّة مُشرَّبة بماء مالح جدًّا. نترك في قلب المنشفة طرف شريط نحاسيّ طويل نصِل طرفه الثاني في حنفيّة ماء. نَصبُر ١٥ إلى ٢٠ دقيقة. - كلورال، ٢ إلى ٥ غرامات في اليوم، في ٢٥٠ إلى ٣٠٠ غرام من الماء المُسَكَّر.

- خليطات لنَوْبات الشَّقيقة

																												-ی		(1
																												ارد		
غ	١	•	• .						 . ,										 			 				ن	امح	حزا	_	
غ	١	•	• .										 						 			 		بار	ئہ	6	عو	مرد	>	
غ	١	•	• .																 				٥	طر	2	ā	يس	بحوَ	-	
غ	۲	•	• ,										 					 	 			 			حر	لب	١	دی	نا	۲)
غ	١	•	• .															 	 			 					سّة	لي	á	
غ	١	•																	 			 		٠.		ζ	بع. ت	نف		
غ	١	•					 																ة	طر	2	ā	یس	جو	-	
_																												غا		
_																												دی		(٣
_																												یز		
غ	١	•	١.				 																	٠.		٠.	مر	ئىو	3	
_																												ننط		
غ																											_			
غ	۲	4		٠.																٠.	٠.	 			ئة	لية	مَا	(8		
غ	١	•															٠.							٠.	٠.		لة	إغا	;	
غ	١																					 			٠.	ن	دير	ار	;	
غ																											_			
غ	۲	•								 	-					 										ى	ام	خز	•	

يُؤخذ ٥٠ إلى ٦٠ غرامًا من الخليط في ليتر ونصف اللّيتر من الماء، يُغلى حتّى إنقاص نصف الكمّيّة. عِدَّة بَلْعات كلّ ساعة خلال النَّوْبات.

عَقْصُ الحَيَّة، نَكْ:ُ الحَيَّة 4- Morsures de serpent (F) Snake bites (E) مَصْل مُضادّ للشُّموم، أرْقِطْبون، خُزامي، لسان الحمل. عَضُّ الحَيوانات 5- Morsures d'animaux (F) Animal bites (E) راجع وَخْزَة، لَدْغَة، لَسْعَة (في المُعجَم الرابع، صفحة ٣٠٦ Voir Piqûre . d'amimaux وَخْهُ الذُّماب 6- Mouches (F) Fly (E) راجع وخز الحشرات (في هذا الملحق) Piqûres d'insects. وَخْز «الذَّباب»، يَعُوض، يَرْغَش 7- Moustiques (F) Mosquito (E) راجع وخز الحشرات (في هذا الملحق) Piqûres d'insects. قُلاع 8- Muguet (F) Thrush (E) نَعْسل الفم، أربع إلى خمس مَرّات في اليوم، بماء مُمَلَّح، بمقدار نصف مِلْعَقة صغيرة من الملح في مقدار مِلْعَقة كبيرة من الماء. - غسل الفَم المُتكرِّر بنقيع أوراق المريمية، السُّرْفِل، القِمام الآسي. - حمّامات للفَم من: بَوْرَق (بوراکس) بُوْرَق (بوراکس) عَسَل مُورَّد عَسَل مُورَّد عَسَل مُورَّد ١٥... عَ ماءماء ٣٠٠ ملار وَجَع عَضَلَيّ 9- Myalgies (F) Myalgia (E) راجع آلام عَضَليَّة (في المُعجَم الرابع، صفحة ٢٩٥) Douleurs musculaires. قُلاب 10- Myocardites (F) Myocarditis (E) أَدُونِيس، قِمعيَّة أي ديجيتال، دِفلي، ستروفَنْتُوس، تَفاتبا دفْليَّة. علاجات طنية. غَثيان، تَهَوُّع 11- Nausées (F) Nausea (E)

4.1

مَلاكيَّة أي أنجليك، نَعْنَع.

كرفس، غافَث، أدُونيس، ورق بَتُولا، حِمْحِم، غالِيون أَصْفَر، ثَيِّل، أوكالپتوس، وزال (أوروبِّيّ)، ثمار العَرْعَر، غرِنْداليا (٣٠ نقطة من المُستخلَص المائع، ٢ إلى ٣ مَرّات في اليوم)، هَدال، جابُورَنْدِي، خُبّازَة، زنبق الوادي، أنواع القرصعنّة، حشيشة الزُّجاج، درّاق، عَصا الرّاعي، لِسان الحَمل، ذنب الخيل، كَنكينا، مَلكة المُروج، بَراعم الصَّنوبَر، إِشْقيل، قَضيب الذَّهَب، بَيْلسان، عُشبة القوى، أريغارون كندا.

- لوز، شَيْلَك، بندق، تُفّاح.

- خَليطات:

٠٤٠) عنب الدُّبّ (أوراق)
٠٢٠ غ	ذنب الخيل
٠٢غ	حشيشة الزُّجاج
٠٠٠٠	مُرّان (أوراق)
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	كشمش أسود
٠.٠٠٠	سُوس (جذور)
٠٠٠٠	نَعنع (أوراق)
٠١٠	جَلْهَم (قشرة)

نقيع ٣ ملاعق كبيرة من الخليط في نصف ليتر ماء يُغلى دقائق قليلة، يُغطّى عشر دقائق، ويُؤخّذ منه قدر المُراد.

روج۳۰۰۰	٢) عراوة ملكة المر
٠٥٢غ	ئيًل
٠.٠٠٠	عنب الدُّبّ
۱۵	شِبرِق
۱٥	كيس الرّاعي
١٥	شِنداب
١٥١غ	خَلَنْج
<u> </u>	بر قريص

كرز (عروق أي أعناق)
نَقيع ٣٠ غرامًا من الخليط في ليتر ماء يُغلى ويُغطَّى ويُؤخَذ حسب المُراد.
٣) عِنب الدُّبِ
نَجيل، ثَيَّل
عراوة ملكة المروج٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
شِبرِق٥٢غ
كرز (أعناق)
زعرور٥١غ
خَلَنْج
فول المَناقِع٥١غ
نَقيعٍ أَربع ملاعق كبيرة من الخليط في ليتر ماء يُغلى عشر دقائق، ويُؤخَذ بكامله
خلال النَّهار. يُنصَع به أيضًا ضدّ تَصلُّب الشَّرايين Artériosclérose.
– نَقيع من خَليطَين مُتَناوِبَيْن:
١) غاليون أصفر٠٠٠
زيزفون٠٠٠٠
ذُرة (سِمات) ذُرة (سِمات)
ذَنَب الخيل٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
بَيلسان (أزهار)
وَرد السِّياج (دَليك)
٢) أخيليا أمّ ألف ورقة٢
غاليون أصفر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
عقّيدة١٠٠٠
نَجيل
عِنب الدُّبّ١٠
داذي مُخَرَّم٠٠٠٠
نَقيع ٣٠ إلى ٤٠ غرامًا في ليتر ماء يُغلى دقيقتين ويُغطّى ١٥ دقيقة. يُؤخَذ منه ٢

٣٠٨ إلى ٣ فناجين في اليوم.

	هُ الطُّبِّيَّةُ ضَروريَّةً .	- المُراقَبا
13- Néphrose lipoïdique (F) Lipoidnephrosis (E)	كُلاءٌ شَحْمانيّ	كُلاءٌ شُحاميّ،
الكُلاء الشُّحاميّ: أريغارون كندا. علاج طبِّيّ.	ت بَوليّة ناتجة عن	اضطوابار
14- Nerfs (crises de) (F) Attack of nerves, Fit of h	ysterics (E)	نَوْبات عَصَبيَّة
بابونج روماني، هَدال، مَليسَّة، نعنع، زيزفون،		
ب ورقة، برتقال، ندى البحر.	، خَزامى، أمّ ألف	ناردین، زعرور
15- Nerveuses (maladies) (F)		أمراض عَصَبِيَّة
ور)ور)	ة أي أنجليك (بز	مَلاكِيًّ
١٠		زيتون
١٠		
١٠٠٠	ر (أزهار)	زعرو
۴۴غ	ن (جذر مُقطَّع) .	ناردير
) (۱۰	بتة (رؤوس مُزهِرة	بَلْسَم
) (۱۰		
رة)ا		
ر ٥ دقائق ويُؤخَذ منها ٣ فناجين يوميًّا بين الوجبات،	الماء الغالى تُغطِّ	نُقاعة في
جان، للبالغ؛ مِلعقة كبيرة لكلّ فنجان، للأولاد من ٥	زعق كبيرة لكلّ فن	كما يلي: ٣ مَا
كلّ فنجان لمن هم دون الخامسة.	،؛ مِلعقة صغيرة ا	إلى ١٠ سنوات
16- Nervosisme (F) Nervosism, Nervosity (E)	لأغصاب	عَصَبيَّة، تُوَتُّر ا
لة عطريَّة، زعرور، فَراسيون نَيِّن، خَسَّ، مردكوش،		
ل الحقول، برتقال، وَدَح، ملكة المروج، مَريميَّة،	ئة، نعنع، نرجم	حَنْدَقوق، ملياً
	ونَة، ناردين.	صَفصاف، شَرُ
، بَصَل، بَقلة حَمقاء، مشمش، لوز، جوز، درّاق،	، فاصوليا، خَسرّ	
		تفاح، عنب.
<i>ن</i>)		
<u> </u>	ت	قَلَمنه

4.9

نعنع مُفَلْفَل (ورق)٢غ	
مَليسَّة (ورق) مَليسَّة (ورق)	
زعتر مَدّاد۲۰	
ناردين (جذور)	
زعرور (أزهار)١٠٠	
آلامِيَّة (ورق)١٠	
نقيع ملعقتين كبيرتين من الخليط لكلّ فنجان ماء يُغلى قليلًا ويُغطَّى	
خمُّس دقائق. فنجانان في اليوم بين الوجبات، وثالث عند النَّوم.	
طوال أسبوع.	
– حَمّامَات: كيلوغرام واحد نُخالة مع ٢٠٠ غرام من ورق الجوز	
في كيس من المُوصليّ. نَغلي ربع ساعة في مقدار ٥ ليترات ماء.	
نضيف النَّقيع إلى الحمَّام: من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.	
- حَمّامات:	
زيزفون (أزهار)وغ	
قَلَمَنْتقَلَمَنْت	
نعنع (ورق)هغ	
صعتر، أوريغانُمهغ	
يُؤخَذ من الخليط خمس قبضات (أي كمشات) في كيس قماش نُغطِّسه في مِقدار	
ليتري ماء. نَعْلَي ١٥ دقيقة ونُضيف الكلّ إلى الحَمّام.	
17- Neurasthénie (F) Neurasthenia (E) حَرَض عَصَبِيّ، حَرَض	
(راجع فَقْد الذَّاكرة في المُعجَم الثالث صفحة ٢٨١، انهيار عَصَبيّ في المُعجَم	
الرابع صفحة ٢٩٣): أَبْسَنْت، أمّ ألف ورقة، حبق، فَراسيون، قِنَّب هنديّ، إيبوغا،	
مردكوش، ماتي، جوز القَيء، آلامِيَّة، مَريميَّة، زعتر مَدَّاد، زعتر، زيزفون، ناردين.	
- بعض الخليطات الواجب تَناوُبُها:	
١) ناردين١	
رِغْي الحمام المَخْزَنيّ وغي الحمام المَخْزَنيّ	
مَلِيسَّةمَلِيسَّة	٣١.

ه غ	4	٠.							 								 	 	 	 				قة	رر	, .	ف	וֹן	أم	
ه غ	٠	١.		. ,					 	٠									 ٠.	 	٠.						يقا	لون	بَه	
٥غ	•					•											 	 		 								نع	نع	
١غ	٠		٠														 						(;	,	نش	5)	يّة	اط	رِب	
ەغ																										_	_			(٢
٥غ																														
٥غ																														
۳غ																											ت	٠	أب	
۱غ																								•				ب		
١غ																														
۱غ																								ن	نَڌِ	ن		_اس		
٥غ																													_	(٣
٥غ																														
٥غ																					(ر.	.و					جا		
۱غ																								•				ب		
٥غ																												_		
۱غ																												وك		
۱غ																							(<u>ā</u>					باط		
ه غ																														({
٥غ																													_	
٥غ																														
١غ																													_	
۵غ س																												,		
۳غ																														
١غ	٠	•	٠.	•			 						٠.					 		 			. (ڹڹ	ن	رن	ىيو	راس	فر	

يُؤخَذ ٥٠ غرامًا من الخليط لمقدار ليتر ونصف من الماء، يُغلى حتّى تُصبح الكمِّيَّة ليترًا واحدًا. ثَلاثة فناجين في اليوم.

آلام عَصَبِيَّة وأَلَمُ النَّسا، أَلَمُ العَصَبِ الوَركيّ

18- Névralgies et sciatique (F) Neuralgia and sciatica (E)

(راجع كذلك روماتيزم في هذا المُلحَق): أكُونيت، شقار الفصح، بابونج رومانيّ، قِنَّب هنديّ، أَقْتَى عُنْقُوديَّة، ملعى، كَرْدَمانَة، أَرطاة أَنيقة، هوانغ نان، عَشْقَة، نعنع، حندقوق، خردل، صعتر، پاريرا براڤا، خشخاش مُنوِّم، زعتر مَدّاد، داتورة شائكة، تربنتين، عراوة، رعي الحمام المخزنيّ.

- لَزْقات ورق ملفوف.
- مرهم سِتَ الحُسُن: ١٠٠ غرام شحم حيوان، مستخلص ستَ الحُسُن ٥٠ غرامًا.
 - تَمسيد بزيت البابونق أو زيت الداذي.
 - مُعالَجة بوخز الإبَر.

19- Névralgies dentaires (F) Dentalgia, Dental neuralgia (E)

عُصابات سِنْيَة، أَلَم عَصَب السِنّ

راجع إِسْنان، مجموعة الأسنان Dentition في المُعجَم الرابع صفحة ٢٩٢.

20- Névralgies faciales (F) Facial neuralgia (E)

آلام عَصَبيَّة وَجُهِيَّة، عُصابات وَجُهيَّة

أكونيت، بابونَق، نعنع، داتُورة شائكة. إلى عُصابات العَصَب المُثلَّث نضيف: أَرْطاة أنيقة، رعى الحمام المَخْزَنيّ.

21- Névrites (F) Neuritis (E)

النيهاب العصب

أسبيرولة عطرة، نعنع، زعتر، رِعي الحمام المَخزَنيّ.

- علاجات طِبْيّة.

22- Obésité (F) Obesity (E)

بَدانَة، سِمْنَة، ثُلَن

غافَث غُولاني، كمالِيَة، ألْغ بحري، كاكَنْج، جَلْهَم، عِنب الدُّبّ، غاليون أصفر، كاراغاهِين، جزر، رُكّة، سُورنجان، فَوْقَس، فَراسيون أبيض، فَقُوس الحَمير، ذَنَب الخَيل، فَوْقَس حُويصلّى، كرمة حمراء.

- الموادّ المُسهلة القَويَّة النَّباتيَّة.
 - ٣١٢ الأنواع النَّباتيَّة المُبوِّلة.

- نُقاعة الماتي تُفَرمِل الشَّهيَّة إذا أُخِذت قبل الوجبات بربع ساعة. خَليطات من:

	فليطات من:
١٠	١) عِنَب الدُّبّ
۱۰.	كمالية
٠٠٠	بَيلسان (جذور)
٠٠٠	غاليون أصفر
٠٠٠	شِبْرِق (جذور)
	بَتُولا (ورق)
٠٠٠	۲) بَیْلسان (جذور)
٠٠٠	ذَنَب الخَيْل
١٠	تُرُنْشاه (أزهار)
١٠	شَيْلَك (ورق)
١٠	كَمالِيَة
١٠٠	بَتُولا (ورق)
تر ماء يُغلى ويُؤخَذ منه ثلاثة فناجين يوميًّا.	نقيع ٤٠ غرامًا من الخليط في ليا
	- - خَليطات أخرى:
٠٠٠	
غ	•
غ	۔ سَنا (ثمار)
هغ	شَرونة
هغ	شيح
١٠	شوس
هغ	مَريميَّة
هغ	كَرْمَة حمراء
هغ	هَمامَليس
<u></u>	لُصيقى

414

نقيع مِلعقة كبيرة من الخليط في مقدار فنجان ماء يُغلى دقيقتين، يُغطّى ربع ساعة ويُؤخَذ منه فنجانان في اليوم.

٢) فَوْقَس حُويْصَليّ
 ٢٠ نَبْق پُورشيانا
 ١٠ أنيسون أخضر

تُغلى الكمِّية خمس دقائق في ليتر ماء. يُؤخَذ في يَومين. مَرّة كلّ أسبوع.

- لَصُوق ضدّ التهاب النَّسيج الخلويّ: فَوْقَس حُوَيْصليّ مع نُخالة. نطبخ لدقائق قليلة في ماءٍ مُمَلَّح بالملح البَحريّ. نحتفظ باللَّصُوق عِدَّة ساعات.

- حَمّامات من:

خَلَنْج (أزهار)، عَرْعَر (ثمار)، صَفْصاف (قشور)، عَراوة، زعتر مَدّاد. خمسون غرامًا من كلّ نبات. نأخذ من الخليط خمس قَبضات (كمشات) في كيس قماش نَغليه في ليتري ماء. نضيفه إلى ماء الحمّام. حَمّامان في الأسبوع.

- حَمَّامات بُخار، رياضة تَنَفُّسيَّة، رياضة جَسديَّة يَوميَّة مُعتدِلة.

23- Œdèmes (F) Œdema, Edema (E)

أُوْدِيْما، أُوْذِيْما

أرضي شَوكي، بِيغينيان، بَتُولا، فاشِرة، كرز، حنظل، قِمعيَّة، وَزّال (أوروبِّيّ)، عرعر، لَبْلاب كبير، جَلَبَة، لُصَيقي، ذرة صفراء، فَقُوس الحمير، نَبْق، بَصَل، شاي جاوا، آذان الفأر، سَقَمونيا، إِشْقيل، ستروفَتْتُوس، بَيْلسان.

- المُراجَعة الطُّبِّيَّة ضروريَّة.

24- Oligurie (F) Oliguria (E)

نزَارَةُ البَوْل، شُحُّ البَوْل

- مُراجَعة الطَّبيب.
- كَرَفْس (أمراض قَلبِيَّة، حالات حُمِّيَّة)، كاكَنْج، هليون (نزارات بَوْل عند مُصابي القَلْب)، بَتُولا، حِمْحِم، شِبرِق، عِنَب الدُّب، خَلَنْج، كشمِش، غاليون أصفر، كرز، شوكة مُباركة، نَجيل، زَهر النَّسْرين، برباريس، شمرة، مُرّان، فُوَّة، وَزَال (أوروبِّيّ)، عرعر، لَبْسانَة، خُزامى، أَنْجُذان رُوميّ، ذُرة صفراء، مرغريت، نعنع، بَصَل، شاي جاوا، شُبُهان، أنواع قرصعنَّة، حشيشة الزُّجاج، بنفسج برِّيّ، بقدونس، سَفَنْدَر، آذان الفأر، إتجاص، تقاح، ذنب الخيل، قُوقاع مُستَدير الورق، ملكة المروج، نَدى البَحْر، قَصَب المكانِس، إيكر، مريميَّة، إشْقيل، زعتر مَدّاد، قضيب الذَّهب، بَيْلَسان، عراوة، أريغارون كندا، فيرونيكة.

- لِفْت، كُرَّاث، هِنْدَب، بندورة، كرز، كشمش، درَّاق، إجَّاص، عنب.

- نبيذ تروشُو

نمرث الكلّ لمدَّة ١٥ يومًا في مزيج من مقدار ليتر نبيذ أبيض مع نصف ليتر من الكحول. نُمرِّر ونعصر. عندها نضيف ٢٠٠ غرام من أستات البوتاس. نُصفيّ. يُؤخَذ مِلعقة إلى ثلاث ملاعق كبيرة في اليوم.

- كمادات ساخنة من:

خُبّازة (ورق)، مريميَّة (ورق)، لَوِيزة، بمقادير مُتساوِية. قبضة (كمشة) من كلّ نبات في ليتر ماء يُغلى ٥ دقائق. كمادات توضع على الأماكن الحَقُويَّة.

- نَزارة البَوْل في حال أمراض الرِّئة، أو في حال الكريب: نَضع فوق الكلى بَصَلتين أو كرائتين نَيئتين ومهروسَتين.

- خليط من:

عِنبِ الدُّبِّ (ورق)
ذُنب الخيل
حشيشة الزُّجاج
مُرّان (ورق)٠٠٠٠
كشمش (ورق)٠٢غ
شوس (جذور)
نعنع (ورق)٠٢غ
جَلْهَم (قشور)١٠٠

يُؤخَذ ٣ ملاعق كبيرة من الخليط في نصف ليتر ماء يُغلى دقائق ويُغطّى عشر. يُؤخذ منه خلال الوجبات أو قدر المُراد خلال النّهار.

25- Ophtalmie (F) Ophthalmia (E)

الْتِهاب العَيْن، رَمَد

تُرُنْشاه، بُوصير أبيض، بابونج، سرفل، بَقلة الخَطاطيف، عُرْقُون، فرمبواز، عطر، خَسّ، خُبّازة، حندقوق، لُبّين المروج، جوز، بقدونس، لسان الحمل، ورد

أحمر، فرفارة.

- حَمَّامات للعين بماء مُملَّح بمقدار مِلعقة صغيرة في نصف ليتر ماء.

26- Orchite (F) Orchitis (E)

الْتِهاب الخُطْيَة، ذَات الخُطْيَة

الرَّاحَة. علاجات طبيّة.

27- Oreilles (F) Ear (E)

أُذُن، وَجَع الأُذُن

- راجع طنين الأُذُن Bourdonnements (في المُعجَم الثالث صفحة ٢٨٩).

- وَجَع الأُذُن Ear - ache: ثُوم، بصل، بندق، بقدونس.

28- Otites (F) Otitis (E)

التهاب الأذن

عِلاجات طبيّة.

29- Oxyures (F) Oxyuriasis, Oxyuria (E)

أَقْصُورِيَّة، داء حادّات الذَّيْل

أَبْسَنت، ثوم، قَيصوم، بَلْسَميَّة، ملفوف، جَنْطيانا، لُصَيقى، بابونج أقرع، غِرْديب، قَيصوم جَبلتي، سَمَن كُونْترا (أي بزور ضدّ الدّود)، حشيشة الشّفاء.

- نُقاعَة مِلعقة صغيرة من الخليط التالي، في مقدار فنجان ماء غالي يُغطّى عشر دقائق. تُؤخَذ النُّقاعة لثمانية أيّام في بدء الهلال، وثمانية أيّام عند تمام البَدْر، صباحًا ومساءً للبالغ، ومساءً فقط للأولاد:

 طُحُلُب کُورسیکا
 ۱۰

 یانسون
 ۲۰

 نعنع (ورق)
 ۲۰

 زعتر (رؤوس مُزهِرة)
 ۱۰

 حشیشة الدُّود (أزهار)
 ۱۰

 أبسنت (رؤوس مُزهِرة)
 ۱۰

 سَرْخَس ذكر (ریزوم)
 ۱۰

 سَنْتُونین (بزور)
 ۲۰

 یُنْصَح بهذه الوصفة أیضًا ضدّ الصَّفَر.
 ۲۰

- حُقن شَرجيَّة بالماء المُملَّح.

۲۱۳

تُؤخَذ النَّباتات المُنقِّية كالأرقطيون وقُرّة العَين. . واليودورات.

31- Palpitation (F) Palpitation (E)

خَفَقان، الْحَتِلاج

إِرْثِد، زعرور، فَراسيون، قنطاريون، كرز، غاركَرزِيّ، نعنع، زنبق الوادي، برتقال (ورق)، آلامِيَّة، ناردين (جذور).

- نُقاعَة أسپَرولة، بالتَّناوب مع ٢٠ نقطة من صبغة الزُّعرور الكحوليَّة أو كحولتور النَّاردين المُثبَّتة، أو كحولتور الفَراسيون.

32- Paludisme (F) Paludism, Malaria (E)

بُرَداء، مَلاريا

بابونَج، جَنْطيانا، عَبّاد الشَّمس، باذَوَرْد، نرجس، وِنكا، هِنْدَب، كَنكينا (خمر الكنكينا، راجع فَقْر الدَّم في المُعجَم الثالث صفحة ٢٨١).

- شولفات الكينا ٠,٦٠ إلى ٢ غرامين في اليوم.
 - خلال النُّوبات، نَقيع من:

ور)	صَفْصاف (قش
٠٣٠	بَتُولا (قشور)
٠٣٠	بَهْشِيَّة (ورق)

الكُلِّ في ليتري ماء يُغْلَيان حتّى إنقاص النُّصف. فناجين صغيرة كلِّ ساعتين.

- خَليطات من:

٥غ)	•.	•		 			 																J	اف	عب	ف	ب	(١
۲غ		• .			 																		يّة	بو		باء	نْدَ	هِا		
۲غ		• .			 									. ,									. 1	۽	لم	11	ﯩﻠ	نَهُ		
٥غ)							 																	J	نت	<u>_</u>	أب		
۱غ	1	• .						 																		ن	ź	فَيْ		
٥غ) (• .		 -		•		 				, ,					 				. (ر)	٠	• :	;)	>	وا	بذ		
۱غ	i '	• .						 									 							ن	بو	ري	طا	قنا	(۲
۲غ	,	• .						 		٠.							 		٠.			ي	ع	را	١١	٠	يس,	ک		
١غ	, ,	• .						 									 					۲.	5 4	يُ	31	ية		ءُ		

بَهْشِيَّة (ورق)

ناردين

بَتُولا (قشور)

بَتُولا (قشور)

يُؤخَذ منهما، أو من أيّ منهما، فنجان أو اثنان في اليوم.

33- Panaris (F) Panaris (E)

جزر، ملفوف، قرّة العين، فول، لفت، بَصَل، كشمش، عنب. راجع خُراج، دُمَّل Abcès في المُعجَم الثالث صفحة ٢٧٩.

وَرَم خُلَيْمِيّ، خُلَيْمُوم (E) Papillomes (F) Papilloma (E)

بَقْلَة الخطاطيف، عَفْصِيَّة أي تُويا.

داچس، داڅوس

غَلَل، فالِج 35- Paralysies (F) Paralysis (E)

(عَواقب الشَّلل): خَلَنْج، مِلْعَقيَّة، فول إنياس، هوانغ نان، جوز القَي، ستركنين، ملفوف. حَمَّامات بَحريَّة. في الشَلَل المُرَعِّش: زَهرة عُطاس، ندى البحر، ناردين (جذور).

36- Paupières (F) Eyelid, Blepharon (E)

التهاب الجُفون: راجع سُلاق Blépharite في المُعجَم الثالث صفحة ٢٨٨.

37- Parkinson (F) Parkinsonism (E)

سِتّ الحُسْن، شَوْكران كبير، بَنْج، ثَلْثان، داتُورة شائكة.

38- Peau (F) Skin (E) بَشَرة، جِلْد، إِهاب

إصابات جِلديَّة، أَمْراض جِلْديَّة: حَشيشة الثُّوم، أَرْقطيون، بَتُولا، حِمْحِم، بَقْس، مشط الرَّاعي أي شَوْك الدُّرَاج، سُعادى، قنطاريون كبير، هندباء بَرِّيَّة، حامض، مِلْعَقِيَّة، قُرَّة العَيْن، حُلوة مُرَّة، شاهترج، غاياك: (٨٠ غرامًا من الخشب في ليتر ماء يُغلى)، قطران، عُشبة الفُقراء، أنجذان روميّ، خُبازة، نَفَل الماء، أفانِيَة أي مَغْد، دَرْدار، حُمَّيض، بَنَفْسَج الثَّالوث، حَوْر، صنوبر، هِنْدَب، فشاغ، صابُونيَّة، جَرَبيَّة، خَنازيريَّة، آذريون، بَيْلَسان، فرفارة.

- سِلْق، شیکوریة برِّیَّة، قُرَّة العین، بَصَل، حُمّاض، هِنْدَب، سَلْسَفیل، فریز، نندق.

- خليط من:

	٠٢غ	بنفسج الثَّالوث (أزهار)
	 	شاهترج
	٥غ	أسبرولة عطريَّة
	٥غ	هِنْدَبِ (ورق)
	٥غ	سَنَى (ثمار)
	٥غ	ملكة المروج
وم.	ان ماء غالٍ. يُؤخذ ٢ إلى ٣ فناجين في الي	نُقاعة مِلعقة كبيرة لكلّ فنجا

- خليط من:

شراب الشاهترج في الشاهترج بيكربونات الصود١٢٠غ نُؤخذ منه ملْعَقة كسرة، صياحًا ومساءً.

- من الخارج: غَسيل مُتكرِّر بنقيع أوراق المريميَّة، أو قشور السِّنديان، أو قشور البَتُولا. مَسْح بزيت الكاد. بَشَرة مُدهِنة: سرفل، ملفوف، خيار، حامض. بشرة

جافّة: شَمّام.

39- Pédiculose (F) Pediculosis (E)

قُمال، داءُ القَمْل، قَمَلُ

غرْدىك، تركنتين، زَعْتر.

40- Péricardites (F) Pericarditis (E)

الْتِهَابُ التَّأْمُورِ، الشِّغاف

أرضى شوكى، بيغينيان، بَتُولا، فاشِرة، كرز، حنظل، قمعيَّة، وَزَّال، عرعر، لبلاب كبير، عُشية الفقراء، جَلَية، ذرة صفراء، فَقُوسِ الحمير، نَبْق، بَصَل، شاي جاوا، آذان الفأر، سَقَمونيا، إشقيل، ستروفَنْتُوس، بَيلسان.

- علاجات طنيّة.

41- Péritonite (F) Peritonitis (E)

النيهاب الصفاق

أو النهاب الخِلْب السُّلِّي يستوجب العِلاج الطُّبِّي. عُشبة الفُقَراء.

42- Pertes blanches (F) Leucorrhea, Leukorrh(o)ea (E)

تَرِيَّة، ثُرٌّ ٱبْيَض، سَيَلان مَهْبِليّ ٱبْيَض

أخيليا أمّ ألف ورقة، غافَث غُولانيّ، كماليّة، عُشبة القوى، أشهيرولة، راسَن، أنجبار، كيس الراعي، سنديان، سرو، بربريس، أوكاليتُوس، حلباء، عرعر، جَنطيانا، طُوقَريون، رمّان، هَدال، همامليس، جُنجُل، هِدْرَسْتِس، كاواكاوا، لاميون أبيض، داذي مُخرَّم، جوز، لسان الحمل، فجل الخيل، عقيدة، نَدى البحر، عوسج، ورد أحمر، فَرَنْدَل، سَكَب، مَريميَّة، جَرَبِيَّة، حشيشة الدود، تربنين، زعتر، عُشبة القوى الزَّاحِفة.

- بقدونس، فريز؛ حُقن من ٤ ملاعق كبيرة من الطِّين في ليتر ماء فاتر. مُراجعة الطَّس.

سَيَلان أَخْمَر 43- Pertes rouges (F)

راجع نَزْف، إدماء وافِر (في المُعجَم السادس، صفحة ٢٨٨). التَّشخيص الطَّبِّي ضَروريِّ. عِنب الدُّبِ، سنديان، هَدال، لاميون أبيض، فَرَنْدَل، جَرَبيَّة.

44- Pertes séminales (F)

سِتّ الحُسْن، جيوم مُبارَك، أَرْغُوت الشَّيلَم، فول إِنْياس، جُنْجُل، خَسّ، مردكوش، نُوفَر، ندى البحر، صَفصاف أبيض، مريميَّة.

- برومور البوتاسيوم، من ٢ إلى ٤ غرامات في اليوم.

دُغام، الْتِهابِ البُلْعُوم كلا Pharyngite (F) Pharyngitis (E)

غافَث غُولاني، أرِيسيمُوم، خُبَّيزة، لِسان الحَمل، عَوْسَج، قِمام آسِيّ.

الْتِهابِ الوَرِيْد (F) Phlebitis (E)

يانسون، سَلبين مريم، سَنْفيتُون، سَرو، شاهترج، همامَليس، كستنا الخيل، داذي مُخرَّم، بَنَفْسَج الثالوث، لسان الحَمَل.

- استشارة الطَّبيب ضروريَّة.

قَمَل، تَقَمُّل، داء القَمْل (Phtyriasis (E)

غِرْديب أي حشيشة الحُمّى، تربَنْتين.

48- Pieds sensibles (F) قَدَم حَسّاس

خيار، حامض.

24.

نَحْل، زنابر، قَمْل، بَقّ، بَرْغَش، إلخ. نَفرك بالثّوم، ورق الأرقطيون، الخُزامى، البقدونس، ورق لسان الحمل، الكرّاث، البصل، المليسّة، النّعنع، ندى البحر، مريميّة، زعتر.

- لَصُوقات من السَّرفل، أو البقدونس، ورق الكشمش المهروس مع النَّبيذ الأبيض.
- كمادات بواسطة ماء مَغليّ شديد الملوحة (كمشة من الملح البحريّ في مقدار نصف كوب ماء)، أو بواسطة خَلّ أو نُشادِر مُخَفَّف بالماء.

- نَزْع إبرة الحشرة إذا كانت لم تزل عالقة.

50- Piqûre d'orties (F) Nettle's bites (E)

وَخْزِ القُرَّيْص

خُمَّيْض: Oseille

51- Pissement de sang (F) Hematuria (E)

بَوْل دَمَوِيّ

راجع بَيْلَة دَمُويَّة Hématurie في المُعجَم السادس صفحة ٢٨٨.

52- Plaies (F) Wound (E)

جُرْح، كَلْم

غافَث غُولانيّ، أرقطيون، بَقْس، سنديان، ملفوف، سَنْفِيتُون، سرو، زَهر ورد السّياج، ورق العطر، خَلُود كبير، زنبق، حَنْدَقوق، نعنع، داذي مُخَرَّم، فَقُوس الحمير، لسان الحَمَل، عقيدة، ندى البحر، قضيب الذَّهب، آذريون، زعتر، زيزفون، فرفارة.

- ماء الشَّرْتَرِيِّين: نَهرس أزهار البَلْسَميَّة قَليلًا ونَضعها في قَنَينة نقفلها ونتركها في الشَّمس. يَتحوَّل قسمٌ كبير من الأزهار إلى زيت. نستعمله كمادات.

- ماءٌ شافِ للجُرْح: eau vulnéraire

ماء يُستعمَل في لَأُم الجروح والقُرحات، نُحضَّره بأخذ ١٢٠ غرامًا من كلِّ من النَّباتات التَّالية: خُزامي (أزهار)، فَيجن، شومر، أنجليك، حشيشة الشَّفاء، أبْسَنت، زعتر، مردكوش، ندى البحر، زعتر مَدّاد، مَليسَّة، مَريميَّة، حَبَق، نضع الكُلِّ في مقدار ثمانية ليترات ماء. نمرث طوال ٢٤ ساعة، ونُقَطِّر حتى الحصول على ليتر واحد من الماء المُقَطِّر. الهدفُ من هذه الوصفة هي الإشارة إلى التَّذكير بمعارف الأسلاف.

- طین Argile

- جزر، حامض، قمام آسى، تفّاح.

جُروح واهِنَة، أو غَنْغَرينيَّة، أو سَرَطانيَّة

53- Plaies atones, ou gangréneuses, ou cancéreuses (F)

غافَث غُولانيّ، ثُوميَّة، بَطُونيقا، بَقْس، جزر، شوكة مُبارَكة، ملفوف، قارُ الفَحْم coaltar (للقروح المُتَقَيِّحة)، سَنْفيتُون، زهر ورد السِّياج، عَشْقَة، زنبق، حندقوق، أمّ ألف ورقة، داذي مُخرَّم، لُبَين المروج، جوز، صعتر، لسان الحمل، ذنب الخيل، عقيدة، نَدى البحر، عوسج، ورد أحمر (أوروبِّيّ)، صابُونيَّة، مريميَّة، زعتر مَدّاد، قضيب الذَّهب، آذريون، بَيلسان، حشيشة الشِّفاء، زعتر، ياسم، فَرفارة.

- قروح سَرطانيَّة: نقيع مَغليِّ من الشَّوكة المُبارَكة أو الآذريون في غسيل مُتكرِّر أو كمادات.

- جزر، حامض، قمام آست، خوخ.

54- Pléthore (F) Plethora (E)

كَظَّة الدَّم، كظاظُ الدَّم، تَكَظَّ

كمالية، رِجْل الأوز، أرضي شوكي، جَيوم مُبارَك، كشمش، ثَلثان ثلثلان، شاهترج، زيزفون، عشبة القوى، زعرور.

ذَاتُ الجَنْب، الْتِهابُ الجَنبَة، جُناب، برْسام 55- Pleurésies (F) Pleurisy (E)

أرضي شوكي، بيغينيان، بَتُولا، فاشِرة، بَقْس (خشب)، كرز، شوكة مُبارَكة، حنظل، خشخاش منثور، ديجيتال، ثلثان ثلثلان، وزال أوروبًا، عرعر، لبلاب كبير، عُشبة الفقراء، لُصَيقى، زوفا، جَلَبَة، ذرة صفراء، فَقُوس الحمير، نبق، بَصَل، شاي جاوا، بليس، آذان الفأر، سَقَمونيا، إشْقيل، ستروفَنْتُوس، بيلسان، حشيشة الشَّفاء، زيزفون.

- ملفوف، كرّاث. علاجات طبّيّة.

56- Pleurite (F) Pleuritis, Pleurisy (E)

برسام ناشِف

فَرْبيون، كَرْدَمانَة، خردل، فجل الخيل.

- عِلاجات طبيَّة.

57- Pneumonie (F) Pneumonia (E)

ذاتُ الرُّئة، الْتِهاب الرُّئة

بُوصير أبيض، حِمْحِم، شوكة مُبارَكة، ثلثان ثلثلان، وزال أوروبًا، عَيْنُون، بَهْشِيَّة (ورق يُغلى)، خردل، ذنب الخيل، زُغْدَة، فجل الخيل، زهرة الجَرَب، بنفسج.

- المُعَرِّقات كما في الجُناب. عِلاجات طبِّيَّة. مُوٰثَة، بروستات 58- Prostate (F) Prostateria (E) تَضَخُّم أو احتقان المُؤثَّة. تَشخيص طبِّق. - خَلَنْج، عِنَب الدُّبّ، كشمش، سرو، هَدال، همامَليس، هِدْرَسْتُس، كاواكاوا، قَسْطل الخَيْل، خُبّازة مَرجانيَّة، ياريرا براڤا، عَفْصيَّة. - في حال الخَمَج والنَّتانَة: عرعر (ثمار)، آس، صنوبر، عنب الدُّبّ. - مُناوَية نَقيعات الخَليطات التّالية: ١) عِنْ الدُّتّ، بَتُولًا (قشور)، كستنا الخيل، جوز (ورق). ٢) فُول (زهر)، كُنْباث، عُشبة القوى، سرو، خَلَنْج. ٣) بَرْبَرِيس، كيس الراعى، كُنباث، ذرة (سِمات)، صابونيّة. ٤) عُشبة القوى، بُوشو Barosma، بنفسج، هِدْراسْتِس، فلفل الماء. الأعشاب بكَمِّيّات مُتساوية. يُؤخّذ من كلّ مجموعة مقدار ٣٠ غرامًا في ليتر ماء يُغلى دقبقَتين، ويُغطِّي عشرًا، ويُؤخذ ٣ إلى ٤ فناجين في اليوم. حُكاك، أكال، تَهَرُّش 59- Prurigo (F) Prurigo (E) راجع بَشَرة، جِلد Peau في هذا المُلحَق. حِكَّة، هُراش، حِكَّة شَديدة 60- Prurits (F) Pruritus (E) مرهم من: شمع أبيضشمع أبيض شحم حيوان٠٠٠٠ - حكَّة شَرجيَّة وفَرْجيَّة : Ani, vulvae كَمالية، يُوصِير أبيض، مَغْد، فَرَنْدَل، بايُونَق. صُداف، صَدَفيَّة، داءُ الصَّدَف 61- Psoriasis (F) Psoriasis (E) بَتُولاً، قطران نَباتتي، بنفسج الثَّالوث، صابُونيَّة. - مرهم من:

قطران مُنَقَّمقطران مُنَقَّم

277

شحم حيوان٠٠٠....

62- Psychasthénie (F) Psychasthenia (E) نَفْه، وَهَن نَفْسيّ، نَهَك نَفْسانيّ

أبسنت، أمّ ألف ورقة، فَراسيون، حبق، قِنَّب هِنْديّ، إِيبوغا، مردكوش، ماتي، جوز القَيء، مَريميَّة، زعتر مَدّاد، زعتر، زيزفون، ناردين.

63- Puces, Punaises (F) Flea, Bug (E) قَمْل، بَقّ، بُرْغُوث

راجع حَشَرات insectes في المُعجَم السادس صفحة ٢٩٦.

النهاب الحُوَيْضَة والكِلْيَة (E) Pyélonéphrites (F) Pyelonephritis (E)

قطلب، راسَن، بيغينيان، خَلَنْج، دِيُوسْمَه الشَّبَق، شِبْرق، عِنب الدُّبّ، كرز، نَجيل، شومر، فول، قطران نَباتتي، ذرة صفراء، خبّازة أرجوانيَّة، قِمام آسي، حور، إجّاص، قضيب الذَّهب، تربنتين.

- عِلاجات طبيّة.

65- Pyrosis (F) Pyrosis, Hearthurn (E)

حِرَّة، خُرْقة المَعِدة

كُساح، رَخَد

فحم نباتي، طبشور، مغنازيا محروقة.

66- Rachitisme (F) Rachitis, Rickets (E)

فُوَّة، نَفَل الماء، جوز، ذنب الخيل، نَدى البحر، زعتر.

- شراب لسان الحَمَل.
- حَمّامات مُملَّحة، حَمّامات إيكر كلّ يومين أو ثلاث، حَمّامات من إبر الصَّنوبر التي تُغلى ساعتين. تُكرَّر الحمّامات، التي تدوم ١٥ دقيقة، طوال شهرين.
- حَمّامات من ٥٠٠ غرام مريميَّة في ليتري ماء يُغليان ربع ساعة، ونضيف الماء إلى ماء الحَمّام.
- حَمَّامات من ٣٠٠ غرام أوراق جوز، تُغلى ربع ساعة في ليتري ماء نضيفهما إلى الحَمَّام مع كيلوغرام واحد من الملح البحريّ.
- حَمَّامات من ٥٠٠ غرام من الفَوْقَس الحُوَيصليّ في ثلاثة أو أربعة ليترات ماء الخن. نضيفها إلى ماء الحَمَّام مع مقدار ٥٠٠ غرام من الملح البحريّ.

67- Règles insuffisantes (F) Insufficient periods, Scanty menses (E)

طَمْتْ غَير كاف، حَيْض غير كافٍ

ثوم، أَبْسَنت، أمّ ألف ورقة، ألْوَة، شيح، راسَن، بابونج رومانيّ، كَبُوسين، جزر، كَراويا، خَرْبَق أسود، شومر، شاهترج، خُزامى، أنجذان روميّ، باذَوَرْد، مَليسّة، ثَفَل الماء، بقدونس، ندى البحر، فَيْجَن، زعفران، مَريميَّة، أَرْغُوت الشَّيْلَم، سَنَى مَكِّيّ، شَرونة يَعْقُوبِيَّة، زعتر مَدّاد، آذريون، سَطاقِس، حشيشة الشَّفاء، زعتر، يُوهِمْب.

- حَمَّامات أَرْجُل مُخَرِّدَلَة.

طَمْتْ غير مُنْتَظَم، حَيْض غير مُنْتَظَم ، حَيْض غير مُنْتَظَم

خليط من:

 لاميون أبيض
 • ٤٠

 جيوم مُبارَك
 • ٢٠

 عشبة القوى
 • ٢٠

 كمالية
 • ٢٠

 نعنع
 • ٢٠

مِلعقة كبيرة من الخليط في فنجان ماء غالٍ يُغطّى، ويُؤخذ ٣ أو ٤ فناجين يوميًّا.

69- Règles douloureuses (F) Painful menses (E) مُؤلِم، حَيْض مُؤلِم، خَيْض مُؤلِم،

أَبْسَنْت، شقّار الفصح، أنجليك، يانسون، شيح، قيصوم، بابونج، أَقْتَى عُنقُوديّة، نبات القُطن، كَمّون، بربريس، شاهترج، أخيليا عطرة، عرعر، هَمامَليس، أنجذان روميّ، يَبْرُوح، فَراسيون، بابونق، نعنع، نَفَل الماء، أمّ ألف ورقة، أفيون، صعتر، عُشبة القوى، پاريرا براڤا، بقدونس، ندى البحر، فيجن، زعفران، مريميَّة، صفصاف أبيض، شرونة يَعقوبيَّة، زعتر مَدّاد، آذريون، سَطاقِس، أريغارون كندا، رِباطيَّة، كرمة حمراء، يُوهِمْب.

70- Reins (F) Kidney, Ren (E)

كِلَى، كُلْوَة، كُلْيَة

- راجع إلتهاب الكُلْيَة Néphrites في هذا المُلحَق.
- بَتُولا، حِمْحِم، خَلَنْج، شِبْرِق، عِنب الدُّبّ، كرز، نَجيل، مُرّان، عرعر، خُزامى، ذرة صفراء، داذي مُخَرَّم، بَيْلَسان، زيزفون (الشَّكير).

- كرفس، بَصَل، كُرّاث، سَلْسَفيل، بندورة، كرز، فريز، أكي دنيا.

71- Rétention d'urines (F) Retention of urine (E)

اختِقان البَوْل، أُسْر، اختِباس البَوْل

- عِنَبِ الدُّبِّ، فُوَّة، عقَّيدة أي بَطْباط الطُّيور.
- لَصُوقات من الملفوف على أَسْفَل البَطن وعلى العِجَان Périnée.
 - استشارة الطّبيب ضروريّة ومُستعجِلة.

روماتيزم، رَثْيَة، داءُ الْمَفاصِل (E) Rhumatismes (F) Rheumatism (E

كاكَنْج، أرضي شوكي، أرْقِطيون، تُرُنْشاه، بَتُولا، حِمْحِم، خَلَنْج، شِبْرِق، بَقْس، غاليون أصفر، كشمش، شوكة مُباركة، هِندباء بَرِّيَّة، نَجيل، سُعادَى، حلوة مُرَّة، مُرّان، شاهترج، غايّاك، وزال أوروبًا، عرعر، بَهْشِيَّة، ذرة صفراء، مردكوش، كستناء الخيل، خبّازة، حندقوق، داذي مُخَرَّم، نَفَل الماء، صعتر، دردار، قُرَّيص، حُمَّيْض، بنفسج بَرِّي، حور، صنوبر، هِنْدَب، تفّاح، ذنب الخيل، فجل الخيل، ملكة المروج، ندى البحر، عوسَج، فشاغ، صابُونيَّة، مريميَّة، سَرْخَس مَخْزَنيّ، شرونة، بَيْلَسان، زعتر.

- ثوم، جزر، ملفوف، طَرخون، شومر، فول، بَصَل، بقدونس، کراث، تفّاح، بطاطا، فجل، سَلْسَفیل، بندورة، قلقاس، کرز، حامض، شَیْلَك، فرمبواز، کشمش، إجاص، خوخ، عِنَب.

- خليطات من:

٠٥٠	١) شِبْرِق (جذور)
٤٣٠	قرَّيص (جذور)
٤٣٠	بَتُولًا (ورق)
٠٠٠	عنب الدُّبِ
	ورد السِّياج (ثمار)
٠٣٠	٢) أمّ ألف ورقة
٠٠٠٠	إيكر
۳۰	بَتُولًا (ورق)
÷0•	عرعو (ثمار)

۱غ	1	٠	٠					 									 		((ور	ذ	ج)	ن	نوا	فِي	ش		
م غ	٠	•,						 									 										ں	<u>ة</u>) بَ	(Υ
م غ	٠ (• .						 				 					 										تر	زء		
م غ	، د	• .										 											ن)	رو	و)	ان	د مر		
ہ غ	، ر	٠.										 					 					(ت	يا ر	۰.	(سِ	ة (ر ذر		

الخَليطان الأَوَّلان في نقيع من ٤٠ غرامًا في ليتر ماء يُغلى ويُؤخذ منه ٣ أو ٤ فناجين في اليوم، بين الوجبات.

الخَليط الثالث يُؤخَذ منه ٤٠ غرامًا في ليتر ماء يُغلى ويُسكَب ساخنًا على ٢٠ غرامًا من ملكة المروج، تُغطّى ١٥ دقيقة. ثلاثة فناجين في اليوم.

تَتناوَب الخليطات.

- ضدّ آلام الرُّماتيزم: جذور السَّرخس الطازجة المُقطَّعة جَيِّدًا، تُوضَع في كيس صغير من القماش، يُوضع على الأماكن المُؤلِمة، أو نضع عليها لَصوقات من الملفوف. أو نضع الثوم أو البصل المهروس.

73- Rhume (toux) (F) Cold (E) زُکام، بَرْد، نَزْلة

غَافَت غُولاني، حِمْحِم، عُرْقُون، خُبَّيزة، خُبَّازة، حشيشة الرِّئة، بيلسان، فرفارة، زيوت دُهنيَّة عِطريَّة.

74- Rhume de cerveau (F) Head cold (E)

أكونيت، كمالية، سِتّ الحُسْن، حامض، عُرْقُون، مردكوش، نعنع، لسان الحَمَل، زُغْدَة الرَّبيع، بيلسان، زعتر.

- من الخارج: بَلْسَم الپيرو، بنجوان، أوكالِپْتُوس، خُزامى، نعنع، نِياوْلي، زعتر. بعض المُستحضَرات الصَّيدليّة تُسْتَنْشَق.

رَبُو، زُكام الجَفِيف 75- Rhume des foins (F) Hay fever (E)

راجع رَبُو Asthme في المُعجَم الثالث صفحة ٢٨٦.

76- Rides (F) Wrinkles (E) تَجاعِيد، غَضْن، غَضَن

سرفل (لُوسيونات)، نضع شرائح من الخيار على التَّجاعيد، ومن الشَّيْلَك، والمشمش، وعصير العنب.

	٥١غ	فُوَّة (جذور)
	٥١غ	شُوس (جذور)
	١٠	ئُش اغ
	٠٠١غ	ذنّب الخيل
	١٠	زعتر مَدّاد (رؤوس)
	١٠٤	سَنی مَکِّيّ (ورق)
	١٠٤	حِمْحِم (ورق)
	في مِقدار فنجان ماء يُغلى ٥ دقائق ويُغطَّى ربع	_
	اعة .	ساعة. فنجان قبل الوجبات بربع س
	82- Scarlatine (F) Scarlatina, Scarlet fever (E)	حُمَّى قِرْمِزيَّة، القِرْمِزيَّة
	جَم الخامس صفحة ٣٠٦: حِمْحِم. بَعد القرمزيَّة:	راجع حُمَّيَات طَفْحِيَّة في المُع قَضيب الذَّهَب.
	83- Sciatique (F) Sciatica (E)	عِرْقُ النَّسا، النَّسا، عَصَب وَرْكيّ
	لي هذا المُلحَق.	راجع أَلَم عَصَبيّ névralgies ف
	ي هذا المُلحَق. 84- Scorbut (F) Scorbutus, Scurvy (E)	راجع ألَم عَصَبيّ névralgies ف حَفَر، داءُ الحَفَر
	•	حَفَر، داءُ الحَفَر ثوم، بَرْبارَة أي جرجير البَرّ،
	على الرّاعي، كَتُوسين، حشيشة الملاعق، قرّة كيس الرّاعي، كَتُوسين، حشيشة الملاعق، قرّة من خُمَّيض، فجل الخيل، نَفَل الماء، ڤيرونيكا.	حَفَر، داءُ الحَفَر ثوم، بَرْبارَة أي جرجير البَرّ،
	على الرّاعي، كَتُوسين، حشيشة الملاعق، قرّة كيس الرّاعي، كَتُوسين، حشيشة الملاعق، قرّة من خُمَّيض، فجل الخيل، نَفَل الماء، ڤيرونيكا.	حَفَر، داءُ الحَفَر ثوم، بَرْبارَة أي جرجير البَرّ، العين، خَلُّود، فَراسيون، نَفَل الماء
	على الرّاعي، كَبُّوسين، حشيشة الملاعق، قرّة كيس الرّاعي، كَبُُوسين، حشيشة الملاعق، قرّة من حُمَّيض، فجل الخيل، نَفَل الماء، ڤيرونيكا.	حَفَر، داءُ الحَفَر ثوم، بَرْبارَة أي جرجير البَرّ، العين، خَلُود، فَراسيون، نَفَل الماء - جزر، لفت، بصل، بطاطا خَنازِيرِيَّة، خِنَّوْصِيَّة راجع فقر الدَّمّ anémie في ال
	84- Scorbut (F) Scorbutus, Scurvy (E) كيس الرّاعي، كَبُّوسين، حشيشة الملاعق، قرّة ه حُمَّيض، فجل الخيل، نَفَل الماء، ڤيرونيكا. بندورة. 85- Scrofule (F) Scrofula (E) مُعجَم الثالث صفحة ۲۸۱. قنطاريون، جَنطيانا، صنوبر، بنفسج بَرِّي، صابُونيّة، فَرْفارة.	حَفَر، داءُ الحَفَر ثوم، بَرْبارَة أي جرجير البَرّ، العين، خَلُود، فَراسيون، نَفَل الماء - جزر، لفت، بصل، بطاطا خَنازِيرِيَّة، خِنَّوْصِيَّة راجع فقر الدَّمّ anémie في ال
	84- Scorbut (F) Scorbutus, Scurvy (E) كيس الرّاعي، كَبُّوسين، حشيشة الملاعق، قرّة ه حُمَّيض، فجل الخيل، نَفَل الماء، ڤيرونيكا. بندورة. 85- Scrofule (F) Scrofula (E) مُعجَم الثالث صفحة ۲۸۱. قنطاريون، جَنطيانا، صنوبر، بنفسج بَرِّي، صابُونيّة، فَرُفارة. رفس، زعتر، جوز (ثمرة).	حَفَر، داءُ الحَفَر ثوم، بَرْبارَة أي جرجير البَرّ، العين، خَلُود، فَراسيون، نَفَل الماء - جزر، لفت، بصل، بطاطا خَنازِيرِيَّة، خِنَّوْصِيَّة راجع فقر الدَّمّ anémie في اللَّم عُنْجُل، نَفَل الماء، جوز (ورق)، جُنْجُل، نَفَل الماء، جوز (ورق)، - هليون، باذنجان، جزر، ك
	84- Scorbut (F) Scorbutus, Scurvy (E) كيس الرّاعي، كَبُّوسين، حشيشة الملاعق، قرّة ه حُمَّيض، فجل الخيل، نَفَل الماء، ڤيرونيكا. بندورة. 85- Scrofule (F) Scrofula (E) مُعجَم الثالث صفحة ۲۸۱. قنطاريون، جَنطيانا، صنوبر، بنفسج بَرِّي، صابُونيّة، فَرْفارة. برفس، زعتر، جوز (ثمرة).	حَفَر، داءُ الحَفَر ثوم، بَرْبارَة أي جرجير البَرّ، العين، خَلُود، فَراسيون، نَفَل الماء - جزر، لفت، بصل، بطاطا خَنازِيرِيَّة، خِنَوْصِيَّة راجع فقر الدَّمّ anémie في اللَّم عُنْجُل، نَفَل الماء، جوز (ورق)، جُنْجُل، نَفَل الماء، جوز (ورق)، - هليون، باذنجان، جزر، كا مراب من: نبيذ مالاغ
***	84- Scorbut (F) Scorbutus, Scurvy (E) كيس الرّاعي، كَبُّوسين، حشيشة الملاعق، قرّة ه حُمَّيض، فجل الخيل، نَفَل الماء، ڤيرونيكا. بندورة. 85- Scrofule (F) Scrofula (E) مُعجَم الثالث صفحة ۲۸۱. قنطاريون، جَنطيانا، صنوبر، بنفسج بَرِّي، صابُونيّة، فَرُفارة. رفس، زعتر، جوز (ثمرة).	حَفَر، داءُ الحَفَر ثوم، بَرْبارَة أي جرجير البَرّ، العين، خَلُود، فَراسيون، نَفَل الماء - جزر، لفت، بصل، بطاطا خَنازِيرِيَّة، خِنَّوْصِيَّة راجع فقر الدَّمّ anémie في اللَّم جُنْجُل، نَفَل الماء، جوز (ورق)، جُنْجُل، نَفَل الماء، جوز (ورق)، - هليون، باذنجان، جزر، كا مناب شراب من: نبيذ مالاغ شراب رَوَانْد

يُؤخَذ من هذا الشَّراب مِلعقة صغيرة في اليوم من عمر ستَّة أشهر إلى سنة، مِلعقتان صغيرتان من سنة إلى ستّ سنوات، ثلاث ملاعق صغيرة لمن هم فوق الستّ سنوات، مع الوجبات.

dala، مَتْ، سَيَلان دُهنيّ تَقَشُّريّ 86- Séborrhée (F) Seborrhea (E)

راجع شَعْر Cheveux في المُعجَم الثاني صفحة ٣٠٧.

87- Serpent (morsure) (F) Snake (bite) (E) (مُعْبَان، حَيَّة (لَدْغَة)

أرقطيون، خُزامي، لسان الحَمَل.

- مَصْل مُضادّ للسَّمّ.

- طبيب.

TT.

88- Sialorrhée (F) Sialorrhea, Salivation, Ptyalism (E) إِلْعَاب، رَوَالِيَّة، ثَرُّ اللَّعَاب اللَّعَابِ اللَّعَابِ اللَّعَابِ اللَّعَابِ اللَّعَابِ اللَّعَابِ اللَّعَابِ اللَّعَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَابِ اللَّهُ الل

89- Sinusite (F) Sinusitis (E) الْتِهَاتُ الجَيْب

راجع نُوَاط، خَبْطَة في هذا المُلحَق. أوكالبِتُوس، خُزَامَي، صنوبر، زعتر.

عَطَشُ المَرْضَى، ظَمَأُ المَرْضَى Soif (des malades) (F) Thirst (E)

حامض، فريز، فرمبواز، برتقال.

نُعاس، وَسَن 91- Somnolence (F) Somnolentia (E)

راجع كَبِد، مَعِدة، وغالبًا مُراجَعة الطَّبيب.

تَشَنُّج، شَنَج، تَقَلُّص 92- Spasmes (F) Spasm (E)

شُقّار، أنجليك، أنيسون، أسپرولة عطرة، زعرور، حبق، بابونج، جُنْجُل، خُزامى، مردكوش، حندقوق، مَليسَّة، أمّ ألف ورقة، برتقال (زهر)، صعتر، زُغدة الرَّبيع، ملكة المروج، ندى البحر، مَريميَّة، صفصاف، زعتر مَدّاد، زيزفون، ناردين.

- تَشَنُّج المَعِدة والأَمْعاء: إِرْثِد، فَراسيون، سِتّ الحُسْن، قطرم، شَوكران، بنج، غاركرزيّ، حُضَض أي عُرْقُد، يَبروح، مردكوش، خشخاش مُنوِّم، سُوس.

تَشَنُّج الأعضاء التَّناسُلِيَّة: أخيليا أمّ ألف ورقة.

سَيَلان مَنُوي، ثُرٌ مَنَوي Spermatorrhée (F) Spermatorrhea (E)

خَبَّيزة، الزَّعفران، المريميَّة.	– حَمَّامات للفم من العرعر، ال
غرامات لكلّ ١٠٠ غرام من الماء الفاتر.	- بُورات الصوديوم بمقدار ١٠
	- غسيل مُتكرِّر للفَم بواسطة:
) هغ	بَوْرَق (أو بُورات الصوديوم)
٥١غ	عَسَل مُتَورُّد
	ماء
95- Stomatites ulcéro- membraneuses (F) Ston	natitis ulceromembraous (E)
رْحيَ غِشائيّ	حُناك قَرْحِيّ غِشائيّ، الْتِهابُ الفَم القَرْ
يّ ومُصَفَّى من فروع العُلَّيق أو الفرمبواز، أو من أو الخُبّازة. بالإمكان أيضًا لَوْك هذه الأوراق	
. في الفَم .	– لَوْك وَرْد طازج والاحتفاظ به
96- Sueurs profuses (F) Profuse sweating (E)	عَرَق غَزير، رَشْح وافِر، تَعَرُّق
، الحُسْن، سِنديان (ورق)، أَرْغُوت الشَّيْلَم، ، صنوبر، ذنب الخيل، مريميَّة، داتورة شائكة.	
	- تَعَرُّق المسلولين: نقيع مريميًّ
	- تَعَرُّق لَيليّ: نقيع ذنب الخيل
راز، لِفْت.	- تَعَرُّق قليل، غير كافٍ: فرمبو
97- Surdité et Hypoacousie (F) Surditas, Surdi	ity; Hypoacousia, Hypoacusia (E)
	طَرَش، صَمَم وضعف السَّمَع
	- بَلْسَم يُحضَّر من:
٢٠غ	زيت زَيتون ساخِن
۳۱	فَيْجَن أي سَذاب

- راجع سَيَلان مَنويّ Perte séminale في هذا المُلحَق.

غافَث غُولاني، أنجبار، كوكا، خبَّيزة، صابُونيَّة، ياسَم.

94- Stomatites (F) Stomatitis (E)

٣

الْتِهاب الفَم، حُناك

بابُونَج أو بابونَقبابُونَج أو بابونَق

ننقع في الزَّيت عِدَّة أيام. نُصفِّي. عِدَّة نِقاط في الأذن، صباحًا ومساءً. وضع قطنة صغيرة في الأذن.

- عصير ملفوف مع عصير حامض، بمقادير مُتساوِية، في الأذن، صباحًا ومساءً، كما ورد أعلاه.
- خَليط من عصير الخَلُّود مع زيت اللَّوز الحلو، مقادير مُتساوِية. عِدَّة نقاط في الأذن صباحًا ومساءً.

- وَصْفَات قَديمة:

- ١) نَسْلُق الفاصولياء في قِدر (كسرولة)، ونَجعل البُخار يَدخل إلى المجرى السَّمعيّ في الأذن بواسطة قمع. نُداوم على ذلك ١٥ يومًا على الأكثر.
 - ٢) نَسْلُق نَبات الكَفْنَة في النَّبيذ. نُكَرِّر العَمَليَّة أعلاه.
- ٣) نَسْلُق المردكوش، أو الزَّعتر، أو الأبْسنت، أو النَّعنع في الخَلِّ. نُكَرِّر العَمَليَّة المذكورة أعلاه.

- نَضَع أوراق سَرْخَس خضراء في الأذن.

89- Surmenage (F) Surmenage (E)

إرهاق، إغياء، إجهاد

نَبيذ المريميَّة، نُحضُّره بمرث ١٠٠ غرام من ورق المريميَّة في ليتر نَبيذ لمدَّة ثمانية أيّام. يُؤخذ منه كأس أو كأسين بُوردو (٧٥ غرامًا) في اليوم. راجع وَهُن Asthénie في المُعجَم الثالث صفحة ٢٨٦. كأس بوردو توازي ٧٥ غرامًا.

مسارد/ Glossaries /مسارد

TT0	١- مَسرد عربتي١
To {	٧- مَسرد إنجليزيّ
~04	٣- مَسرد فرنسيّ
TVT	٤- مَسرد ألمانيّ
TVA	ه- مُسرد لاتين <i>ج</i>

۱ - مسرد عربيّ

أرِسْتُولُوخِيَة ثُلاثِيّة الفُصوص ١١٢	آیاواشکا
أَرِسْتُولُوخِيَة جَبّارَة١١٣	أَيُوزام مُضادّ للإسهال المساد الم
أَرْطَماسِيا أُنْثَى٧	أپُوزام مُضادّ لليرَقان
أَرْطَماسِيا الحُقُول ١٥١.	أَثْرُوبِيْن وقَلْوِيدات الباذِنْجانِيّات١
أَرْطَماسِيا سَوْداء٧	أَتُم َأ
أَرْطَمَاسِيا مَغْرِبيّة١٥١	أَثيراْمِيْل نَتْرُونيّ١٢
أَرْقِطْيُون صَغِيْر مُزَغْبَر٨	أثيل هيدروكُوپْراپِيْن٢
أَرْقِطْيُون مُزَغْبَر٨	أَثِيْنَة الحِيْطان
أَرُورُوت البرازيل١٠	أخيليا أجِيراتُم
أَرْيَلُ أَحْمَر	أُخِيلِيا بَقْلَةُ العُطَاسِ
أزِيميْنَة مُفَصَّصة	أخِيليا دِمَشْق
أَسَّاكُو٢٦٩	أخِيْليا دُوْلابِيَّة
أَسَيْتُول	أخيليا صُوفِيَّة
أَشْتَرَأُمِيْلَ نَتُرُونِي١٢	أَخِيْلِيا فَتِيَّة
أَسْتِربَنْزيلسالِسيليك١٤	أُخِيلِيا مِنْجَلِيَّة٥
أَسْطراغَالُس العَقْرَبِ١٤	أخيليا نانا
أَسْطراغَالُس نَجْمِيّ١٥	أخِيليا نَانَا
أَسْقُولُوسيد	أَدَپْتينول٦
أَسْوَد حَيَوانِيّ مُنَقَّى١٧٩	أَدُونِيس الپيرينيه
أَشْباه قِلَىا١٩٨	أَدُونِيس صَيْفِيّ
إِشْقِيْل بَحْرِيّ	أراك
أَشْنَانُ	أَرِسْتُولُوخِيَة ثُعْبانِيَّة

أَنِيْسُونَ نَجْمِيّ صَغِيرِ الزَّهْرِ٣١	شْنَهَ الجمجمة
أَنِيْسُونَ نَجْمِيّ مُوَقّر ٢١٣	طْمَاطُ الكَاشُو٢١٧
أَنِيْسُونَ نَجْمِيّ يَابانِيّ٣١	فْلُوس خَوْخِيّ الوَرَق١٨
أنيلين (ألوان ال)	فْلُوْس لانْتَانا١٩
أُورِيْغَانُم أَرَنْبَرْغ١٥٢	فْيُون مخزنتي (مُركّباته الكيميائيَّة) ٢٠
إِدْرِياس٩٤	قاسِيا زَرْقاءُا۱۳۳
اِذْخِر٧	قْراص عِلاجِيَّة٢١
اِشْقِیْل بَحْرِیّ	قُراص فَحْم ً
إكسير فجلَ الخيل المُركَّب ٢٠٨	قْسُون حَرْشَفي الشَّكل١٨٢
إكسير كلُوروفورْميّ٢٢	
إكسير مُضاد لالْتِهاب المَفْصِل ٢٢	ْقُسُونْ نَدِيفَتِّ
إكسير مُضاد للرَّثْيَة٢٢	َلْبِيْزِيَةَ أَبُو سِنِّ٢٢
إڭسيرات ٢٢	لْبَيْزِيَة طارِدة للدُّود٢٢
إِلْقِس كَبِيْر ٨٥	لُّغُ بَعْرِيُّ (الخصائص والاستعمال) ٢٢.
إِمْرُوْس أَغْبَر	لُوَةلام
إيهَاسِيْن (كلورهيدرات ال) ٢٧	َلْوَة پارِّيلا
بَابَاوْ	لْوَة البَحْر الأَحْمَر٢٧
بَابُوني۲۰۲	أمّ كُلْبأمّ
باجِيَتُنَا شَمْعِيَّة	مُتين (كلورهيدرات اله)٢٧
باذَق	املاح صَفراوِيّة
پاریرا برافا۳٤	
بَتْجَنْجُور٣٥	•
بَتْياتُور٣٥	نُجَالِيْم
بَدْیان صَغِیر الزَّهْر۳۱	•
بِرازِيَّة التَّمْبايَنْغ٥٨	
بَرْسِيم أَحْمَر ٢٦٥	
بَرْشَامْ خُبْز فَطِيْر ٢١	•
بُوْشان عِلاجِت ٢١	
بَرْنُوف٣٥	

بَناقَنْتُه هَنْرِي	بسكويت طارد للديدان بالسَّنْتُونِيْن ٣٦
بَناكُس شائك	پسّيْدِيَا مُسْكِرَة٣٦
بناكس لاسع ٤٣	بَصَل الذُّنْب
بَناكس لاطَّى الزَّهْر ٤٣	بَصل الزِّيْزِبَصل الزِّيْزِ
بَناكُس هَنْرِي	بَصَل الفارب
بَنْج أَبْيَضُ	بَصَل العِشك
بَنْزُوات الصوديوم	بَقْلَة العُطَاسِ
بَنْكِرِيَاتِيْن٥٤	بَقْلَة العَوْفبه ١٥٧.، ١٥٩
بَهَا بَرِّيَّة١٦٧	بَقَم أَسْودب٣٧ ٩٠، ٣٧
پُودُوفِلُون دَرَقتي	بَقَنْقُومُونب٣٧
بُوْصِيْر مُسْكِر	بلادون
بُوْط أَسْتِراليّ٧٤	البَلاسِما
أَبُوْط رَفِيْع	بُلْبُوس أَشْعَربُلْبُوس أَشْعَر
پُولِّينِيا رِيشيَّة٩٥	بُلْبُوس الكَلْبِ٨٣
بيرة مُضَادَّة للحَفَر	بَلْخ
بِيْكُولُورِيْن١٥	بَلَخِيَّة يُونَانِيَّة
بَيْلَسان أَحْمَر ٤٨.	بَلْسَم جَنَفْيَف
پیْلُوگزْبیْن وأملاحه ٤٩	بَلْسَم دُوْرِيْه
بَيلُولاتَ٠٥	بَلْسَم سَانشيز المضاد لداء المفصل ٣٩٠٠
بيلولات بالكربونات الحديدتي	بلسم الصابون
المنغنازيّ٠٠٥	بلسم عالميّ
بيلولات بالكربونات الحديدية والمنغانيّة	بَلْسَم عِطْرِيّب
(حَنُّون)	
بيلولات أو بلعات قلبيَّة ومبوِّلة٧٥	• 1
بيلولات أو بلعات مُسهِّلة قويَّة٧٥	
بيلولات برومور الرَّصاص ٥٠	بُنَّ أَخْضَر
بيلولات بُونتيوس٥٠	•
بيلولات حديدية (أنْدرال)١٥	بناقنثة لاسِعة
سلُولات حديديَّة (بلود)٥١	يَناقَنْتُهُ لاطئة الرَّهُ

o Y	بيلولات المَرُوخ الزِّئبقيّ	بيلولات (بلعات) دافعة السُّعال٥٥
٥٧ (،	بيلولات مُسهِّلةً قويَّة (للكلاب	بیلولات دوپُویتْرَن٥١
٥١	بيلولات مُضادَّة للسُّفلس	بيلولات زبدة الكاكاو اليوديَّة
0 0	بيلولات مُضادَّة للصَّرع	الحديديَّة١٥
٥٧,	بيلولات مُقوِّية	بيلولات زرنيخيَّة آسيويَّة١٥
0 0	بيلولات المُقيِّئ المُسهِّل	بيلولات زرنيخيَّة (بُودَان)٥٢
0 0	بيلُولات النُّحاس النُّشادريَّة	بيلولات زئبقيَّة (لانْبِو)٥٢
o o ,	بيلولات نحاسيَّة	بيلولات زئبقيَّة (مُوسكاتي)٥٢
0 0	بيلولات هُولُووَاي	بيلولات زئبقيَّة (هانمان)٥٢
٥٦	بيلولات وبَلْعات بيطريَّة	بيلولات زيت الزَّعتر الدُّهنيّ٥٢
07-00 1	بيلُولات يودور الحديد والكين	بيلولات ضدّ الإمساك (مكاريو) ٣٠٠٠٠
۰٦	بيلولات يودور الكبريت	بيلولات ضدّ النَّزلة المثانيَّة٥٣
رن) ۲۰۰۰ (ن	بيلولات يودور المنغانيز (حَتَّو	بيلولات ضدّ النقرس (بيكرال)٥٣
٥٧	بيلولة أو بلعة ألويَّة للحصان	بيلولات ضد النقرس (سكودامور) ٥٣
٥٨	تَارُو القُدامَى	بيلولات ضدّ النِّقرس (هَلْفُورد) ٢٣٠٠٠٠
Y 1 V	تانْبُول	بيلولات ضدّ النُّقرس (هَنْروتاي)٥٣
٥٨	تَايُوف كَبِيْر	بيلولات ضدّ اليرقان٥٣
	يَبْنِ الجَمَلِ	بيلولات ضدّ اليَرَقان (شُومَل)٥٥
V	يْبْن مَكَّة	بيلولات عرق الذَّهب المُركَّبة٥٥
	تصنيف المُشتَخْلَصات	بيلولات عرق الذَّهب والأفيون٥٤
٥٨	تَمْبايَنْغ	بيلولات العنصل وعرق الذَّهب٥٤
	تِمْبو تِمْبو	بيلولات الكريوزوت(دستور ١٩٣٧) . ٥٤.
٠٩	تُؤت أَحْمَر	بيلولات كلورور زئبقيّ مُؤَفّين٥
۲•	تُؤيا غَرْبِيَّة	بيلولات الكُوباهو (رِيْغَيْني)٥٥
٩٤	ثابْسِيا غَرْغانُو	بيلولات الكودايين
١٨٤	ثِمار بَيْضاء	بيلولات لَبَنات الحديد
٠١	ثِمار السَّنَى	بيلولات مبولة (كروڤاييه)
٠٨	جامورة	بيلولات مُدرَّة للسَّوائله
٦٣	جُدْجُدُ حَفْلِيّ	سلولات مُدرَّة للسَّوائل (يُونتيوس)٥٥

جَرُوْمَة غُدِّيَّة١٥٢	فدُوارفدُ
	فِرُّوْد
جُعْدَة٧٢	
جَعْدَة٧٢	_
جُلَّابِ مُزَجَّج	لپرافین
جُلَّابِ مُضادً للنَّزيف٦٥	جروع برُو ميّ أو برمودِيّ
جُمّار	جروع بلسم يّ قلويّ أثيريّ
جُمّارَة	جروع بنزوات الأمونيوم٦٤
جِنّ ووِيسْكي ٢٥٠	بَرُوع حامضبــــــــــ
جِنْسَن شائك	جروع حامض فوسفوريك
جِنْسَن لاسع ٤٣	جروع زُلالتي
جِنْسَن لاطئلاطئ	جروع ضدّ اختفاء الصَّوت
جِنْسَن هَنْرِي ٤٣	جَروع ضدّ الإسهال
جَوْزَة العَفْصَة	جروع ضدّ التَّشنُّج مُؤَفّين ٦٥
جُوفْرِيَة٧٠	جروع ضدّ التَّشنُّج نَتِن
جُوفْرِيَة سَرْحَة٧٠	جروع ضدّ الْتِهاب الصِّماخ (طبلة
جوفرية سُورِينام٧٠	الأذن)٥٢
جوفرية طاردة الدود٧١٠٠	جروع ضدّ الدودة الوحيدة
جِيْدار	جروع ضدّ زلال البول
جَيْفَلة	جروع ضدّ الشّعال
حامِض پروسُيك٧٢	جروع ضدّ السّفلس
حامِض دُهْنيّ٧٢	_
حامِض ستيارِيك٧٢	
حامض سُولْفُوريك مُلَطَّف٢٥٥	_
حامِض سِيانْهيدْرِيك٧٢	
حامض سيانْهِيدريك (سُمِّيَّة الـ)٧٣	_
حامِض شِيازِيك٧٢	•
حامِض لَبَنيك مَخْزَنِيّ٧٤	جَروعات
حامض لَسُك مُوازَم٧٤	حَرُوْمَة يَنْضاء١٥٢

حقنة زيت الخروع٨٢	ىبَاق (تونس)٧٦
حقنة زيتيَّة٨٢	عَبَقَ أُخْضَر٧٥
حقنة طاردة للحمّى٨٢	فَبَقَ الْبَرْغَشُ٧٥
حقنة مُغَلْسَرَة٨٢	فَبَقَ بَنَفْسَجِيّ الْوَرَقَ٧٥
حقنة مُيَوَّدَة٨٢	عَبَق جِعْدِيِّ الوَرَق٧٥
حَلْحَل أَزَبّ	حَبَق خَسِّيِّ الوَرَق٧٥
حَلْحَل أَشْعَر٨٣	فَبَقَ سُمَيْسِمَة (لبنان)٧٦
حليب نشادريّ۲٤١	فَبَقَ صَغِيْر٧٦
حمّام حالّ٨٤	فَبَقَ كُرْمَانِيِّ٧٦
حمّام زيزفون۸۳	فَبْل مِسْكِيّ٢٥٦
حَمَّام ضدَّ الجَرَب (بيطريّ) ٨٣	فَيْنِيَات٧٧
حَمَّام مُصرِّف ٨٤	
حَمَّام مُضادَّ للطُّفَيْليّات بالنيكوتين ٨٤	فُرْف الحَقْل
حَمَّام مُنَشْدَر حَدِيدِيّ٨٤	عزاز
حمّام مُنشّط٨٤	فزاز بَياض الثَّلْج٧٨
حَمّامات۸۳	فزاز الحيطان
حُمَّيْض مُنفرِج الوَرَق٨٤	عَزازِ الرَّنَّاتِك
حَوْدَان شِرّير۸٥	عزاز صِباغِيّ
حَوْذَانَ شَقِيّ٨٥	فزاز الكَلَب
حَيِّ العالَم المِكْرار٨٦	فزاز مُتَحابِك
حَيّ العالَم الوَرْدِيّ٨٧	فسّاء عجل
حَيُّون مِكْرار٨٦	مَشِيْشَة البَرَص١٢٧
حَيُّون وَرْدِيِّ٨٧	عَشِيْشَة الرِّيْح٦٧
خُبَّازَة خُطْمِيَّة٨٨	كَشِيْشَة عَقْرَب ١٤
خثیرات	حَشِيْشَة اللَّيْمُون٨٠
خَرْبَق أَخْضَر٨٨	حَشِيشَة النَّتَاق
خَرْبَق أَمْرَط٨٩	
خَرْبَق الشَّرْق٨٩	حُقَن٨٢
خَرْبَق مَخْزَنِيّ٨٩	حقنة جيلاتينيَّة٨٢

دَنْتَارِيا رِيْشِيَّة٩٨	خَوْبَق مُنَفِّط
دِهان	_
دِهان جَنَفْيَيْڤ	
دُهْن تِيْكُوتِيْس أَجْوان٩٨	خَشُب
دُهْن الخُزامي الهَجِيْنَة٩٩	خَشَب الأَلْوَةفَشَب الأَلْوَة
دُهْن كانَنْغا	
دُهْن يَلانِج	خَشَب رُودِسن
دُهْن يَنُونَ٩٩	خَشُبِ الصَّبْرِن
دُهْنِين٧٢	خَشَبِ الكَلْبِنخشب الكَلْبِ
دُهُون مُهَدْرَجَة٩٦	
دواء	خَشْخَاش لُبْنَاننخشخَاش لُبْنَان
دواء الاشْقِيْل العسلميّ١٠٠	خَلُّوْد عَنْكَبُوْتِي
دواء الإشقيل العسليّ المُركّب١٠٠	خَمان عُنْقُودِيّخمان عُنْقُودِيّ
دواء البنفسج العَسَليّ١٠٠	نُحُوْكان
دواء الزَّعِفران العسليّ١٠١	خِيار الأُنْتِيل
ديجيتال أُرْجُوانِيَّة١٠١	خِيار الكُورْنِيشُون
رَأْس الدُّوري٢٠١	دُخْنَهَ ٢٦٧
راتافيا الكارابيب	دَرْسَتدرُسَت
راتِنْج	دَرَقَة مُقَلْنَسَة٢٦٧
راتِنْج أَصْفَر	دَرُوْسدُرُوْس
راتِنْجات	دِرْياسدِرْياس
رَاسَن البَراغِيْث	دِرِّيْسدِرِّيْس
راك	دَزَرْ پيدِيْن
راوَنْد	دُسُوم مُهَدُّرَجَة٩٦
راوَنْد رِيْباسِيّ١٠٨	دَنْنَهُ سامَّة
راوَنْد صِیْنیّ	دْقُفْتدْقُفْت
راوَنْد مَخْزَنِيّ١٠٨	دَم الأَخَوَيْن٩٧
رِباص	- 1
رَبَاطِيّة خَوْخِيَّة الوَرَق١٨	دَم الثُّعْبان٩٧

زَيْت صمغ الدَّوْرَم المخزنيّ المُحترّ ١٢٣٠٠	رَزِّيْن١٢٨.
زَيْت الكَتَّان	رَطْبَة
زَيْت الكَرْدَمَانة١٢١	رُغُل طارِد للدُّود١٨٠
زَيْت مُسهِّل قَوِيّ١٢١	رَمْراَم
زَيْت مُفَنَّكَ أُو َمُفَنَّل١٢١	رَمْرَم ٰرَمْرَم ٰ
زَيْت مُكَوْفَر١٢١	رُوحٌ إِفْرازِ القُنْدُسِ٢٠٧
زَيْت مُكَوْفَر مُركَّز١٢٢	روح فجل الخيل المُركَّب٢٠٨
زَيْت مُكَوفر يُزْرَق١٢٢	روح الفرمبواز۲۰۸
زَيْت مُوَرَّد	روح قشرة الحامض٢٠٨
زَيْت مُيَوَّد	رَوَنْد
زَيْت النَّضِيْد	رِيْباس١٠٨
زَيْت الورد الباهت	رَيْحَانَ صَعْتَرِيّ٧٦
زَيْت الورد الجوريّ١٢٢	زبدة السَّكْبُ لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زَيْتُون الأَرْضِ٢٢٩	زَدُوار
زَيْتُونَ بَرِّيِّ١١٨	زَراوَنْد ثُعْبانِيّ
زَيْتُوْن عِطْرِيّ١١٩	زَراوَنْد ثُلاثِيِّ الفُصوص١١٢
زَيْزَفُون أَنْشَى١١٩	زَراوَنْد كبير ُ الزَّهْرُِ
زَيْزَفُون شَحِيْح الزَّهْر١١٩	زَعْتَر إسْبانِيّ
زَيْزَفُون صيفيّ١١٩	زَعْتَر مُنتَفِعُ الرّأس١١٣
زَيْزَفُون عَرِيْض الوَرَق١١٩	زُعْرُور شائِكا
زَيْزَفُون كَبِيْر الزَّهْر١١٩	زِغْلِيلِ الْفِسْقِ
	ِ زُ فت أسود
زيوت مُحْتَرَّة١٢٣	زِفْت راتِنْجنِبْت
ساغُو	_ <u> </u>
	زَيْت رَمادِيّ١٢١
سامَّة (دستور ۱۹۰۸)۲۵۲	زَيْت زَيْتُونَ مُعادَل ومُعَقَّم١١٦
سَبَدِيْل مَخْزَنِيّ	,
سبيجالِيَة طاردة للدود١٢٤	
سبيجاليَة طبيَّة	

سِنْدِيان البُرْتُغال١٣٢.	ستروفَلتُتُوس أَمْرَط١٢٥
سِنْدِيان بُلاخ١٣٢.	
سِنْدِيان العَفْص١٣٢.	سترِيكُنُوس إِيْنِياس١٨٥
سِنْدِيان عُنْقُودِيّ١٣٢	سترَيكُنُوس غُلْطَارِيّ٢٦٨
سِنْدِيان كَسْتَنيّ الوَرَق١٣٣	سِتيارِيْن٧٢
سَنْط أَبْيَض١٣٣	سجائر بودان الزَّرْنيخيَّة١٢٦
سَنْط أَزْرَق١٣٣.	سجائر ديوسقوريدس١٢٦
سَنَى الإسْكَنْدَرِيَّة	سجائر زَرْنیخیّة
سَنَّى بَيْضي الشكل المنقلب ٢٢	سجائر وسيجارات طبيَّة١٢٦
سَنَى سُودانتي٢٢	سَحْلَبِا
سَنَى ضَيِّقَ الْوَرَقِ	شخام۲٦٧
سَنَى مُسْتَدِق الطَّرف	سِدْر بَرِّيّ١٥٥
سَنَى هِنْدِيِّ	سَرَنْتَة صَغِيْرة١٢٧
سُوْرَنْجان الخَرِيْف١٣٣	سَرَنْتَة كَبِيْرة١٢٧
سُوْرَنْجان دُوكاين١٣٥	سَطُوال
شُوْس (تَركيب السُّوس الكيميائتي) . ١٣٥.	سَطورِيُون١٢٦
شُوس شائِك١٣٨	شُعْد الحَمِيْرِ
سَوْقَم الجِبال١٣٨	سُعْد شَرْقِيّ١٢٨
سَوْلَع (عُصَارة اله)٢٥	سُعْد مُسْتَدِيْر١٢٨
سُولْفوغَيّاكول١٧٧	سَعُوط٣
سُولْفُوكَرْبُول١٨٩	سَفَدِيْل مَخْزَنتي١٢٩
سِيْرُوس كَبير الزَّهْرِ١٣٩	سكابيُوزة أُوْكُرانِيَة١٣٠
سِیْسَارُون١٣٩	سكابيُوزَة فِضَّيَّة١٣٠
سِیْسَبان کَبِیْر الزَّهْر۱٤٠	سِلَّيْتَة٨٣
سَيْكُران	سُمَّاق جُحالِيّ١٣٠
سِيُوْم۲۱۰	
سِيُوم ضَيِّق الوَرَق ٢١٠	سُمْشُو٢٤٩
شَاهْبَانَج	سِنْدِيان أَبْيَض١٣١
شاهِسْفَرَم٧٦	سِنْدِيان أَمْرِيكيّ١٣١

صابونولة الكافور٢٣٨	شِبتَ بَرِّيَ۱٤١
	شُبَيْط شائِك
صَبْر	
صبغة الصابون المُكوفَرة٢٣٨	شَجَرَةُ الْحَياة الغَرْبِيَّة
صبغة طاردة الحمّى٢٤٠	شَجَرَة الزَّنْبَقُ
صِبغة مِلْح الدُّرْدِيِّ٢٥٤	شَجَرَة الشَّمْع١٤٢
صِبْغة النَّفْتالين	شَجَرَة القَشّ١٩٠
صَرّارُ اللَّيْلِ الْحَقْلِيّ٦٣	شَجَرَة القَياثِيرِ
صَعْتَر أَرَنْبَرُغ١٥٢	شُخْص شرقي
صَفْراء الثَّوْر٢٣٢	شُحْص عَرِيْض الوَرَق١٤٣
صُقْراب أبيض١٥٢	شُخص مُتَوَسِّط الورق١٤٣
صُقْرابِ غُدِّيِّ١٥٢	شراب ليمون
صُمُوغ رَاتنْجِيَّة١٥٣	شراب ليمون سيترو – مَغْنازِيّ١٤٤
صِناب الماء	شراب ليمون مُسهِّل قويِّ بسيترات
ضال	المَغْنازيوما
طباق البَرَاغِيْث	شَرَعْطَط مَنْقِعتي١٤٥
طَحِيْن السَّنْفِيّات١٥٦	شعَال
طَحِيْن القَرْنِيَّات١٥٦	شُقّار المروج١٤٦
طَحِيْنِ القَطانِيَّاتِ١٥٦	شَمار الماء
طُوْقَرِيُون١٥٦.	شَمْعٌ نَباتِيّ١٤٦
طُوْقَرْيُون أَصْفَر١٥٧، ١٥٧	شُمْعَة طبيَّة١٤٨
طُوْقَرْيُون إِخْرِيتِيِّ١٥٧، ١٥٩	شُمُوْع طِلِيَّة١٤٨
طُوْقَرِيُونَ بَحْرِيِّ١٥٧	شَوْكَةً حادًّة١١٤
طُوقَريُون جَبَلِيِّ١٥٨	شَوْكَران (أنواع)١٤٩
طوقَرْيون جَعْدِيّ	شياف
طُوْقَريُون كَمافِيطُوس١٥٨	شِيْح أراغُون١٥١
طُوْقَريُون كَوْرَبِيّ١٥٨	شِيْح حَقْلِي١٥١
طُوْقَرْيُون لَبِد َ	شِيْح المَغْرِب١٥١
طِیْب العَرَب٧	صابون للحَمّى القويَّة ومُصرِّف ٢٣٩

عِرْق الذَّهَبِ النَّشَوِيِّ اللَّونِ الأبيض ١٦٥	لْمُوقَرِيُونِلامَاتِينِ المُعَالِمُ لَوْنِ اللهِ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَا
عُرُوقِ الذَّهَبِ١٦٥	لَمْيُونَ الذُّبَابِ٣٥
عَسَل إشْقِيليّ	عُتْم
عَسَل بنفسجتي	عجائن للاستعمال البيطري١٦٠
عَسَم سَنْدَاييق	عجينة أو لَبَن كلس سميك ضدّ مرض
عُشْبَةُ الشَّاي هُشْبَةُ الشَّاي	لظُلفل
عُشبة الطِّحال ٢٧، ١٥٧	عجينة أو مُجَمَّدة الثِّمار الصَّدريَّة ١٦١
عُشْبَة مار الياس	عجينة بالريزورسِين١٦٠
عُشْبَة مُقَدَّسة	عجينة بُلَاسُ الكاوية١٦٠
عُشْبَة الهند الهند	عجينة حشيشة السُّعال باليانسون ١٦٢
عُصَارَة الخَسِّ العَسِ	عجينة سُوْسَان١٦٠
عُصَيْفِيْرَة بَرِيَّة١٦٧	عجينة السولفاميد
عَفْصعَفْص	عجينة الصَّمغ العربيّ المُسمَّاة عجينة
عَفْصَة	الخُبَيْزةالله المُعَالِين المُعَالِين المُعَالِين المُعَالِين المُعَالِين المُعَالِين المُعَالِين المُع
عَفْصَة السِّنْدِيَان	عجينة ضدّ الْتِهاب الرُّجل ١٦١
عقاقير للتَّدخين١٦٨	عجينة ضدّ مرض الظُّلف (تَعَفَّن الظُّلف)الظُّلف)
عقاقير مُبَخِّرة١٦٨	عجينة كانكوان الكاوية
عقاقير مُخدِّرة١٦٨	عجينة كاوية ضدّ الْتِهاب رجل عجينة كاوية ضدّ الْتِهاب رجل
عقاقير مُدَخِّنَة١٦٨	الحصانالحصان العصان الع
عقاقير مُنَوِّمة١٦٨	عجينة ليانو الكاوية
عقاقير نباتيَّة١٦٨	عجينة مخزنيَّة بالحزاز١٦٣
عَقِيد هِنْدِيّ	عَراوَة مَلَكَة المُرُوجِ١٦٣
عَقَّيْلَةَ مُٰذَبَّبَةً١٩٣	عَرْضَف جَعْدِيّ
عَمِيْر عَنْكَبُوْتِيّ٩٢	عَرْضَف صَنَوْبَرِيّ١٥٨
عُنَّابِ بَرِّيِّ٥٥١	عِرْق إنجبار
عِناقِيَّة عُشْبِيَّة٢٧١	عِرْق ذَهَب القدِّيسة مَرْتا١٦٥
	عِرْق الذَّهَب المُتَمَوِّج
	عِرْق الذَّهَب المُخَطَّط الصَّغير١٦٥
عُنْصُل بَحْرِيّ١٦٠	عِرْق الذَّهَبِ المُخَطَّطِ الكبير١٦٥

غَيَّاكُول سولفُونات البوتاسيوم١٧٧	عَوْف عَطِر١١٩
فاقُوع فِضِّيِّ١٣٠.	عَيْنُ التَّدْرُجِ٦
فَحْمَ حَيُوانِيّ مُنَقًى١٧٩	عَيْنُ الحَجَلِ
فِرْصاد أَحْمَر٩٥	غافَث عَطِر
فَرْق٢٠٦.	غُبارُ الطَّلْع١٧٠
قُرْنُونِيَة طارِدَة للدُّود١٨٠	غُبَيْراء مَبْذُوْلَة١٧٢
فِساء الكَلْبَ	غَرور
فُشّاغ	غرور ألومينتي رَقوء١٧٢
فُشاغ صِيْنِي١٨١	غَرور بِنّاتي الْعَقُول١٧٢
فَص الحِمار	غرور خمريّ عَقول١٧٣
فَص الحِمار الحَرْشَفي١٨٢	غرور زئبقتی۱۷۳
فَصّ الحِمار الخُرْشُوفيّ١٨٣	غرور مُلَيِّن١٧٣
فَص الحِمار المُغايِر الشَّوْك١٨٣	غرور مُهَيِّج
فوافُوتْسِي	غرور مُيَوَّد١٧٣
فواكَنْغا أَفْرِيقيا١٨٥	غُرَيّاء باليودوفورم
فواكَنْغا ثواُرسي١٨٥	غُرَيّاء مُصَفْصَف أَ
فُوفَل	غَسُول
فُوْل إِيْنِياس١٨٥	غسول أستات الرَّصاص القاعديّ١٧٤
فُوْل كالابّار	غسول غلیشرین۱۷٤
فينول سُولْفُورِيسينتي١٨٨	غسول غلیشرین مُذَرَّح١٧٤
قانَة بُرْتُقالِيَّة	غَسُول غُولاند١٧٤
قاۇون ھِنْدِي	غسول قلويّ١٧٥
قُبَّرِيَّة جَمِيْلَة١٩٠	غسول مُهيِّج إنكليزيِّ١٧٥.
قُبَّرِيَّة جَوْفاء١٩١	غسول مُهيِّج (مُستَشفى مار لويس) ١٧٥
قُرّاص غِشائيّ١٩٢	غَفَث مَثْقُوب الوَرَق١٧٥
قُرَّاص كَاوِ١٩٢	غَفَث نَدْغِيّ الوَرَق١٧٦
قُرّاص مُذَنَّب	غلوكوز سائل١٧٧
قُرّاص مُرِيب	غواڭو١٧٦
قَرانيا حَرِيرِيَّة١٩٤	غُوالات

قَنْبُر جَمِيْل١٩٠	قَرانِيا لَوْلَبِيَّة
قَنْدَرِيْس خُرْشُوفيّ الرّأس١٨٣	قَرْدَبِ حُلُوقُرْدَبِ حُلُو
قَنْدَرِيس لُبْنانيّ١٨٢	
قَنْدَرَيس مُغايِر الشَّوْك١٨٣	قَرْن الأَيِّل٢٢٣
قِنْدِیْد	قَرْن اصطناعتي (بيطريّ)
قَنْطُرِيُون أَسْمَر٢٠١	
قُنيَطَسَة قَالَنْسِيا	
قُويْسَة الجَبَل	قُرَيْص رُوْمانِيقُرَيْص
قُوَيْسَة الغاب ٢٠٢	قُرَيْطَفَةقُرَيْطَفَةقُرَيْطَفَة
قَيْسُون	قِشْطَة شَريمُوْلِيا١٩٥
قَيْصُوم أُنْثَى	قِشْطَة مَنْقِعِيَّة١٩٥
کاپي	قَضاب مُسَطّح
كَافُور طَبِيعيّ٢٠٤	قَضِيْبِ الرَّيِّ١٦
كاوٍ نشادَريّ	قَطْرَة١٩٥
كَايَا بُوْنِيا كُرَوِيَّة٢٠٦	قَطْرة (تركيبات)١٩٦
كَتَان مُسْهِل	قَطْرة ألومينيَّة أو عَقُولة١٩٦
كحول مُفَسْفَر	قطرة ألومينيَّة - رصاصِيَّة١٩٦
كُحولات	قطرة أمونياكيَّة١٩٦
كُحولة إفْراز القُنْدُس٢٠٧	قُطْن مَعْدِنتي١٩٧
كُحُولَة التَّرَبَنْتِيْن المُركَّبَة٢٠٧	قِلْوانِيّات َ١٩٨
گُحولة الفرمبواز٢٠٨	قِلَویْدات١٩٨
كحولَة فِيُوراڤَنْتي٢٠٧	قَلْوِيْدات الخَرْبَق والخُرْبُوق١٩٧
كُحولة اللَّيمون الحامض ٢٠٨	
كحولة مُضادَّة لداء الحَفَر٢٠٨	قِلْي١٩٨
كحولة المَليسَّة المُركَّبة٢٠٨	- قِمام تُرْبِيّ
كُخُولَة نَمْل مُركَّبة	قِمامُ جَبَلِيّ١٩٨
کحولتور۲۰۹	قِمام عُنْبُوبِيّ
كُحُولَتُور البُرْتُقال الحُلُو٢٠٩	قِمامُ المَوْحِلِ١٩٩
كُخُولَتُور الحامض	قُنَّبُ (طريقة استعمال)

گونياككونياك	كَرَفْس الجَبَلكَرَفْس الجَبَل
كيرْش	كَرَفْس الماءكَرُفْس الماء
كِيْنُو أَسْتِراليا٢٢١	
كِيْنُو (أَصْنَاف منه)٢٢١	كَرَفْس الماء المُنتَصِب ٢١٠
كِيْنُو أَفْرِيْقِيا	كُرْكُم صِباغِيّكُرْكُم صِباغِيّ
كِيْنُو البَنْغال	كَرْلِيْن ذَهَبِيّكَرْلِيْن ذَهَبِيّ
كِيْنُو بُوْتاني بايْ	كَوْلين شائِع
كِيْنُو البُوْتِيَّة	كُرْيَنْتِس يُوْهِمْبكُرْيَنْتِس يُوْهِمْب
كينو الجَمايِيْك	كلُورُودِيْن
كِيْنُو غَمْبِيا	كلُورُور حديديك٢١٢
لاذَن قُوَّيْسِيِّ الوَرَق٢٢٢	كلورور حديديك محلول۲۱۳
لاصِف٧	كِمادات مِن وَرَقكِمادات مِن وَرَق
لاصُوْق مُصَفْصَف ٢٧٣	كَمافِيْطُوسكمافِيْطُوس
لَخْلاح دُوْكاين	كَمالِيَّة البَرِّ
لزقة۲۲۲	كَمَالِيَّةُ الحُقُولِ٢١٤
لزقة بالكالومِل (زئبق حُلُو)٢٢٢	كَمَالِيَّة مُتَوَِّجَة
لزقة حجر التوتيا	كَمَالِيَّة مُكَلِّلَة٢١٥
لزقة حجر سُلَماني (سيليكات الزَّنك	كَنْكِيْنا بِيتَايُوكَنْكِيْنا بِيتَايُو
الطَّبيعيّ)	كَتْكِيْنا كُولُومْبِيا الصَّفراء٢١٦
لزقة كلورو – زئبقيَّة٢٢٢	الكَنْكِيْنا وتَركيبها الكيميائيّ٢١٥
لِسان الحَمَل القَرْنِيِّ	كَوْثَلُ الكاشُو٢١٧
	گُورْنِيشُون
	گُورُونِيلًا غَبْراء٢٩
	گۈكاگۇكا
لُعابِ الحلزون	كَوْكَبِيَّة كَبِيْرَة٢٢٠
لعاب الصَّمغ العربي	گۈگە
لُعاب صمغ الكثيراء	كَوُكُولُس عَرِيْضِ الوَرَقِ٣٤
•	كُوكُولُس گُونْدُودَنْدَرُون٣٤
لعاب الهيدرات البيشمُوثيّ٢٢٦	كُونْدُودَنْدَرون لِبْدِي

ماء غرِنْدَل الأكّال٢٥٨	لَقاحلا
ماء غُولارد٢٥٨	لَقَحَ ١٧٠
ماء الكُرّة٢٥٨	لُوسِيُونلا
ماء كَلِّيدُور١٧٥	لُوْف عِطْرِيّلانتا
ماء مُبارَك	ليكورلكور عالم
ماء مُبارَك (شَاريتيه)٢٥٩	ليكور بُورتَرلكور بُورتَر
ماء مُتَأْكْسِج مُبَوْرَق٢٥٩	ليكور زئبقيّ مُكوفَر٢٥٨
ماء مُخَبَّز	ليكور غُولاًند١٧٤.
ماء مُسَكِّن	ليكور كُوشْلَن
ماء مُنظِّف أسنان٢٦٠	ليكور هُوْلتُنلكور هُوْلتُن
ماء نباتتي معدنتي	ليكور وقائيّ ضدّ السُّفلس٢٢٧
ماء نشادريّ مُكَوْفَر٢٥٩	لَيْمُوناضة غَازِيَّة٢٦١
ماتِیْکا	ماء أبيض٢٥٨،١٧٤
ماتِیْکُو۲۲۸	ماء الأرْيَحِيَّة
ماراسْکِي زارا	ماء أكّال
مَارُوم۸۵۱	ماء برومُوفُورمتي٢٥٧
مازَرْيُوْن	ماء بنِّيِّ اللَّون (وَرْلُومُونْت) ٢٥٧
مِجْزاعَة بَرِّيَّة١٦٧	ماءُ الحَياة
مُجمَّدات	ماء خُزامَی سمیث۲۵۷
مُجمَّدة الخبز	
	ماء دوقة لَمْبال١٩٦
مَحفوظات٢٥٢.	ماء رابَل٥٥٢
مُحَلِّيات٢٣١.	ماء رَماديّ اللَّون٢٥٨
مُذابة البوتاس الكُحوليَّة٢٥٤	ماء زُحَل ً٢٥٨
مُذابَة كربونات البوتاسيوم الكُحوليّة ٢٥٤.	ماء الشَّهامَة
مُذابَة الكلورور الزُّئبقيّ المُغَلْسَرة ٢٥٣	ماء غازيّ بـ پروتوكسيد الأزوت ٢٦١
مِرّة الثَّوْرِ٢٣٢	ماء غازتي بسيط۲٦٠
مَرْعان	4
مَرَق عجل	ماء غازيّ مُنتَرَج
	-

مرهم يودور الكبريت۲۳۸	مَرْمَاخُور١٥٨.
مرهم يودوفورم۲۳۸	مَرْهَم
مرهم يودوفورم (غلوير)۲۳۸	مرهم أُثْرُجِيّ
مَروخ	مرهم أصفر (الأخ قُوْوم) ٢٣٤
مَرُوخ أُثْرُجِيّ٢٣٣	مَرْهَمْ بُوتَ الشَّمْعِيِّ٢٣٤
مروخ الرازي الأبيض٢٣٧.	مرهم بوري اليوديّ٢٣٤.
مروخ صابونتي۲۳۸	مرهم الخلُّود أو المُخلَّدة٢٣٤.
مروخ صابونتي مُكوفَر٢٣٨	مرهم دوتوكسيد الزُّئبق المُكوفَر ٢٣٤
مروخ صابوني هيدروسولفوري۲۳۸	مرهم سيترات الكينا
مَرُوخ ضد الجرب	مَرْهَم شَمْعِي بالمُؤرفِين٢٣٥
مروخ مُبوِّل٢٣٩	مَرْهَم شَمْعِي مُؤَفِّين٢٣٥
مروخ مُسَكِّب	مرهم صاقِل٢٣٥
مَرُوخ مُكَوْفَر١٢١	مرهم ضد حبّ الشباب
مروخ مُهيِّج٢٣٩	مرهم ضدّ الشَّرَث (بروك)٢٣٥
مُرَّيْرَة الغابُون١٢٥	مرهم ضد الشَّرَث (كنُولْزَر) ٢٣٥
مُرَّيْرَة لَطِيْفَة١٢٥	مرهم ضد الشَّرَث (مايَت) ٢٣٥
مَزْرِيْطَة١٠٩	مرهم ضدّ القَرَع (بورياس)٢٣٥
مَزيع	مرهم ضدّ القرع (پينكل) ٢٣٦
مزيج برازيلتي٢٣٩	مرهم ضدّ القرع (مَاهون) ٢٣٦
مزيج برازيلتي (لوپير)۲٤٠	مرهم ضد المَرَط٢٣٦.
مَزيج بِيَتّ لتحضير الغَسُولات١٧٥	مرهم غُونُدريت٢٣٦.
مزیج دُردی ناری۲٤۰	مرهم قطران (غیلیوت)۲۳۷
مزيج ضُراسِيِّ إنجليزيِّ٢٤٠	مرهم کاو
مزيج مُسهِّل قويّ٢٤٠	
مزيج المغنازيا المُمَيَّهَة٢٤٠	مرهم منغانيز۲۳۷
مزيج مُكوفَر	مرهم نشادري۲۳٦
مزيج مُكوفَر مغنازيّ٢٤٠	
مَزيجات	مرهم اليود
مُستحضَر سِيْمَرْلِنْغ التَّجميليِّ١٧٥	

مسحوق لِيسون١٩٦	تُستحضَرات مُختلِفة من الكلورور
مِسْك الجنّ	لحديديك
مُسَهِّلات٢٤٧	مُستحلَب بالكلوروفورم۲٤١
مَشْرُوبات كُحوليَّة٢٤٩	مُستحلَب دونكان الزَّئبقي١٧٥
مَصًّاصَة صَغِيْرة٢٢٣	مُستحلَب صمغ نشادريّ۲٤١
مَعاجِينِ الأَفيونِ٢٥١	مُستحلَب غولاند التَّجميليّ١٧٤
معجونأفيونطاردللحمّى (بورجوا) ٢٥١	مُسْتَحلَبات۲٤١
معجون أفيون مُضادّ للتَّعقيبة (بايْران) ٢٥١	مُستخرَج۲٤١
معجون أفيون مُضادّ للتَّعقيبة	مُستخلَص۲٤١
(دِیْدایِ)۲٥١	مُستخلَص الآلاميَّة المائع٢٤٦
معجون أفيون مُضادّ للديسنتيريا ٢٥١	مُستخلَص أفيون عامّ٢٤٦
معجون أفيون مُنظِّف أسنان بالفحم	مُستخلَص الجنطيانا٢٤٢
(بَرْييه)	مُستخلَص الجنطيانا المُثَبَّتَة٢٤٢
معجون أفيون مُنظِّف أسنان بقرن الأيِّل	مُستخلَص الخشخاش المُنوِّم٢٤٧
المحروق١٥١	مستخلَص زهرة العُطاس٢٤٢
معجون عَسَلتي٢٥٢	مُستخلَص السوس الخام٢٤٧
معجون عَسَليّ طاردللدودة الوحيدة ٢٥٢	مُستخلَص صفراء الثُّور٢٣٣
معجون عَسَليّ مُضادّ للبواسير ٢٥٢	مُستخِلَص صفراء الثُّور المُنَقَّى
معجون عَسَلتي مُضادّ للتَّعقيبة ٢٥٢	المُجَفَّفا
معجون عَسَلتي مُضادّ للقوباء٢٥٢	مُستخلَص الغرنداليا المائع٢٤٥
مُعَلِّب الكرز الغاريّ٢٥٢	مُستخلَص الفَرَنْدَل المائع٢٤٦
مُعلّب مُضادّ لداء الحَفَر٥٣٠	مُستخلَص الفشّاغ المائع٢٤٦
<i>y</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	مُستخلَص القنَّب الهنديّ٢٤٣
	مُستخلَص الكَبابَة
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	مُستخلَص الكولا٢٤٤
مُعلَّبات النَّباتات الغضَّة مُعَلَّب	مستخلص الكينا الصفراء٢٤٥
الْمِلْعَقِيَّة٥٢	مُستَخلَصات كحوليَّة أو هيدروكحوليَّة ٢٤٢
	مُستخلصات مائعة
مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ	مُستخلَصات مائيَّة

مَياسِم	مُغَلِّسَرَة بالكلورور الزُّئبقيِّ٢٥٣
مياه عِلاجيَّة مُختلِفة٢٥٧	مُغَلْسَرَة بكلورور الزَّنك ْ٢٥٣
مياه معدنيَّة اصطناعيَّة	مُغَلْسَرَة الغُرَيّاء٢٥٣
مَيْسَم	مُغَلِّسَرَة الكلوروفورم٢٥٣
مِيكَانيا غواكُو١٧٦	مَغْنُولية بَحْريَّة اللَّون٢٥٤
مِيمُوزا بَيْضاء١٣٣	مُغَوَّل البوتاُسمُغَوَّل البوتاُس
نَبات النارا	مُغَوَّل البوتاس الكَربُوناتِيّ٢٥٤
نَخْلُ مَلَكِيّ٢٦٤	مُغَوّل الحامض السُولْفُوريك٢٥٥
نشاء البطاطا	مُغَوَّلُ الفوسفور٥٥٢
نَشَاءُ الرُّزِّ٢٦٤	مُغَوّل النَّفْتالِين
نَفَل بَنَفْسَجِيّ ٢٦٥	مُغوَّلات
نَفَلُ المُرُوجِ	مَقْرمَقْر
نقاط	مَكْلُورَة بُرْتُقالِيَّة١٩٠
نِقاط حامضة مُقَوِّية	مِلاط الطَّبَرُخَى٢٥٥
نقاط روسِيَّة مُضادَّة للكوليرا٢٦٥	ملح لامائتي
نقاط طاردة الحمّى	مَلْعَى عَنَمِيّ
نقاط طاردة للدود٢٦٥	مَلُّولمَلُّول
نقاط مُضادَّة لاعتلال المفصل ٢٦٦	مُلَيِّنات البَطْن٧٤٧
نيتريت الأمِيْل١٢	مَلِيْنَةَ صَغِيْرة١٢٧
مُباب	مَلِيْنَةَ كَبِيْرَة
هَرَاس مَرَاس	مُنفِّط نشادريِّ٢٣٦
الهُرْبُون الجانبيّ الوَرَق٢٦٧	مُومُومُومُومُومُومُومُومُومُوم
هُرْبُون مُقَلْنَس٢٦٧	مَوْز باشجُو٢٥٧
الهُرْبُون الهِنْدِي٢٦٧	مَوْز السَّعْدمُوْز السَّعْد
. مُرْد	مَوْز الصِّيْنمُوْز الصِّيْن
هَرْقَل	مَوْز الفَأَل٢٥٦
هِنْدَبِ٢٦٧	مَوْز الهِنْد
هِنْدَبِ أَسْمَانِي٢٦٨	مَوْز اليابان
هواکُو١٧٦	مُوْممُوْم

وِنْكَا عُشْبِيَّة	هُوَانْغ نَان٢٦٨
ياً جَه	هُوْراً البرازيل
يافُوْخيافُوْخ	هيدرولة زئبقيَّة كلسيَّة٢٥٧
يَغْمِيْصا ١٠٨	هِيلُونيا صَفْراء
يَنْبُوت نَتِن٣٠	هِيلُونيا كارُولينا٢٦٩
يُؤهِمْب مُعايِش	هيُوسِيامِين (سولفات)۲۷۰
,	ودْنَة مِكْرارَة٨٦

٧- مسرد إنجليزي

African voacanga\	Black-horn
Ageratum milfoil \$	Black centaury ۲۰۱
Agreeable strophanthus \ Y o	Blister hellebore
Alkalies and Alkaloids ۱۹۸	Bloody finger ۱۰۱
Alligator apple\90	Blue acacia
Aloes ۲٥	Bogberry \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
American oak ۱۳۱	Bow-wood tree.
American star anis٣١	Brandy Yo.
Angustifoliate water celery Y1.	Break stone ٢١٤
Areca - palm Y \V	Bresilian sandbox Y79
Astragal	Brown rayed knapweed ۲۰۱
Autumn colchicum ۱۳۳	Buck's-horn plantain YYY
Balsam ٣٩	Bush basil
Barbary worm wood	Cabbage tree V
Basjoo banana Yov	Calabar bean ۱۸٦
Bastard pellitory ٣	Camel's hay V
Bean-clover ٣.	Campeachy wood٣٧
Beautiful corydalis\ \ 9.	Canoe cedar 7.
Beergherkin 4 Y	Cardoon's shape donkey-fart \AY
Betel-nut palm Y \V	Cardoon's shape onopordon \AY
Big flowering worm-killer \ \\	Carline thistle Y \ Y
Big Tayove OA	Cathartic flax Y•3
Bile ۲۳۲	Cat thyme

Caudate nettle 19Y	Derris 9
Cautery YTY	Devil's-bit scabious ٣١
Celery leaved crowfoot	Diadem lady's mantle Y \ 6
Cevadilla\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Donkey-fart ۱۸۱
Chestnut foliate oak	Donkey fart's artichoke \AY
China smilax	Doubtful nettle ۱۹۱
Chinese banana You	Downy bachelor's buttons
Chinese root\\\\\	Dragon's-blood 9
Chirimoyas 190	Drias plant
Circinate corneltree \9 &	Dwarf laurel YY
Circinate dogberry	Dyer's oak\
Circinate dogwood \98	Ehrenberg organy
Coca Y19	Elixir
Coffee-beans £ \	Europeanfield cricket
Colic wort Y18	Evergreen clematis You
Common carline Y \ Y	Evergreen coronilla Y
Common service tree \VY	Fair-haired hyacinth
Conserve YoY	Falcate milfoil
Cork wood ۱۹۵	Fetish banana You
Corydalis ۱۹۱	Feuberry 174
Cranberry 199.179	Field worm wood
Cretan germander	Finger flower
Crowned lady's mantle Y \ o	Flea-bane ٣0
Cuckoo flower	Flea-wort To
Curcuma	Gall
Currant fruited rhubarb \ • A	Gall oak 177
Damascus milfoil	Geant birthwort
Danchi plant \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Germander
Decaisne colchicum ١٣٥	Glabrous strophanthus \Yo
Decaisne meadow saffron \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Glass-wool

Glaucous coronilla ۲۹	Lebanese donkey fart \A
Gooseberry currant\ \ . \ \	Lebanon poppy
Great flowered sesban \ \ \ \ •	Lemon grass A
Green hellebore AA	Little leafed star anis
Ground cypress Y • Y	Livelong
Ground pine	Log wood
Guaco	Long rooted curcuma Y \
Hawthorn \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Lotus jujub \ o o
Headed thyme \\\T	Lotus tree\oo
Helmet orchid YYY	Lucky banana Yo
Herbaceous periwinkle YV	Lyre tree \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Herb ivy	Major honey-wort \Y\
Heterospiny donkey's fart \AT	Major wax flower ۱۲۱
Heterospiny onopordum\\	Mandrake
Hoary plantain YYY	Marsh Crowfoot
Huaco	Marum germander \ 0 /
Hulwort	Master wort YY
Indian banana Yol	Matico plants ۲۲/
Indian pink 17 &	May bush
Jamaica dogwood٣٦	Meadow-sweet \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Japanese banana YoV	Meadow bitter-cress V/
Japanese star anis tree ٣١	Meadow clover
Jelly ۲۳•	Meadow saffron 177
Jupiter's beard 97	Medical cigarettes and cigars \ \ \
Kermes oak	Medicinal candles \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ladie's smock	Medicinal squill
ladies' gloves ۲٥	Medium plantain YYY
Lamb's tongue YYY	Membranaceous nettle ۱۹۲
Larger astrantia YY•	Meu 181
Lavender cotton Y•Y	Mezereon YY9

Midsummer men A7	Purging flax Y•7
Mixture YT9	Purple-apple
Mock privet ١٤٣	Purple clover ٢٦٥
Mossberry 199	Queen of meadows \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Mothmulleine £V	Quick ۱۱٤
Mountain laburnum ۱۳۸	Racemose elder £ A
Mountain parsley Y•9	Red clover YTO
Musky bugle	Red mulberry tree
Nettle leaved goose-foot ۱ • ٩	Red sea aloeYV
Nut-grass ۱۲۸	Reed-mace £V
Nut gall oak\	Resin
Odoriferous agrimony \V•	Rhubarb
Odoriferous olive tree \\9	Roman nettle 197
Odoriferous osmanthus ۱۱۹	Royal wine palm ٢٦٤
Opiate Yol	Saddle tree\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Oriental hellebore	Sage-leaved rockrose YYY
Oriental whortle-berry ۱۹۸	Sago 17 8
Orpine	Salep
Osage orange ۱۹.	Sarsaparilla
Palm-marrow	scarlet oak
Papaw \ Y	ScenanthV
Para cress	Scorpion astragal \ \ \ \ \ \
Pareira brava ٣٤	Sea lavender \ \
Perry's aloe YV	Sea oignon\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Persley piert Y\ &	Setwall \ \ \ \
Pointed persicaria ۱۹۳	Silk vine ٣٨
Poisonus sumach ١٣٠	Silky corneltree ١٩٤
Pollen \V•	Silky dogberry\9 &
Prickly water celery Y1.	Silky dogwood\98
Pubescent bachelor's buttons A	Silver scabious \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Skirret\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ukranian scabious \\
Skull cap Ylv	Vegetable wax \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
small bulrush £V	Venerate star anis tree
Small honey-wort\YV	Vermifuge albizzia Y
Small leaved basil	Vernonia vermifuge \A
Smooth thapsia 9 8	vesicatory hellebore
Sneezewort ٣	Virginia snake-root \ \ \ \
Spadic busch	Voa-Fotsy\
Spanish red thyme\\\\	Wall goose-foot
Spignel \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Water celery Y1. A
Spilanthes A1	Water drop-wort\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Spiny burdock \ \ \ \	Water hemlock \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Spiny burrweed \ \ \ \	Wax flower ۱۲۱
Spurge olive	Wax tree 183
St. Ignatus bean	Wayfaring-tree
Star of earth YYY	West indian gherkin 43
Stinking wood ٣•	White acacia
Summer adonis 7	White cedar
Summer pheasant's eye 7	White henbane £ 5
Sweet maudlin	White oak
Sylvan-cricket	White thorn
Talladonis	Wild balsam ١٦١
Tambayang stinking tree oA	Wild jujub 100
Taro plant oA	Wild marsh beet
Tassel hyacinth AT	Wild may apple ٤
Thouarsi's voacanga	Wild olive tree \ \ /
Trebizond tea\ \ ٩٨	Wood 9
Trilobate birth wort \\Y	Worm grass\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Trilobate worm-killer\\\Y	Yellow bugle\0/
Tulip tree \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Yellow germander \ov. 7\
Turmeric Y11	Zedoary١١

۳- مسرد فرنسي

Acacia à musenna ۲۲	Adonis des Pyrénées
Acacia blanc\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Agati\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Acacia bleu ۱۳۳	Aigremoine odorante
Achillée agérate {	Ail à toupet AT
Achillée de Damas 0	Airelle à maurets \79
Achillée falciforme 0	Airelle de Cappadoce ۱۹۸
Achillée falquée	Airelle des fanges
Achillée herbe roue	Airelle des marais 199
Achillée laineuse	Alavert \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Achillée nain £	Albizzie anthelminthique YY
Achillée sternutatoire	Alcalis et Alcaloïdes
Achillée visqueuse {	Alcaloïdes d'helleborus et du
Acide chyazique VY	veratrum\ \qua
Acide cyanhydrique YY-Y۳	Alcée
Acide hydrocyanique VY	Alchémille à diadème ۲۱٥
Acide lactique racémique V 8	Alchémille couronnée Y \ 0
Acide lactique officinal V \$	Alchémille des champs Y \ \ \
Acide prussique VY	Alcoolat antiscorbutique Y • A
Acide stéarique VY	Alcoolat de castoréum Y • V
Acide sulfurique dulcifié Yoo	Alcoolat de citron Y • A
Adaptinol	Alcoolat de fourmis composé Y • A
Adonide estivale	Alcoolat de framboise Y•A
Adonis d'été	Alcoolat de mélisse composé Y • A

Alcoolat de térébenthine composé Y • V	AngélineV\
Alcoolats Y•V	Anguria 97
Alcoolature d'orange douce Y • 9	Angurie 4 Y
Alcoolature de citron	Angusture fausse **•
Alcoolatures Y•9	Aniline (Couleurs d') TT
Alcoolé d'acide sulfurique Yoo	Anone des marais
Alcoolé de naphtaline	Anone trilobée\Y
Alcoolé de phosphore Yoo	Ansérine des murs
Alcoolé de potasse Yo &	Aouret \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Alcoolé de potasse carbonatée Yo &	Apozème antidiarrhéique
Alcoolés Yo &	Apozème antiictérique
Algues marines YY	Arach 7 £ 9
Alisier	Arbre à chou V•
Alocasie macrorhize o A	Arbre à cire \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Aloès Yo	Arbre de paresse
Aloès de Perry YV	Arbre de vie
Ambaiva	Arbre du poison 17.
Amer de bœuf YYY	Arec ou Aréquier Y \V
Amidon de riz ٢٦٤	Aristoloche à grandes fleurs ۱۱۳
Anacycle de Valence ۲۹	Aristoloche géante ۱۱۳
Anagyre fétide ٣•	Aristoloche serpentaire ۱۱۲
Anagyris ٣•	Aristoloche trilobée ۱۱۲
Andire V•	Armoise champêtre \ 0 \
Andire de Surinam V•	Armoise de Barbarie١٥١
Andire inerme V•	Arrow-root du Brésil \ •
Andire vermifuge Y\	Asiminier\\Y
Anémone des prés ١٤٦	Astragale à gousses velues\o
Aneth sauvage \ \ \	Astragale mareotique\ \ \ \ \
AngélimV1	Astrance majeure YY.
Angélin Y \	Athamante Selin persillée Y•9

Atropine et Alcaloïdes des solanées . \	Basilic à moustiques Vo
Aubépine \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Basilic fin
Aubépine épineuse۱۱٤	Basilic fin vert V7
Aubour de montagne ۱۳۸	Basilic vert
Aunée conyze	Batiator (Racine de) ٣٥
Aurone des Champs \o\	Batjenjor ٣0
Aurone femelle Y•Y	Baume antiarthritique ٣٩
Ayahuasca	Baume aromatique ٤ •
Badianier à petites fleurs ٣١	Baume de Fioravanti Y•V
Badianier du Japon ٣١	Baume de Geneviève ٣٩
Badianier vénéré ٣١	Baume du Chevalier Laborde § •
Bain ammoniaté ferrugineux A \$	Baume Duret ٣٩
Bain antigaleux (Vétérinaire) AT	Baumes ٣٩
Bain antiparasitaire à la nicotine A \$	Béhen astringent\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Bain de tilleul	Béhen rouge \\
Bain résolutif	Benzoate de sodium £ £
Bains	Berle ۲۱•
Bain stimulant A \$	Berle à feuilles étroites Y \ •
Balsamine sauvage \ \\	Berle dressée ۲۱۰
Bananier basjoo YoV	Bicolorine
Bananier d'Inde ٢٥٦	Bière antiscorbutique
Bananier de Chine ٢٥٦	Bile de bœuf YTY
Bananier fétiche Yol	Biscuits vermifuges à la santonine. ٣٦
Bananier japonais YoV	Bois 9 ·
Barbe-de-chêne \ \\T	Bois d'aloès 9 •
Barbeau Y•\	Bois d'arc
Bardane pubérulente	Bois d'oreilles YY9
Basilic à feuilles de laitue Vo	Bois de campêche 9.
Basilic à feuilles frisées Vo	Bois de chien ٣٦
Basilic à feuilles violettes Vo	Bois de couleuvre 9 •

Bois de garou YY9	Cérat de Pott YY
Bois de mai\\\	Cérat morphiné ۲۳
Bois de Rhodes 41	Cérat opiacé YY
Bois de rose 41	Cérinthe majeure ۱۲۱
Bois gentil YY9	Cérinthe petite ۱۲۱
Bois joli YY9	Cévadille 176
Bois puant ".	Chamépitys \o/
Boissons spiritueuses Y & 9	Chanvre (Mode d'usage) 196
Bougies médicinales \ \ \ \ \ \ \	Charbon animal purifié \V
Bouillon de veau	Chardon doré Y \ Y
Bouton d'argent 🏲	Charpentaire
Brimble \\74	Chêne à feuilles de châtaigner \\Y\
Brinvillière \Y &	Chêne à galles 171
Caapi YVY	Chêne à grappes 171
Cachets médicamenteux Y \	Chêne blanc 17
Cactus à grandes fleurs 189	Chêne cocciné ۱۳۱
Café vert ٤١	Chêne d'Amérique ١٣١
Campêche٣٧	Chêne des teinturiers ۱۳۱
Camphre naturel Y • §	Chêne du Portugal ۱۳۲
Canneberge	Chêne garouille ١٣٢
Canneberge des marais 179	Chêne kermès ۱۳۱
Capsules de pain azyme Y \	Chérimolier 190
Cardamine des prés VA	Cherouis 176
Carline vulgaire Y \ Y	Chervis
Cataplasme en feuilles YYo	Chevalon Y.
Cautère ۲٦٢	Chigommier\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Cayapona Y•7	Chirimoyer 190
Cécropie glanduleuse	Chlorodyne Y 1 Y
Cécropie toute blanche	Chlorure de fer hémostatique Y \ Y
Centaurée jacée ۲۰۱	Chlorure ferrique ٢١٢

Cigarettes arsenicales 177	Coquelicot du Liban 91
Cigarettes arsenicales de Boudin. 177	Cormier 1VY
Cigarettes et cigares médicaux \ \ \ \ \ \ \	Corne artificielle
Ciguë aquatique \ \ \ \ o	Cornichon 9Y
Ciguës (Espèces) \	Cornouiller circiné
Cires végétales \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Cornouiller soyeux ۱۹٤
Ciste à feuilles de sauge YYY	Coronille glauque ٢٩
Citronnelle Y•Y	Coronille toujours verte ۲۹
Classification des extractions Y & \	Coronope
Clématite à vrilles ۲۰٦	Corossol d'Asie
Clématite toujours verte ۲۰٦	Corossol des marais\90
Clystères	Corossolier des marais \ 90
Coca YIA	Corydalle belle ۱۹۰
Cognac Yo.	Corydalle creuse \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Colchique d'automne ۱۳۳	Coton de verre ۱۹۷
Colchique de Decaisne ۱۳٥	Coton minéral ۱۹۷
Colequim	Couleuvrée de Virginie \ \ \ Y
Collodion salicylé ۱۷۳	Coussinet
Collyre	Cresson de Para A\
Collyre (Formules) ١٩٦	Cresson des prés VA
Combretum\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Cresson du Brésil
Composition chimique de l'opium of-	Cresson élégant VA
ficinal Y•	Cressonnette VA
Concombre-cornichon 47	Cricri
Concombre des Antilles 47	Curcuma
Concombre marron 47	Curcuma long ۲۱۱
Conserves YoY	Curcuma zédoaire ۱۱۱
Conyse	Cytise de montagne ١٣٨
Conyze٣٥	Daphné joli bois YY9
Conyze vermifuge \A.	Daphné mézéréon YY9

Deguélie	Enègmes
Dentaire٩٨	Épine blanche\\\
Derris 4 o	Esculoside \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Déserpidine 97	Espèces\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Digitale pourprée \ \ \	Esprit d'écorce de citron Y • A
Dwarfmilfoil	Esprit de Castoréum Y • V
Eau-de-vie Yo.	Esprit de framboise Y • A
Eau de Dardel Y • A	Esprit de raifort composé Y • A
Eau de magnanimité Y•A	Esquine \A\
Eau de Rabel Yoo	Essence d'ylang-ylang 9
Eau gazeuse au protoxyde d'azote. ۲71	Essence de lavande bâtarde 9
Eau gazeuse azotée ۲٦١	Essence de lavandin 9
Eau gazeuse édulcorée ۲٦١	Essence de Ptychotis ajowan 4
Eau gazeuse simple Y7.	Ester amylnitreux
Eaux minérales YoV	Ester benzylsalicylique \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Eaux minérales artificielles Y7.	Ether amylazoteux\
Eccalochrome \\ \\ \o	Ether amylnitreux
Édulcorants ۲۳۱	Éthylhydrocupréine Y
Eléctuaires	Eupatoire à seuilles de sarriette \V7
Electuaires simples YoY	Eupatoire de Mésué
Elixir de raifort composé Y • A	Extait alcoolique de quinquina Y &
Elixirs YY	Extait de quinquina jaune Y &
Ellébore à fleures vertes AA	Extrait Y & \
Ellébore d'Orient	Extrait brut de réglisse Y & V
Ellébore officinal	Extrait d'arnica Y & Y
Ellébore vert	Extrait de bile de bœuf YYY
Ellébore vésicant	Extrait de bile de bœuf purisié et
Émétine (Chlorhydrate d') YV	desséché YYY
Emplâtre YYY	Extrait de chanvre indien Y & Y
Emulsions Y & \	Extrait de cubèbe Y & Y

Extrait de gentiane Y & Y	Galle de chêne
Extrait de gentiane stabilisée Y & Y	Garde-robe Y•Y
Extrait de kola Y & &	Gargarismes
Extrait de pavot Y & V	Gelées
Extrait fluide de grindelia Y & o	Génépi bâtard ٤
Extrait fluide de passiflore 7 8 7	Génépi femelle V
Extrait fluide de salicaire Y & 7	Génépi noirV
Extrait fluide de salseparelle Y & 7	Geoffrée V
Extraits alcooliques ou hydro-alco-oli-	Geoffrée de Surinam V
ques 7 £ 7	Geoffrée inerme V
Extraits aqueux Y & 7	Géoffrée vermifuge V1
Extraits fluides Y & 0	Germandrée à fleurs en tête \ o V
Extrait total d'opium Y & ٦	Germandrée ambrée \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Farines de légumineuses	Germandrée crétoise \\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Faux cyprès Y•Y	Germandrée de Crète 109, 10V
Faux fenouil	Germandrée des montagnes ۱٥٨
Faux turbith٩٤	Germandrée flavescente ۱۵۷ ، ٦٧
Fécule de pomme de terre ۲٦٤	Germandrée ivette\ \ o A
Fenouil d'eau \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Germandrée jaune ۱۵۷، ٦٧
Fenouil d'ours \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Germandrée maritime ۱٥٨
Fève de Calabar ۱۸٦	Germandrées
Fève de Saint Ignace \Ao	Germandrée tomenteuse
Fiel de bœuf YTY	Gin et Whisky Yo.
Filaria à larges feuilles \ ٤٣	Gingembre bâtard\\\\\
Foin de chameau V	Glucose liquide \VV
Fontanelles ۲٦٢	Glycérés Yow
Fonticules YlY	Gommes-résines \o٣
Fruits du séné	Gouttes Y70
Gaïacol sulfonate de potassium \VV	Gouttes acides toniques ۲00
Galle	Graisses hydrogénées 97

Grande astrance YY•	Huile camphrée concentrée \ Y
Grande cérinthe\YV	Huile camphrée injectable \ Y
Grande digitale \•\	Huile d'olive neutralisée et stérilisée \
Grand mélinet \YV	Huile de cantharides\
Grand orpin A7	Huile de cire\Y\
Grand Tayove ٥٨	Huile de fougère mâle\Y
Granules VV	Huile de garou\
Grillon champêtre ٦٣	Huile de gomme ammoniaque pyrogé
Grillon des champs٦٣	née \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Guaco\V7	Huile de lin
Hachich des mexicains ۲۱۹	Huile de roses pâles \Y'
Hachich des péruviens ۲۱۹	Huile de schistes \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Hellébore vésicant	Huile grise
Hélonias Jaune ۲٦٩	Huile iodée\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Hématoxyle TV	Huile phéniquée ou phénolée \ Y
Herbe à éternuer 🏋	Huile philocome \ Y
Herbe à la coupure	Huile purgative \ Y
Herbe à la fièvre	Huile rosat\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Herbe à oignons ١٢٨	Huiles médicinales \ Y
Herbe à scorpion \ \ \	Huiles pyrogénées\
Herbe aux abeilles \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Hure du Brésil Y7
Herbe aux chats	Hyoscyamine (sulfate d') YV
Herbe aux mouches ٣٥	Imbahyba ١٥١
Herbe aux puces	Ipécacuanha blanc amylacé \ \ \
Herbe judaïque ۲٦٧	Ipécacuanha ondulé \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Herbe parfaite \vo	Ipécacuanhas
Herbe sarrazine 🏲	Ipécacuanha strié majeur \ \ \ \
Hoang-Nan YIA	Ipécacuanha strié mineur \ \ \ \ \ \
Huaco\V7	Ipéca glycyphloea١٦٥
Huile camphrée ۱۲۱	Ipéca gris cendré glycyrrhizé \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ipéca Sainte-Marthe \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Lavande triste
Ipéca strié noir	Lavements
Ipéca violet	Laxatifs Y & V
Ive \oA	Lichen
Ivette\oA	Lichen blanc de neige VA
Ivette musquée ١٥٨	Lichen contre la rage VA
Jacée Y•\	Lichen des murs VA
Jacée des prés Y•1	Lichen des rennes VA
Jacinth à toupet AT	Lichen entrelacé VA
Jone odorant	Lichens tinctoriaux V4
Joubarbe des vignes Λ 7	Lilas de terre AT
Joubarbe rose	Limonades\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Joubarbe Toile d'Araignée 4Y	Limonade gazeuse ۲٦١
Jujubier des lotophages \ 00	Liniment
Jujubier sauvage \ \ o o	Liniment camphré ۱۲۱
Jusquiame blanche £ £	Lin purgatif Y•7
Katran	Lin sauvage
Khoka Y\A	Liqueur YY7
Kino d'Australie YY \	Liqueur du Dr Pravaz Y \ Y
Kino de Gambie YY \	Liriodendron \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Kino de la Jamaïque ۲۲۱	Lok
Kino du Bengale YY	Looch
Kinos (sortes de) YY \	Lotions \V &
Kirsch Yo.	lotus des anciens
Kirsch-wasser Yo.	Lucotte
Lactucarium 177	Maclure
Laine de verre ۱۹۷	Magnolier de Virginie You
Lampourde épineuse \ \ \	Magnolier glauque Yo &
Langue d'agneau ۲۲۳	Malon ۲・۱
Lavande de mer \\	Marasquin de Zara Yo.

Marum\0A	Olivier sauvage \\/
Massette des étangs	Onguent
Mastic à la Gutta percha Yoo	Onopordon à épines variées \A
Matico YYA	Onopordon à tête d'artichaut \AY
Mauvealcée	Onopordon carduiforme \A\
Médicament	Onopordon du Liban \A
Mélinet minor \YV	Onopordon floconneux \A\
Meum 1 & 1	Opiats
Mikanie Guaco ۱۷٦	Oranger des Osages \ 4
Millefeuille aquatique \ \ \ \ o	Oréodoxe royal ٢٦٤
Mimosa blanc\	Origan d'Ehrenberg
Mimosa bleu	Origan d'Espagne\
Mixture YT9	Ormière 177
Molène sinueuse £V	Orpin reprise
Mors de diable ٣٧	Orpin rose
Mucilage YYo	Ortie à pilules 197
Muriate de fer Y \ Y	Ortie à queue
Mûrier rouge oq	Ortie douteuse
Muscari à toupet	Ortie membraneuse ۱۹۲
Muscari chevelu	Ortic romaine
Nitrite d'amyle\	Osmanthe odorant\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Noble épine ۱۱٤	Pagianthe cérifère \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Noir animal purifié	Palmier royal ٢٦٤
Noir de fumée Y7V	Palmite
Noisette d'Inde Y \ V	Panacée d'Esculape
Noix de galle	Panax à fleurs sessiles £7
Oeil de perdrix	Panax de Henri
Oignon marin \7	Panax épineux £7
Oléastre \\A	Panax piquant £Y
Olivier odorant \\ \ \	Pancréatine

Pareira brava ٣٤	Pied de canard £7
Parelle ^ 	Pilingre 197
Pâte de gomme arabique dite pâte de	Pilules
guimauve 177	Pilules et Bols 07
Pâte dite Tussilage à l'anis de Lille \\\	Piscidie ٣٦
Pâte officinale au lichen \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Pissenlit assemani ۲٦٨
Pâte ou gelée pectorale de fruits. \\\	Pissenlit bessarabique Y TV
Pâtes pour usage vétérinaire \7.	PistouV7
Patience sauvage	Plantain bâtard YYY
Patte d'oie vraie \ • ٩	Plantain corne de cerf YYY
Patte de loup ١٢٦	Plantain moyen YYY
Perce-pierre des champs Y\ \ \ \	Plante à moustiques Vo
Perchlorure de fer ۲۱۲	Podophylle £٦
Périploque grec ٣٨	Podophylle en bouclier £ ٦
Persicaire douce 197	Podophylle pelté £7
Persicaire pointue ۱۹۳	Poix noire
Persil de montagne ۲۰۹	Poix résine \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Pervenche herbacée YV1	Polium Nov. TV
Pet d'âne NAY	Polium à feuilles de lavande \ OA
Pet d'âne à épines variées ۱۸۳	Polium blanc 109,10V
Pet d'âne à tête d'artichaut ۱۸۳	Polium maritime\ov
Petit basilic ٧٦	Pollen \V•
Petit mélinet	Pommade YTT
Phellandrie\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Pouliot de Crète \ o q
Phénol sulforiciné \AA	Pouliot de montagne \ o A
Phillyrée à larges feuilles \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Pouliot jaune ۱۵۷, ٦٧
Phillyrée intermédiaire \ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Ptarmique٣
Phillyrée Orientale \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Pudis ٣.
Physostigma vénéneux \A7	Quenouille
Pied de boue	Ouinquina Pitavo ۲۱٦

Quinquinas et leur composition chimi-	Salsepareille
que	Salsepareille squine
Quinquinas jaunes de Colombie Y \ 7	Sang-de-dragon 9V
Racine de Chine ۱۸۱	Sang-dragon 9V
Racine de safran ۲۱۱	Sanicle de montagne ۲۲۰
Rack 7	Sanicle femelle ۲۲۰
Radiaire YY•	Santoline Y•Y
Réglisse (composition chimique). 140	Santoline blanche Y•Y
Réglisse hérissée	Santoline petit cyprès Y•Y
Reine-des-prés ١٦٣	Santonique Y•Y
Renoncule scélérate	Sapinette £A
Renouée de Sieboldi ۱۹۳	Satyrion ١٢٦
Renouée persicaire\\	Sauge des bois Y • Y
Résine jaune ۱۱٦	Scabieuse٣٧
Résines ۱ • ٤	Scabieuse argentée ۱۳۰
Rhodiole	Scabieuse d'Ukranie ۱۳.
Rhubarbes	Schænanthe V
Rhubarbe-groseille	Scille١٦
Rhubarbe officinale	Scrotum de chien ١٢٦
Rhubarbe sauvage	Scutellaire galériculée ۲٦٧
Romarin des marais \\	Sébadille ۱۲۹
Sabadille 179	Sédum reprise
Sablier du Brésil ٢٦٩	Sédum télèphe A7
Saccharolés mous	Sel anhydre Y \ Y
Safran des Indes Y\\	Senelle\\\\\
Sagou 17 &	Senellier \\ \ \ \ \ \ \
Saladelle\	Serpentaire de Virginie ۱۱۲
Salap 177	Sesbanie à grandes fleurs \ \ \ \ \ \
Salep 177	Sinapismes en feuilles YYO
Salicylate de benzyle\ \ \ \	Smilax de Chine ۱۸۱

Soie de verre ۱۹۷	Thapsie 9 8
Soluté officinal de chlorure ferrique Y \ Y	Thé de Trébizonde ۱۹۸
Solution aqueuse de gaz carboni-	Thuya du Canada 7.
que	Typha d'Australie £V
Sorbier \VY	Typhace
Souchet des Indes ۲۱۱	Thym blanc
Souchet rond ١٢٨	Thym capité \ \\\
Spigélie anthelminthique \ Y &	Thym rouge d'Espagne \ \\"
Spilanthe	Thym rouge de Tunisie \ \ \ T
Spirée filipendule \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Tilleul à grandes feuilles \ \ ٩
Spirée ulmaire ١٦٣	Tilleul d'été \ \ \ \ \
Squille 17	Tilleul femelle \ \ \ ٩
Squine ۱۸۱	Timbo 0 9
Statice 11	Tontaque £V
Statice maritime \\	Toque Ylv
Stéarine VY	Tramène ٢٦٥
Sterculier scaphigère	Trèfle commun Y70
Sterculier tambayang	Trèfle des prés Y70
Strophanthe agréable ۱۲٥	Trèfle rouge ٢٦٥
Strophanthe glabre ۱۲0	Trèfle violet ۲٦٥
Strychnos ignatier ۱۸٥	Triolet ۲٦٥
Sulfocarbol ۱۸۹	Tulipier \ \ \ \ Y
Sulfogaïacol \VV	Tulipier de Virginie \ \ \ Y
Sumac vénéneux ۱۳۰	Typhace £V
Sureau à grappes £ A	Typha d'Australie ٤٧
Tambayang OA	Ulmaire\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Taro des anciens o A	Usage vétérinaire 07
Terra merita Y\\	Vaciet AT
Tête de loup ٣٧	Vernonie vermifuge\A•
 Tête de moineau Y•1	Verveine indienne ^ •

Vétiver V	Voacanga de Thouarsi ۱۸٥
Vignette 17	Vomiquier amer
Viorne à feuilles de prunier \A	Xanthium épineux \ \ \ \
Viorne mancienne	Yagé YVY
Vipérine de Virginie ۱۱۲	Yohimbe YVY
Voa-Fotsy	Yumbehoa YVY
Voacanga d'Afrique \A0	Zédoaire 111

٤- مسرد ألماني

Ackergamander \\ \\ \\ \	Blaugrünkronwicke Y
Afrikanischer voacanga \Ao	Blütenstaub
Alkali\\q	Branntwein Yo
Alligatorapfel \ 9 o	Brasilianisch Sandbücksenbaum . Y74
Aloe ۲0	Brennung Y71
Amerikanischer eiche ۱۳۱	Broussatee ١٩/
Anguriengurke 9 Y	Cameleshov
Arekapalme Y \ V	Campechebaum٣٧
Astragal\	Campecheholz ٣٧
Ätzmittel	Chinastechwinde\
Augentropfen \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Chinawurzel ۱۸۱
Augen wurz Y•9	Chinesischbanane You
Balsam٣٩	Chirimoya 190
Balsamgarbe £	Citronengras
Barbarei Beifuss ١٥١	Citrongrass A.
Berggoldregen \\TA	Cocastrauch Y 19
Betramgarbe	Cretischer berglavendel \ o 9 , \ o V
Beumkränzensinau Y 1 0	Damaszengarbe
Birngurke 4 Y	Decaisne lichtblume \٣0
Bittere ignatie	Decaisne zeitlose \٣0
Blasenziehend nieswurz A9	Diademfrauenmantel ۲۱۵
Blattkastanie eiche \TT	Diademsinau ۲۱۵
Blaue akazie \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Drachenblut 9V

Dreilappigosterluzei\\\\\	Gelber gamander ۱۵۷، ٦٧
Dreilappighohlwurz\\\\	Gelber günsel \ o A
Dürrwurz ٣٥	Gelbe wachsblume ۱۲۷
Echeter tulpenbaum \ \ \ \ \ \	Gelee ۲۳
Echte galleiche ۱۳۲	Gemeiner dorn
Echte hundsschlinge	Gewürzgarbe
Echte meerzwiebel ١٦	Gifthahnenfuss
Echter rhabarber \ • A	Giftigesumach
Echter seidelbast ۲۲۹	Gilberingwer Y \ \
Echter speierling	Gilbwurzel Y \ \
Echter widerstoss	Glücksbringerbanane Yol
Echtes mädesüss \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Grasartig sinngrün YV \
Ehrenbergdost \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	Groberblüte osterluzei ۱۱۲
Einfachblättrige waldrebe Yon	Grossblüte sesbanie \ \ \ .
Eselfurz \AY	Grosse Fetthenne
Eselfurz artischoke	Grosser Tayove 0 A
Falsche turbith	Grosser wachsblume\\
Feine Bärwurz \ \ \ \ \	Grosses flöhkraut ***
Feinfilzige lorbeerlinde \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Grosse sterndolde ۲۲.
Feldbeifuss	Grüner Kronwicke Y
Feldfrauenmantel Y \ \ \ \ \ \	Grüner nieswurz
Feldgrille	Hagedorn \\ \ \ \ \ \
Feldsinau Y \ &	Harz١٠٤
Fetischbanane You	Hauswurz 9 Y
Fingerhut \•\	Heilstearinkerze \\ \\ \ \ \
Flockig eselfurz\\\Y	Heiltrank YY
Galläpfel eiche\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Helmblume YVY
Galle YTY	Herbstzeitlose
Gamander\07	Hirschorn wegerich YYY
Gänsefussmelde \ • ٩	Holz٩•

	Husarenknopf A\	Mittlerer wegerich 777
	Ignatienbaum \\ \	Mixtur Y٣٩
	Indianisches wurmkraut ۱۲٤	Moosebeere 179
	Indischbanane You	Moosheldelbeere\
	Ivygünsel ١٥٨	Niesgarbe T
	Japanisch badianenbaum ٣١	Orientalische nieswurz A9
	Japanisch banane Yov	Osagedorn \ 9 •
	Kaffee ξ \	Osagen apfel\
	Kalabarbohne ۱۸٦	Pappawbaum
	Katzengamander \oA	Parakresse A1
	Katzenkraut	Persischer rhabarber \ \ \ \ \ \
	Kellerhals YY9	Pflaumenblatt schlinge \A
	kermesbaum ۱۳۲	Pillennessel\ \ \ \ \ \ \ \ \
	Kermes eiche ۱۳۲	Pinangpalme Y \V
	Klee Y70	Poleigamander 7V
	Kleine blütbadianenbaum ٣١	Purgier-léin Y•7
	Kleine blütsternanis ٣١	Purgier-Flachs Y•7
	Kleine eberwurz Y \ Y	Purpurapfel
	Kleines basilienkraut ٧٦	Rhabarber \ \ • o
	Kletternder ۱۹۱	Riechölbaum \ \ \ 9
	Königspalme. Y78	Riesenhohlwurz
	Konserve YoY	Rohrkolben £V
	KukucksblumeVA	Rollenkornelbaum\\9\&
	Lebensbaum	Rollenkorneliuskirschbaum \ 9 &
	Libanesisch eselfurz ۱۸۲	Rote bergfetthenne A7
	Libanon mohn	Roteklee Y70
	Lotosbaum	Rote maulbeerbaum o 4
	Mauergansefuss	Rotodkopfklee ٢٦٥
	Mauszwiebel \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Runde zyperwurzel\\\\\\\\
0	Meisterwurzel YY•	Sago 17 &

Salbeiblatt cistrose	Wachs baum \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Salepwurzel ۱۲٦	Waldbalsamine\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Schlinge 19	Wälzenhornstrauch \ 9 &
Schmaler £V	Wasserapfel \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Schnurfrechme \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Wasser filipendel \ \ \ 0
Schöne kletternder\	Wasser pfersaat \ \ \ \ o
Schopfmusk	Wasser sellerie Y \ •
Schwanznessel\\9\	Weicherkleinklette A
Seidenhornstrauch ١٩٤	Weicherklette ^
Silberskabiose	Weichkornelbaum. \ 98
Skorpion astragel \ \ \ \	Weisenkönigin \ ٦٣
Sommeradonisblume ٦	WeisenschaumkrautVA
Spanisch Dost ۱۱۳	Weissdorn \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Spanisch thymian \ \\T	Weisse akazie ۱۳۳
Spitzig Knöterich \\ \\ \\ \\	Weissenflockenblume Y•1
Stachelspitzklette \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Weisser bilsenkraut £ £
Stechwinde	Weisser eiche ۱۳۱
Steifwassersellerie ۲۱۰	Wiesenklee Y70
Steinbrech Y\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Wilder dillen \ \ \ \
Stinkbaum T•	Wilder Ölbaum ۱۱۸
Stinkholz	Wolliges agremonen \V•
Tambayangstinkbaum oA	Wollkraut £V
Tenfelsabbiss TV	Wurmabführend albizzia ۲۲
Thouarsische voacanga\	Wurmabführendvernonia \A.
Tropenworz	ysop gamander \oq .\ov
Unechter kohlbaum V•	Zedoarwurzel ۱۱۱
Verehren sternanisbaum ٣١	Zittwer Kurkume ۱۱۱
Virginischer Hohlwurz\\\\	Zuckermerk 179
Virginischer osterluzei \\Y	Zweifelhaftnessel\ \ 4 Y
Voa-Fotsy\\A	Zwerggarbe {

٥- مسرد لاتيني

Acacia albida ۱۳۳	Alocasia macrorrhiza
Acacia cyanophylla ۱۳۳	AloeYo
Acanthopanax ٤٣	Aloë perryiYV
Acanthopanax Henryi ٤٣	Amomum curcuma ۲۱۱
Acanthopanax senticosus ٤٣	Amylum oryzae Y78
Acanthopanax sessiliflorum & T	Amylum solani Y78
Achillea ageratum \$	Anacyclus velentinus Y 9
Achillea damascena	Anagyris fœtida "
Achillea falcata 0	Andira V•
Achillea herba-rotas §	Andira inermis V•
Achillea macrocephala ٣	Andira surinamensis V.
Achillea nana	Andira vermifuga V
Achillea ptarmica ٣	Andropogon citratus A.
Achillea sulphurea o	Andropogon schænanthus V
Achillea viscosa §	Anemone pratensis 187
Adonis æstivalis	Anona asiatica
Adonis Pyrenaica	Anona cherimolia
Agrimonia odorata ۱۷۰	Anona palustris
Ajuga chamæpitys	Anona triloba\
Ajuga iva	Aphanes arvensis Y \ &
Albizzia anthelminthica YY	Aphloia sp \A&
Alchemilla arvensis Y\ \ \	Arctium minus pubescens A
Alchemilla diademata Y \ o	Areca catechu ۲۱۷

Areca faufel Y \ V	Cerinthe minor \YV
Aristolochia gigas \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Chamælirium carolinianum ٢٦٩
Aristolochia grandiflora\\\\	Chenopodium murale \ • ٩
Aristolochia serpentaria\\\\	Chondodendron tomentosum ٣٤
Aristolochia trilobata ۱۱۲	Cinchona pitayensis ٢١٦
Artemisia aragonensis \ 0 \	Cistus salviifolius YYY
Artemisia campestris \ 0 \	Cladonia rangiferina VA
Artemisia Cina	Clematis cirrhosa Yo7
Artemisia spicata JacqV	Cocculus chondodendron ٣٤
Asiminia triloba \ Y	Cocculus plathyphylla ٣٤
Astragalus mareoticus\ \ \ \	Coffea ٤١
Astrantia major YY•	Colchicum autumnale ۱۳۳
Athamanta oreoselinum Y•9	Colchicum decaisnei ۱۳٥
Atragalus exscapus 10	Colocasia odora
Baccharoides ascaricida \A•	Combretum sundaicum \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Banisteria caapi YVY	Conyza anthelminthica \A.
Berula angustifolia Y1.	Conyza squarrosa ٣0
Berula erecta Y1.	Coridothymus capitatus ۱۱۳
Cactus grandiflorus 179	Cornus circinatus ۱۹٤
Caladium odorum	Cornus sericea\\9\\$
Calamus draco 9V	Coronilla glauca ۲۹
Cardamine pratensis VA	Coronilla sempervirens Y 9
Carlina vulgaris Y 1 Y	Cortex pseudo-angusturae T.
Cayaponia globosa Y•7	Corydalis cava ۱۹۱
Cecropia adenopus 10 Y	Corydalis formosa ۱۹۰
Cecropia hololeuca ١٥٢	Corynanthe Yohimbe YVY
Centaurea jacea Y•\	Cratægus oxyacantha\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Cereus grandiflorus 149	Cucumis anguria 47
Cerinthe aspera\\YV	Curcuma longa Y 1 1
 Cerinthe major \YV	Curcuma zedoaria rosc \\\\

Cymbopogon citratus	Helonia dioica ٢٦٩
Cyperus rotundus	Hura brasiliensis ٢٦٩
Daphne mezereum ۲۲۹	Hyacinthus comosus AT
Deguelia٩0	Hyoscyamus albus ٤ ٤
Dentaria pinnata٩٨	Ignatia amara\\
Derris 90	Illicium parviflorum ٣١
Digitalis purpurea \ \ \	Illicium religiosum٣١
Dracæna draco ٩٧	Imbricaria parietina VA
Eleutherococcus Henryi १٣	Impatiens nolitangere \ \ \ \
Eleutherococcus senticosus १٣	Inula conyza ٣٥
Erythroxylum coca Y 1 9	Inula vulgaris ٣٥
Eupatorium perfoliatum \Vo	Jacea communis Y•1
Eupatorium satureiæfolium \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Laburnum alpinum ۱۳۸
Extractum fellis bovis YTT	Lactuca sativa
Fellis bovis	lactuca virosa ١٦٦
Filipendula Ulmaria ١٦٣	Lappa minor pubescens A
Galla quercina 79	Ligusticum meum ١٤١
Galla tinctoria 79	Linum catharticum Y•7
Galla turcica	Liriodendron tulipifera \ \ \ \ \ \ \
GeoffrœaV•	Maclura aurantiaca Nutt ۱۹۰
Geoffrœa inermis V•	Maclura pomifera schneid \ 4 •
Geoffrœa surinamensis V•	Magnolia glauca ۲0 ξ
Geoffrœa vermifuga V\	Magnolia Virginiana Yoʻt
Glycyrrhiza echinata ١٣٨	Malva alcea ٨٨
Gryllus campestris ٦٣	Manettia ignita
Hæmatoxylon campechianum TV	Marum verum ١٥٨
Helleborus officinalis A9	Mespilus oxyacantha \\ \ \
Helleborus orientalis	Meum athamanticum \ \ \
Helleborus vesicarius	Mezereum officinal YY9
Helleborus viridis AA	Morus rubra

Musa basjoo YoV	Pausinystalia Yohimba YVY
Musa japonica	Peltigera canina V/
Musa religiosa You	Periploca græca
Musa sinensis You	Phellandrium aquaticum L \ \ \ \ \ \
Muscari comosum	Phillyrea latifolia \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Muscari longissimum	Phillyrea media \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ocimum minimum ٧٦	Physica nivalis V/
Ocimum viride ٧٥	Physostigma venenosum \A
Olea fragrans \ \ \ 9	Pimpinella sisarum 176
Olea oleaster\\A	Pipper angustifolium YYV
Olea sylvestris \\A	Pipper camphoriferum YY/
Enanthe phellandrium \ \ \ \ \ \ \ \	Pipper elongatum ۲۲۷
Onopordum	Piscidia erythrina
Onopordum carduiforme \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Plantago coronopus YYY
Onopordum cynarocephalum ۱۸۳	Plantago media ۲۲۲
Onopordum floccosum \AY	Podophyllum peltatum £7
Onopordum heteracantha ۱۸۳	Polygonum cuspidatum 197
Onopordum libanoticum ۱۸۲	Polygonum persicaria ۱۹۲
Onopordum telavivense ۱۸۲	Polygonum sieboldii
Orchis	Psychotria emetica
Oreodoxa regia ٢٦٤	Ptarmica vulgaris
Origanum Ehrenbergii	Pterocarpus draco 4V
Osmanthus fragrans 119	Quercus aesculus \\TT
Oxycoccos palustris ١٦٩	Quercus alba
Oxycoccos quadripetala	Quercus castaneifolia\
Pagiantha cerifera \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Quercus coccifera\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Panax sessiliflorum £٣	Quercus infectoria \\T\T
Papaver libanoticum ٩١	Quercus lusitanica \\T\T
Parmelia parietinaVA	Quercus lusitanica var. infectoria 79
Paullinia pinnata 0 9	Quercus racemosa

Ranunculus sceleratus Ao	Sedum vulgare
Réglisse (composition chimique). 170	Sempervivum arachnoideum 4
Resina. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Serjania curassavica 06
Rhamnus lotus\\oo	Sesbania grandiflora \ \ \ \
Rheum \ \ • o	Sium ۲۱
Rheum officinale ۱۰۸	Sium angustifolium Y \
Rheum ribes \ \ ^ \ \	Sium berula
Rhodiola rosea	Sium erectum
Rhus toxicodendron \٣•	Sium sisarum 176
Richardia	Smilax \A
Richardsonia brasiliensis \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Smilax china \A
Rumex obtusifolius A &	Sorbus domestica \VY
Sabadilla officinarum ۱۲۹	Spigelia anthelmia
Salvia nemorosa Y•Y	Spilanthes oleracea
Salvia silvestris Y•Y	Spiraea Ulmaria ١٦٢
Salvia sylvestris Hort Y•Y	Spiritus vini
Sambucus racemosa £ A	Statice limonium
Santolina chamæcyparissus Y•Y	Sterculia staphigera
Santolina incana Y•Y	Strophanthus gratus 170
Satureia capitata ۱۱۳	Strychnos Gaultheriana ۲٦٨
Scabiosa argentea\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Strychnos ignatii \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Scabiosa ucranica\\T.	Succisa pratensis ٣٧
Scaphium scaphigerum ٥٨	Taraxacum assemanii Y7
Schœnocaulon officinalis ۱۲۹	Taraxacum bessarabicum Y 7V
Scilla maritima L	Teucrium\07
Scutellaria galericulata Y 7V	Teucrium aureum \oV. TV
Sedum purpureum A7	Teucrium capitatum ١٥٧
Sedum rhodiola	Teucrium chamæpitys ١٥٨
Sedum roseum	Teucrium creticum \oq.\ov
Sedum telephium A7	Teucrium flavum ۱۵۷، ٦٧

Teucrium iva	Urginea maritima (L.) Baker \ \
Teucrium marum	Urginea scilla steinh
Teucrium montanum ۱٥٨	Urtica caudata
Teucrium polium ۱۵۷، ٦٧	Urtica dubia 197
Teucrium rosmarinifolium . 109.10V	Urtica membranacea ۱۹۲
Thapsia garganica 9 8	Urtica pilulifera ۱۹۲
Thuya occidentalis 7.	Usnea plicataVA
Thymbra capitata ۱۱۳	Vaccinium arctostaphylos ۱۹۸
Thymelæa mezereum	Vaccinium oxycoccos
Thymelæa præcox YY9	Vaccinium uliginosum
Thymus capitatus١١٣	Verbascum gileadense {V
Thymus creticus ۱۱۳	Verbascum sinuatum
Tilia europaea var. platyphyllos . 119	Vernonia anthelminthica \ \ .
Tilia grandiflora	Vernonia nigritiana
Tilia pauciflora	Viburnum lantana 1 9
Tilia platyphyllos	Viburnum prunifolium ۱۸
Toxylon pomifera Rafin ۱۹.	Vinca herbacea YV1
Trifolium pratense Y70	Voacanga africana\
Typha angustata £V	Voacanga thouarsii\
Typha angustifolia ٤٧	Xanthium spinosum \ \ \ \
Typha australis ٤٧	Zizyphus jujuba \ o o
Ulmaria palustris ١٦٣	Zizyphus lotus

مسارد الملاحق

TAY	١ - مسرد عربتي
٣٩٦	٧- مسرد فرنسيّ٢
٤٠٣	٣- مسرد إنجليزيّ
£ • V	٤- مسرد لاتيني

۱ - مسرد عربي

أشر۳۲٦	آجِيسارِيْن۲۸۱
أشق (دُهن)	آس (دُهن)
أغُونِيادِيْن	آس (زیت)
أَقْصُورِيَّة٣١٦	آلام عَصَبِيَّة وأَلَمُ النَّسا٣١٢
أكارُويد	آلام عَصَبيَّة وَجْهِيَّة
أكالأكال	أَبُو صفير (دهن)
أَكْرُوْيِد	أبِيسَة بَيْضاء (دُهن أكراز)٣٠٣
أَكْرِيفُولِين	أَبِيْسَة حَمراء (دُهن إبر ال) ٣٠٣
أَكُوشي	أَجَاسِين
التهاب الأذن	أَجَاكُونين
الْتِهابِ البُلْعُومِ٢٢٠	أخِيتامِيديْن
الْتِهابُ التَّأْمُور٣١٩	أُخِيتَامِين
الْتِهابُ الجَنبَة	أخِيتَانِيْن
الْتِهابُ الجَيْبِ ٢٣٠	أخِيتايِيْن
التهاب الحُوَيْضَة والكِلْيَة٣٢٤	أُخْيِيْن
الْتِهابِ الخُصْيَةِ	أَذْلُمِيدِيْن
الْتِهَابُ الرَّحِم	أَذْلُويْن
الْتِهاب الرُّنَّة٣٢٢	أَدْها تُودِي
الْتِهاب الصِّفاق٣١٩	أُذُن
الْتِهَابُ الْعَصَبِ	أَرَالِيًّات
الْتِهاب العَيْن	أسارِيْن
الْتِهاب الفّم	أَسَتِيلُ قَانِيلُون٢٨٠

74	wwwalac _ *fl fl *1 _fl
إيريدين	الْتِهَابُ الفَّم القَرْحِيّ غِشائيّ٣٣١
الحتيباس البَوْل	الْتِهاب الوَرِيْد
احْتِقان البَوْل	أَلَم عَصَب السِنّ٣١٢
الحمِرار الأنّف	أَلَمُ العَصَبِ الوَركيِّ٣١٢
الحميرار الوجه	ألَّمُ نِصْفِ الرَّأْسِ٣٠٤
اختِلاج	أَلْيُوكُوكًا (زيت)
پاتُرنُوسيد۲۹۹	أَمْرَاض عَصَبِيَّة
باذِنْجانِيًّات	أَنْجُرِيَّات٢٧٧.
بارابُقْسِیْن۲۹۸	أَنْداكُونِين۲۹۱
باركِنْسُون	انْسُولِيْن۲۹۱
بَارُوسْمَة أنيقة٢٨٢	أَنْكُرْناتِين٢٩١
بارُوسْمَة جَميلة٢٨٣	أَهُوكَاتِيَّة أَمْرِيكَيَّة (دهن)٢٩٨
باسِيَّة (زُبْدَة الـ)٢٩٠	أَهُوكَاتَيَّةَ زُغَبَيَّةَ (دهن)٢٩٨
باننان	أُوْدِيْما
پائِتِیْن	أُوْذِيْما ٣١٤
يَبْسِيْن	أولايُورَازِين٢٩٧
بَتُولا٢٨٣	أولاييك ً
بَتُولَة	أوليڤيل
بَدانَة	أُونُوساًرُول٢٩٧
برازِیًّات۲۷۷	
بَرْبَرِيسِيًّات٢٧٧	
بُرْتُقَال٢٩٩	•
•	إجهاد
بُرَداء	
.ر بُرُدُقان (دُهن)۲۹۹	•
پڑسام	
برسام ناشِف۳۲۲	
بِرْسِيم (صابُونين ال)۲۸۲	· ·
بَرْغَش	_
برعس	إِهْلِيكِجِيُّ تُ

تَقَلُّصت	بُرْغُوث
	بروستات
	بَشَرةبمثرة
تَنْبُل (دُهن)	
	بُطْمِيًّات٢٧٧
تَهَرُّشت	بَعُوضبنتون ۳۰٦
تَهَوَّعتهرا	بَقّ
تَوَتُّر الأغصاب ٢٠٩	
تُوْتِيًّات	بَلْسَمِيْنِيًّات ٢٧٧
ئَذَن	بَلْقاء (دُهْن)
ئَرُّ أَبْيَض	پَلُّوتِيْن۲۹۸
نَرُّ اللَّعابِ	البَلُّوْطِيَّات٢٧٨
ئَزٌّ مَنَوِيِّ٣٣١	بُنْدُق (دُهن ورق شجرة الـ) ٢٩٧
ثُعْبان ً	پُوسيدانِين
ثُوْم (دُهن) ٢٨١	بُوطِيًّات
ثُومُ (صبغة)	بَوْل دَمَوِيّبَوْل دَمَوِيّ
جاْباكُونِيتِين	بِيقُوسِيْنَ٢٨٣
جانيين العَشْقَة	بِيكُوكُولِين
جَثْرُوفِين	پِيَلَرْغُونيدُول٢٩٨
جُرْح	تامُول٢٨٣
جُروح واهِنَة	تَجاعِيد
جَفْن	تَرَنْجَبِيْنِ
جُفُون	,
جُلْبانِين ج	
جِلْد	تَزُبيْل
جُلْهَم (غلوكوسيد)	<u>.</u> -
جُناب بُ	
جَنْبُوزِين	
جَوْزَةُ العَفْصِ٢٨٩	•

خُرَّم (دُهن ال)۲۹٦	مُجُوليانا (زيت)۲۹۲
خُزام (دُهن)	حِرَّة
خَشْخَاشِيًّات	حَرَض
خَفْقان	حُرْقة المَعِدة٣٢٤
خَلَنْجِيًّات	حَشيشةُ القُرْعان (دهن) ٢٩٩
خَليطات	خطبّة ٢٢٨
خَمانِيًّات	حَفَر
خَنازِيْرِيًّات	حُکاك ځ
خَنازِيرِيَّة٣٢٩	حِكَّة
خِنَّوْصِيَّة٣٢٩	حكَّة شَديدة
خَيْمِيَّات	حُلَيّاء (زيت اله)
داء حادّات الذَّيْل	خُلَيْمُوم
داءُ الحَفَر	حِمْحِويًّات
داءُ الصَّدَف داءُ الصَّدَف	حُمْرَةُ الوَجْه
داءُ القَمْل	حَمَلِيًّات
داءُ المَفاصِل	حُمَّى قِرْمِزيَّة٣٢٩
داتِسينُوسيد	حُمَيْراء
داحِسداحِس	خُناك
داخُوْسداخُوْس	خُناكَ قَرْحِيّ غِشائيّ
دِبْساسِيًّات۲۷۷	
	حَوْذَانِيًّات٢٧٧
دَرُويْنِيَةَ حُزمِيَّة (دهن)٢٨٦	حَوْر (دهن بَراعم الـ)٢٩٩
دَرُوَينِيَّة طُقْسُوسِيَّة الوَرَق (دهن) ٢٨٦	حَيَّة (لَدْغَة)
دُغاَم	حَيْض غير كافٍ
دِفْلِيًّات٢٧٨	حَيْضَ غير مُنْتَظَم٢٢٥
دَفْنُوسيد	•
دَفْنِين	·
دَقِيْق	,
دَلْتالِيْن	_

_	
زَنْبَقِيًّات٢٧٨	دَلْفِينُويدِيْن٢٨٧
زَنْجَبِيْلِيًّات٢٧٨	دَم ۲۲۸
زُهامئهام	دَمُ الأَخَوَيْنِ٣٠٢
	دَوْرَم ٢٨٧
	ذَاتُ الجَنْبِ
زَيْتُونِيَّاتُ	ذَات الخُصْيَة
زَيْزَفُوْنِيًّات٢٧٨	
	ذَنَن الرَّحِمذَنَن الرَّحِم
	رازِیانَة (دُهن)
	رَبُو
	رَئْيَة
	رُحامرُحام
	رَخُد ُ ٢٢٤
•	رَزَرْ پِشْنِ
	رَشْحَ وافِر٣٣١
	رَصاصِیّات
	رُعاف
	رَمَد٥١٠
سَنْدَرَك	
	رَوالِيَّة
	رُوبازِیْدرُوبازِیْد
سِيْزالْبِيْنِيَّات	رَوْتُ٢٨٤
سَيَلانَ أَخْمَر	روماتيزم
سَيَلان دُهني تَقَشُّري٣٠	•
•	زِبْلزِبْل
سَيَلان مَهْبِلَيّ أَبْيَض ٢٢٠	زَراوَنْدِيًّات٢٧٨
شاهَتْرَجِيَّات٢٧٨	زُکام
شُحُّ الْبَوْل٣١٤	'
الشّغاف	زُناخَة

عَقْصُ الحَيَّة	شَفَوِيَّات٢٧٨
غارْغاجِيَّات: هي الأَنْجُرِيَّات ٢٧٨	شُقَّارِيَّات: سبط شَقِيْقِيَّات٢٧٨
	شَقِيْقَةشَقِيْقَة
	شَلَلشَلَل شَكْل
	شَنَجشَنَج شَنَع اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْم
	شُوْنِيز دِمشقتي (دهن)۲۹٦
غَثيانغَثيان عَشَان	
	صَبّارِيَّات٢٧٨
	صُداف
غَضْن	
	صُقْلابِيًّات
	صَلِيْبِيَّات
	صَمَمُ وضعف السَّمَع٣٣١
قازیِسیْن۲۹۸	صنْدَل
فازِیْن	طَرَشطَرَش
	طَمْتُ غَير كاف
فالِج	طَمْت غير مُنتَظَمطَمْت
فايُوراتِين	
	ظَمَأُ المَرْضَىظَمَأُ المَرْضَى
	عِجْل البَحْر (زيت)
فَرْمَاكُوبِيا	
نِصَّة	
فُقْمَة	
فِلْيرُوسيد	
فَوْقَسِيْن	
فِيزالِين	-
فِيكاريا (دُهن) ٢٨٨	
قابُوق	
قابُوق (زیت) ۲۹۲	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	<u></u> .
گرْدُول٥٨٠	قُتامِين٢٩٤
كَرْلِيْن نَجْمَيّ٢٨٥	قَدَم حَسّاس٣٢٠
كَرْمَدِيسِيْن٢٨٥	قُرًاصِيًّات۲۷۸
كَرَميلَّة٢٨٤	قَرْطُم (زَيْت الـ)٢٨٦
كروتُن عَنْبَريّ (دُهن)۲۸٦	قَرْعِيَّات٢٧٨
كَرِيْتُه (زُبدة)	قِرْمِزِيَّة٢٨٢، ٣٢٩
كَرَيُوفِيلِّين	قُرْنُوْسِيَّات٢٧٨
کُساح	قَرْنِيًّات
كَظَاظُ الدَّم	قِشْطِيًّات
كَظَّة الدَّم ٰ ٢٢٢	قَطانِيًّات
كُلاءٌ شُحامي	قُلابقُلاب
كُلاءٌ شَحْماني	قُلاعت٠٦
كِلَّاجة (صابُونين-السَّامّ) ٣٠١	قِلْفِلِيًّات ٢٧٨
كِلَّاجِيّكِلَّاجِيّ	قُلْقاسِيَّات
كَلْم َكَلْم َ	قِلَوِيْد٢٨٢
كُلْوَةكُنْوَة	قُماًل
کِلَی ۔۔۔۔۔۔۔	قَمَريًّات
كُلْيَة كُلْيَة	قَمَلً ٢٢٠، ٣١٩
كَناريُوم (دُهن) ٢٠١	قَمْلقمْل
كَنالِين ٢٨٤	
كَنَدِيْن ٢٨٤	كابُوك
كُوْكِيًّات	كاوالا (زيت الـ)
	كايا (زيت الـ)
لاثيرين ٢٩٣	
•	كُرّاتُ الدُّبّ (دُهْن) ٢٨٢
	گراویا (دهن)
لامِيْن ٢٩٣	كَرْبايش ٢٨٥
	ر. بِـِن كَرَبَّة (زيت الـ)۲۸٤
لكُتُوزِينُوز٢٩٢	كَرَيِّن
	حرچن

	٠
نَبْق (مُسْهِل الـ)	ِلَکْتُوسِیْن۲۹۳۲۹۳
نَبْقِيًّات	لُورُولاييك۲۹۳
نبيذ تروسُّو۳۱۰	لُوْغانِيًّات٧٧٨، ٢٧٩
نَتَانَةُ الأنْف٣١٧	ليمون حامِض (دُهن)۲۹۹
نَجِيْلِيَّات٢٧٩	مارُوتي (زيت الـ)۲۹٤
نَخْلِيًّات٢٧٩	مازَرْيُونِيَّات٢٧٩
نَدُغ بُستانيّ (دُهن) ٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مانیسُوبا
نَرْقَال (بَلْسَم)٢٩٥	مَتْمَتْ
نزَارَةُ البَوْل٣١٤	مُخَلَّدات
نَزْفٌ أَنْفِيّ	مَرَض بْرايْت٣٠٧
نَزْفٌ رَحِمِيّ	
نَزْلةنْلةنْلة	مَرُّوْبِين٢٩٤
النَّسا	مُسْتَقِيْماتُ الأَجْنِحَة٢٧٩
نُعاس	مَغْنُوْلِيَّات
نُعْضِيًّات	مُكَوْفَرمُكَوْفَر
نَعْنَع (دُهن)	مَلابِيًّات
تنّه مثنّ	مَلارِيامَلارِيا
	مِلانِين
	مَلْبِيْغِيًّات
نَلْهَة	
نَهَك نَفْسانيّ	مَلِيسَّة (دُهن) ٢٩٤
نُواط	مَنّمَنّ
نَوْبات عَصَبيَّة	مَنْديُوسِين٢٩٣
نُوراستِنيا	مَنْغُوسْتِين٢٩٣
نُولِي (صمغ)	مَنْيُوك٢٩٤
نِياوْلِي (دُهن)۲۹٦	مُوْنَةمُوْنَة
نيكُوتَلِّين٢٩٦	
نیکُوتیامِین۲۹٦	,
نيكُوتيمين٢٩٦	

وَخْزِ الحَشَراتِ٣٢١	نيڭوتىن
وَخْزُ الذُّبابِ٣٠٦	نِيكُولِينَ
	هال صَغير (دُهن)
	هَدْيُوتِيْن٩٩
	هُراشهُراش عليه المستعدد المستعد
	هَلْيانْتِيّ
	هَنْداي (ليكور)
	هِيدْرَانْجِين٢٩٠
ياسمينين۲۹۱	وَجَع الأُذُن ٣١٦
يُسْر (زيت)	وَجَع عَضَلتي
	وَخْزِ «الذُّبابِ» ٣٠٦

۲- مسرد فرنسي

Acaroïde ۲۸•	Anonacées YV
Acérine	Apocynacées YV/
Acer saccharinum (Sirop) YA.	Aracées YV
Acétylvanillone ۲۸•	Araliacées YVV
Acouchi YA•	Aristolochiacées
Acrifoline YA•	Artocarpées YVV
Acroïde YA•	Asclépiadacées YV/
Adhatodique ۲۸۱	Atriplicées. YV/
Adlumidine YA1	Balsaminacées YVV
Adlumine ۲۸۱	Barosma pulchella (ess.) YAY
Aegicérine ۲۸۱	Barosma venusta (ess.) YAY
Ageratum (ess.) YAN	Béhen (huile) YAY
Agoniadine YAN	Ben
Ail (ess.) YA1	Bérbéridacées YVV
Ail (teinture) YAN	Bétel (ess.) YAY
Ail des ours (ess.)	Bicucine YAY
Ajacine YAY	Bicuculline YAY
Ajaconine YAY	Borraginacées YVV
Alcaloïde YAY	Bouleau YAY
Alfalfa (saponine) YAY	Bousage YAY
Alkermès YAY	Bouse YA
Anacardiacées YVV	CactacéesYVA
Anemonées YVA	Camphré YA 8

	Canadine	3 8 7	Darmous	7.47
	Canaline	3 1 7	Darwinia fascicularis (ess.)	7.4.7
	Capock (huile)	797	Darwinia taxifolia (ess.)	7.4.7
	Caprifoliacées	***	Datiscinoside	YAY
	Caramel	3 1 7	Décantation	YAY
	Carapa (huile)	3 1.7	Delphinoïdine	YAY
	Carapine	440	Deltaline	YAY
	Cardamome (ess.)	440	Dipsacées	YVV
	Cardol	440	Dormea (ess.)	YAY
	Carline (ess.)	440	Echiine	YAY
	Carmédicine	440	Echitamidine	YAY
	Carnauba (cire de)	440	Echitamine	YAY
	Carpaine	440	Echitéine	Y A A Y
	Carthame (huile de)	7.7.7	Echiténine	***
	Carvi (ess.)	777	Éléococca (huile d')	***
	Caryophylline	7.47	Ericacées	***
	Cascarille (ess.)	7.4.7	Erythroxylacées	444
	Césalpinacées	***	Euphorbiacées	***
	Cistacées	4	Fécule	***
	Colchicacées	YVA	Ficaria (ess.)	***
	Combrétacées	***	Flacourtiacées	444
	Composées	444	Franguloside	***
	Cornacées	***	Fucusine	***
	Crassulacées	444	Fumariacées	***
	Crucifères	***	Galénique	***
	Cucurbitacées	***	Galipidine	PAY
	Cupressinées	YVX	Galipine	PAY
	Cupulifères	YVA	Galipol	PAY
	Cypéracées	***	Galle	PAY
۳۹۷	Daphnoside	7.47	Gardenia	PAY

Glaucine YA9	Ladaniol Y 9Y
Graminées YV9	Lallemantia (huile de) Y 97
Hédéragénine YA9	Lamine Y 47
Hédéraglucoside Y 9 •	Lathyrine Y 97
Hedyotine ۲۹۰	Lauroléique Y 9 Y
Hélianthique ۲۹.	Légumineuses YV
Hendaye (Liqueur) ۲۹.	Liliacées YV/
Henné ۲۹.	Loganiacées YVA (YV
Hydrangine ۲۹.	Magnoliacées YV
Hyménoptéroïdes YVA	Malpighiacées YV
Illipé (beurre d') Y 9 •	Malvacées YVV
Imagostérol Y 9 •	Mandiocine Y 97
Impastation ۲۹.	Mangostine Y97
Incarnatine Y91	Maniçoba Y 97
indaconine Y¶1	Manioc Y48
Insuline Y 9 \	Manne ۲۹8
Iridine Y 4 1	Marotty (huile de) ۲۹8
Jambosine ۲۹۱	Marrubine Y48
Japaconitine ۲۹۱	Melaleuca (ess.de) Y 9 8
Jasminine YAN	Mélanine Y 9 8
Jatrophine Y 9 \	Mélisse (ess.)
Julienne (huile de) Y 4 Y	Ménispermacées YV
Kapok Y9Y	Menthe (ess.)
Karité (beurre) ۲۹۲	Métrites ٣٠٤
Kawala (huile de) Y۹Y	Métrorragies ٣٠٤
Kaya (huile de) Y۹Y	Migraines ٣٠٤
L-péganine ۲۹۸	Moracées YVV
Labiées YVA	Morsures d'animaux ٢٠٦
Lactosinose	Morsures de serpent T.
Lactucine	Morue (huile de foie de) Y 9 0

Mouches ٣•٦	Noisetier (ess. de feuilles)	447
Moustiques ٣٠٦	Obésité	414
Muguet ٣٠٦	Œdèmes	317
Musacées YV9	Oléacées	771
Myalgies ٣٠٦	Oléique	444
Myocardites ٣٠٦	Oléorésine	444
Myrte (ess.)	Oligurie	317
Myrte (huile) Y٩٥	Olive (huile d')	797
Nauli (gomme) YAo	Olive (huile de moyau 'd)	447
Nausées ٣٠٦	Olivile	T 9 V
Néphrites chroniques ٣٠٧	Ombellifères	**
Néphrose lipoïdique ٣٠٩	Onocérine	4 4 V
Nerfs (crises de) ٣•٩	Onocérol	4 9 V
Nerval (baume) Y90	Onocol	790
Nerveuses (maladies) ٢٠٩	Ononine	491
Nervosisme $r \cdot q$	Ophtalmie	٣١٥
Neurasthénie٣١٠	Orchidacées	774
Névralgies et sciatique ٣١٢	Orchite	۲۱٦
Névralgies dentaires ٣١٢	Oreilles	۲۱٦
Névalgies faciales	Orthoptères	779
Névrites ٣١٢	Otites	۲۱۳
Niaouli (ess.) Y97	Oxyures	۲۱۶
Nicoline Y97	Ozène	417
Nicotelline Y97	Palmacées	779
Nicotiamine ۲۹٦	Palpitation	۳۱۷
Nicotimine Y97	Paludisme	414
Nicotine Y97	Panaris	۲۱۸
Nielle (Ess.) Y97	Papavéracées	**
Nigelle cultivée (huile) ۲۹٦	Papillomes	۲۱۸
Nigelle de Damas (Ess.) ۲۹٦	Parabuxine	291

Paralysies TIA	Phéorétine Y·•
Parkinson ٣١٨	Phillyroside " "" ""
Paupières ٣١٨	Phlébites ٣٢.
Paytine ۲۹۸	Phoque (huile) " " • •
Peau٣1A	Phtyriase ٣٢٠
Pédiculose ٣١٩	Physaline T.
Pélargonidol Y 9A	Pieds sensibles ٣٢.
Pellotine Y 9A	Pipéracées YVA
Pepsine Y 4 A	Piqûre d'orties ٣٢١
Péricardites٣١٩	Piqures d'insectes ٣٢١
Péritonite ٣١٩	Pissement de sang ٣٢١
Persea gratissima (ess.) YAA	Plaies ٣٢١
Persea pubescens (ess.) YAA	Plaies atones ٣٢٢
Persil Y99	Plantaginacées YVV
Pertes blanches ٣٢.	Pléthore ٣٢٢
Pertes rouges ٣٢٠	Pleurésies ٣٢٢
Pertes séminales ٣٢٠	Pleurite ٣٢٢
Pétasites (ess.)	Plombaginacées YVA
Petit-grain (ess.)	Pneumonie ٣٢٢
Petit grain citronnier Y 4 4	Polygonacées YVV
Petit grain Portugal (ess.) Y 4 9	Prostate TYT
Pétunoside Y 9 9	Prurigo ٣٢٣
Peucédanine Y99	Prurits٣٢٣
Peuplier (ess. des bourgeons) Y99	Psoriasis
Pharbitine \mathcal{T} • •	Psychasthénie ٣٢ ٤
Pharmacopée \mathcal{Y} • •	Puces ٣٢ ٤
Pharyngite ٣٢٠	Punaises ٣٢ ٤
Phasine $\Upsilon \cdot \cdot$	Pyélonéphrites ٣٢ ٤
Phasol T	Pyrosis ٣٢٤
Phellandre (ess.) T	Quetsh ٣٠١

Quillaïque ٣•١	Sandaraque	٣٠٢
Quillajique ٣٠١	Sang	447
Quillayasapotoxine ٣٠١	Sang-dragon	4.1
Rachitisme TY &	Santal	٣٠٣
Rancidité ٣•١	Santonine	٣٠٢
Rasamala (ess.) ٣٠١	Sapin (écorce)	٣٠٢
Raubaside ٣•١	Sapin blanc (ess. de cônes)	٣٠٣
Rauwolsine ٣٠١	Sapindacées	771
Règles douloureuses ٣٢٥	Sapin rouge (ess. d'aiguilles)	٣٠٣
Régles insuffisantes ٣٢٥	Sariette des jardins (ess.)	٣٠٣
Règles irrégulières ٣٢٥	Scarlatine	444
Reine-des-prés (ess.) ٣٠٢	Sciatique	444
Reins TYo	Scorbut	444
Renonculacées YVV-YVA	Scrofulariacées	***
Réséda (ess.) ٣٠٢	Scrofule	٩٢٣
Résérpine Y•Y	Séborrhée	٣٣.
Rétentions d'urines ٣٢٦	Serpent (morsure)	٣٣٠
Rhamnacées YV4	Sialorrhée	۳۳.
Rhamnocathartine ٣٠٢	Sinusite	٣٣٠
Rhumatismes ۲۲٦	Soif (des malades)	۰۳۳
Rhume (toux) ٣٢٧	Solanacées	***
Rhume de cerveau ٣٢٧	Somnolence	٣٣٠
Rhume des foins TYV	Spasmes	٣٣٠
Rides ٣٢٧	Spermatorrhée	۱۳۳
Rosacées YV9	Sterculiacées	**
Rougeole ٣٢٨	Stomatites	۱۳۳
Rougeur du nez ٣٢٨	Stomatites ulcéro-membraneuses.	۱۳۳
Rougeur du visage TYA	Sueurs profuses	۱۳۲
Saignement de nez ٣٢٨	Surdité et Hypoacousie	۱۳۳
Sambucoside Y • Y	Surmenage	٣٣٢

Thyméléacées YV9	Ulmacées YVV-YVA
Tiliacées YVA	Urticacées YVA
Typhacées YVV	Zingibéracées YVA

٣- مسرد إنجليزي

Anacardiaceæ YVV	Cold ٣٢٧
Animal bites ٣٠٦	Combretaceæ YVV
Anonaceæ YV9	Compositæ
Apocynaceæ YVA	Cornaceæ YVA
Araceæ ۲۷۹	CrassulaceæYV9
Araliaceæ YVV	Cruciferæ YVA
Aristolochiaceæ	Cucurbitaceæ YVA
Artocarpæ YVV	Cyperaceæ YVA
Asclepiadaceæ YVA	Dentalgia ٣١٢
Atripliceæ	Dental neuralgia ٣١٢
Attack of nerves ٣.٩	Dipsaceæ YVV
Balsaminaceæ YVV	Ear ٣١٦
Berberidaceæ YVV	Edema ٣١٤
Blepharon ٣١٨	Ericacæ YVV
Blood ٣٢٨	Erythroxylaceæ YV9
Borraginaceæ YVV	Euphorbiaceæ YVA
Bright's disease \\T • V	Eyelid٣١٨
Bug ٣٢ ٤	Facial neuralgia ٣١٢
Cactaceæ	Fit of hysterics ٣٠٩
Caprifoliaceæ YVV	Flacourtiaceæ YV4
Cesalpineæ YVA	Flea TY &
Cistaceæ YV9	Flush TYA
Colchicaceæ	Fly ٣•٦

Fumariaceæ YVA	Myalgia Y•	• 7
Graminaceæ	Myocarditis ٣	٠٦
Hay fever ٣٢٧	Nausea Y	٠٦
Head cold	Nervosism Y	٠ ٩
Hearthurn ٣٢ ξ	Nervosity \mathcal{T}	, ۹
Hematuria ٣٢١	Nettle's bites 77	۲۱
Hemicrania ٣٠٤	Neuralgia and sciatica ٣١	۱۲
Hypoacousia ٣٣١	Neurasthenia ٣١	١.
Hypoacusia TT1	Neuritis ٣١	١٢
Insect's bites ٣٢١	Nosebleed TY	۲۸
Insufficient periods ٣٢٥	Nose flush 77	1 /
Kidney TYo	Obesity ٣١	۲۱
Labiatæ YVA	Œdema٣1	1 &
Leguminosæ YV¶	Oleaceæ YV	/۸
Leucorrhea ٣٢٠	Oliguria "Y	1 &
Leukorrh(o)ea ٣٢.	Ophthalmia ٣١	0
Liliaceæ YVA	Orchidaceæ YV	/۸
Lipoidnephrosis ٣•٩	Orchitis ٣١	١٦
Loganiaceæ YVA . YV9	Orthoptera YV	19
MagnoliaceæYV9	Otitis	17
Malaria "IV	Oxyuria ٣١	٦
Malpighiaceæ YV9	Oxyuriasis "\"	7
Malvaceæ YVV	Ozaena ۲۱	V
Menispermaceæ YV9	Ozena ٣١	V
Metritis ٣٠٤	Painful menses YY	٥ '
Metrorrhagia ٣٠٤	Palmaceæ YV	19
Migraine ٣٠٤	Palpitation ٣1	٧
Moraceæ YVV	Paludism	٧
Mosquito ٣•٦	Panaris ٣1	٨
Musaceæ YV9	Papaveraceæ YV	′ V


Papilloma٣١٨	Rhamnaceæ YV
Paralysis TIA	Rheumatism ٣٢٠
Parkinsonism ٣١٨	Rickets TY
Pediculosis	Rosaceæ YV
Pericarditis٣١٩	Rubella TY
Peritonitis٣١٩	Rubeola ٣٢٨
Pharyngitis ٣٢.	Salivation
Phlebitis ٣٢.	Sapindaceæ YVA
Phtyriasis ٣٢.	Scanty menses TY
Piperacæ YVA	Scarlatina ٣٢٩
Plantaginaceæ YVV	Scarlet fever ٣٢٩
Plethora TYY	Sciatica ٣٢٩
Pleurisy ٣٢٢	Scorbutus TY 9
Plombaginaceæ YVA	Scrofula ٣٢٩
Pneumonia ٣٢٢	Scrofulariaceæ YVV
Pleuritis ٣٢٢	Scurvy ٣٢٩
Polygonaceæ YVV	Seborrhea ٣٣٠
Profuse sweating ٣٣١	Sialorrhea٣٣٠
Prostateria ٣٢٣	Sinusitis
Prurigo. "YY"	Skin
Pruritus ۲۲۲	Snake (bite) ٣٠٦ ، ٣٣٠
Psoriasis TYT	Solanaceæ. YVV
Psychasthenia TY &	Somnolentia ٣٣٠
Ptyalism TT•	Spasm. TT.
Pyelonephritis ٣٢ ٤	Spermatorrhea ٣٣١
Pyrosis ٣٢٤	Sterculiaceæ
Rachitis ٣٢٤	Stomatitis
Ranunculaceæ YVV	Stomatitis ulceromembraous ٣٣١
Ren TTO	Surditas ٣٣١
Retention of urine	Surdity


Surmenage TTT	Ulmaceæ YVV-YVA
Thirst ****	Umbelliferæ ۲۷۷
Thrush ٣.٦	Urticaceæ YVA
Thymeleaceæ YV9	Wound TY
Tiliaceæ YVA	Wrinkles ٣٢٧
Typhaceæ YVV	Zingiberaceæ YVA

٤- مسرد لاتيني

Anacardiaceæ	Y 	Cyperaceæ	211
Anonaceæ	444	Dipsaceæ	Y Y Y
Apocynaceæ	Y Y X	Ericacæ	TVV
Araceæ	4	Erythroxylaceæ	279
Araliaceæ	Y Y Y	Euphorbiaceæ	777
Aristolochiaceæ	7 V A	Flacourtiaceæ	279
Artocarpæ	7 V V	Fumariaceæ	277
Asclepiadaceæ	۲ ۷۸	Graminaceæ	779
Atripliceæ	7 V A	Labiatæ	277
Balsaminaceæ	7 V V	Leguminosæ	7 V 9
Berberidaceæ	7 V V	Liliaceæ	244
Borraginaceæ	7 V V	LoganiaceæYVA-	779
Cactaceæ	TV A	Magnoliaceæ	449
Caprifoliaceæ	777	Malpighiaceæ	244
Cesalpineæ	7 V A	Malvaceæ	777
Cistaceæ	779	Menispermaceæ	779
Colchicaceæ.	1 V A	Moraceæ	200
Combretaceæ	1 V V	Musaceæ	444
Compositæ	779	Oleaceæ	244
Cornaceæ	1 V A	Orchidaceæ	244
Crassulaceæ	779	Orthoptera	444
Cruciferæ	1 V A	Palmaceæ	449
Cucurbitaceæ	1 V A	Papaveraceæ	777

Piperacæ	۲۷۸	Solanaceæ	۲۷۷
Plantaginaceæ	۲۷۷	Sterculiaceæ	۲۷۷
Plombaginaceæ	۲۷۸	Thymeleaceæ	۲۷۹
Polygonaceæ	۲۷۷	Tiliaceæ	۲۷۸
Ranunculaceæ	۲۷۷	Typhaceæ	۲۷۷
Rhamnaceæ	YV9	Ulmaceæ Y	۷۷-۲ ۷۸
Rosaceæ	۲۷۹	Umbelliferæ	۲۷۷
Sapindaceæ	YV A	Urticaceæ	۲۷۸
Scrofulariaceæ	۲۷۷	Zingiberaceæ	۲۷۸









أدونيس صيفي




















































































مسرو عربي عام

مسرد عربي عام

<u>ح</u>	<u>ص</u>	مدخل	<u>ح</u>	<u>ص</u>	مدخل
۲	**	أَيُّوْس	١,	144	آء
١	\$ \$	إِثْرَارَة	٥	Y0.	آبَ ٱبْجَدِيَّة
٥	4.5	إِثْرارَة لُبْنان	۲	1	أبْجَدِيَّة
7	1	أثل	۲	1	إِبْرَةُ الرَّاهِبْ
7	٥٤	أثمان تُزبُد	٣	٥٤	إبْرَة العَجوز
٥	7	أثينة بيضاء	٥	104	إبْرَة العَجُوز
٧	1 • 9	أثينة الجيطان	١ ،	7.5	أبرُوْتَانُم
٤	٥	أثينة دُوْدِيَّة	۲	*	أبرين
۲	٥	أثينة عِطْريَّة	١ ،	1	أَبْرِيْن ابْسَنْت
۲	٥	أثينة نحنفُوْدِيَّة	۲	184	أبْسَنْت أرْمَنيّ
1	77	أثينة هنري الطّيب	١	*	أبْسَنْت يَحْرِيَّة
٥	*	أثيوريزا درنية	۲	٣	أَبْسَنْت بَحْرِيَّة شَحِيْحَة الزَّهْر
1	٥	إبجاص	٤	1	أبْنُوس كاذِب
١	٥	إتجاص شاثع	Ł	1	أبهَل
*	7	إجّاصَة	٤	1	أبهل
٦	*	أجِيْرَاتُوم كُوْشَانِيّ	١ ،	717	أبُو خَنْجَر
١	٦	أُخْذَريَّة	٣	774	أبُو صُفَيْر
٥	٣	أخِلَى	٤	779	أبُو صُفَيْر
٥	٣	ٱخْدَرِيَّة ٲڿڵؠ ٲڿڮڎ ٲڂؽڞؘڔ	١	٣	أَبُو غُلامُ الرَّمال
٣	41	أخيض	١	٥	أبُو فَايِسَ
٥	۲	أخِيْلِيا	١	7.8.7	أبُو فَرْوَةَ الحِصَان
٧	٤	أخيليا أجِيراتُم	٦	10	أبُو قابس
١	٧	أخِيْلِيا أُمَّ ٱلْفُ وَرَقَة	١	٤٠	أبوكاتيَّة
٦	٣	أخِيليا أَيْثَة	١	٤٠	أبؤكادُو
٧	۴	أخِيليا بَقْلَةُ العُطَاس	١	٤٠	أبُوْكة
٥	٣	أخِيليا بِيْبَرشْتَايْن	۲	70	أبؤ.
٧	٥	أخِيليا دِمَثْق	۲	٤	أبيئة سامية
٧	٤	اخِيْليا دُوْلابِيَّة	۲	٤	أَبِيْسَة شامِخَة
٦	٣	أخِيليا سَوْداء	٤	٤	أبيض البال
٥	٤	أخيليا صغيرة الزَّهر	٧	779	أثم

					•	HUUUUIIIII
<u> </u>	<u>من</u> ۲	مدخل أَذْن يَهُوَذا	<u>5</u>	<u>ص</u> ٤	مدخل آرین میس	
۳	٥		٦		أخِيلياً صُوْفِيَّة	
٤		ا أرارُوْيا المارِين أنها المحالات :	٧	ŧ	أخيليا صُوفِيّة المرابد المائية	
۲ -	٦٠	أراليا خُماسيَّة الوَرَق أُدُّ مِن	٥	•	أخِيلِيا ظَرِيْفَة	
•	17	ا آرْیِیَان روم	7	۳	أخِيليا ظَرِيْفَة	
۴.	114	ٔ ٳۯؿؚۮ ؙڎ؞ؘۦ؞ؙ	٦	٣	أخِيليا عَنْبَة	
1	140	ارْدَسِيمُن أَدُة	۲	Y	أخِيْلِيا عَطِرَة أ أ	
٣	۳ ۱۱۲	ا اُرْزَ ا اَدِيْ اَدِيْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِن	•	4	أخِيليا عِطْرِيّة أرديد نَهُ	
٧	117	أَرِسْتُولُوخِيَة ثُعْبانِيَّة أَرِسْتُولُوخِيَة ثُلاثِيَّة الفُصوص	0	٤	أُخِيْلِيا فَتِيَّة أُخِيليا كُونْشِي	
٧ ٧	117			1	اجِينيا كونيني أخِيليا مُلَوَّرَة	
7	47	أَرِشْتُولُوخِيَّة جَبَّارَة ارِشْتُولُوخِيَّة زَوْرَ يَيَّة		•	اجِيب مدوره أخِيليا مِنْجَلِيَّة	
٠	44	ارِستُونُوجِية روزيية أرِسْتُولُوخِيّة طَوِيْلَة		٣	اجِيب سِجيب أخِيلِا مُنْعِثَة	
١	17.	ارِستُونُوجِية طوِينة ارسْتُولُوخِيّة الكُرُوم		٠	اچيپ صبح أخيليا نانا	
, Y	4	ارِسْتُولُوخِيَّة مُسْتَدِيْرَة ارِسْتُولُوخِيَّة مُسْتَدِيْرَة	7	۳	أخِيليا نَبِيْلَة	
,	49	ارِستُولُوخِيَة مُفَرَّخَة		, £	اجبلبا ويلقلم	
7	41	ارشئولوجية نتينة		٤	اخْيُوْن مَعْرُوف	
Y	1.	ارِنسوورِيا ب اُدْخِي شَوْكِي	٤	48	أدامِيا مِلُوانَة أدامِيا مِلُوانَة	
٣	٣	رَبِي اُدْضِي شَوْكِي		48	۔۔ إِذْرِياس	
٣	٤	أرطاة	۲	71	أَدَنُّسُونِي	
٤	7	أرطاة أنيقة	٣	*	أذهاتورا	
ŧ	٦	أرطاة العِين	٤	771	ادرڭسا	
٣	17	أرطس	٧	٦	أدُونِيس الهيرينيه	
٤	٧	أزطَماسِيا ألْبِيّة	۲	٧	أدُوْنِيْس حَوْلِيّ	
٧	٧	ارْطَماسِيا أَنْثَى	١	4	أدُونِيْس رَبِيعيّ	
٤	Y	أزطماسيا بيضاء	٧	7	أدُونِيس مَسْيْفِيّ	
٥	•	أزطَمَاسِيًا بَيْضاء	١	75	آذان الدُّبّ	
٣	٦	أرْطَماسِيا ثَلْجِيَّة	۲	88	آذان الدُّبّ	
٣	7	أرْطَماسِيا جَبَلِيَّة	٥	777	آذان العَبْرَ	
٧	101	أرْطَماسِيا الحُقُول	١	١٠	آذَان الفَأْر المَنْقِعِيّ	
٧	Y	أرْطَماسِيا سَوْداء	١	787	آذان الفار النبطي	
7	•	أدطماميا مينية	٦	١٣	آذان القِسِّيس	
٤	104	أرطماسيا عطرية		147	آذان الكَبْش	
٧	101	أدطمكاسيا مغربية		Y	إذْخِر	
٦	•	أرْغَمُون المَكْسِيك	١	11	آذَرْيُون الحَدائق	
٥	Y	ً أَرْغُوت 	۲	٨	آفَرْيُوْن الماء	
٦	٦	ا أَرْغُوت عَدِّمُ عَدِّهُ عَد		11	آفَرْيُون مَخْرَنِيّ اللّهُ مِنْ مَنْ	
1	18	أَرْغُوْت أَرْجُوانِيّ وَمُوْتِ مُوْتِ		14	أَذُن الأَرْنَب	
1	14	اً أَرْغُوتِ الدَّيْسِ		Υ	أَذُن الراهِب عَيْمُ مِنْهِ	
١	۱۳	اً أَرْغُوت الشُّوْفَان	١	797	أَذْنُ الفَار	
						anmannum()

				1		
أ ص ط	<u>ح</u>	<u>ص</u> ۱۵۹	مدخل أزولة المَناقِع	<u>3</u>	<u>صن</u> ۱٤	مدخل
- 0-	٣				١٤	مدخل أَرْغُوْت الشَّيْلَم
	٥	١٢	أزُولَة مَنْقِعيّة		١٥	أرْغُوت القَمْح
	٧	١٣	أزيمينة مُفَطَّعة		71	<u>أ</u> رْقِطْيُون •
	١	۲.	آسٌ أَبْيَض	l	11	أرْقِطُيُون رَأْسُ الحَمامَة
	١	*1	أسارُوْن	٥	4	أرقطيُون صَغِير
	٧	774	أشَّاكُو	٧	٨	أرْقِطْيُون صَغِيْر مُزَغْبَر
	٣	١.	إشبانيخ	ŧ	٧	أرْقِطْيُون لِبْدِيّ
	١	**	إسبانَخ بَرَّيِّ		٨	أرْقِطْيُون مُزَغْبَر
	۲	٥١	إسبائخ زِيْلَنْدَه	!	٩	أرْقِطُيُون مُنَمْنَم
	٤	11	أَسْبِرُوْلَة خانِقَةُ الكَلْب	٤	٨	أرْمادِيلاً
	٤	11	أَسْبِرُوْلَة سَاجُورِيَّة	١	700	أَرْمَن *****
	١	**	أشبِرُوْلَة عِطْرِيَّة		١٦	أرنيكا
	٣	14	إِسْبَغُولَة		17	أرنيكا الجِبَال
	١	***	إِسْبِيْدار	٣	٦	أرُورُوت
	٤	777	أشطَر أرْغوفيلوس	٤	٩	أرُورُوت الأَنْتِيْلِ
	٧	18	أشطراغالس العَقْرَب	٤	٩	أرُورُوت الجَماييك
	٧	١٥	أشطراغالس نَجْمِيّ		11	أرُورُوت الهِند
	٦	11	أشطراغالُوس إكْرِيتي	٣	۸ ،۷	أروم
	۲	18	أشطراغالُوس دَبِق		٨	أرُوم الأنتيل
	٦	17	أشطراغالُوس كُثَيْراء	٤	٩	أرُوم إِيْطالِيّ
	٥	٧٤	أَسْطُوخُودُس		V	الأرُوم الشَّائع أو الرَّسَّة
	۲	٧٩	أشفند	٤	1.	أريتْروفْلايُوم
	٣	140	أَشْفَنْدان	٤	11	أريثرينا أميركا
	٤	١٣	أَشْقُوْرديُوْن مائِيّ	٣	4	أريثرينا مَرْجانِيّة
	٦	124	أَسْقُوردِيُونَ مَانِيّ	١	140	أريسِيْمُوم
	٥	14	أُسِيْنُوس مُسْتَدِيْرِ الوَرَق	١	١٩	أريْغَارُون كَنَدا
	7	14	ا أشْرَان	٧	11	أزيل أخمَر
	٦	17	أشرَان أَصْفَر	٣	1.	أُرْيَل بَرازِيليّ
	۲	10	أشران الشخر	١	177	أزَاد
	٦	١٣	أَشْرَان سُرِّي	٦	1.5	ازْدَرَخْت مورت
	١	77	اشْفِيْل بَحْرِي	٥	17	أَزُوْلَة
	٧	17	إِشْقِيْل بَحْرِيّ أَشْنان داوُود	٣	109	ازُوْلَة صغيرة
	٣	١	ا أشنان داۇود ا ئ	•	17	أزُولَة صغيرة
	٤	1.7	أَشْنَانَ دَاوُوْد	٣	109	أزُوْلة كبيرة
	٦	10	إشنان القلي		17	أزولَة كبيرة
	٧	VA.	أشنة الجمجمة	٣	109	أزولة الكروم
	۲	144	أضبان إصْبَع العَذْرَاء أصْطَرُك	•	17	أزُولَة الكروم
	1	127	إصبَع العَذرَاء	٣	109	أزولة مُستَديرة
214	٣	4.1	ا أضطرَك	٥	17	أزُولَة مستديرة

_		منخا	_		مدخا
٥	<u>من</u> ١٦	. ملىخ <u>ل</u> : أَفْحُوَان أَصْفَر	۲	<u>مس</u> 8 ه	<u>مسلمنی</u> اضطفلین
٥	17	المتوان خين	,	70	المستويل أُضْرَاس الكَلْب
١	YOA	أَقْحُوان شَرُونِي	۳	78	أطد شائع
١	77	الحدوان شريف أَقْحُوان شَريْف	١	4.4	أطَد يَاسَمِيْنِي
٥	17	أَفْحُوَانَ الصُّبَّاغِيْن	٥	4٧	۔ اَطْرَاوَنْدِي
٦	.	إفْرِيْطَشِيَّة	١	747	إطريْغَل إطريْغَل
٥	71	، وبعدي ا أقْسُون	۲	١٣	أَطْرَيْلال تُبْطِيّ
٧	147	أقْسُون حَرْشَفِيّ الشَّكل	١	77.7	أطريون
٧	۱۸۳	أَقْسُون خُرْشُوفيّ الرّأس	٧	*17	أطماط الكاشو
٧	144	اقْشُون نَدِيفِيّ	٤	198	أغايس
١	1.1	أفضيك صغير	٣	170	أغار – أغار سيلان
۲	19	التشئة رمِلة	۲	10	أغار-أغار
۲	71	اقُونيطُن	٣	١٣	أغُرُوان
٥	*1	أكامجو	١	101	أفازيّة
٦	77	أكاجُو	١	71	أفتينمؤن
٥	77	أكامجو أسود	١	737	أفَلْرَا هَشَّة
٥	77	أكاجو الخشب	٣	١٦٨	إفراز القُنْدُس
٥	77	أكاجو السنغال	١	1	افستثين
٥	77	أكاجو طارِدَة للحُمّى	١	*	أنْسَنْتِين بَحْرِي
٥	74	أكاجُو الفِيجي	٥	1 8	أَفْعَى نَمِرَة
٣	789	إكرار أوروبئي	۲	14	أَفْلُوْس ثَلْجِي
٤	107	إكْسُور بَنْدُوقا	٧	14	أُفْلُوس خَوْخِيّ الوَرَق
۲	777	إثمليل الجَبَل	٦	10	أُفْلُوس غارِي
٣	737	إثخليل الجَبَل	٧	19	أفْلُوْس لانْتَانا
١	1.0	إِكْلِيلُ المَلِكَ	٣	١٥	اقْيُون
٣	۱۳۷	إِكْلِيْلِ المَلَك	٣	10	أفيون خام
۲	1	أكيلة	٤	17	أَفْيُون مَخْزَنِيّ
۲	71	أگونيت	٣	10	أفيون نَيْء
۲	71	أكونيت أنتورا		178	أقاسيا دماعة
۲	**	أكُونيت بَرُّاق	٥	114	أقاسيا دخوة
۲	**	أكونيت بَلْفُور	٥	114	أقاسيا رَهْلَة
۲	77	أَكُوْنِيْت خانِقُ الذُّنْب	٧	124	أقاسِيا زَرْقاء
۲	**	أكونيت دِيْنُوريزُن	٥	119	أقاسيا السنفال
۲	77	أكُونيت سَخَالِيْن	7	371	أقاسيا عَسَلِيَّة
۲	71	أكونيت سرطاني	7	371	أقاسِيا العَبْبَر
۲	77	اگونیت سنغور	0	7 114	أقاسيا مُجَنَّحة
۲	71	أكُونيت عُنْكُوليَ		14	أَثْنَى سُنْبُلِيَةً
۲	77	أَكُونِيْت قاتِلُ النُّئب		77	أَثْنَى عُنْثُودِيَّة
۲	71	أكُونيت كبير الزَّهر	۲	١٨	أفتى عُنْقُودِيَّة

			ı		
<u> </u>	<u>ص</u> ۳۰	مدخل ام يَـــاً	3	<u>ص</u> ۲۲	ملخل اشر تریش
٧		أَمْ كُلِّب	۲		آگونیت گرگول اگریت گرگول
۲	70	اً مارَنْطُوْن ا	٦	17	اڭونىئت مُبَرُقَش ئۇرە مىڭ
4	40	اُمَ <u>ت</u> ِیْن کار دارد	٦	17	اڭونىئت مُوَشَّم ئۇرىي
۲	17	أمَلْزَيان	1	**	أَكُوٰنِيْت هَرَمِيّ دُرُ
٥	Y.A	إِمْرُوْس أَرْقَش	۲	77	اڭونىت مَلْهَلْ
٧	79	إِمْرُوْس أَغْبَر	۲	3.7	أكِيْلاجِيا حَمْراء أس
7	71	إمْرُوس عَفْرَيِيّ	١ ١	77	أكِيْلاجِيا شائِعة *
1	**	أمْسُوخ أمْسُوخ أمْسُوخ	۲	740	أكينُوسَ أليي
٣	17	أمشوخ	١	٣٠	آلامِيَّة أَرْجُوانِيَّة
٤	۲.	أنشوخ أنرع	٥	3.4	آلامية زرقاء
۴	14	أمسوخ شتوي	٦	17	آلايئة مُضَلَّعَة
٤	71	أمسُوخ مُسْتَنْقَعِيّ	٧	**	الْبِيْزِيَة ٱبُو سِنْ
٣	19	أمشوخ منقبي	٤	197	الْبيزِيَة أَبُوسنَ
٣	۲.	أمشوخ المؤجل	٧	**	أَلْبِيْزِيَة طارِدة للدُّود
٣	**	أمشوخ العَوْجِل أمنه أمنه أمنه آخليش	٦	17	ٱلْبِيزيَة غِدِّيَّة
٤	175	أملج	٥	40	الْبِيْزِيَة اللَّبَخ
٥	1.5	آمٰلِيْس	٥	40	الْبِيْزِيَة لَبُكَ
•	1.5	اخليلس	٦	۱۷	أَلْبِيْزِيَة مُتَشَبَّكَة الثَّمار
0	177	أمومين	٦	١٨	الغ اخمر
٤	37	أناباز مَعْدُوْمُ الوَرَق	٦	۱۷	ألغ الخضر
1	77	أنارِف	٦	١٨	أَلْغ أَزْرَق
٧	79	أناسِيْكُلُوس فالنَّسِيا	٦	14	أأبغ بُنُيِّ
٧	٣٠	أناغُوْرُس طبّي	Y	٥٨	إلقِس كَبيْر
١	**	أناناس	۲	71	الكُرْنُك
1	13	أنب	۲	17	الْكُورنُوك
٤	70	أثبَج	٣	117	ألْوَة
١	2.5	أنبرباريس	٧	40	ألوة
٥	45	انْبُرْبارِیْس لُبْنان الْعُرِبارِیْس لُبْنان	١	71	ألوة الأنتيل
١	YA	انقله	٦	۲٠	ألوة أنيتقة
1	78	أنتينارية شائقة	٧	TV	ألوة البخر الأخمر
٤	7.7	أَنْثِلِيْس الجِبال	١	71	ألوة البرياد
٦	Y • Y	أنثِليس الجُرْح	٧	**	أَلْوَة بِارِّي
٤	77	أَنْطِيس الجُرْح إِنْجا عَقُولَة	7	۲.	ألوة الحبشة
1	٥	إنجاص	١	71	ألْوَه مَخْزَيْته
1	711	ا أنْجُبا	٣	17	الوريت
1	**	اُنْجَيار انْجُذَان	٣	17	الألوريت القُلْبِيِّ أو الْوريت اليابان
۲	77			Aq	ألْيَارِيا مَخْزَنِيَّة
٣	101	أنْجُذان حَرَمُون	١	Y	أمّ ألْف وَرَقَة
1	78	أَنْجُذَان رُوْمِيّ	٦	371	أمَّ غِيلان

<u>c</u>	ص	مدخل	3	<u>م</u> ى	مدخل
٣	من ۲۲	إَهْلِيْلُجَ مِنْدِي شعيري	٤	100	أنْجُذَانَ عَجَمِيّ
1	٤٠	أَهُزُكَاتِيَّة	١	3AY	انْجُرَة كَبِيْرَة
1	707	أُوبَاتُوْرِيا القُدَامَى	١	47	أنجليك ملانكة
٦	77	أوراثيثت مُتتعيب	7	*1	أنْدرويُوغُن أَهْلَب
٥	۳٠	ٳ ۅڒؙؾؙۅڛؽۼؙۅڹ	٦	٨٣	أنْدرُوسَامُن
٣	179	أوريغائم	٧	٧٠	أنديرا
V	107	أوريْغانُم أرَنْبَرْغ	٧	٧.	أنديرا شورينام
٦	۱۳۸	أوريغائم شؤريا	٧	٧١	أنديرا طاردة الدود
٥	127	أورِیْغَانُم لُبُنَارِیَا	٧	٧.	أنديرا ملساء
٤	140	أوريغائم لُبنان	7	141	أنس التمس
1	148	ٲ ۅؙ۫ۿؘٵڔؿڠؙۅڹ	٥	717	أنشؤزة لازوردية
٣	37	ا ُوْكالِينِتُوس	٥	717	أنشوزة هجيئة
4	**	أوكاليبتوس عريض الورق	٥	4	أنْصَرِيْن بَيْضاء
٣	7 £	أوگوتيا بيشُورِيْم	٥	79	إِنْغَا أَفَرُتِيمُو
٤	**	أيابانا	٤	77	إنْغا بَرْباتيماو
٧	***	آياواشكا	٥	79	أنْغُسْتُورَة حَقيقيّة
٣	40	إيبوغا	V	٣٠	أنْغُسْتُورَة كاذِبَة
٣	40	إيثوغه	٤	14.	أنف التَّوْر
۲	70	إِيْهَامِينْن	1	40	أنكؤزة مَخْزَنيّة
N	190	إيريسا	1	77	أنكؤلية شائِعة
1	720	ایریسا ایکر	1	**	أنناس
۲	187	إِنْلَنْطُس	*	***	أييشون
1	100	إيْهَان	4	**	أنيشؤن تئييت
٧	17	بَابَاوْ	٣	71	أنيشؤن تييسي
٤	۴.	بابُوْرُس	٣	71	أينشؤن صَغِيْر
٥	17	بَابُوْنَج أَصْفَر	٦	**	أنيشون فأوريدا النجيي
4	79	بابُوْنَجُ ٱلْمانِيَ	4	**	أينشؤن كبير
١	77	بَابُوْنَج رُوْمانِيّ	1	44	أينشون نَجْميّ
۲	77	بابُونِج روسي بابُوْنَج الطَّيْر بَابُوْنَق أَسْطُوانِيّ بابُوْنَق أَسْطُوانِيّ	٧	71	أُنِيْسُون نَجْمِيّ صَغِير الزَّهْر انِيْسُون نَجْمِيّ مُوَقِّر
1	3 • 7	بَابُوْنَجِ الطُّيْرِ	٧	٣١	أنيشون نَجْمِيّ مُوَقّر
*	79	بابُوْنَق أَسْطُوانيّ	Y	71	أنيشون نَجْمِيّ يَابانِيّ
*	79	ا بابُوْنَق أَقْرَع	٤	177	أنيمُون
Y	79	بابُوْنَقُ ٱلْمَانِيّ	١	44	إغلال قُسُطا
٣	77	بابُوْنَق ذَهَبِيّ	7	٧٠	إعلال قسطا
Y	7 • 7	بَابُوني	٣	**	إمْلِيْلج .
٤	۲.	بایپٹر بایپٹرُوس باتگانا باتُور	٣	**	اُمْلِيُّلج أَصْفَر إمْلِيُّلج بَلْبَلَه إمْلِيْلِج كِابلي
ŧ	۲.	بابِیْرُوس	٣	**	إلمليلج بَلْيَلَه
٥	*	نائانا	٣	77	إمْلِيْلج كابلي
۲	17.	ا باتُور	٦	77	إهْلِيْلَجَ لَوْزِي

ب ر ش	<u>ح</u> ۲	<u>صن</u> ٣٦	مدخل	<u>ح</u> ه	<u>ص</u> ١٦٠	<u>مدخل</u> باتور الپارا
			بثينة			
	\	3.97	بَتْجَ بِتْجُ مُثْكُوليّ بَخُور الأكْراد	7	174	باتُور الجَمايِئك باتور المَكسِيك
	٥	۱۷۰	ہج عنکوئی از الکاما		171 171	باتور المحسِيك باتُور هُنْدُوراس
	4	73	بحور الأفراد	٤		بانور هندوراس بَاثُوْر شائِك
	7	1.9	بَخُور الماء رَبُّ رَوِي	1	187	بانور سايك باجينتا شمعيّة
	٦	77	بَخُور مَرْيَم	٧		باچىتا سىمىيە بادرنىجۇيە
	٥	177	بَخُود مَرْيَم البُسْتَانِيَ	١	777 70	
	٤	171	بَخُوْر مَرْيَم لُبْنانِيّ يَرَ مِنْ الذَّرَ	٥	۱۸۱	بَادَرُوج باذاوَرْد صوف ي
	۰	177	بَدَح صَغِيْر الثَّمَر رَبُّ:	۲ ٤	100	باداورد صوفي باذاوَرْد عِطْرِيّ
	٣	17	بَدْرانج		70.	باذَق باذَق
	٧ -	٣١	بَدْیان صَغِیر الزَّهْر مَدْین نازی	٧		بادى باذنجان بَرِّي
	٦.	**	بَدْیان فلُورِیدا	0	149 51	بادنجان بري باذِنْجان مَعْروف
	1	* A	بَدْیان نَجْمَيّ دوس الله الله الله			بادَوَرْد أَبْيَض باذَوَرْد أَبْيَض
	٧ -	٥٨	بِرازِيَّة التَّمْبايَنْغ	1	771	بادورد ابیص بارْذَد
	۲ .	۳۳.	بِرازِيَّة لِيُكَنُوفُورا	۲	Y7 \^{	
	1	440	بِرَازِيَّة مُسْتَدِقَّة الطَّرَف		108	بَارِسْطارِيُون بَارُوْمَثْر الخِرَق
	٤ -	190	براتیٹرا آماد دائند م	١	۳۲۰	بازومتر العجرق بازیلَّة بَیْضاء
	٦ -	YV	بَرْباتيماو أَنْرْتِيمُو	٤	79	
	٦ .	**	بَرْبَاتيماو البرازيل	1	787	بَاطُس باطُور
	١	VV	َ بَرْبَارَه مَوْرِ مِ	۲,	17.	باطور بَاطُوْر أَصْلِيّ
	1	££	بَرْبَارِیْس بَرْبارِیْس لُبُنان	١	۲۷۰	
	۰	T		٤	7 8	باقِل مَعْدُومُ الوَرَق
	۴.	***	بَرْباطُوْدَة	۲	۳۱	بان
	1	£ £	بَوْبَرِيْس شائع	٣	* V	بان دُهْنِيّ ان تر ال کا
	•	4.5	بَرْبَرِیْس لَبْنان مُویُد،	۲ ــ	۳۱	بان عَدِيم الجَناح بان مُجَنَّع
	١	£ 0	بُرْتُقال موندرو م	۳	YV	بان مجنح باهِرَة أَمْرِيْكِيَّة
	٣	747	بُوْتُقال مُرَّ موجينة	٣	۲۷	•
	۲.	44	بُرْ تُقَالَة موشور	۲	۲۱	باۇباب
	١	٤٥	بُرْتُقان مودر	۳	١٠	بَايْكُورُو (جذر)
	1	£0	بُرُّدُقان مومین	1	13	بَباظ زِراعِيّ
	۲	77	بُرْدُقانَة 	7	* *	بَباظ زِراعِي
	ŧ	۳.	بَرْدِي م		Y0 ~^	بَبَاظ زراعيّ مَدَاءُ
	Ł	17.	وه بوس ترومه د	£	79	بَيَيارُو بَيَيارُو رُودِي
	٤	707	بَرَشْکان مَدْ رَادِي	ŧ	79	
	٧	770	بَرْسِيم أَحْمَر بَرْسِيْم جَشْوِيْ	٤	۳.	ببیر ده د ه و
	1	72	برسيم جشوي	v -	٣٥	بَتَير بَنْجَنْجُور بَنْشُولي عَذْب
	٣	177	برسِيم حِجازي بَرْسِيْم المَاء	۲	۲۸	بتشولي عدب
	\	۲۸۲	برسيم الماء	1	73	بَتُولا بَيْضاء مِنْ يُ
£1V	١	441	ا بَرْشَاوْشَان	٧	40	بَتْياتُور

			ı			
<u>ح</u> ۱	<u>من</u> ۱۹۱	مدخل بَصَل الذِّنْب	<u>ح</u> ۳	<u>ص</u> ۱۹۷	مدخل بُرْعُون	ب رع
١	191	بَصَل الذِّئب	٣	194	بُرْعُون	<u> </u>
٧	٨٣	بَصَلُ الذِّئْب		73	بَرْغُمُوت بَرْغُونِيَّة	
٧	۸۳	بَصل الزَّيْز		337	بَرْغُوْثِيَّة	
١	**	بَصَل الفار	Į.	171	بَرْقُوق شائِك	
٧	17	بَصَل الفار		۲3	ؠؚڒڮؙۣڎ	
٧	۸۴	بَصَلِ الْمِسُك	۲	37	بَرْناسِيا المَناقِع	
١	77	بِعَّيْلَة	٣	79	َبَرِنْج بَرِنْج بَرْتِيَان بَرِنْج بَرْتِيَان	
٣	71	بطاطا	l	٥٤	بَرِنْج بَرْبَيَان	
٣	71	بَطاطِس *	١	719	بُرَنْجَاسَف	
١	٤٧	بَطْباط الدُّواجن	٣	79	بَرْنق	
٣	44	بَطْباط الرِّمال	•	٥٤	بَرْنَقَ بَرْبَيَان	
١	377	بَطْبَاط مُفَلْفَل		74	بَرْنَق قَوِيّ	
7	٣٢	بَطْباط نِيْلَتِي	٣	44	بَرْنَق كِشْمِشْيِّ	
١	٤٨	بَطُونِيْقًا طِبَيَّة	٧	۳٥	بَرْنُوف :	
٤	۲۱	بَطُونِيْقَا طِلِيَّة بِطَّيْخ بَعَيْثَرَان بَعْدُونِس بَدُ	٦	**	بَرْْنَق كِشْمِشْيّ بَرْنُوف بَرْواق أَبْيَض بَرْواق صَغير الثَّمَر	
7	۴	بَعَيْثُران	٤	٣٠	بَرُّواق صَغير الثَّمَر	
۲	**	بَقْدُوْنِس م	٤	۲.	بَرْواق مُتَفَرِّع	
٤	77	بَقْدُوْنِس	٦	44	بَرُواق ناسُورِيّ بُرُوْسِيَّة سُومَطْرَة	
7	115	بَقْدُونس بَرِّيّ	٥	7 • 7	بُرُوْسِيَّة شُومَطَرَة	
٤	147	بقدونس كاذب بَقْس دَاثِم الخُفْسَرَة	٤	۲1	بُرُوْبِيَّة مُضادَّة للدُّبْسَنْتِيرِيا	
1	٥٠	بَقْس دَائِم الخَضْرَة	٣	7 • 9	برُونْفَلْسِيا هُؤبيانا	
7	77	بُقْلامُس بُقْلامُس الرَّبيع بَقْلَة الإمْبَراطُور بَقْلَة الإمْبَراطُور	٦	79	بِزْر قَطُونا	
7	14.	بقلامُس الرَّبيع	7	۲۱	بَوْر قَطُونا الرَّمَال	
1	٥١	بَقَلَةُ الإَمْبَراطُورِ وَمُوعِلُمُ عَلَيْهِ	١	337	بَزْر قَطونَاء	
٤	104	بَقْلَةُ الْأُمُّهات	٥	٧٢	بَزْرَةُ الثِّبَشِعِ مِدَةُ مِنْ	
٤	**	بَعْلَة الأَوْجاع	٥	٧٣	بِزْرَةُ الخِرْوَع	
١	1 • 1	بَقْلَة حَامِضَة	۲	70	بَزِلة	
۲	47	بَقُلَة حَمْقاء	۲	70	بَزِيْلا من در مردا ا	
١	777	بَقْلَة الخَطَاطِيْف	*	71	َبَرِِّ ثَلَّا بَسْباسَة الطَّيْب بَسْبَایج بِشْسِس بَرُّتِی	
۲	V 9	بَقَلَةُ الرِّمَاحِ	1	۲۵	بشبايج	
١	٥١	ا بقلة الرئيس مؤتم روم تر	١,	717	يشيس بري	
٧		بَقْلَة الرَّماح بَقْلَة الرَّئيس بَقْلَة المُطَاس بَقْلَة المَوْف	5	7.7	بنتج	
٧	109 . 100	بَقَلَةُ الغَوْفُ	٥	7 · V	بنتج خبين	
۲	79	بَقْلَةُ الغَزالِ			بَسْنَج حَبَيْق بَسْنَج حَبَيْق بَسْنَج مِنْدِي بِسِلَّة الكُوْنْفُر بِسِلَّة مِنْدِيَّة	
1	***	بَقْلَة القِطَّ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَ	٦ _	141	بِسِلَةَ الْكُوْنَفُو	
۲ .	178	ُ بَقْلَةُ اللَّبَن بَقْلَة المُلُوك	\ \ .	1/1	بِسِلَة هِنْدِيَة مِنْ مِنْ مِنْ	
1	197	ا بقلة الملوك الرب ع.	١ ,	۳۸٥	بَشْنِيْن أَصْفَر	
٧	۳۷	بَقَم أَسُود - تَــَّهُ مِــــ		۳٦	بَ صَ ل	
٧	۲۷	ا بَقَنْقُومُون	٣	۳۰	بَصَل	٤١٨

				ĺ		
<i>ب</i> ن د	<u> </u>	<u>ص</u>	مدخل	<u>خ</u>	ص	مدخل
-0-	<u>ح</u> د	ص ۳۷	مدخل بُلْقاء خَضْراء الأزْهار	١	<u>ص</u> ۱۱۸	مدحن بَكْبَر مِنْدِيَ بِكْسا بِكْسَة بِلَّادُوْن بِلَّادُون بَالْادُون
	٥	44	بَلْقاء كاجِيْبُوت بَلْنْجَاشَف بَلُوْتَة شَائِعَة	٣	٤٩	بُكَّة
	١	719	بَلِنْجَاشَف	٤	78	بِکْسا
	١	774	بَلُّوْتَة شَائِعَة	٤	45	بِکْسَة
	١	777	بَلُوْتَهَ مُكَلِّبَة		01	بِلَّادُوْن
	١	*1*	بَلُّوْتَة نَتِنَة		45	بِلَّادُون
	7	177	بَلُّوط أخْضَر		**	باز در عربِي
	1	149	بَلُّوطُ أَسْوَد إنجليزيِّ		۲۷	بِلَّان
	۲	2.4	بلومارية	٣	۳۷	بَلِّان
	٤	۴۸	بُلُومارِيَة بَيْضاء	٤	4.5	بَلَّان بِلِّان
	٤	77	بلوماريّة خمراء .	٤	4.5	بِلَّان
	٣	٤٠	بُلومارِيَة صَفْراء	٥	۳۸	بَلَّان شَوْكَيّ
	۲	27	بلُومارِيَة مُسْتَدِقَة	1	٣٥	بَلَّان صَغِيْر
	٥	٤٠	بلُومِيَةُ بَلْسَمِيّة		44	بَلَّان ضُرِّيّ
	٥	13	بلُومِيَة مُمَزَّقَة		77	بَلَان غَيَّارِدُوت *
	٤	۸١	بُلَیْحاء بَلَیْس مُعمَّر	٥	44	بَلَّان مُثَالَل
	1	00	ا بَلَيْسِ مُعمَّر		٣٥	بَلَّان مِحْجَام
	٣	**	بَلَيْلُجَ بُنِّ الْحُضَر	۲	٤١	بَلَّان مَخْزَنِيّ
	٧	٤١	ا بُنِّ أَخْضُر	٦	44	بَلَّان مُنْدَمِج
	0	٤١	بُنّ (أَنُواع البُنّ)	٧	۸۴	بُلْبُوس أَشْغَر
	1	00	أُبِنَّ عَرَبِيِّ	٧	۸۴	بُلْبُوس الكَلْب
	٧	٤٣	بَناقَئْكَة	٦	787	بَلَح الصَّحْراء
	٧	27	بناقنثة لاسِعة	٧	141	بَلْخ يَا عَدْ فَيْ يَا مِنْ عَدْ عَدْ عَدْ عَدْ عَدْ عَدْ عَدْ عَد
	٧	27	بَناقَتُنَة لاطئة الزَّهْرِ	٧	۲۸	بَلَخِيَّة يُونَانِيَّة مُنُّهُ
	٧	£ ٣	بَناقَتُثَة هَنْرِي بَناكُس شائك	1	7.7	بُلْدُس الشَّيلِي
	٧	£٣		1	79	بلس بَلَسان أَغَلُّوشا
	V	£٣	بناكس لاسع	۲	Y7.	
	٧	87	بَناكس لاطئ الزَّهْرِ	۲ .	Y7.	بَلَـــان أَفريقيا
	٧	***	بناکس هنرِي ره	١	Y00	بَلَسْکی بَلْسَم افریقیا بَلْسَم الپِیْرُو بَلْسَم رُوکِسبُورغ
	٣	٤٠	ا بنج ا ما امر	Υ .	Y7.	بلشم افريفيا
	٧ .	£ £	بنج ابيض	2	۳٥	بلشم البيزو
	١	٥٦	بنج اسود	Υ 	۲٦٠	بلشم روکسبورغ تأتم بُومِ من
	٥	13	بنج اصفر رو :	,	٣٨	بَلْسَم غُرْجُوْن
	6	/3	ا بنج دهبي	-	P 0 7	بلتم الماء الرابعة
	٤	44	بنائحس لاطئ الرهر بَنْجُ البَيْض بَنْج أَلْيَض بَنْج أَشْفَر بَنْج ذَهَبِيْ بَنْج سَرْح بَنْج المَغْرِب بَنْج المَغْرِب	τ	79	بلسّم مخه د: د
	٦,	۳٦	ا بنج المعرِب	1	177	بلىئىن ئى ،،»،
	١	* 1 •	بنجر بَنْجُوان	``	140	بسلم مربوی بَلْسَم مَكَّة بُلْسُن بَلْغ الرَّيْس بَلْغاء بَيْضاء بَلْغاء بَيْضاء
	١		بنجوان بُنْدُق مَعْروف	1	0 £	بلفاء بيصاء بَلْقاء خَضْراء الأَزْهار
19	1	٥٨	ا بندق معروف	1	٣٩	بلقاء حصراء الارهار

		1		_	le c	
<u>ح</u>	<u>من</u> ٤١	مدخل بُوْصِيْر فلوميْسانيّ	۲	<u>من</u> ٤٣	مدخل بُنْدُق مَعْرُوف	ب ن د
٣	££	بوعيير تعوييداي بُؤْمِيْر كَيْيْف الزَّهْر	٣	٤١	بىدى ئىروك بُنْدق هِنْدِيّ	
٧	٤٧	بوچیر کیک اومو ا بوصیر مُشکِر		41	بندن بَنَدُوْرَة	
١	74	1	١.	٥٨	بَنْطَافِلُن	
۲	££	بوجيوا بۇمپيرا موراغورا	١	799		
٧	٤٧	بُورَ يُر بُوط أشترالي	٤	۲۵	بَنْغ بَنْغُوار جَمْيِي	
٧	٤٧	ُ بُوْط رَفِيْع		۲۸	بَنَفْسَج آذار	
٦	٤١	بُوط عَربُض الوَرَق بُوط عَربُض الوَرَق	١	٥٩	بَنَفْسَج آذار ۗ بَنَفْسَج الثَّالوث	
٥	717	بُوْط عَرِيْض الوَرَق بُوْغُلْصُن سَمَنْجُوْنِيّ	٤	٤٠	بَنَفْسَجُ الثَّالُوْث المِهْمازِيِّ	
١	70	بُوْغُلْصُن مَخْزَنِي	٦	٣٨	بَنَفْسَج عَطِر	
٥	717	بُوْغُلْصُن هَجِيْنَ		٤٤	بَهَا	
٣	٤٥	بُوْقِيَّة أُرْجُوانِيَّة	٧	177	بَها بَرِّيَّة	
١	١٣٨	بُوْقِيْصا حَفْلِيَّة		17	بَهَار حَقْلِي	
١	147	بُوْقِيْصا حَمْراء	٥	۱۷	بَهَارِ الصَّبَّاغِيْن	
۲	27	بُوْكُشُو	١	77	بَهَاد نَبِيْل	
١	۲۰۳	بُولْدُو عَذْب	7	79	بَهْرَمانَة مارِدَة	
٥	٤٦	بُولُوعَالِن بَقْسِيَ بُولُوعَالِن بَقْسِيَ	٥	117	بَهُش	
١	٦٤	بُولُوغَالِن شائِع	1	٦٠	بَهْشِيَّة الدِّبْق	
٦	٤١	بُوْلُوغَالِن ڤيرجِينيا بُولُوغالِن مُرّ	١	17	بَهْشِيَّة الشَّاي	
٤	23	بُولُوغالِن مُرّ	7	707	بَهْشِيَّة كَاشِّيْن	
٦	٤١	بُوْلِيْغَالا سَنِيْغَا	1	٣٠٣	بُو نَقّار	
1	78	بُولِيْغالا شائعة	٣	73	بُوْتَالِياً مُرَّة	
٥	*17	بُوْمَرِي	١	٥٨	بُوتَنْتِلًا مَدّادة	
٥	90	ا يُدهُمُ يَا	١	777	بُوتَشِيلا الوَزْ	
٥	47	بوسويري بُوهْييرِيَا فِضَيَة بُوهْييرِيَا نافِعَة	1	3 P 7	بُوجْبِيْبَة	
٥	47	أبولهبيريا نافعة	7	71	بُوركيبَ ة	
ξ	87	بِيْتَارِه دافعة للحتى	٣	24	بُوْسِيْدان مَخْزَنيّ	
۲	**	بينخ	٤	٤١	بُوسِّينا	
۲	AFI	بَیْدَسْتِر بیرهٔ طبیّه	۲	73	بُوْشُو بُوْصِيْر بُوْصِيْر بُوْصِيْر بُوْصِيْر أَبْيَض بُوْصِيْر تَبْسِيّ الشَّكل بُوْصِيْر تَبْسِيّ الشَّكل	
٥	٤٦	بيرة طبيّة	١	791	بُوْص	
۲	**	بيش	١	74	بُوْصِيْر	
1	44	بِيْش البَبْر	۲	11	بُوْصِير	
١	YA	بِیْشِ مُوْش بِیْشا	۲	٤٥	بُوْصِير أَبْيَض	
۲	٤٦	يُضُة	٣	8.8	بُوْمِيْرِ ثَبْيِيِ الشَّكُلُ	
٤	27	بيكرينا شامِخة	٥	£ 0	بؤصِيْر الشَّمَكُ	
7	73	بيرة طبيه بيش البَيْر بِيْش مُؤش بِيْشا بَيْضَة بيكرينا شامِخَة بيلا بيلسان أخمَر	٥	£ £	بۇمپىر سىئنائى م	
V	٤٨	ا بیلسان آخمر	٥	£ £	بُوْصِير صُوْماليّ رُدُ مِنْ رَدُرُ	
1	78	بَيْلُسَانَ اشْوَد	٥	٤٥	بُوْصِیْر طَرابُلُس مُو مِیْر مَوابُلُس	
1	771	ا بَیْلَسان صَغِیر	٤	٤١	بُوْصِيْر عَيْزارانِيّ	٤٢٠

				ī		
ت و ز	<u></u>	<u>ص</u> ٣٦٦	مدخل تُرُجَان	ح	<u>ص</u> ٥٠	مدخل
	١	411		٦	٥٠	بيوت
	1	178	تُرْسِيَّة إِسْلَنْدَة	٧	37	پاریْرا براڤا پالیکُوریا
	۲	٥١	تَرْغُوْن	٤	177	
	۲	٥١	تُرْمُس زِراعِيّ	۲	٦.	پاناڭس خُماستي الوَرَق
	١	411	تُرُنْجان	٦	70	پَا وْب ِيرِيْرَا
	٣	89	تُرُبُّجان	۲	377	پرُوتوڭىيىد الھيدروجين
	۲	*11	ا تَرَنْجُبِيْن	٧	4.1	پتينديًا مُشكِرَة
	١	٦٧	ِ تَرُّنُشَانِ 	٤	140	پِکْرِیْنا شامِخَة
	١	٦٧	تُرُنْشَاه ِ	٧	73	پُودُوفِلُون دَرَقتي
	٣	٨	تِرْياق أَبْيض	٦	171	پُولِیْیا پُولِینیا رِیشیَّة
	٤	89	تِرْيا قِيَّة	٧	٥٩	
	٥	10.	ا تُسَلَّغَة	٥	Y 7.A	يُولِّينِيا قِرمِزيّة
	١	40	تَفْتِيوَان تَشْوِيْزَج	٦	171	پُولِّینِیا کُوپانا
	٦	٥	تَشْمِيْزَج	٣	٤٥	پِيتُوْدِي
	۲	YAA	تُفَاح الجِنّ	۴	100	پِيُشِي پيڭرُوتوڭسِين
	٤	٥٠	تُفّاح شانِع	٣	13	
	٤	17.	يّم السَّمَكَة	٤	٥٥	ييلوقربوس خَشِن القُنزُعة
	٧	٥٨	تَمْبايَنْغ	۲	٥٧	بيْلُوقَرْبُوس ريشتي الوَرَق
	٧	٥٩	تِمْبو تَمْتَم تَمْر المَطْي	ŧ	٥٥	يبلوقربُوس سُنبُليّ
	٥	117	تُمْتَم إ	٤	٥٤	يبلُوقَرْبُوس صغير الوَرَق
	٥	۲	تَمْر المَطْي	٤	٥٥	بيلوقرئبوس عُنْقُوديّ
	٦	00	تَمْر هِنْديّ	٣	70	تابَرنَنْت
	٣	89	تَمُرة	7	140	تَارُو
	٥	٥٤	تُثْتِيراكالا	٧	٥٨	تَارُو القُدامَى
	٥	00	تَنُوْب فِضِي	٧	717	تانْبُول
	٥	00	تَنُوْب مُشْطِيّ	٧	٥٨	تَايُوف كَبِيْر
	١	٦٨	تُوْت أَبْيَض	٦	70	تَايُوْيا
	٧	٥٩	تُؤت أَخْمَر	1	114	تُبشُع تُبشُع تَبُغ نَباكُم تَبُغ الحُرّاس
	١	777	تُؤت الأرْض		V 9	تُبشُع
	١	٦٨	تُؤت أَسْوَد		٥٢	تَبْغ تَبَاكُم
	١	٥٣	يُّوْت الثَّغْلَب		٤٨	تبنغ الحراس
	١	٦٨	تُؤت شَامِي		P37	تَبْغ هِنْدِيّ
	1	787	تُوْت شَوْكِيْ	٧	٧	يَبْن الجَمَل
	١	٦٨	تُؤت القَزّ		Y	نِبْن مَكَّة
	٤	744	تُوْت هِنْدِي		44	تَحُلاذَن
	۲	٥٢	تُوْتَة سَوداء		٥٤	تُرْبُد
	١	140	تُوْذَرِيجْ	٥	10.	تُرْبِد أَبْيُض
	٤	140	ئودرىج تورنىئول ئىرىنىدى			تَرْبَنْتِيْن (أي المادة تستخرج
173	٣	٥١	ا تُؤز مَخْزَنِيّ	۲	٥٠	من كافة هذه الأنواع)

		,				
<u></u>	ص	مدخل	٥	<u>ص</u>	مدخل	ت و م
٣	<u>صن</u> ۱۸۱	<u>مدخل</u> جاوَشِیْر	١	من ۷۳	سند <u>س</u> نُوْم نُوْيا عِقْدِيّة نُوْيا غَرْبِيَّة	13-
٤	AV	جَثْرُوفَه	۲	3.0	تُوْم	
٧	75"	جُدْجُدٌ حَفْلِي	7	177	تُؤيا عِقْدِيّة	
٤	٦٨	ُ جُدْجُدٌ حَقْلِيّ جُدَرِيَّة أَسْطُوانِيَّة	٧	7.	تُوْيا غَرْبِيَّة	
٤	٦٨	جُدَريَّة مُرَّة	٦	177	تُؤيّا مَفْصِلِيّة	
٥	19.	جَدْع جَدُوار	۲	٥٢	تِيڤاتِيا دِفْلِيَّة	
٧	111			777	تِین آدم	
٦	٤١	جَذر ذات الأجراس	١	79	يئين مَعْرُوف	
٦	٤١	جَذر الكُروتال	۲	٥٤	تِیْن مَعْروف	
٥	117	جَذْر العِسْك		4.4	تَيُوْبُرُوْمَه الكاكاو	
1	700	جَذْر وِنْدُوْك	٧	9.8	ثابْسِيا غَرْغانُو	
٣	٨	جذور القُلْقاس	٥	79	ثاقِب الوَرَق	
4	٥١	چ ۇ چو	٤	۲۵	ثبُوت بارُومَتز	
١	100	چۇچ <u>ى</u> ر	1	٧٢	ثَلْثان ثُلْثُلان	
١	VV	َ جَرْجِئْر جِرْجِئْر أَرْضَيَ جِرْجِئْر أَرْضَيَ	٣	٥٣	ثليب أضفر	
1	vv	جِرْجِيْرِ البَرّ	۲	0.0	ثَلِيْب أَكِيْلاجِيّ الوَرَق	
4	٥٨	جِرْجِيْر حَقْلِيّ	٧	148	ثِمار بَيْضاء	
٦	141	جرجير الماء	*	٩.	ثمام	
٣	140	جَرْمَشْق	۲	١٠٨	ثُمَرَةُ الزَّان	
٧	٣٠	جَ ر ُود	1	11.	ثَمَرَة النُّسْرِيْن	
٤	١٣٦	جَرُوْمَة	١	18.	ثُمَرَة وَرْد السِّيَاج	
٧	107	جَرُوْمَة بَيْضاء	٤	719	ثَوْر الماء المَخْزَنِيّ	
٤	140	جَرُوْمَة دَرَقِيّة	٤	17	نُوْمُ الحَيَّة	
٧	107	جَرُوْمَة غُدُّيَّة	٦	124	ثنزم الحيَّة	
٥	١٣٨	جَرُومَة كَلِيْلَة	١	٧٣	ثُوْم زِرَاعِي	
١	١٦٨	جُرَيْسَة الغَابِ	*	0.0	ثُوْم زِراعِي	
٣	٥٤	جِزاب شَوْكَراني	٤	141	ثُوْم الشَّرْق	
٥	107	جِزَابِ مِــُكِيّ	٤	70	بُوْم قَصَبِيّ	
٣	٥٤	جَزَر جَزَر بَرِّي جَزَر البَقَر	٦	1 • 9	تُوْم فَصَبِيٍّ تُوْم مُعَمَّر	
۲	٥٩	جَزَر بَرِّي	١	444	ييْل	
١	PAT	جَزَر البَقَر	٣	04	ئیْل نَیْل نَیْل أَحْمَر	
٤	٥٥	جَزَر الرَّعاة	٣	٥٣	نَيُّل	
1	177	جَزَر شَيْطانِيّ		14.	ئيًّل أَحْمَر	
1	177	مُجسَاد	۲	٥٧	جابُورَنَدي الپاراغواي	
٥	73	جِعَة طبيّة	١	77	جَابُوْرَنْدِي پَرْنَمْبُوكُو	
٧	٧٢	جُعْدَة	*	٥٧	جابُورَنْدي الرَّيُو	
V	VF	جَعْدَة	٤	٥٤	جابُورَنْدِي مارَنْهام	
۲	0.0	جَعْفِيْل كَبِيْر	1	177	جَادِي جاوَرس	
٤	70	ا جَكَرَنْدَة البرازيل		۹.	جاوَرس	277

ج ي ل	<u>ح</u> ٤	<u>من</u>	مدخل	<u>ح</u>	ص	مدخل
ج ي ت	٤	04	جَنْطِيانَا أَرْجُوانِيَّة	٤	<u>ص</u> ٥٦	مدخل جَكَرَنْدَة جَذَّابَة
	٤	09	جَنْطِيانا شِيْرِايْتا	١	VV	جَلَاب حَقِيفتي
	١	V 9	جَنْطِيَانَا صَفْراء	1	VV	جَلاب مَخْزَنِي
	٦	7.5	جَنْطَيَانَا صَفْراء (جَذْر)	٤	7	جَلَب أبيض
	۲	٦٠	جَنْطِيانا مَقِرَة	٤	70	جَلَب أوريزابا
	٤	٥٩	جَنْطِيانا مُنَقَّطَة	٦	77	جَلَب تَمْبِيْكُو
	١	٤٥	جَنَه	7	77	جَلَب مُتَصَبِّع
	١	11	جَهُوان	\	VV	جَلَب مَخْزَنيْ
	7	7.7	جَوْز أَرْمَانِيُوس	٤	70	جَلَب مِغْزَلِيَ الشَّكْل
	٦	7 8 9	جَوْز الجَماييك	٦	117	جَلِّبة أُوْرِيْزَابا
	۲	11	جَوْز الطُّيْب	١ ١	VV	جَلَبَة مَخْزَنِيَّة
	١	۸١	جَوْز عادِيّ	٦	119	جَلْجان
	۲	77	جَوْز عادِي	٦	119	جُلْجُلان
	٤	٥٩	جَوْز عادِي	١	441	جُلْنِسْرِیْن
	٦	188	جَوْز القَيْء	١	474	جُلْهَم
	۲	Y 7 A	جَوْز الهِنْد	۲	AFY	جَلِْهَم
	٦	747	جَوْز الهِنْد	١ ١	٥٨	جِلُّوز عاديّ
	٤	٥٩	جَوْزُهٔ	٣	70	جِمْلاج دُوْبِيا
	٦	307	جَوْزَة الشِّرْك	٣	70	جِمْلاج زِبْدِي
	٧	79	جَوْزَة العَفْصَة	1	٥٨	جَمْلَج صُحِي
	٧	٧٠	جُوفْرِيَة	٤	٥٨	جَمْلَج مُصْفَرُ اللَّون الأخضر
	٧	٧٠	جُوفْرِيَة سَرْحَة	۲	111	جُمَّى
	٧	٧٠	جوفرية شورينام	١ ١	٧٨	جِنْ - سَنْ
	٧	٧١	جوفرية طاردة الدود	١,	3.57	جِناء أَحْمَر
	٥	140	جُوْكَلَانَة صَغِيْرَة	1	189	جِنَاح رُوْمِيَ
	١	414	جُوْكُلانَه	٤	٥٩	جَنْثيانا
	١	۸Y	جُوْلِيَانَا نِسَائِيَّة	١	٧٩	جَنْثِيانا صَفْراء
	١	**	مجويسة غطيرة	١ ١	٤٧	جُنْجُر جُنْجُل شَائِع جِنْسَن جِنْسَن أَبْيَض (جذر)
	٧	124	جِیْدار جِیْرَانیُوم جِیْرانیُوم دَمَوِيّ	١ ،	41	جُنْجُل شَايِع
	٥	107	جِيْرَانِيُوم	١ ١	٧٨	جِنْ ٿن
	۲	178	جِيْرانْيوم دَمَوِيّ	٦	75	جِنْسَن أَبْيَض (جذر)
	٥	107	جيرانيوم مَرْجِيّ	۲	7.	جِنْسَن أميركيّ
	٥	105	جَيْرَانيُومُ مَرْجِيٍّ جِئْرَانِيُومُ مُسْتَديرِ الوَرَق	٧	73	جِنْسَن شائك
	٥	107	جيرانيوم مُلَطّخ	١ ١	٧٨	جِنْسَن كوريا
	٤	111	جِبراييوم مشتدير الورق جيرانيوم مُلَطَّخ جَيْفَلَة جَيْفَلَة جيلاتين جِيْلَانِيا مُثْلَقَة الأوراق	٧	27	جِئْسَن لاسع
	٧	170	جَيْفَلة	V	23	جِئْسَن لاطئ
	٢	۰۷	جيلاتين	\ \	23	جِنْسَن هَنْرِي
	٤	77	جِيْلَانِيا مُثْلَثَةِ الأوراق	٤	٥٨	جِئْسَن ياباًنتِ جَنْطِيانا
274	٥	٥٩	جِيْلَانِيَا مُؤَذَّنَة	l £	٥٩	جَنْطِيانا

		1				
ح	ص	مدخل حَبَق شَمَيْسِمَة (لِنان)	<u>ح</u>	ص	مدخل	ج ي ل
V	ص ۷٦	حَبَق سُمَيْسِمَة (لِنان)	٥	<u>ص</u> 9 ه	مدخل جيلينية اذِنَة	ے ب
٧	7.	حَبَق صَغِيْر	٤	77	جِئْلَبِيَة طَيَّة جِيْكُو	
٥	3.5	حَبَق ظَرِيْف		۸۳	جِينُكُو	
٦	74	حَبَق عَذْب الرّائِحة		177	جَيْهُمَان	
7	79	حَبَق عَذْب مُتَشَجِّر		75	جَيُوْم جَبَلِيّ	
٥	7.8	حَبَق قُرّاصِيّ الوَرَق		٥٦	جَيُوم كَنَدِيّ	
٦	74	حَبَق قَرَنْفُلِيّ	١	٨٥	جَيُوم مُبارَك	
٧	77	خَبَق كَرْمانِيّ	٦	٦٥	جَيُوم مُنتَصِب	
٥	78	حَبَق لِيفِي		٥٨	جيوم ٺَهْرِيّ	
٦	737	حَبَق الماء		171	حافِرِيَّة حَالُوم	
٥	3.5	حَبَق مُتَشَجَّر	١	711		
٥	OF	حَبَق مُتَقَبِّض		78	حامِض	
٥	٦٥	حَبَق مَغْرُوف	٣	13	حامض پيڭرُوتوڭسيني	
٥	70	حَبَق نَبَطِي		77	حامض خَلِّي مُركّز	
٥	٦٥	حَبّق هِنْدِيّ		٦٥	حامِض كلورهيدريك	
7	79	حَبَق وَبِر	٤	70	حامِض هيدروكلوريك	
1	777	حَبْل المَسَاكِيْن		٥٥	حامُول کَبِیْر	
٧	707	حَبْل مِسْكِي	٦	711	حَبّ الزُّلَم	
١	189	حَبْن	7	١٨٧	حَبّ السُّلاطِين	
۲	TAT	حَبْهان	7	144	حَبّ العَرُوس	
١	٣١٠	حَبْوَة الكاكَنْج	7	117	حْبّ العَزِيز	
١	144	حَبِيْن	7	711	حَبُّ القَلْب	
١	1.7	حَيِّن حَدَج حِرَابِيَّة مَأْكُولَة	٤	٦٧	حَبُّ العِسْك	
٥	175	حِرَابِيَّة مَاْكُولَة	٣	109	حَبّ الملوك	
١	1	حِرْبق حَوْلِيَ	٤	AV	حَبّ المُلوك	
٤	77	حِرْجِل	٦	177	حَبّ المُلُوك	
١	377	حَرْشُف بَرِّي	٥	198	حَبَاحِب أَحْرَش	
۲	7.6	حَرُّشَف مَبُّذُول	1	AV	حَباحِبُ الشُّقُوق	
٤	1 • 4	ُ حُرْف حُرْف أَبْيَض حُرْف أَبْيَض	7	7.7	حَبَاحِب مَبْذُول	
١	78.	خُرْف أَبْيَض	٥	٧٢	حُبَّار	
٥	٦٧	حُرُف الحَقْل	٧	٧٦	ځبَاق (تونس)	
٧	٧٨	حُرْف الْحَقْل	1	٨٨	حَبَق	
٤	٦٨	حُرِّف الماء		۷٥	حَبَق أَخْضِر	
٣	71	حَوْمَل		٧٥	حَبَق البَرْغَش	
١	3.47	حُرَّيْق شائع		411	حَبَق تُونُجَانِيّ	
١	178	حَزَاز إِسْلَنْدَة	٦	787	حَبَق التَّمُساح	
٧	٧٨	حَزَاز بَياض الثَّلْج		719	حَبَقُ الرِّاعي	
٤	٨٢	حَزاز جُدَرِيّ		78	حَبَق الرُّهْبان	
۲	74	كزاز حُقَيْقِي	٥	7.8	حَبَق زَعْتَرِيّ الرّائِحَة	373

				,			
ح ش ي	<u>ح</u>	<u>من</u>	الدُّبَ	مدخل	ج	ص	مدخل
ے س ب	7	7 • 7			٧	<u>ص</u> ۷۸	مدخل خزاز الحيطان
	١	٩.		خنيشة		٧٨	حَزاز الرَّنَّات
	١	9.8		خييشة		79	حَزاز رِئوِي
	١	174	لَمَهُ الدُّوْدِيَّة		٤	٦٨	حَزاز الزَّان
	١	41	الدِّيْنار		٦	٧١	خزاز عِطْرِي
	1	174	ة الدِّمَب		۲	74	خزاز عُلَيْبِي
	٣	119	ة الذِّهَب		٧	٧٨	حَزاز الكَلَب
	١	44	أ الرَّئة المَخْزَنِيَّة		٦	٧١	حَزاز مَأْكُول
	٧	٦٧	الرَّيْح		٧	٧٨	خزاز مُتَحابِك
	١	١	الزُّنْبَق		7	٧١	خزاز المَنّ
	1	44	أ الزُّجَاجِ المَخْزَنِيَّة		١	14.	حُسْ نِ المَرَاهِ
	١	770	ة الشُّعَال		٣	77	خُسَيْكَة
	١	9.8	ةُ الشِّفَاء			٦٣	حُسَيْكَة ثُلاَثِيَّة التَّشْرِيْم
	١	444	ة الصَّقْر		٣	74	حُسَيْكَة شُغْراء
	٣	19	ة الطَّوْخ		٣	77	حُمَيْكَة مُشِعَّة
	٧	18	ة عَقْرَب		٣	74	حُمَيْكَة مُنْحَنِيَة
	٥	ŧ٥		خييئ		77	حُسَيْكَة مُؤرِقة
	١	797	ة الغُرَاب		٦	777	جنوج
	٥	Y7•	ة الفَتْق المَرْدَاء		٤	79	حَشَفَةً البرازيل
	٤	787	ة الفَنْق الهُلْبِيَّة		٣	٥٤	خشيشة الإبرة
	١	707	ة الفُقَراء		١	٨٨	حَشيشةُ الأشنان
	1	***	ة القِزَاز . •		١	400	حَثِيْثَة الأَفَاعِي
	١	178	ة القَلْب • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		٦	٤	حَثِيْثَة الأَفْعَى
	١	771	ة الكُلّاب		٤	79	حشيشة آلإغ الرَّمْداء
	١	799	ة الكَيْف		١	108	خشيشة الأزجاع
	٥	141	ة الكَيْف		١	140	حَشِيْشَة الإوَزّ
	١	3.5	ة اللَّبَن الشَّائِعة		٦	79	خشيشة البراغيث
	٤	23	ة اللَّبَن المُرّة		٧	177	حَشِيْشَة البَرَص
	٧	۸٠	ة اللَّيْمُون		٦	731	خشيشة البِلَوْر
	١	٨٥	ة مُبارَكَة			75	حَثِيشَة التُّنِّينِ النَّتِنَة
	١	144	ة المَكْنَسَة ر		١	٨٩	حَشيْشة الثُّوم
	1	*1*	ةُ المَلاعِق		١	178	حَثِيْثَة الجُرْح
	١	47	ةُ المَلاك		٦	7 • 7	خشِيْشَة الجُرْح
	١	44	ة المَلِكَة		١	371	حَشِيْشَة الحُرِوق
	۲	٧٠	ة المَلِكَة	- 1	١	737	خَيْئِشَة الحَلْمَة
	١	9 8	ةُ المُلُوكِ ه		١	707	حَثِيثُة الحُمِّي الشَّرُونِيَّة
	٥	Y • A	ة مَهْبُولَة		١	777	حَشِيْشَة الخَطَّاف
	٧	۸١	ة التَّتَاق م		١	179	حَشِيْشَة الخَنازِيْر
570	١	4.	ةُ النَّجَارِيْن	ا خشیشا	٦	۸۲	خشيشة الخَنازِير

			ì			
<u>ح</u>	<u>من</u>	مدخل	ح	<u>صن</u> ٦٩	مدخل	ح ش ي
٣	م <u>س</u> ۲۸، ۲۹	مدخل خُمَّيْض	٤	74	مدخل حشيشة النَّجْم الرَّمْداء	ع س ب
٤	77	محميض الحمر		411	حَشِيْشَة النَّحْل	
٤	74	حُمَّيْض جَعْدِيِّ	١	797	خششه الهر	
٣	79	حُمَّيْض حادً		TV 1	خشيشة الهورة	
١	1 • 8	حُمَّيْض الحَقُّل		9.4	حَضَض بَوْبَرِيّ	
7	٧٤	حُمَّيض الحَقْل الشَّرقيّ	1	3.5	خُضَض شائع	
٤	77	حُمَّيْض دَم التَّنين	٧	٤٧	حَفَا	
۲	**	حُمَّيْض زِراعِيّ		707	حَفْلِيَّة مِيْثرِيْدَات	
٣	79	حُمَّيْض سُوري		179	حِكْمَة الجَرَّاحِيْن	
٦	٧٤	حُمَّيْض شَرَّقيّ	١	4.4	حُلْبَةَ رَوْمِ يَّ	
٣	79	حُمَّيْض شَلَبِيّ	١	4.4	حُلْبَة مَزْرُوعَة	
١	1 • £	حُمَّيْض الصَّبْر	٥	79	حَلَبْلاب مُسْتَدِيرِ الوَرَق	
٣	٧٠	حُمَّيْض صَغِير الوَرَق	١	797	حُلْبُوْب	
٣	٧٠	حُمَّيْض ضَيِّق الوَرَق	١	١	حَلْبُوب حَوْلِيّ	
7	77	حُمَّيْض ظَرِيْف	٣	٦٥	حِلْيْت	
٣	٧٠	حُمَّيْض الغَنَم	٧	٨٣	حَلْحَل أَزَبَ	
٥	٧٠	حُمَّيْض كبير الثُمَر		۸۳	حَلْحَل أَشْعَر	
۲	٧٠	حُمَّيْض لُبنانيّ	٤	٧١	حَلَزُون كَرْمِي	
٥	٧٠	حُمَّيْض لَحْمِيّ الوَرَق		VT	حُلو مُرّ	
٤	٧٤	حُمَّيض الماء	١	٧٢	حُلْوَة مُرَّة	
۲	٧١	حُمَّيْض مائي	٦	17	حَلُّومِييا	
٣	٧١	خُمَّيْض مُتَكَثِّل		٥٦	حِلْین	
٥	٧٠	خُمَّيْض مُسْتَبِر	٦	79	خماجم	
٤	٧٤	حميض مُسَنَّن	٤	٨	حِمار أرْمادِيْلا	
٤	V &	حُمَّيْض المَناقِع	٣	٦٧	حِمار البَيْت	
٧	٨٤	حُمَّيْض مُنفرِج الوَرَق	٣	٧٢	حِمار قَبَّانِ	
٤	٧٤	حُمَّيْض النيال	٤	191	حُمّاض أَرْجُوانِيّ	
١	1 • 1	ٔ حُمَّلِضَة حُمَّلِضَة	١	437	حُمَّاضِ الأَرْنَبُ	
۲	V Y	حُمَّيْضَة	١	۱ • ٤	حُمَّاض إِسْبَانَخِيّ	
٣	V 7	حِنَّاء سَرْحَة	١	1 • 8	حُمَّاضِ الطَّبْر	
١	1.0	حَنْتُم حَنْدَقُوْقَ أَبْيَض	1	1 • 1	حُمَّاضُ العِيْد	
۲	٧٣	خُنْدَقُوْق أَبْيَض	٥	177	حَمَامًا .	
١	1 • 0	حَنْدَقُوْق حَقْلِيّ	١	۲.	حَمْبَلاس أَبْيَض	
٣	337	َ جِنْطَة تَتَرِيَّة جِنْطَة سَوْداء	١	1.4	جِمْجِمٌّ مَخْزَنِيٌ جِمْجِمَةٌ مَخْزَنِيَّة	
٤	.37	حِنْطَة سَوْداء	١	1.7	حِمْجِمَةٌ مَخْزَنِيَّة	
1	1.7	خَنْظَل	7	٥٥	محُمَر	
1	1.7	حَنْظَل مَخْزَنِيّ	١	٣٦٠	حَمّرايّة	
٥	Y•V	خييخنة	۴	٦٧	خمّراية حمّص حمّص	
۲	FAY	خَنْظُل حَنْظُل مَخْزَنِيّ خنيځنه خيځنه خوجَم	۲	3.5	حَمُّض	573

خ ر ط	<u>ح</u> ۱	<u>می</u>	مدخل	ع ا	<u>ص</u>	مدخل
	١	می ن ۱۱۰	<u>خُبَّازَة</u> بَرُيَّة	7	77	<u>ملخل</u> حَوْذان
	٧	٨٨	خُبَّازَة خُطْمِيَّة	٤	٧٥	حَوْذان
	٤	YY	خُبَّازَة مُسْتَدِيْرَة الوَرَق	٦	۲۷	حَوْدَان آسْيَوِيّ
	٤	771	خُبّازة مِسْكِيّة	۲	٧٤	حَوْذَان حِرُيْف
	٥	٧٢	خُبَّازَة مِسْكِيَّة	٧	٨٥	حَوْدَان شِرْير
	۲	77	خُبّازَة مَغْرِبِيَّة	٧	٨٥	حَوْذَان شَقِيّ
	١	11.	خُبَّازَى الغاب	٥	٧١	حَوْدَان كُرَوِيّ البزرة
	٣	٧٥	خُبْز خُبْز الغُراب	٥	٧١	حَوْدَانِ مائيّ كرويّ البزرة
	٦	177	خُبْز الغُراب	٤	٧٥	حَوْر أَبْيَض
	٦	18	خُبْز القَاق	١	١٠٨	حَوْر أَسْوَد
	٦	77	خُبْز المَشايخ	١	١٠٨	حَوْر بَلَدِيّ
	١	111	خُبَّيْزَة مَخْزَنِيَّة	٦	VV	خۇر بَلْسَمِيّ
	۲	٧٥	خُبَيَّزَة وَرْدِيَّة	۲	۷٥	حَوْر رَجُواج
	١	1	خُتُرُق	١	١٠٨	حور رُوْمِيْ
	١	117	خَدُّ البِنْت	٦	VV	خَوْر كارولينا
	۲	VV	خُدْرِيَّة سَبِيْنيَّة	١	٣٦٠	حَوْرَة رُوْمِيَّة
	١	114	خُدْرِيَّة هِرَاوِيَّة	٥	٥٦	حَوْك
	٥	V Y	خَذَّاق	٤	٧٦	حَوْمان زِفْتِيّ
	٣	٧٦	خِذْراف أَمْرَط	٣	V E	حَوْمان غُدِّيّ
	٣	77	خِذْراف مُبَقَّع	۴	٧٤	حَوْمان مَغْضِنيّ
	1	444	خُوَاشَة ِ	7	٥٥	حَوْمَر
	٧	٨٨	خَرْبَق أَخْضَر	٦	VV	حَيّ العالَم الحِرّيْف
	۲	٧A	خَرْبَق أَسْوَد	7	VV	حَيّ العالَم الصَّغِيْر
	٧	۸٩	خَوْبَق أَمْرَط	٧	7.8	حَيّ العالَم المِكْرار
	٧	۸۹	خَرْبَق الشَّرْق	٧	AY	حَيُّ العالَمُ الوَرْدِيّ
	Y	۸۹	خَوْبَق مَخْزَيي	٦	VV	حَيُّوْن حِرَّيْف
	٧	۸٩	خَوْبَق مُنَقَّط	٧	7.8	حَيُّون مِكْرار
	٣	VV	خَوْبَق نَجِس	٧	AV	حَيْون وَرْدِي
	*	V 9	خُرْبُوْق أَبْيَض	1	78	خَابُور
	N	١٣٨	خَوْخَفْتِي خَوْدَل أَبْيض	*	٧٦	خاتَم سُلَيْمان المَخْزَنيّ
	*	V 9	خَرْدَل أَبْيَض	*	40	خالِدَةُ الجُزُر
	١	311	خَرْدَل أَسْوَد	٦	184	خالِف وَالِدَيْه
	١	777	ا خَاْدَل مِثْ نُدَات	١	177	خاما أقطي
	*	٨٥	خَرَز الخَوْخ خَرَز الصُّخُور خَرَز الصُّخُور	٦	188	خامادريُوس
	١	178	خَوَز الصُّخُور	٣	114	خامِشة
	٣	1.	الخرشوف	1	71	خَانِق الفَهْد
	٣	٣	ا خاشاف	٤	۸۳	خانِقُ الكَلْبِ القُنَّبِيّ
	٧	717	خَرْشُوف بَرُّي		9.8	حايق الكُلْبِ الْقُنَّبِيِّ خايق النَّمِر خايق النَّمِر
277	3	110	كخرطال زراعي	٥	**	خايا السنغال

			ı			
<u>ح</u>	<u>ص</u>	<u>مدخل</u> خِشْخاشِيَّة	<u>5</u>	<u>ص</u> ۷٤	مدخل	خ ر م
٦	<u>حی</u> ه	خَشْخاشِيَّة	٥	٧٤	ملخل خُرْم خُرَّمُ الحِنْطَة خُرَّم الحِنْطَة	150
١	177	خُشَيْزَكَ خُصَى الثَّعْلَب	٤	V 4	خُرَّمُ الجِنْطَة	
۲	175	خُصَى التَّعْلَب	٥	77	نُحرَّم الحِنْطَة	
1	1 • •	خصی هِرُمِس خُصی هِرُمِس	١	117	خُوْنُوب خُونُوب هِٺٰڍِي	
١	111	خِطْمِي	١	114	خُرْنُوب هِنْدِي	
ŧ	١٨٣	خِطْمِي سَبْدارِيْفا	١	117	خَوُّوبِ	
٤	٦٧	خطئي يريس خطئي سبداريفا خطيق مشكق خفّان خفّج مَبْذُوْل خلّ أساسي	٧	۴.	خَرُّوْب الخِنْزِير	
٣	۸٠	خَفَّان	٣	VV	خَرُّوْبَةَ اليَّهُودِيَّة	
٣	۸٠	خَفَج مَبْذُوْل	١	114	خِرْقَع	
۲	77	خَلّ أساسيّ	٤	V4	نيخروع	
۲	77	خَلَّ أَصْلِيق	٥	٧٣	خواقع خواقع خونیش	
۲	77	خلِ جَذْري	٦	10	خُورَيْس	
١	177	خِلَّة	٤	۸۱	خُزامُ الصَّبَّاغِيْن خُزَامَی بَحْرِیَّة	
4	۸۳	خِلَّة شَيْطانِيَّة	۰	٧٤	خُزَامَی بَحْرِیَّة	
4	۸۳	خِلَّة كَبِيْرَة	٤	۸۲	خُزامی ذَکرِیَّة	
1	١٢٣	خَلَنْج أَشِوَد	۲	۸۰	بُحزامی مَخْزَنِیَّة	
*	۸۳	خَلَنْج الثُّلُوْج	٣	٧٨	خُزامَى مَخْزَنِيَّة	
١	١٢٣	خَلَنْج رَماديّ	٣	770	خَـــق (عصير)	
١	144	خَلَنْج شَائِع	١	444	خَــنّ البَحْر	
٥	٧٥	خَلِّ أَصْلِيَّ خَلْ أَصْلِيَّ خَلْ جَنْدِيَ خِلَّة شَيْطانِيَّة خِلَنْج أَسْوَد خَلَنْج أَسْوَد خَلَنْج مَنْ فَرَاد خَلَنْج مَنْ فَرَاد خَلَنْج مُنْ فَرَاد خَلَنْج مُنْ فَرَاد خَلْنْج مُنْ فَرَاد خَلْود السُّطوح خَلُود كَبِيْر الزَّمْر خَلَاد كَبِيْر الزَّمْر خَلَان صَغِير الرَّمْر خَلَان صَغِير الرَّمْر خَلَان صَغِير الرَّمْر	۲	۸۱	خَصَّ بَوْيَ	
1	178	خَلُود السُّطوح	٣	٧٩	خَــن بُسْتانِيّ	
٧	47	خَلُّوْد عَنْكَبُوْتي	٥	Y••	خَسّ الحِمَار	
4	٨٤	خَلُوْد كَبِيْرِ الزَّهْرِ	۲	۸۱	خَـــن الزَّيْت	
١	177	خَمان صَغِير خَمان عُنْقُودِيّ خَمان عُنْقُودِيّ	٤	۸۲	خَسُّ السَّمَّ خَسَ النَّفجَة خَشَب الأنْتِيْل الأبْيَض	
٧	٤A	خَمان عُنْقُودِيّ	٣	111	خَسّ النَّعْجَة	
1	7.8	خَمان كَبِيْر	١	7.47	خَشَب الأنْتِيْل الأبْيَض	
٥	٧٦	خَمُّو	٦	127	خشب بَرْنود	
1	191	خَمَل	١	٣٠٨	خَشَب سُوْرِيْنَام	
7	140	خَمَل خَمِيْرُ آذار خَمِيْرِ الخَوْخ	٧	77	خَشَب الكَلْب	
٥	V9	خَمِیْرُ آذار	١	4.4	خَشَب مُرّ	
۲	٨٥	خميير الخؤخ	٣	3.7	خَشَب اليانِسون	
١	144	خَمِيْرَة البِيْرَة	١	119	خَشْخَاش أَبْيَض	
١	144	خَمِيْرَة الجِعَة		۸۰	خَشْخَاش أَرْغَمُونِيْ	
٦	A١	خَميرة الدار	١	171	خشخاش أغمى	
١	179	خَنازِيْرِيَّة عَقْداء	١	171	خَشْخَاش بُسْتَانيّ	
٦	AY	خَنَازِيرِيَّة المَناقِع خنشار أُنْثَى	١	119	خَشْخَاش زَبَدِي	
٥	۸٠	خنشار أنثى	٧	91	خَشْخَاش لُبْنَانَ	
٣	٨٨	خنشار کبیر خَوْخ	۲	AY	خَشْخاش مُقَنَّب	
۲	٨٥	خَوْخ	l y	171	خَشْخَاش مَنْثُور	473

د ل ب	3	<u>ص</u>	مدخل	3	<u>ص</u>	مدخل
-	1	120	دُرًّاق	١	171	<u>مدخل</u> خَوْخ بَرِّي
	۲	97	دُرّاقَ ة	١	171	خَوْخَ شائِك
	1	140	دُرَاقِ ن	٣	AY	خَوْخَ مُجَفَّف
	١	140	دُرَّاقِ ن	٤	۸۳	خَوْشَان قُنَّبِيّ
	۲	97	دُرّافِنَهَ	٧	719	نحؤكا
	٦	174	دَرّام	٤	٨٤	خُوْلَنْجان مَخْزَنِيّ
	٤	89	كُرْتينيا بَرِياقِية	۲	۸٦	خِيار
	١	١٣٨	دَرْدار إنْكُلِيزِي	٧	97	خِيار الأُنْتِيل
	١	147	دَرْدَار حَقْلِيّ	١	114	خِيَاد شَنْبَر
	1	4.4	دَرْدَرِيَّة	٧	44	خِيار الكُورُنِيشُون
	٧	4 8	دَرْسَت _.		787	خَيْربُوَا
	٧	777	دَرُقَة مُقَلَّنَتَة	١	417	خِيْرِيّ أَصْفَر
	۲	9.6	دُرْنُوْق خانِق النَّمِر		v	دَابِرَة
	۲	9.8	دُرْنُوق مِزْمارِيّ	7	7	دابِرَة داتُورَة شائكة
	٧	9.8	دَرُوْس دِرْوِيْلَة ثُلَاثِيَّة التَّفْلِيْق	1	188	
	٥	۸۱	دِرْوِيْلَة ثُلَاثِيَّة التَّفْلِيْق	۲	٨٨	دائورة شائِكَة
	٥	۸۱	دِرْوِيْلَة كَنَدِيّة		٤١	دَادي
	٧	4.8	دِرْياس		178	دَاذِي
	٧	90	دِرِیْس دریئیس مَجِلّان	1	188	دَاذِي رُوْمِ <i>ي</i> ّ
	٥	۸۱	دریمِس مَجِلّان	۲	۸۹	داذِي زَعْتَرِيّ الورق
	٥	۸۱	درييس ونثر	1	188	دَاذي مُخَرَّم
	٦	40	دَسَم الكَريتَه	7	۸۳	داذِي مَخْزَنِيّ
	۲	٥٢	دِفْلَى صَفْراء		170	دَارْصُوْص
	1	144	دِفْلَى مَبْذُوْلَة	١	٤١	دبّاء الهِنْد
	٥	٨٢	دَفْنَهُ	٦	70	دَبّاء الهند
	٥	۸۳	دَفْنَهُ تِيْمِيْلِيَا	١	474	دَبًّاب
	٥	٨٥	دَفْنَهُ زَيْتُونِيَّة	۲	۸۹	دَبَح زِراعِيّ
	٥	٨٥	دَفْتَهُ زَيْتُونِيَّةُ الوَرَق	١	٣٨٨	ڍِبْق
	٥	٨٢	دَنْكَ سامَّة		٣٨٨	وبنی آبیکض دَبُوْن دِئار النّاء دُخان الفُوْج
	٧	774	دَفْنَهَ سامَّة	١	40	دَبُّوْن
	٥	AY		١	777	دِثَارِ النِّساء
	٥	٨٤	دَفْنَهَ قَاتِلَة		۱٦	دُخّان الفُوْج
	٥	۸۲	دَنْنَهُ لِاحِفَة		454	دُخَان هِنْدِي دُخْن
	٥	۸٥	دَفْنَهَ لُبُنَان		٩.	دُخْن
	٦	٨٤	دِقْتَمُونَ أَبْيُض	۲	91	دُخْن أَصْفَر
	٧	101	دْقَنْت	۲	41	دُخْن إيْطالِيّ
	0	181	ُ دَقِيْق دَقِيْق	۲	91	دُخْن شائِع
	٦	137	دَقِيْق	۲	91	دُخْنُ العَصَافِيْر
244	٣	117	كُلُبُوت شانع	۲	47	دُخْن مُنْبَسِط

			I			
ح	<u>من</u> 9٤	مدخل دِيْجِيْنال صُوفِيْ دريد مريز	<u>ح</u>	<u>ص</u>	<u>مدخل</u> دَلْهَفَان	د ل ه
٤		دِيْجِيْنال صُوْفِي	١	177		
٥	۸۹	1 ** 1 1 **	١ ١	18.	دَلِيْك	
٥	44	وپیجیدایی صبر دیجیتوکسوسید دیجیتوکسین	٣	10, 451	دَمّ الأَخْوَيْن	
٥	۸۹	ديجيتوكسين	٧	4٧	دَمُ الْأَخَوَيْنَ	
٥	٩	ا دیس العرب	V	9٧	دَم التَّنَيِّن	
٣	AV	دِيْشُ أَصْفَر دِيْشُ أَمْرِيْكِيّ	٧	4٧	دَم الثُّعْبان	
٣	۸v	دِيْش أَمْرِيْكِيّ	٤	198	دَمَّارَة	
٣	AV	دِيْشُ مُرَّانِيَ	٤	40.	دَمانيُوم	
٣	**	دِیْشار	١	7.8	دَمْدَمُوْن	
٤	9.8	ديڭرُوا الحُمِّي	١	1	دَشْرِیْتَ دَمْع أَیُوب دَمَوِیَّه دَشْیانا	
٣	41	ذُرَاح ناعِظ ذُرَاح ناعِظ	٣	17	دَمْع أَيُّرب	
٤	47	ذَرّاح ناعِظ	٣	189	دَمَوِيَّة	
١	184	ا ذَرَة شامَّة	٤	٨٦	دَمْيانا	
١	184	ذُرَة صَفْراء	٤	٨٦	دَمْیانَه	
١	۸۶/	ذُرْفَة	٤	٨٦	دُمَيْصٌ ثُمانِيُّ البَتَلات	
٣	91	ذِرْنُوح	٧	4.8	دَنْتَارِيا رِيْشِيَّة	
٣	91	ذُرْفَة دُرْنُوح ذُرُوح ذُرَيْرَة ذَعْلُوق	٤	۸Y	دَنْد المُلُوك	
٤	٩	ۮؙۯؽ۫ۯؘ	٤	777	دُنْدُل مِسْكيّ دَهامِين شَوْكَرانيّ	
٣	44	ذَعْلُوٰق	۲	٥٤	دَهامِين شَوْكَرانيّ	
٥	70	ذُقِّن الباشا	٥	107	دَهَامِين مِسْكيّ	
١	***	ُ ذَنَب الخَيْل ذَنَب الخَيْل	1	198	دَهَق	
٣	14	ذَنَب الخَيْل	1	11.	الدَّهْماء	
١	**•	ذَنَب الفَرَس	*	41	دُهُون	
٣	19	ذَنَب الفَرَس	1	V 4	دَوَاء الحَيَّة	
٤	4٧	دىپ بىرس دُنْيان جَبَلِيق دُونُون خَفِيّ	ŧ	97	دواء عَسَلِيّ	
٦	۸۹	ذُؤنُون خَفِيّ	1	181	دَوَّار الشَّمْس	
٤	4.4	رَاتَانِيا البرازيل	۲	דדו	دَوَار الشَّمس	
٤	4.4	راتانيا البارا	٣	7.	دُوبُوازِيا	
٣	97	راتانِيا ساڤانِيْلَّة	٣	٤٥	دُوبُوازِيا هُوپُؤُود	
٣	94	راتانيا غرناطة الجديدة		94	دُوبُوازِيْ <u>ن</u>	
٧	3 • 1	راينْج رَايَنْج المُصْطَكَاء	1	077	دَوْسَة الحِمَار	
٦	377	رَاتِنْج المُصْطَكَاء	٤	00	دُوْقُس	
٧	۱ • ٤	راتِنْجات	٣	AY	ديانْتِيرا صَدْرِيَّة	
٦	۸١	راححة الأشد	٥	177	دِيانْتِيرا صَدْرِيَّة	
١	177	رَادِن	1	187	دِيْجِينال أُرْجُوانِيّ	
١	177	ٔ رَازِ قِي	٥	۸۸	دِيْجِيتال أَرْجُوانِيَّة	
۲	79	رَأْسِ الثَّوْر	٦	AV	دِيجِيْتَال أِرْجُوَانِيّة	
٥	90	رَاذِقِي رَأْس النَّوْر رَأْس حِبْحِم مُزْهِر	٧	1.1	ديجيتال أرُجُوانِيَّة	
٧	7.1	رَأْسُ الدُّورِي	۲	1.4	دِيْجِيْتال أَصْفَر	٤٣٠
						•

				1		
ر و ب	<u>ح</u>	من	مدخل رِجْل القُبَّرَة	ح	<u>ص</u>	مدخل
- 33	<u>ح</u> ٦	ص ۱٤٧		۰	<u>من</u> ۲۱	مدخل رأس الشَّيْخ
	1	377	رجُل القِطِّ الشَّائِع	۰	194	رَأْس العُصْفُور
	١	777	رِجْل اللَّبْوَة	v	70	رَاسَن البَراغِيْث
	1	377	رُجُل الهِرَ الشَّائِع	۲	1.5	راسَن الجِبال
	۲	۴	رُزِ	١	189	رَاسَن طِبْتِي
	٧	144	ۮؘڒؙؽؙڹ	١	189	رَاسَنِ هِيلانَة
	٤	1 • ٢	رَشاد	٤	1.4	رافانالَة
	٤	٨٢	رَشاد برِّيِّ	٥	40	رَامَه
	1	٨٨	رَصَاصِيَّة أُورُوبَيَّة	٥	47	رَامَه بيضاء
	١	115	رَضَنٌ هِرَاوِي	٥	47	رَامَه خضراء
	٣	89	رُطَبَة	٥	90	رَامِي
	٧	410	رُطْبَة رَطْبَة رُعامَة	٥	47	رَامِي بيضاء
	٤	1.5	رُعامَة	٥	47	رامي خضراء
	٤	1.4	رُعامَی	٤	99	رامِيْجِيا بُؤْرْدِي
	١	771	رَغْبَل	٤	44	رَامِيْجِيا تريانا المُزَنَّدة
	۲	1.4	رَغْراع أَيُّوْب	٦	747	رَانِج راوَنْد
	١	404	رِغْي الحَمَام اللَّيْمُونِيِّ	٤	99	راوَنْد
	١	108	رِغْيُ الحَمام المَخْزَنِيّ		٩.	راوَنْد
	٧	١٨٠	, ,	V	1.0	راوَنْد
	٦	۸۱	رَقَف	٥	4٧	رَاوَنْد ذَكَر
	۲	P 3 7	Q.000 U	٦	47	راوَنْد راحِي
	٥	*	رُگب الجَمَل رُگَة	٧	١٠٨	راوَنْد رِيْباسِيّ
	١	100	رُکُّة	٧	١٠٨	راوَنْد صِيْنِيّ
	7	77	رِکْفَة	٥	9.4	راوَنْد فلسطين
	٣	47	رَڭُو	7	91	راوَنْد القُصْبان
	١	٤٠٠	رُمَّادَه أو رُمَّدَه	٦	97	رَاوَنْد كَفِّيْ
	١	107	رُمَّان	٧	١٠٨	راوَنْد مَخْزَنِيّ
	۲	1 • 8	رُمّان	4	74	رِئوِيَّة السُّنديان رِباص رَبَاطِيَّة خَوْخِيَّة الوَرَق
	٦	۸۳	رُمَّان الأَنْهار	٧	1+4	رِباص
	١	119	رُمَّان السَّعَالَى	٧	١٨	رَبَاطِيَّة خَوْخِيَّة الوَرَق
	۲	١٠٤	رُمَّانة		10	رَبَاطِيَّة غارِيَّة
	٧	1 • 9	دَمْرام دَمْرَم	1	101	رَبْرَق رَنَانِيا مَخْزَنِيَّة
	٧	١٠٩	رَمْوَم	1	104	
	٤	777	رَمْغِيُوس (الخشب)		9.8	رَتَم رَتَّحِي
	١	٣	رَمْلِيَّة حَمْرَاء	7	737	رِجُلُ الأَرْنَب رِجُل الأَسَد
	٤	1 • £	رَّمَهُ رَنْد شَائِع رَنْد الشَّعَرَاء	١	777	رِجُل الأَسَد
	١	701	رَنْد شَائِع	٥	*	رِجْل الإوَرْ البَيْضاء
	١	701	رَنْد الشُّعَرَاء	١	301	رِجْلُ الحِمَام
173	۲	1.0	ا رُوْبِيْنِيَة سَنْطِيَّة	١	114	رِجُلُ الذُّئب

			ı			
ح	<u>ص</u> ۴٤	مدخل زَرِّشُك لُبُنان زَرْنَبُوك فِيرجِينية رَرَبُوك فِيرجِينية	ے	من	مدخل	رور
٥	78	زَرَّشَكَ كُبُنان	1	144	مدخل رُوْر رُوگو	
۲	175	زَرْنَب	٣	47	رُوکُو	
٣	44	زَرَنبُوك فِيرجِينية	٤	44	رَوَنْد	
7	9∨	زَنْیْنْخ زْرِیْقَة زَعْتَر	٦	٩٠	رَوَنْد	
٥	10.	زْرِيْقَة	٧	١٠٥	رَوَنْد دُونْد	
٦	4٧	زُ غُتَر	۲	1.4	رُوْوُلْفيا الأفاعي	
٧	114	زِّغْتَرُ إِسْبانِيَ	۲	1.4	رُوْوُلْفِيا مَدّادَة	
٦	4∨	زَعْتَر رَسُعِيَّ زَعْتَر مُتَتَفِخ الرَّأس	٧	1.4	رِیْباس	
٧	117	زُغْتَر مُنتَّفِخ الرَّأْس	٥	70	رَيْحَان	
0	44	زُغْرُور زُغْرُور أَحَادِيّ المِدَقَّة	١	۲.	رَيْحَان أَيْيَض	
1	171	زغرُور آحَادِيّ الْمِدْقة	١	3.7	رَيْحَان الأرْض	
'	171	زُغْرُوْرِ الأَوْدِيَة	*	79	رَيْحان الأَرْض	
٥	1	زُغُرُور سِيناء	0	78	رِیْحان سُلَیْمان	
v	118	زُعْرُور شائِك مُوم ريان		٧٦	رَيْحَان صَعْتَرِيّ رَوْرِد رَيْدُون	
7	١٠٠	زُغُرُور عادِيّ بور		19	رَيْحَان قَرَنْفُلَيّ أور الريَّة	
٦ .	1.1	زُغْرُور مالِس زُغْرُور وَجِيْد البِزْرَة	τ .	٧	ريزوم لُؤف الْحَيَّة مِنْ مَنْ :	
'	171	زعرور وجيد البِزرة زَعْفَرَان مَخْزَنِيّ	,	197	ريڭليس مَخْزَنِيّ مَعْمَدَن	
	177			177	رَيْهُقَان رَيْهُقان	
٥	1 • 1 1 T T	زَعْفَران مَخْزَنيّ زَعْفَرَان مَعْرُوْف		109		
,	1.1	رعفران معروف زُغْفَران مَعْروف		109	زان شایع زان مَعْرُوف	
١	170	رعفران معروف زُغْدَة مَخْزَنِيَّة		۱۰۸	را <i>ن معروف</i> زان <i>ة</i>	
ì	171			44		
v	٨٥	ِ زِغْلِیْل :غٰل الفنت	,	1.7	زَبادَة أَفْرِيْقِيَّة زَبادَة الهِنْد	
`	727	َ وَغُلِيلَ الْفِسْق زِغْلِيْلَة زَغْرِيْن زِفْیْر زِفْیْر	٦	40	ربارة الجِند زُبْدَة البَاسِيَّة الطَّويْلة الوَرَق	
	1.5		٠,	90	ربده المجرية السويك الورق	
٥	1.5	ر موین : فند	£	181	زېيب بَرِّي	
١	7 77	ۗ ڒؚڰؙڹ ٲ	١	11	ربيب بري زُبيَّدَة	
٦	787	زَّگُون / زَكُون		٨٦	ر زِداع شابِق	
٦	١٢	أ زَلاتف المُلُوك	٧	111	َ دِوار زَدُوار	
٦	117	زُلَم زَلُوع صَغِيْر زُمُنِير زَنْبَق أَبْيَض	٦	47	زَرَاوَنْد البرازيل	
٦	141	زَلُوْع صَغِيْر	٧	117	زَراوَنْد ثُغْبانِيَ	
١	110	دُعْنِ زمیر	٧	117	زَراوَنْد ثُعْبانِيَّ زَراوَنْد ثُلاثِيِّ الفُصوص	
1	177	زَنْبَقَ أَبْيَض	٥	99	زَرَاوَنْد دَقِيْقُ	
*	۱۰۸	ا زنبق احمر	0	99	زَرَاوَنْد دَقِیْق زَرَاوَنْد طَوِیْل	
١	190	زَئْبَقَ أَزْرَقَ زَئْبَقَ أَيَّار	٧	118	زَراوَنْد كبير الزَّهْر	
١	١٦٨	زَنْبَق أَيَّار	1	17.	زَراوَنْد مَلْعَوِيَّة	
١	177	زَنْبَق مار يُوسُف	٦	47	زَرَاوَنْد نَتِن َ	
*	١٠٨	زَنْبَق مَرْتَغُوْن	1	£ £	زَرُّشَك	247
						J . ,

س ت ر	<u> </u>	ص	مدخل	<u>ح</u>	ص	مدخل
	1	<u>ص</u> ۱۷۱	زَيْزَفُوْن صَغِيْر الوَرَق	1	<u>ص</u> ۱۶۸	مدخل زَنْبَق الوَادِي
	5	1.0	زَيْزَفُون صَغِيْر الوَرَق		189	زَنْجَبِيل شاميّ
	٧	119	زَيْزَفُون صيفيّ		377	زَنْجَبِيْل الكِلاب
	٧	119	زَيْزَفُون عَرِيْض الوَرَق	۲	1 • 4	زَنْجَبِيْل مَخْزَنِي
	١	171	زَيْزَفُوْن الغَاب	٦	1.5	زِنْزَلَخْتِ
	٥	1.0	زَيْزَفُوْن الغَاب		99	زَهْرِ النَّلْجِ
	١	171	زَيْزَفُون قَلْبِيِّ الوَرَق	١	170	زَهْر الرَّبِيْع العِطْرِيّ
	٥	1.0	زَيْزَفُون قَلْبِيّ الوَرَق	١	٥٥	زَهْرِ الفِصْحِ المُعمَّر
	٧	119	زَيْزَفُون كَبِيْر الزَّهْر	١	187	زَهْرِ الكَشَائْبِيْن
	۲	47	زُيوت دُهْنِيَّة		77	زَهْر المَبِيح
	۲	47	زُيوت طَيّارَة	١	۳.	زَهْرَة الآلام الحَمْراء
	٤	1	سابينا	٥	3.7	زَهْرَة الآلام الزَّرْقاء
	١	197	س َاتَوَاج	٦	17	زَهْرَة الآلام المُرَبَّعَة
	٤	٤	ساتين	١	٥٩	زَهْرَة الثَّالُوث
	٥	178	سادِج	٥	1.4	زَهْرَة حِنْجِم
	Y	14.	سامتفواس	١	١٦٥	زَهْرَة الرَّبِيْعِ المَخْزَنِيَّة
	Y	17.	ساصَفُرا	٥	4.5	زَهْرَة الساعَة
	7	١٠٩	سالينُم المَنافِع	١	١٦	زَهْرَة العُطَاس
	٥	140	سَبَّاتِيا مُقَرَّنَة	1	۲.۷	زَهْرَة الفِصْح
	١	١٧٢	سَبَال مَكْسِيكِي	١	۸۲	زَهْرَة المَسَاء الجَمِيْلَة
	١	١٧٢	سَبَالِ مِنْشادِي	٣	1	زُ ر ُوفا م
	٣	١.	سَبانَخ	٤	1.1	زُوْفا
	٧	179	سَبَدِيْل مَخْزَنيْ	٣	17	زيت الأرطس
	٤	747	سِيشتان أو مِقْساس (الخشب)	٦	90	زَيْت البَاسِيّة الطَّوِيْلة الوَرَق
	٣	٥٥	َ سَبْع كَبِيْر سَبُّوفَة	٣	1.7	زَيْت الخِرْوَع
	1	7.8		٤	١٦٩	زیت الکاد
	٤	٥٢	سَبُوْل	Ł	1 • 9	زَيْت كَبِد المُورَة
	٦	1.4	سَبُوْل صَغِيْر	1	١٧٠	زَيْتُون مور
	٦	1.9	سَبُوْلَة		110	زَيْتُوْن مور سنگور
	٧	371	سبيجاليّة طاردة للدود		779	زَيْتُوْن الأَرْض
	٧	371	سيجالية طبية		٨٥	زَيْتُون البَرّ
	٤	111			114	زَيْتُون بَرِّيْ رَمُون أَنْ
		۷۲	سَئِيدَج		119	زَيْتُوْن عِطْرِيّ رَوْدُوْن عِطْرِيّ
	1	01	سِتْ الحُسْن		119	زَيْزَفُون أَنْثَى
	۴.	**	سِت المُحشن المُحشن	1	171	زَيْزَفُوْن بَرِّيِّ بِهِ: أَنْ بَرِيْ
	1	178	مِشْرَارِيَة إِشْلَنْدَة ستروفَنْتُوس أَمْرَط	٥	1+0	زَيْزَفُون ذَكَر مَعْمَدُهُ مِن اللَّهُمِن
	٧ -	170	ا ستروفنتوس امرط :ه ۱۰۶		1 • 0	زَيْزَفُون الشَّتاء
	۲	17.	ستروفَنثُوس أَهْلَب		171	زَيْزَفُوْن شَتَوِيّ رَوْزُوْرُون شَتَوِيّ
2773	٧	170	ا ستروفَنْتُوس الغابُون	٧	119	زَيْزَفُون شَجِيْح الزَّهْر

			ì			
<u>ح</u>	<u>من</u> ۱۲۵	مدخل سَرْخَس مَلکِيّ 	<u>ج</u> ٤	<u>صق</u> ۱۱۱	مدخل ستروفنتُوس كُمْب	س ت ر
*		سَرْخَس مَلَكِيّ	٤	111	ستروفنتُوس كُمْب	• •
٦	118	سِرْفِل سِرْفِل بَرِّي	V	140	سترِيكْنُوس إِيْنِياس ستريكْنُوس جَوْز القَيْء	
٦	115			144	ستريڭئوس جَوْز القَيْء	
٤	115	سِرْفِل بَقْلِيَ		YZA	ستريڭئوس غُلْطَارِيّ سَحْلَب سَحْلَب أَبْقَع سَحْلَب ذَكَر سَحْلَب ذَكَر	
٦	118	سِرْفِل عَــْقَلِيْ		177	شخلب	
٣	1 • ٨	سِرْفِل عَطِر		11.	سَحْلِب أَبْقَع	
٦	115	سِرْفِل الغاب		174	سَخُلِب ذُكُر	
۴	14	سِرْفِل قُبْطِي		37/	سَخْلَب مُورِيُو سَخْلَب مُوْرِيُو لُبْنَانِيّ	
٥	1.4	سَرْفِل كُبْنان	ı	37/	سَخُلِب مُؤْرِيُو لَلْبَنَانِيّ	
١	14.	سَرْمَق أَبْيَض	٣	7	سَحْلَب الهِنْدُ الغَرْبِيَّةُ سَدا سِدْر سِدْر سِدْر	
٧	144	سَرَنْتَة صَغِيْرة		۸۳	شدا	
٧	184	سَرَنْتَة كَبِيْرة		140	ميذر	
*	177	َ سَرُو شَائِع سَرِيْشَ أَبْيُض	٦	111	بيذر	
٦	**	سَرِيْش أَبْيَض	٧	100	سِذْر بَرِّي	
٦	7.4	سَرِّيْش ناسوريّ	٣	117	سَدْرُون	
۲	177	سطاخيس الغاب	٦	111	سُذ اب	
7	110	سطاخيس الغاب	١	7 • 1	منذاب البَرّ	
Ł	118	سطاخيس المناقع	٤	115	سَذاب شُلَبِيّ	
٦	118	سَطافِس دَرَنِيّ	٤	114	سَذاب قُنيَيِيّ	
٥	1.9	سطاقِس سُنبَّلِي	١	771	سَذَابِ الماعِز	
*	177	سطاقِسُ الغاب	١	140	سُذَاب مَخْزَنِيّ	
7	110	سطاقِس الغاب	٦	111	شذاب مَخْزَنيّ	
٤	118	سطاقس المناقع		177	سَرَّابيه سِرَاج الغُوْلَة الخَوِيْفِيّ سِراجُ القُطْرُب	
٥	1 • 4	سطاقس منتصب	٦	140	سِرَاجِ الغُوْلَةِ الخَرِيْفِيّ	
٦	118	سطاقس اليابان	٤	٧٩	سِراجُ القُطُوُب	
٣	119	ميعكم كالمستحدث	٤	7.4	سِراجِيَّة سَوَّازان تَتَرِيِّ	
٧	111	شطوال	٣	337	سَوَّازان تَتَوِي	
٧	771	سطوريُون	٤	48.	سَرَّازان شافِع	
١	14.	سُعَادَى الرَّمْل	٦	14	سُرُّة	
١	410	شعَالَى الله	٦	14	سُرَّة الأرْض	
۲	١٢٨	ا سَغْتَرُ الْبَرِّ	٤	337	شُرَّة البَحْر الأسيويَّة	
7	4٧	سَعْتَر شَائِع		14	سُرَّة البُّرْتُغال	
7	117	شغد الحُصْر	*	10	شرَّةُ السَّحَر	
٧	144	شغد الخيير	٣	۲	سُرَّة النَّجَفِ	
Y	144	سُعْد شَرْقِي	٥	١٠٨	سَرْخَس البَّلُوط	
0	1 • 4	ريي شفد طَويل		171	سَرْخَس ذُكّر	
٥	1.9	شعْد عَطِر شعْد مَاكُول	١	144	سَوْخَس عِشْ النُّرْ	
٦	117			1.4	سَرْخَس لِحاء الغُوْل	
٧	۱۲۸	ا سُعْد مُسْتَدِيْر	١	179	سَرْخَس مَخْزَنيّ	£ T £

			منشا	۱ _		ريدا
	5	<u>صق</u> ۱۳٤	مدخل سُلْسَفِيْل المَرْج	١	<u>صن</u> ٤٠٠	مدخ <u>ل</u> شغّدَه
	1	777	شُلُعاًن الجَبَل		٣	سعده سَعُوط سَفَدِيْل مَخْزَني سَفَرْجَل سَفَرْجَلِ هِنْدِيْ
	٥	10.	سَلْفَة	٧	144	سَفَدِيْل مَخْزَنِيْ
	٦	114	-i	۲	174	مَنفُوْجُل مَنفُوْجُل مِن اللهِ ا
	٤	44	سِلْق بَرَّيْ سَلْق كبير الثَّمَر سِلْق مُضَلَّع سِلْقِيَّة سِلْقِيَّة سِلْبَيَّة سَلِيْخَة نَجْب سَمْ الأَرْض	٦	۱۷۳	سَفَرْجَل هِنْدِي
	7	114	مَنْ لَنْ كَبِيرِ الثَّمَرِ	٤	110	سَفَرْجَلَة سَفَرْجَلَةُ البَنْغال
	١	347	سِلْق مُضَلَّم	٦	73	سَفَرْجَلَةُ البَنْغال
	1	148	سِلْقِيَّة	١	141	متفرس الخصى
	v	AT	بالميتة	۲	14.	سَفْرَسَ الحَصَى
	٥	170	سَلِيْخَة نَجْب	۲	171	شفرس سيبيريا
	1	17.	سَمّ الأرْض	١	141	سَفْرَسَ الظُّلّ
	1	179	سّم الحمار	۲	171	سَفْرَس قاس
	•	114	سُمّ الصِّلّ الهِنْديّ		141	سَفْرَس قَلْبِيّ الوَرَق
	0	117	شُمُّ الكُوْبِرا	٣	1.4	سَفْرَس مُثْلَث
	٥	117	شم نَاغِران	*	141	سَفْرَس مُسْتَدِيْرُ الوَرَق
	•	114	سُمّ نَجا الهِنْدِيَّة	١	144	سَفَنْلَر لاسِع
	7	111	سمار محلو	١	PAT	<i>؞</i> ٮؘڡؘؘڹ۫ۮڵؽؙۅ۫ڹ
	7	179	سَمَّارَة الحِكْمَة	۲	141	سَقَمُوْنِيا
	1	140	سَمَارَة مَخْزَنِيَّة		1.4	<i>مَ</i> نَقَمُونيا
	٦	114	سُمَّاق ثُلاثِيِّ الوَرَق	7	114	سَقَمُونيا المَكْسِيك
	Y	14.	سُمَّاق جُحالِيّ	1	PAY	سَكَ الحَمام
	٥	117	سُمَّاق الدَّبَّاغِيْن	٤	117	سَكَابِيُوْزا سُوْئْحِينْزا
	7	119	سُمَّاق سامٌ	٧	14.	سكابيوزة أوثمرانية
	7	114	شتاق شايك	٣	11.	سَكابِيُوزَة حَقْمِلِيَّة
	4	140	سُمَّاق الصُّبَّاغِين	٧	14.	سكابيُوزَة فِضَّيَّة
	7	114	سُمَّاق مُتَجَلِّر السَّاق	7	117	سكابيُوزَه فِلَسْطِينِيَّة
	٥	114	شنبل مشكين	٤	114	سَكُبُ الغَرْب
Market State	٤	777	شنبئول مشكي	١	70	سَك ُوان
	٥	٤٠	سُمْبُونَغ بَلْسَمِيّ	7	77	شگِع ر
	١	7.67	سَمَرُوْيَةَ مُرَّة	۲	144	سُكِّع أَرْجُوانِيِّ
	1	114	ا سَمْسَق	۲	122	سُكِّع أُورُونِيِّن
H See	7	119	يئيم	٦	14.	سُكِّع جَزِيْرَة القَصَّ
	٥	1 • 9	منتفيقا	٥	1.40	سَلْبُوْت قَزِم
	1	444	سَمْفِيْطُن مَخْزَني	١	717	مَـلِبُوْت كَبِيْر
μ_i $\hat{\phi}_i$	4	۲	سَمَنْ كونترا	0	1.40	سَلِيَّة صَغِيْرَة
1,50	1	17.	شغبُول مِشكَّن شغبُونَة بَلْسَين سَعَرُوْيَة مُرَّة سِنسَمِ سِنسَمِ سَعَنْ عَوْنُوا سَعَنْ كُونُوا سَعَنْ كُونُوا سَعَنْ كُونُوا سَعَنْ كُونُوا سَعَنْ كُونُوا سَعَيْدِنُوم سَعْيْدِمُ	١	717	سعران شكع أزنجواني شكع أورُونيً شكع جزيرة القعن سلبُوت قزم سلبُوت كبير سلبية تبيرة سلبين مَرْيَم سلبين مَرْيَم سلبنن مَرْيَم
	۲	111	ا مُنة ا	1	377	سَلْبِیْن مَرْیَم
		14.	<u>سَمِیْر</u> نوم	٣	177	<i>ش</i> لت •
	1	144	ا شمَیْدِم	۲	371	مَـلـَـفِيْل

			I		
ح	<u>من</u> ۱۱۸	مدخل	٥	<u>من</u>	مدخل
ŧ		سِنْدِيْل (ثمرة ال)	۳	117	منا در
V	177	سَنْط أَيْتِص سَنْط أَزْرَق		118	سننا
٧	177	سَنْط ازرق سَنْط أطحَل	\ \ \	۳.,	سَنَّا بَرِ ِّي مَنَا جَارِي
٥	114	سنط اطحل سنط أفنك	\ \ \	۳.,	سَنَا گاذِب سَنْدَر أَيْيَض
٥	114		,	£ Y	
٦	371	ِ سَنْط دَمَّاع سَنْط رَخُو	۳ ـ	117	سَنْدَرَك نَدَ ا
٥	11A 119	سنط رحو سَنْط السِّنغال	٥	110	سِنْلَرُوس سَنْلَرُوْس
٥	114	سنط السعان	٥	117	
٦	178	ست سابع . سَنْط صَمْنِين	٥	117	سَنْدَروس استوائي سَنْدَروس بَحْريّ اللّون
,	17.	سنط عربي	٥	117	سندروس بخري النون سنندروس تشمانيا
7	178	سط عربي سنط عسلي	٥	117	سندروس سماي سَنْدَروس درومّون
٠,	178	منط العَنْبَر سَنْط العَنْبَر	7	177	ستنووس درومون سَنْدَرُوْس رُباعِيِّ المَصارِيْع
,	119	ا منطقہ العبر سَنْط عَنْبَرِيْ	,	110	سندروس رباعي المصاريع سَنْدَروس رَمُليّ
7	177	سنط عبري سنط كاشو	٥	117	سنندوس رسي سَنْدَروس سَرْدِيْ
۴	110	ئىكە ئاسو سَنْكُوفُولاس	٥	117	مىندروس مىروي سَنْدَروس قَوِي
,	TYA	منتعومو د من مِنْوْت	0	117	ستنزوس مُ تَعَ لاوِل سَنْدَروس مُ تَع لاوِل
ì	****	ميلوت مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	•	117	مستروس منقارب سَنْدَروس مُنقارب
٣	117		0	117	متنقروس مُثَالَل سَنْقَروس مُثَالَل
	118	ا متنی متنی	0	117	سَنْدَروس مُعَيِّنيِّ
١	777	عى سَوْحَر أَيْيُض	•	117	ئىشىروس مكلايان شندوس مكلايان
۲	107	منوخر أخمر	0	117	سنندروس ميهمازي سَنْدَروس مِهْمازِي
١	191	شؤرَنْجَان الخَريْف		117	ستروس عَزِيْل سَنْدَروس هَزِيْل
٦	170	سُوْرَنْجان الخَرِيْف	٦	١٢٣	منادي
٧	177	شُوْرَنْجان الخَرِيْف	٧	171	سِنْدِيان أَيْيَض
٧	140	ئۇرنجان دُوكاين سُؤرَنْجان دُوكاين	7	174	سِنْدِيان أَخْضَر
١	144	شؤس أمْرَط	٦	174	سِنْدِیان إسْبانیّ
٥	14.	شؤس بيتاً بَنَفْسَجِيّ	٧	171	مِنْدِيَان أَمْرِيكِيّ
٧	۱۳۸	سُوس شائِك	١	774	سِنْدِيان البَحْر
٦	177	سُوْس غُدُّي	٧	141	سِنْدِيان البُرْتُغال
١	147	شؤس مَخْزَنِي	1	144	سِنْدِیان بَریطانی
٤	114	شؤس مَخْزَنيّ	V	177	سِنْدِيان بُلاخ
٣	110	-	٥	117	سِنْدِيَان شُوْبَر
١	148	ً مَـوْمَـن مَـوْمَـن أَلِيَـض	٦	177	سِنْدِيان صِباخِي
۲	117	سَوْسَن باهِت	٧	141	سِنْدِيان الْمَفْص
١	190	سَوْسَن جِرْمانِيّ	V	177	سِنْدِيان عُنْقُودِيِّ
١	190	سَوْسَن الْحَداثِق	٥	117	سِنْدِيان الفِلْيُن
١	198	مَوْمَنَ شَاحِب	٧	177	سِنْدِيان كَسْتَنِيّ الوَرَق
٣	117	ا سَوْسَن شَائِب	•	144	سِنْلِيَان مُزَنَّد

ش ب ط	ج	ص	مدخل	<u> </u>	ص	مدخل
<i>ت</i> ن ب ت	<u>e</u> 7	من ۱۸۹	مدخل سِیْنکُوْنَه	١ ١	<u>من</u> ۱۹٥	<u>مدخل</u> مَوْمَن شائِع
	١	۲۳۸	سِیْنکُوْنَه حَمْراء	١,	198	سَوْسَن فلُورَنْسَة
	٧	۲۱۰	بييؤم	۲	١٣٨	سؤسن المناقع
	٧	۲۱.	سِيُوم ضَيِّق الوَرَق	٣	117	سَوْسَن مُثْنِن
	7	141	سِيُوم عَرِيْض الوَرَق	v	144	سَوْقَم الجِبال
	1	٣١٠	شاش القَاضِي	٣	117	سَوْلَع
	١	43	شاطوا	v	40	سَوْلُع (عُصَارة الـ)
	٦	739	شاطِرِيّة	٦	177	سَوْلُع خَيْلِيّ
	٣	۱۷۳	شانية	٤	14.	سَوْلُع سُوكُوتُورا
	Y	199	شافيتة مَخْزَنِيَّة	۲	179	سَوْلُعُ شائِك
	۲	7	شافية المُروج	۲	18.	سَوْلُع شَمعدانيّ
	٥	140	شافية هُرْمِينيّة		189	سَوْلُعُ الكابُ
	٧	40	شَاهْبَانَج شاهْبَلُوط	١	٣١	سَوْلُع مَخْزَنِيّ
	٦	١٨٨	شالهَبَلُوط	۲	18.	سَوْلَع النَّاتال
	٦	١٧٠	شَاهَتُرَج بَصَليَ صُلْب	۲	١٣٨	سَيَّافَ
	١	197	شَاهَتُرَج مَخْزَنَى	٦	178	سَ بال
	١	799	شَاهْدَانَج		٣٨٠	مييراس
	٧	77	شاهِشفَرَم	٤	140	م مييرُوس
	٤	190	شاوا	٧	١٣٩	سِيْروس كَبير الزَّهْر
	١	197	شاي أخْضَر	٤	140	مييريُوس
	1	197	شاي أشوَد	١	7 • 9	سيريُوس كَبِيْر الزَّهْر
	١	TAI	شَاي أورُوبًا	٧	189	مِیٹِسَارُون
	١	71	شَاي البَرَازِيْل	٣	141	مِيْسارُون بَرُّي
	١	71	شَاي الپَارَاغُوَاي	4	18.	سَيْسارون كَبِيْر
	٥	٣٠	شاي جاوا	٣	114	مَيْسَبان
	٥	175	شاي الحَبَثَة	V	18.	سِیْسَبان کَبِیْر الزَّهْر
	1	197	ا شَايَ صِبْنِيّ	٦	1 TA	سَيْسَم أَرُنْسِيُوم
	٥	175	شَاي العَرَب	٤	14.	سَيْسَم ماجُوس
	٦	YOV	شاي كارولينا	٦	144	
	٤	177	شاي المُروج	7	179	سَيْسَم هَجِيْن سِيْسَنْبُرْيُوْن الحِكْمَة
	٤	177	شاي المُروج العريض الوَرَق	1	140	سَيسَتُبَرْيُونَ مَخْزَنِيَ سَيْكَران سِيكُلامَن البُشتانيَ
	٤	177	شاي المروج المَنقعيّ	Y	££	- مَـيْكُران
	1	71	أشاى النشوعتين	٥	177	سِيكُلامَن البُسْتانيّ
	1	Y • 1	ا شِبِتَ	٦	77	سِيكلامَن فَارِسي
	١	7.1	شبِت شِبْث شِبِت شِبِت شِبِتْ بَرُّي	٦	14.	سِيكلامَن فَارِسيِّ سِيكلامَن القُص سِيْكُلامَن لُبُنانِيَّ
	١	7 - 1	شِبتَ	٤	171	مِيْكُلامَن لُبْنانِيّ
	٧	181	شِبَتْ بَرِّي	۳	117	سِیْمابا سَدْرُون
	0	٧1.	شِبْرق شائِك	١	7.61	سِيْمارُوْبة مَخْزَنِيَّة
£44	١	٤v	شِبْرِق شائِك شَبَط الغُول شَبَط الغُول	٣	114	سِيمُولُو

			l			
<u>ح</u>	<u>من</u> ۱۱۱	مدخل شَجَرَة النَّبَق شُخص شرقي شُخص عَرِيْض الوَرَق شُخص مُنَوَسط الورق شَخم الأنعاء شَذُو شَرَاج شَرَاج شَرَاج شَرَاج شَرَاج شَرَاج شُرَانِق شُرُانِق شُرُانِق شُرُانِة شُرُانِة شُرُانِة شُرَانِق شُرُانِة شُرُانِة	ے	<u>ص</u> ۳۲	مدخل شَبَطباط	ش ب ط
٦	111	شَجَرَة النَّبق	٦	77		. 0
٧	731	شُخص شرقي	٦	171	شَبَه شائِك	
٧	731	شُخْص عَرِيْض الوَرَق	٦	141	حب حدیث شُبهان شافِك شُبَیَّط سِلَعِیّ شُبیَّط شافِك شُبیَّط شافِك شِنْراق مَخْزَنیٌ	
٧	731	شُخص مُتَوَسّط الورق	۰	۲۱۰	شُبَيْرِقَة	
٤	701	شخم الأمعاء	۲	187	شُبَيَّط سِلَعِي	
٣	779	شَذُو	٧	181	شبيط شائك	
١	٦٠	شُرَّابَة الرَّاعي	٣	119	شِتْرِاق مَخْزَنيّ	
١	777	شَرَاج	١	44	شُتُلةً الرُّكة	
١	799	شَرَانِق	٦	۲.٧	شَجَر أَدْرِيْس شَجَر البَخْوْر	
٤	178	شِرْخاتُ اللَّيْل	٥	7.7	شَجَر البَّخُوْر	
١	177	شُرُد	١	400	شَجَر البَقّ	
٣	١٥٦	(27) (27)		444	شَجَر الدَّبْق	
٦	187	شِرْش ناعِظ	٣	119	شَجَرَةُ إِبْراهِيْم شَجَرَة الأَبْسَنْت	
٧	180	شَرَعْطَط مَنْقِعيّ	٦	127	شَجَرَة الأَبْسَنْت	
٣	171	شِرْش ناعِظ شَرَعْطَط مَثْقِعيّ شَرُوْنَة دُوْرِيا شَرُوْنَة شَائِعَة	٧	187	شَجَرَة التُّولِيْب	
١	3 • ٢	شَرُوْنَة شَائِعَة	٦	184	شَجَرَة جَوْز القَيْء شَجَرَة حَبِّ الشُّوْم	
٣	171	شَرُوْنَة مُذْهَبَة	١	٣٧٣	شَجَرَة حَبّ الشُّوْم	
ŧ	140	شَرُونَة يَعْقُوب		77	شَجَرَة الحِلْتِيْت	
7	١٣٥	شَشَم شعَال	۲	**	شَجَرَةُ الحُمَّى	
٧	101			3.7	شَجَرَةُ الحُمَّى	
١	441	شَعْر الأرْض	٧	٦٠	شَجَرَةُ الْحَياةُ الغَرْبِيَّة	
١	177, 137	شف الحة	١ ١	777	شَجَرَة الدُّكْن	
١	441	شغر الغُوْل	٧	731	شَجَرَة الزُّنْبَق	
٥	191	شَعْرِيَّة الْثَوْبِيا شَعْرِيَّة بَيْضَاء شَعْرِيَّة سَوْداء شَعْرِيَّة كَنَدا	۲	731	شَجَرَة السَّماء	
٥	191	شغريَّة بَيْضَاء	٤	10.	شَجَرَة السُّمِّن	
٥	١٠٨	شغرية سؤداء	١	197	شَجَرَة الشُّؤس	
٥	191	شُغْرِيَّة كَنَدا	٧	187	شَجَرَه الشُّمْع	
٥	197	شغرية المكييك	٦	P 3 Y	شَجَرَة الشَّيْطَان	
7	777	شُعْصُور	٦	19.	شَجَرة الصَّابُون	
٦	180	شعث مَعْرُوف	٤	37	شجرة صبغ أنّاتُو	
١	171	شَقَائِق حُمْر شَقائِقُ النَّعْمَان شَقائِق النَّعْمَان شَقَائِق النَّعْمان الكَبِدِيّ مُقَائِق النَّعْمان الكَبِدِيّ	٤	37	شجرة صِبْغ الرّوكُو	
1	171	شَعَائِقُ النُّعْمَان	٣	140	شَجَرَة العَرَب	
٦	77	شقايق النُّعْمان	٧	19.	شَجَرَة القَش	
١	7.7	شَفَّائِق النُّعْمان الكَبِدِيّ	٧	731	شَجَرَة القَياثِير	
٤	771	شقًا،	١	7.7	شَجَرَة الكَبِد	
۲	337	شُقًار الغاب شُقًار الغاب	٣	7.67	شَجَرَة الكَرْنِيْب	
١	***	شُقَّار الفِضح شُقَّار الكَبِد شُقَار المروج	٣	٩	شَجَرَة المَرْجان	
1	7.7	مُنقَّار الكَبِد	٤	1.5	شَجَرَة المُسافِر	
٧	187	أ شُقّار المروج	١	۸۳	شَجَرَة المَعْبَد	271

ش ي ح	ج	مِن	مدخل شُوْفان زِراعِيّ شَدْك الدُّرَاءِ	<u>د</u> ۱	مي	مدخل شُقَّارَى الثَّالُوْث شَقَامُل شَقَةُ، هَوايَه شَقْنِق الثُّعْمَان المَبْلُوْل شُكَاعَى شُكُوْنَا شُكُوْنَا شُكُونَا شُلُكُ شَمَار بَحْرِي شَمار بَرْي مُقَلْقَل
حن پ	<u>ح</u> ۱	من ۱۱۵	شُوْفان زِراعِيّ	ī	من ۲۰۶	شُفًّارَى الثَّالُوث
	۲	405	سوت اسراج	· '	717	شُفَاقُل
	١	377	شَوْك الدِّمَن	١ ١	7.7	شَقَر، هَوايَه
	٤	177	شَوْك عَقْرَبانِيْ		3 • 7	شُفُواص
	1	٥	شؤك القصار		Y•V	شَقِيْق النُّعْمَان المَبْذُوْل
	٦	171	شَوْك مُبَارَك		71	شُكاعَى
	١	3 77	شؤك النّصارى	١	A37	شُكُوْنَا
	*	19	شَوْكُ البَهُود	٦	127	شُلْطَة الحَرَمُوْن
	٧	118	شُؤكة حادَّة	١	777	شُكَنْك
	٥	1	شَوْكَة سِيناه		۲۰۸	شَمار بَحْرِيّ
	٥	17.	شزكة فببطية		150	شَمار بَرِّي
	1	317	شَوْكَة مُبَارَكَة	٣	171	شَمارٌ بَرِّيٌّ مُفَلَّفَل
	1	717	شۇگران	٤	177	<i>y y</i> .
	1	414	ا شَوْكَرَان سام	٧	180	شمار الماء
	١	717	شَوْكَرَان شُقْراط	*	187	شَمَّام شُمُر الخَنازِيْر شُمُرَة بَحْرِيَّة شُمْرَة مَخْزَيْة
	٤	174	شۇگران صَغير	٣	27	شُمْر الخَنازِيْر
	١	717	شَوْکَرَان کَبِیْر شَوْکَرَان مُبَعَّع	1	Y • A	شُمْرَة بَحْرِيَّة
	1	717	شَوْكَرَان مُبَقَّع	٤	177	شُمْرَة مَخْزَنِيّة
	١	717	شَوْكَرَان مَخْزَني	١	444	شِمِرْضَاض الكُنْدُوْر
	١	714	شُوْكَرَان المَنَاقِع	1	٥٠	شَمْشاد أُخْضَر
	١	714	شَوْكَرَان مُثْتِن	1	٥٠	شَمْثِيْر شَمْع العَبْر شَمْعَة قَمَرِيَّة كَبِيْرَة الزَّهْر
	١	727	ا شَوْكُل	٤	٤	شَمْع العَنْبَر
	۲	171	شؤلة بينضاء	1	7 • 9	شَمْعَة قَمَرِيَّة كَبِيْرَة الزَّهْر
	1	Y•A	شُوْمار قَرْن الأَيْل	1	۲۱.	شَمَنْدَر أَحْمَر
	4	180	شُوْمَو بَرِّي	1	7.1	شَمَنْدَر بَعْلِيّ
	٣	171	شُوْمَرٌ بَرِّيٌّ مُفَلْفَل	4	۲۵	شَمُّوْل أَسْوَد
	٤	177	شُوْمَر مُحلُو	٥	٣٠	شَنَب الهِرّ
	٣	140	شُونِيْز الحَقْل شُونِيْز دِمَشْقِيّ	٥	Y • •	شِنْجَار البَرْ شِنْجِبَار مَخْزَنِيْ
	٤	141	شُوْنِيْز دِمَشْقِي	1	711	شِنْجِبَار مَخْزَنِي
	4	184	شُوْنِيْزُ زِراعِيٍّ شُوَيْلاء شُوَيْلاء عطريَّة	٣	174	شِنْداب
	1	719	شُوَيْلاء	٤	177	شِنْداب إخْرِيتيّ
	ŧ	109	شُوَيْلاء عطريَّة	٣	177	شِنْداب بَحْرِيّ
	١	714	شُوَيْلَة	١	717	ثينْدَاب الحُقُول
	1	44.	شُوَيْلاء عطريَّة شُويْلَة شَبَّالَة مُنَالَة	1	717	شِنْدَاب رَجَّال
	٣	14	ا شيالة	٥	117	شِنْدَاب سُمْبُل
	٥	٥	ا شبع أتنف	٥	171	شِنْدَّابِ مِنْجَلِيّ
	V	101	شِيْح أراغُون	0	٧٥	شَنْطُف دَوّادِيّ
	4	184	شِئْح أَرْمَنِيَ شِئْح حَقْلِي	١	١٢٣	شَنْطَف رَماديّ
243	٧	101	ا شِيْح حَقْلِي	٦	177	شوارِب عَشر

<u>E</u>	<u>مس</u> ۱۵۳	مدخل صَخِهٔ	٥	<u>من</u> ۱	مدخل ثینے دُومیّ
٧	75	مَدِّارُ اللَّيْلِ الحَفْلِيِّ صَوَّارُ اللَّيْلِ الحَفْلِيِّ	7	٥	نيع ميني
١	777	صُرَّة يَهُوَذا	٤	109	شنع عِطرِي
١	144	صِرْم الدِّيْك	٧	101	شِيْح الْمَغُرِب
٦	١٣٨	صُرَيْمة الجَدِي الجَبَلِيّة	١	4 • £	شنيخ الربيع
٥	۱۳۷	صَرِيْعَة الجَدِي الخُرْجِيَّة	٣	177	شَيْخَة البَخر الرَّمادِيَّة
Y	108	صَرِيْمَة الجَدِي الدَّفْلِيَّة	٥	178	شِيْرُوْنِيا الشِّيلي
1	777	صَرِيْمَة الجَدِي الشَّائِعَة	٥	140	شِيرُونيا مُزَوّاة
٣	174	مَغْقَر	١	4.1	فِيرُونِيَة
Y	107	صَعْتَر أَرْنَبُرْغ	٣	12.	مِنْ يُعْلِرُج مِنْ يُعْلِرُج
4	171	صَغْتَر بَرُّيْ	٣	181	شَيْطَرَج الرُّدُوم
7	۱۳۸	صَعْتَر سُؤْدِيا	١	714	شَیْکَرَان مَانی
4	100	صغتر شانع	۲	3AY	شِيْكُوْرِيَة
٦	4٧	صَعْتَر شَافِع	ŧ	121	شِيْكُورِيَة
0	١٣٧	صَعْتَر لُبْنَادِيَا	٥	777	شِيْكُوْرِيَة مَرْطاء
٤	140	صَعْتَر لُبُنان	1	777	شَيْلُك مَبْذُوْل
٥	70	صَغْتَر هِنْدِي	۲	189	شَيْلَك مَبْذُوْل
٧	777	صَفْراء الثُّور	١	777	شَيْلَك مَعْرُوف
1	177	حَفَرَان	٣	177	شيكم
١	***	مَنْصاف أَيْيَض	٣	170	شِيْنِيْز الحَقل
4	101	صَفْصاف أَرْجُوانِيّ	ŧ	121	طِيئِيْرُ دِمَثْقِيْ
4	104	صُفَيْراءُ اليابان	٣	177	صابُون
٤	1	مَنِيْنَة	1	377	صَابُوٰنِيَّة مَخْزَنِيَّة
٤	141	صُفْراب	٦	121	صامُود شائِك
Y	107	صُفْراب أَيْتِض	Y	147	حتباح الخير
٤	١٣٧	صُفْراب تُرْسِي	٤	140	حَبَّاد ،
٧	107	صُغْراب غُدِّي	ŧ	140	صَبّار قُنْفُذي
0	۱۲۸	صُفْرَابِ كَلِيْل	*	101	صَبّار مَعْروف
*	104	صُفُلاب مَخْزَنِيّ	٤	371	صَبَّار الهِنْد
١	144	ا صَفْلِيْن	٦	٥٠	متبار وليئز
٣	170	متنصال أمغر	٣	77, 711	صَبَّارة
١	144	مِسْلَقِيْن	١	٣١	صَبُّارَة شائِعة
٥	13	صَمْغ جاوَة	٣	117	حَبْبُو
٣	171	مشغغ تجندم	٧	40	مَنبُر
٣	171	مُعْقَرَابِ كَلِيْلُ مُعْقَلَابِ مَخْزَنِيَ مَعْقَلِيْن مِعْقِيْن مَعْنِع جَاوَة مَعْنِع خَرْبِينِيا مَعْنِع الكُنْيَراء مَعْنِع الكُنْيراء مَعْنِع الكُنْيراء مَعْنِع اللَّكَ	7	144	صبار معروف صبار العِنْد صبارة صبارة صبر صبر صبر صبر عبر الخينل صبر گؤراساؤة صبرة مشبرة مشبر العِنْد
•	109	صَمْعُ الكَثَيْراء	١	۳۱	مَنبُر كُوْرَاسَاوَهُ
٣	144	مَسْمَعُ اللَّكَ	٤	140	حَسِيرَة
٣	171	متنغ نقطة	۲	101	مبير مبير
٥	٦٧	أحيناب الماء	٤	148	مشيير الهند

ظفر	2	<u>صن</u> ۱۳۳	مدخل	ح	<u>ص</u>	مدخل
	۲	175	<u> طَوْ</u> خُوْن	٧	٧٨	صِناب اِلماء
	١	711	طَرْطُوْر الباشا	۲	109	صَنْدَل أَبْيَض
	٦	1	طَرُفاء	٤	144	صَنْدَل أَسْتراليَ
	١	٤٧	طُرْنَة	۲	17.	صَنَوْبَر بَحْرِيّ
	1	181	طُرُنْشُول سَنَوِيّ	٤	144	صَنَوْبَر بَرِّيِّ
	7	١٨٨	مُرُنْشُول الصّبّاغين	7	17.	صَنَوْبَر الكُثبان
	٦	17	طُغْلُق	٣	144	صَنَوْبَر مُثْمِر
	٦	17	طُغْلُق مُنْتَصِب	۲	171	صُوْجَه
	١	444	طَفْرَة	١	۲۱.	صَوْطَلَة
	۲	۱٦۴	طَقْسُوْس عَادي	۲	171	صُوفان
	7	371	طَلْح	٥	189	صُولائُم
	٦	77	طماطم	۲	171	صُوْيَه
	٦	149	طيره طُقْسُوْس عَاديّ طَمَاطِم طِمْخَة ذَهَبِيَّة الوَرَق طَهَف طُوْس طُوْس طُوْس طُوْس عُلُوس مِزْهَار	٤	119	صيئومانيُوم حاڌ
	۲	178 .4.	ا طُهَف	٧	100	ضال
	٥	71	طُوْبَه	١	4.4	ضَرْضَر
	٥	7.7	طُوْس	۲	٨	<i>ضُ</i> رُّغُوْس
	٥	Y•V	طُوْس مِزْهَار	1	444	ضَرِيْع
	٤	١٧٠	ٔ طُوْط طُوْقَرِيُون	1	44.	ضُغْبُوس
	٧	107	طُوْقَرِيُون	٣	178	خِفْدَع
	٧	104 .74	طُوْقَرَيُون أَصْفَر	٣	148	ضَرِيْع ضُغَبُوس ضِفْدَع ضِفْدَع أَخْضَر
	٧	VO1, PO1	طُوْقَريُون إكْريتي	7	727	ضيمران
	٧	104	طُوْقَريُون بَحْرِيّ	١	977	طارِدَة الشُعَال
	٦	731	طُوْقَرْيُون ثُوميّ	٦	177	طارْطَقَة
	٧	101	طُوقَريُون جَبَلِيّ	٧	70	طباق البَرَاغِيْث
	٧	101	طوقريون جَعْدِي	٥	104	طَبَرْخَی طُخلُب بَحْرِيّ
	٧	101	طُوْقَريُون كَمافِيطُوس	٦	181	
	٧	101	طُوْقِرِيُون كَوْرَبِيّ	٣	140	طُخلَب سِیْلان
	٧	٦٧	طُوْقَرْيُون لَبِد	7	181	طُخلُب گؤرسِيكا
	7	731	طُوْقُرْيُون الماء	١	717	طِلحمًاء
	٦	331	طُوْقَرْيُون الَماء طُوْقَرِيُون مَخْزَنِيّ طُوْقَرْيُون مَنْقِعِيّ	٥	181	طَحْمَاء طَحِيْن طَحِيْن البُرّ
	٤	17	طُوْقُرْيُون مَنْقِعِيّ	٥	131	طُحِيْن البُرّ
	٧	V	طِیْب العَرَب			طَحِيْن الحِنْطَة (دستور
	١	٦٠	ا مليِّم	٥	131	أدرية ١٩٣٧)
	٣	۱۳۵	طينن ألحمر	٥	131	طَحِیْن القَمْح طُرْبوش الغُراب
	٣	170	طِيْنِ أَرْمينيا	۲	377	طُرْبوش الغَراب
	٧	701	طَيُومَريُونِ	١	707	طَرْثُوْث حُلُو
	٧	۲٥	طُيُّون الذَّبَاب	۲	P 3 Y	طَرَخُشَقُون
	٦	371	ا ظبَّة	٦	787	طَرَخْشَقُون أَشْنَانَ الْأَسَد
133	٦	737	طين الحرب طين المحمر طين ارمينيا طين آرمينيا طيورة الذّباب طبّة طبّة	٦	Y & V	طَرَخْشَقُون مَخْزَنيّ

ح	<u>ص</u>	مدخل	ے ا	ص	مدخل	ظ ف ي
٥	178	<u>مدخل</u> عَرْطَب	2	من ۲٤۲	<u>مدخل</u> ظَفِيْرَة	د ت ي
7	77	عَرْطَنِيْتَا	٦	187	طَهِيْرَة بِلُوْدِيَّة	
۲	184	عَرْعَر شائِع	١ ،	777	عَارِشَة الكُّنْدُوْر	
٤	787	عَرْعَر شائِع	٦	140	عارِشَة الوَردِيَّة	
٥	1 8 0	عَرْعَو فوجينيا	٣	144	عاقِر قَرْحا	
4	AFI	عَرْعَو كادِي	١	10	عَاكُوْبِ الحِنْطَة	
1	450	عِرْق أَكُوْر	١	١٣	عَاكُوْبِ الخَرْطَال	
٥	180	عِرْق إِنْجِبار	١ ١	١٣	عَاكُوْبِ الدَّيْس	
٧	11	عِرْق إنجبار	١ ،	1 8	عاكُوْب الشَّيْلَم	
1	3 7 7	عِرْق الحَلاوَة		181	عانِق جَبَلِيّ	
٣	189	عِرْق الدِّم	٦	184	عانِق الحُقُول	
1	779	عِرْق الذِّهَبِ الرَّمَادِيِّ المُحْمَرِّ	١,	181	عَبَّاد الشَّمْس	
٧	١٦٥	عِرْق الذَّهَبِ المُتَمَوِّج	۲	177	عَبَّادُ الشُّمْسِ السُّنَوِيّ	
١	779	عِرْق الذَّهَبِ المُحَلَّقِ الصَّغِيْر	۲	177	عبَّادُ الشُّمْسِ العُسفُوْلِيّ	
٣	18.	عِرقُ الذِّهبِ المُحَلِّقِ الكبير	٦	184	عَبْد اللَّاوِي	
١	779	عِرْق الذُّهَبِ المَخْزَنيِّ الصَّغِيْر	٦	97	العَبْس	
٣	18+	عِرْقُ الذِّهب المخزنيّ الكبير		١	عَبْل	
٧	170	عِرْق الذَّهَبِ المُخَطُّط الصَّغير	١ ،	719	عَبَيْثُوَان	
V	170	عِرْق الذَّهَبِ المُخَطُّط الكبير		109	عَبَيْثُران عِطْرِيّ	
		عِرْق الذَّهَب النَّشَوِي	۲	377	عُبَيْراء سُنْبَلِيَّة	
٧	170	اللَّون الأبيض		114	عُتْم، عُتُم	
٣	78	عُرْفُد شائع		184	عَجُّور	
١	4.4	عَرْقَد يَاسَمِيْنِيّ		13	عَجّور إفريقيّ	
١	40	عَرَقْسُوْس	٦	Y 0	عَجُّور أَفْرِيقيّ	
1	197	و ران عِرْقْشُوس مَخْزَنِيّ		177	عَدَس عُدَيْن ثُلاثيّ التَّذَلُّق	
٤	119	عِرْقُسُوْس مَخْزَنِيّ		10.	عُدَيْن ثُلاثيّ التَّذَلُّق	
١	771	عُرْقُوْن مَخْزَنيّ	٦	101	عُدَيْن جاڤا	
*	777	عَروس النِّيل	٤	787	عَراثِس النَّيْل	
1	777	عُرُوق الصَّبَّاغِيْن	٣	144	عَرار قَيْصَرِيّ	
١	777	عُرُوق صُفْر	٤	127	عَراوَة عُسْقُولِيّة	
٦	۸۲	عَرِيْنَة	1	415	عَراوَة مَلِكَة المُرُوج	
٣	۱۷۳	عَزَقان	٧	771	عَراوَة مَلَكَة المُرُوج	
٦	۸۱	غشلج الأشد		150	عَوَبُوَب	
٤	19.	عَسَم أَبْيَض	٧	101	عَرْصَف جَعْدِي	
١	740	عَسَمُ رَمْبُوْلتُ	7	101	غرصف جنيف	
٧	177	عَسَم سَنْدَايِيق	1	777	عَرْضَف شَاثِع عَرْضَف شَنْدَقُوْرَة	
٤	19.	عَسَمْ صَغير الزَّمْرِ عُشْبَة الأبارِيْق الأرجُوانِيَّة	١	777	عَرْضَف شَنْدَقُوْرَة	
٣	٤٥	عُشْبَة الأبارِيْق الأرجُوانِيَّة	٧	101	عَرُّصَف صَنَوْبَرِيِّ	
۲	٤٥	ا عُشْبَة الأَبُواق الأَرْجُوانِيَّة	1	YYA	عَرْضَف مَدَّاد	733

				i		
ع ف ص	<u>خ</u> ۷	<u>ص</u> ٦٧	مدخل	<u>ح</u>	<u>ص</u> ۲۳۱	مدخل عُشْبَةَ الأخسَر
0	٧	٦٧	عُشْبَةً مار الياس	١	171	
	١	477	عُشْبَة مار يُؤخَنّا	١ ١	177	غُشْبَة الأَعْمَى
	١	777	عُشْبَة المُتَسَوِّلِيْن	١ ١	707	عُشْبَةَ أُوبَاتُوْر
	٤	777	عشبة الميشك	١	Y•A	تحشبة البخر
	١	***	عُشْبَةَ مَغْرِبِيَّة		337	عُشْبَة البَرَاغِيْث
	٧	7.7	عُشْبَة مُقَدَّسة		79	عُشْبَةِ البَراغِيْث
	١	177, 097	عُشْبَةَ النَّجَار	٦	71	عُطَّبَّةُ البَرَاغِيْثِ الرَّمْلِيَّة
	١	4.15	عُشْبَة النَّحُل	۲	١٨	عشبة البَقّ
	٧	178	عُشْبَةَ الهنِد	١	777	عُشْبَة البَوَاسِيْر
	١	17	عُشْبَةَ الوُقُوع	١	174	عُشْبَة البَوَاسِيْرِ العَقْداء
	١	٥٠	عَشَق	٥	٥	عُشْبَة بَيْضاء
	١	777	عَشْقَة حَلَزُوْنِيَّة	۲	٨٩	عُشْبَة التَّالُول
	1	747	عَشْقَة مَبِذُوْلَة	١	777	عُشْبَة الثَّوْلُول
	١	137	عَصَا الرَّاعي الزَّبَّاء	٥	371	عُشْبَة الجُناب
	۲	AFI	عَصا يَعْقوب	٦	171	عُشْبَة الحَصاة
	٣	18.	<i>عُص</i> اب	١	۲	نحشبة خفراء
	٣	181	عُصاب إسْبانيّ	١	107, 1.7	عُشْبَةَ الحُمَّى
	٣	181	عُصاب الرُّدُوم	١	737	عُشْبَة الحَمِيْر
	٣	181	عُصاب صغير	١	۲۲۷	عُشْبَةَ الخِيْمِيائِيِّين
	٣	18.	عُصاب عَرِيض الوَرَق	١	377	عُشْبَهَ الدَّعِاك
	٧	177	عُصَارَة الخَس	٣	119	العُشْبَة الذَّهَبِيَة
	٦	140	عُصْبَةَ السُّوس	١	789	عُشْبَةَ الرَّبُو
	١	371	عُصْبَةُ القَلْب	٦	٨٩	عُشْبَة الرَّحِم
	۲	179	عَصَلَة حَديديّة	۲	79	عُشبة الرَّوَايا
	٤	180	عَصَلَة سيبيريا	1	١٣٣	عُشْبة السَّحَرَة
	٤	187	عَصَلَة الشَّرق القصيرة الثَّمر	١	190	العُشْبَة السَّمْرَاء
	٤	187	عَصَلَة الشَّرق اللَّبنانيَّة	٧	۸۰	عُنْبَةُ الشَّاي
	٤	180	عَصَلَة مَخْزَنيّة	١	١٣٣	عُشْبَة الشَّيْطان
	٣	181	عَصَلة مُشْوِكَة	١	377	عُشْبَة الصَّابُون
	7	13	عَصَوِيَّة المَناقِع	١	178	عُشْبَة الصّاعِقَة
	١	٨٨	عُطْيَة	٧	VF. V01	عُشْبَة الطّحال
	١	448	عَصِيْر الدُّبّ	ŧ	11	عُشْبَة طَوْقِ الكَلْب
	٥	٤٤	عُصَيْفِيرة	١	737	عُشْبَة العَلَق
	٧	777	عُصَيْفِيرَة بَرْيَة	١	771	عُشْبَةَ الْعَيْن
	١	111	عِضْرِس	1	707	عُشْبَة الفُقَراء
	٤	١٧٠	عُطْب	٦	179	عُثْبَة القِدِّيْمَة صُوْفيا
	٧	141	عَفْص	£	181	عُشْبَة القُمَّل
	٧	79	عَفْصَة ا	٥	180	عُشْبَة القُوَى المُتَتَصِبَة
254	٣	VV	عَصَلَة مُشْوِكَة عَصَوِيَّة المَناقِع عُصَيْبَة عُصَيْبَة عَصِيْر الدُّب عُصَيْبِرة عُصَيْبِرة عُصَيْبِرة عُصَيْبِرة عَصْبِرس عُصْبِ عُطْب عُطْب عَمْضة عَمْضة البُطْم	1	۲۳۷	عُشْبَة القُوَى الوَزِّيَّة

ع فس مسطل س المحلل المحلل<				ı			
عَلَيْهُ الْطُرَاوَةُ ٧٧ عَلَيْتِ كَانِيْتِ كَانِيْتِ الْكَالِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّ لِلْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّ الْكِلِيِ الْكِلِيِّ الْكِلِيِ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّ الْكِلِيِّ الْكِلِيِيِ الْكِلِيِّ الْكِلِيِيِ الْكِلِيِيِ الْكِلِيِيِ الْكِلِيِيِ الْكِلِيِيِ الْكِلِيِ	ح	<u>ص</u>	مدخل	5	ص	مدخل	ء ف ص
المناف علمي المناف	٤	307	عِناقِيَّةً كَبِيْرة	٧	79	عَفْصَةِ السِّنْدِيَان	0 - 2
المنافقة ا المنافة المنافة ا المنافة ا المنافة ا المنافة ا المنافة	٦	708			YY		
الله المنافرة المناف	٣	187	عِنَب	۲	٧٦		
عَيْد عِنْدِي ثَنْ اللّٰ ٧ ٢١ ٢٤ ١ ٢٤ ١ ٢٤ ١ ٢٤ ١ ٢٤ ١ ١١ <th>۲</th> <th>١٧٠</th> <th>عِنَب البِّحْر</th> <th>١</th> <th>11</th> <th></th> <th></th>	۲	١٧٠	عِنَب البِّحْر	١	11		
مُؤْيَة مُؤْيَة عُرْيَة عُرِيًّا الرَّوْنِ ١ ١١ ١٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١	١	101	عِنَبِ الثَّعْلَبِ	١	١٧٩		
مَنْهِ الدَّمْ الله الله الله الله الله الله الله الل	۲	144	عِنَبِ الثُّعْلَبِ	٧	711	عَقِيد هِنْدِي	
عَلْبُلْدَة الدُّواسِّ ٧٤ ا چنب الفرال ١٤	١	ABY	عِنَب الدِّبْ	١	137		
عَلَيْهُ الرُّمَالُ اللَّهِ الْمِثَالُ اللَّهِ الْمُثَالُ اللَّهِ الْمُثَالُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ	١	101 . 44			171		
المنظائة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	۲	107			£ V		
مَا مُنْدُونَ مُنْدُرَيْ ١٩٢ ٧ عَنْبا مِنْدَيْ اللهِ مُنْدُونَ مُنْدُونَ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَلِيْلِ الْحَلِمُ الْحَلِيْلِ الْحَلِمُ الْحَلِيْلِ الْحَلِمُ الْحَلِيْلِ الْحَلِمُ الْحَلَمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ	٤	107	عِنَب القِطا	٣	۲۲		
عَنْهِ مُنْوَانَ 107 ا عَنْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ	١	13			137		
عَنْتُت ١٥٥ ١ غَنْوب رُبِاعِيَ البَّنَالِات ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٢ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥٥ ١١٥١ ١١٥٥<	٦	40	عِنَب هِنْدي	٧	198		
عَنْتُت ١٥٥ ١ غَنْوب رُبِاعِيَ البَّنَالِات ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٢ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥٥ ١١٥١ ١١٥٥<	٤	40	عَنْبا	١	3 7 7	_	
عَنْتُت ١٥٥ ١ غَنْوب رُبِاعِيَ البَّنَالِات ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٢ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥١ ١١٥٥ ١١٥١ ١١٥٥<	٣	189	غنبر	٤	127		
عَلَد سويسرا ١٩٤ ٣ غَيْرِهِ النَّسَائِي ١٠٥ ١٦٩ عَنْبُودِ النَّسَائِي ١١٥ ١٢١ ٢ غَنْبُودِ النَّسَائِي ١١٧ ١٢ غَنْبُودِ النَّسَائِي ١٧٠ ٢ غَنْبُودِ النَّسَائِي ١١٤ ٢ غَنْبُودِ النَّسِيةِ ١٤٤ ١ غَنْمُل بَحْرِيَ ١٢٢ ١ غَنْمُل بَحْرِيَ ١٢٢ ١ غَنْمُل بَحْرِي ١٢٢ ١ غَنْمُل بَحْرِي ١٢٢ ١ غَنْمُل بَحْرِي ١٢٦ ١ غَنْمُل بَحْرِي ١٢٦ ١ غُنُود الأَنْبِاء ١٤٩ ٤ عَنْبُو المُنْفِي ١٢٠ ١ غُرُود الأَنْبِاء ١٢٠ ١ غُرُود الرَّبِياء ١٤٩ ١ ١٢ ١ غُرُود الرَّبِياء ١٤٩ ١ ١١٥ ١ عَنْرُ مَنْرُو بِ ١٢٠ ١ غُرُود الرَّبِيع المُنْفِق ١٤٤ ١ عَنْدُ الرَّبِيع المُنْفِق ١٤٤ ١ عَنْدُ الرَّبِيع المُنْفِق ١٢٤ ١ عَنْدُ الرَّبِيع المُنْفِق ١٢٤ ١ عَنْرُ وَلَوْ الرَّبِع المُنْفِق ١٢٤ ١ عَنْ عَنْ اللَّبُونِيَ ١٢٤ ١ عَنْ عَنْ اللَّبُونِيَ ١٢٤ ١ عَنْ عَنْ اللَّبُونِيَ ١٢٤ ١ عَنْ الرَّبُونِيَ ١٢٤ ١ عَنْ اللَّبُونِيَ ١٢٤ ١٤٤ عَنْ اللَّبُونِيَ ١٤٤ عَنْ ١٤٤٤ عَنْ ١٤٤ عَنْ ١٤٤ عَنْ ١٤٤	٤	٤	عَنْبُر أَبْيُض	١	191		
عَلَد مُؤَدِيجُ الشَّنَابِلُ () ﴿ ﴿ عَنْجُدَ الْكَبِيرِ النَّوْقِ النَّهُ الْمُورِي النَّهِ النَّهُ الْمُورِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُورِي النَّهُ الْمُورِي النَّهُ الْمُورِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُورِي النَّهُ النَّا الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي الْمُنِالِقُ الْمُنِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَا	٧	179			170		
عَلَد مُؤَدِيجُ الشَّنَابِلُ () ﴿ ﴿ عَنْجُدَ الْكَبِيرِ النَّوْقِ النَّهُ الْمُورِي النَّهِ النَّهُ الْمُورِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُورِي النَّهُ الْمُورِي النَّهُ الْمُورِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُورِي النَّهُ النَّا الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي الْمُنِالِقُ الْمُنِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَا	٦	100			184	عَلَّد سويسرا	
عَلَد مُؤَدِيجُ الشَّنَابِلُ () ﴿ ﴿ عَنْجُدَ الْكَبِيرِ النَّوْقِ النَّهُ الْمُورِي النَّهِ النَّهُ الْمُورِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُورِي النَّهُ الْمُورِي النَّهُ الْمُورِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُورِي النَّهُ النَّا الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي الْمُنِالِقُ الْمُنِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَا	٧	179	مُحنَّبُوبِ المَناقِع	١	737	عَلْد مُتَدَلِّي السُّوق	
عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَرِيِّ الْكَرِيِّ الْكَرِيِّ الْكَرِيِّ الْكَرِيِّ الْكَرِيِّ الْكَرِيِّ الْكَرِيِّ الْكَرِيِّ الْكَرِيِّ الْكَرِيْ الْكَرْيِيْ الْكِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْل	۲	171	عَنْجَد	۲	١٧٠	عَلد مُزْدَوِجُ السَّنابِل	
عَلَقَةَ طِبِيَّةَ عَلَيْنِ الْفَرِيْ الْفَرْدِيِّ الْفَرْدِيِيْ الْفَرْدِيِيْ الْفَرْدِيِيِّ الْفَرْدِيِيِّ الْفَرْدِيِيِّ الْفِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْل	1	77			787		
القرن القرائي ١١٠ عُوْد الخَيْر ١٠٠ ١٠٠ الله القيار ١٠٠ ١٠٠ الله القيار ١٠٠ ١٠	٧	17			184	عَلَق	
القرن القرائي ١١٠ عُوْد الخَيْر ١٠٠ ١٠٠ الله القيار ١٠٠ ١٠٠ الله القيار ١٠٠ ١٠	٤	791	-		184	عَلَقَة طِيَّة	
القرن القرائي ١١٠ عُوْد الخَيْر ١٠٠ ١٠٠ الله القيار ١٠٠ ١٠٠ الله القيار ١٠٠ ١٠	٣	189		٦	117	عَلُوب	
من كبوش العُلَيْق)	١	7.			171	عُلَيْق (الثَّمرة)	
عُلْیْق لَذِیْذ الفّمار ۱ کود القرح ۳ ۱ کود القرح ۱ کود القرح <th>٥</th> <th>1.4</th> <th>عُوْد الخَيْر</th> <th></th> <th></th> <th>عُلَيْق (مشروب روحيّ</th> <th></th>	٥	1.4	عُوْد الخَيْر			عُلَيْق (مشروب روحيّ	
عُلْیْق لَذِیْذ الفّمار ۱ کود القرح ۳ ۱ کود القرح ۱ کود القرح <th>1</th> <th>£ £</th> <th>عُوْد الرِّيْح</th> <th>۴</th> <th>188</th> <th></th> <th></th>	1	£ £	عُوْد الرِّيْح	۴	188		
ا کام ا کود الرتج ا	٥	72	عُوْد الرِّيْح اللَّبْنانيّ	١	727		
عنابه ۱۰۶ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲۱۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲ ۲ ۲ عِنَاقِيَّة أَمْرِيْكِيَّة ٢ ٢ ٥ عَوْسَج جَوْيِّي ٢ ٢٤ ٢ عَوْسَج دَغْلِيِّ ٢ ٢٤٧ ١ عَوْسَج دَغْلِي	٣		مُحُوْد القَرْح	٣	331		
عنابه ۱۰۶ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲۱۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲ ۲ ۲ عِنَاقِيَّة أَمْرِيْكِيَّة ٢ ٢ ٥ عَوْسَج جَوْيِّي ٢ ٢٤ ٢ عَوْسَج دَغْلِيِّ ٢ ٢٤٧ ١ عَوْسَج دَغْلِي	١		عُوْد الوَجْ	٥		عَمَامَة	
عنابه ۱۰۶ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲۱۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲ ۲ ۲ عِنَاقِيَّة أَمْرِيْكِيَّة ٢ ٢ ٥ عَوْسَج جَوْيِّي ٢ ٢٤ ٢ عَوْسَج دَغْلِيِّ ٢ ٢٤٧ ١ عَوْسَج دَغْلِي			عَوَذُوَد	١		عَمَى الدِّجَاجِ	
عنابه ۱۰۶ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲۱۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲ ۲ ۲ عِنَاقِيَّة أَمْرِيْكِيَّة ٢ ٢ ٥ عَوْسَج جَوْيِّي ٢ ٢٤ ٢ عَوْسَج دَغْلِيِّ ٢ ٢٤٧ ١ عَوْسَج دَغْلِي			عَوْسَج	٧			
عنابه ۱۰۶ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲۱۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲ ۲ ۲ عِنَاقِيَّة أَمْرِيْكِيَّة ٢ ٢ ٥ عَوْسَج جَوْيِّي ٢ ٢٤ ٢ عَوْسَج دَغْلِيِّ ٢ ٢٤٧ ١ عَوْسَج دَغْلِي	۲		غۇشج	١	337		
عنابه ۱۰۶ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲۱۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲ ۲ ۲ عِنَاقِيَّة أَمْرِيْكِيَّة ٢ ٢ ٥ عَوْسَج جَوْيِّي ٢ ٢٤ ٢ عَوْسَج دَغْلِيِّ ٢ ٢٤٧ ١ عَوْسَج دَغْلِي	١		عَوْسَج أَسْوَد	٦	301		
عنابه ۱۰۶ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲۱۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲ ۲ ۲ عِنَاقِيَّة أَمْرِيْكِيَّة ٢ ٢ ٥ عَوْسَج جَوْيِّي ٢ ٢٤ ٢ عَوْسَج دَغْلِيِّ ٢ ٢٤٧ ١ عَوْسَج دَغْلِي			عَوْسَج أَسْوَد	٧			
عنابه ۱۰۶ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲۱۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲۵ ۲ ۲ عَوْسَج جَوْيَ ۲ ۲ ۲ ۲ عِنَاقِيَّة أَمْرِيْكِيَّة ٢ ٢ ٥ عَوْسَج جَوْيِّي ٢ ٢٤ ٢ عَوْسَج دَغْلِيِّ ٢ ٢٤٧ ١ عَوْسَج دَغْلِي			عَوْسَج إِيْدَه	١			
عِناقِيَةً صَغِيْرَةً ٢٩٦ ا عَوْسَج دَغَلِيّ ٢٤٧ ١			عَوْسَج جُوِّي	٦			
عِناقِيَةً صَغِيْرَةً ٢٩٦ ا عَوْسَج دَغَلِيّ ٢٤٧ ١			عَوْسَج جَوِّي	٥			
ع عِناقِيَّة عُشْبِيَّة ٢٧١ ٧ ا عَوْسَج شائِع ٢٤٧ ١			غَوْسَج دَغلِيّ	١			
	١	787	ا عَوْسَج شائِع	٧	771	عِناقِيَةً عُشْبِيَّةً	888

غ م ب	<u>ح</u> ۲	<u>صن</u> ۱۷٤	مدخل غالِيُوْن أَصْفَر	<u>E</u>	<u>صن</u> ۱٤٤	<u>مدخل</u> عَوْسَج لَذِيْذ الثَّمار
	٤	10.		1		عَوْسَج لَلْإِيدُ التَّمَارُ
	1	700	غالِيُون صُلَيْيِي غَالِيُوْن لاصِق	٧ ٤	\\\ \\\\	عَوْف عَطِر عُوْيْنَة
	,	700	عاييون و طيق غَالِيُوْن هُلْبِيّ لُصَيْقَى	*	197	عويته ءَهَ
	٤	10.	كانيون مىنبي تصيمى غُبَيْراء الحابِلِيْن	,	YEA	عَیْدَم عَیْسَران عِنَب الدُّبّ
	v	177	خبيراء مَبْذُولَة غُبيراء مَبْذُولَة	I	9	
	,	781	خيراء مبدون غَدَّار	v	1	عَيْن البِزِّ عَيْنُ التُّدْرُج
	1	7.4	غِدَاء الله	,	9	عين القُور عَيْن القُور
	١	707	غَرَاتِيُوْلَة مَخْزَنِيَّة	٥	17	عين الشَّوْر عَيْنُ الشَّوْر
	١	701	رور غِرْدِيْب أَخْوَيْنِيّ	ĺ	737	عين الجَمَل عَيْن الجَمَل
	١	TOA	َ بَرْدِيْبِ دَلْمَاسِيَا غِرْدِيْبِ دَلْمَاسِيَا	٧	٦	ين برن عَيْنُ الحَجَل
	1	137	غَرُّز	٦	١٣٥	ين عَيْنِ الدِّيك
	١	۱۳۸	غُرْغَاج	١	181	عين الشَّمْس عَيْن الشَّمْس
	١	۱۳۸	ِ غَر ْغَار	۲	177	عَيْن الشَّمس
	٦	104	غَوْغَرَة	٤	1 • £	عَيْنِ الْقِطِّ
	٤	101	غَرِنْدالِيا فويَّة	٥	١٦	عَيْنِ القِطَ
	٤	101	غَرَنْديليَة ضَليعة		١.	عَيْنَ الهُدْهُد
	٥	101	غُرْنُوق	٥	١٥٠	عَيْنُون تُرْبِد
	*	171	غُرْنوق دَمَوِيْ	٥	10.	عَيْنُون عَطِر
	۲	١	غُرْنُوْق عَطِر	۲	171	عَيْنُون مَبْذُول
	٥	107	غُرْنُوق المُروج	۲	177	عَيْهُوْن مِعْطار
	٥	107	غُرْنُوق مُسْتَدير الوَرَق	٣	101	عَيْهُوْن مِعْطار
	٥	107	غُرْنُوق مُلَطَّخ	١	791	غَاب غَار أَپُولُون
	ŧ	107	غُرَيْب بَنْدُوقا	1	101	
	٥	10.	إغشكة	٣	3.7	غار پیشُورِیْم
	١	7.7	غُضْرُوْف مُتَقَلِّص	۲	٧١٠	غار سام
	٥	1 8	غَطْرَب	١	417	غار لَوْٰذِي
	1	117	غَفَث إبن سِيْنَاه	١	411	غار مِلَكِيّ
	٦	171	عَفَثُ أَرْجُوانِيَ	1	701	غَار نَبِيْل
	٧ -	170	غَفَت مَثْقُوب الوَرَق غَفَت المُروج غَفَت نَدْخِيَ الوَرَق	ξ	197	غارِيا ترِي کِيْل يُو ماريا تري کِيْل يُو
	٦	171	غفث المروج	۲.	107	غارِيْقُونَ أَبْيَض
	٧	177	َ غَفَثُ نَدَغِيِّ الوَّرِقِ غُلْطارِيَة كَنَدِيَّة	,	707	غاريقُوْن الحَقْل
	ξ	107			707	غارِيقُوْن مَأْكُوْل
	۴		غُلُطًارِيَة كَنَدِيَة (زيت ال-الطيّار) غَلْقَة	,	107	غارِيْقُون مَخْزَنِيِّ نَد وَهُون مَخْزَنِيِّ
	٨,	100	علمه غَلْقَة الذَّبُ	,	707	غَارِيْقُوْن مَرِيء
	' 7	7 T 3 3 Y	علمه الدنب غَلَنْتَامِيْن برومْهِيْدُرات		111	الغاشول غَاغَة مَغْرِبيَّة
	٤	777	علىتامين برومهپيدرات غليئرة بسيطة	V	\7·	عاعه معربیه غافث عَطِر
	*	108	عليسره بسيعه اغَمْيْر مُكَعَب	١	707	عافت عطر غَافَث غُوْلانِيّ
550	•	100	ا عمبير مععب	•	101	عاقب غولا يي

		ı	1			
<u>5</u>	ص	مدخل	<u>ح</u>	من	مدخل	غ و ا
ī	140	مدخل فِجُل الجِمال	7	171	<u>مدخل</u> غوارانا	, 3 C
4	174	فُجْل حارّ	٤	777	غوارَنْهَم البرازيل	
٦	۲0٠	فُجُل الخَيْل	٧	171	غواگو	
٣	107	فُجْل زِراعِيّ	٣	١.	غَوَايْكُورُو	
١	Y7•	فَحْم الجَلْهَم	٥	104	غُوْتابَوْشا	
1	77.	فَحْم الْحَوْر		۲	غَوْلان طُبّاقِيّ	
١	18	فَحْم الشَّيْلَم	۴	189	غَيّاك مَخْزَنيّ	
1	41.	فَحْم نَبَاتِي	١	PAT	غَيْطَل	
١	177	فَراسِيُوْن أَبْيَض	٣	100	فابيانا مُتَراكِبَة الوَرَق	
1	777	فَرَاسِيُوْن أَسْوَد	٣	107	فارُولا حَرَمُون	
۲	141	فَراسِيون صوفيّ		100	فارُولا العَجَم	
٤	104	فَراسِيُون عِطْرِيّ	٦	١٦٥	فَارُولا مَبْذُولة	
٣	3 • 7	فَراسِيُون فِرْجِينيا	٤	100	فاشِرا بَيْضاء	
٤	104	فَراسِيُون القَلْب	۲	١٧٦	فاشِرا سَوْداء	
٤	104	فَراسِيُون مانتي	۲	١٧٦	فاشرشين مَبْذُول	
1	777	فَرَاسِيُوْن نَتِن	٦	170	فَاصُولِيا الكاپ	
١	077	فَرامْبُوَاز	٦	١٦٥	فَاصُولِيا لِيما	
۲	141	فرامبُواز		177	فاصُولياء إشبانيّة	
١	***	فَرَاوِلَة		144	فاصُولِياء مَعْروفَة	
٣	109	فَرْبِيازُوْلَة		701	فاصُوْلِياء مَعْرُوفَة	
٣	109	فَرْبِيُون	٦	١٦٥	فاصُولية التشاد	
١	1.3	فَرْبِيُون بِيلُوليّ فربيون عِرْق الذَّهَب	۲	١٧٨	فاصُوْلِيَة مَعْرُوْفَة	
۲	109	فربيون عِرْق الذَّهَب	٤	107	فاصُوْلِيَةً مَعْرُوْفَةً	
٣	109	فَرْبِيُون الغاب	٤	101	فاغارة ثمانية الأشدية	
1	٤٠٠	فَرْبِيُون الفَجْر		Y Y	فاغيّة بيّضاء	
٣	109	فَرْبَيُونَ الفَجْر	1	797	فَافْذَنْج جَبَليْ	
٣	109	فربيون كسِيرُس	٧	17.	فاقُوع فِضِّيّ	
٦	177	فَرْبِيُوْن لَسِيرُس	٦	114	فَاقُوع فِلْسُطينيّ	
٦	177	فَرْبِيُوْن مُتَصالِب	٣	101	فاهام عَذْب	
٣	109	فَرْبَيُونات	٣	101	فاهُوْن عَذْب	
١	140	ا فرسك	٣	700	فاوانبيا كسروان	
١	7.6	ُوْرُضَاد فِرُصاد أَخْتَر	۲	440	فاوانيّا مَخْزَنِّة	
٧	٥٩	فِرْصاد أَخْمَر	۲	73		
١	077	ئِرْفارَة فَرْفَارَة فَرْفَحِيْن	٤	**	فِئْنَة بَيْضاء	
۲	**	فَر ْفَحِیْن	٤	**	فِئْنَة خَمْراء	
٧	7.7	َ فَرُق فَرْلُوتُورُن	۴	٤٠	فِتْنَة صَفْراء	
٤	109	فُرُّلُوتُورُن	۲	73	فِئْنَةَ مُسْتَدِقًة	
7	79	ئرنجۇرى فَرَنْجَمُشْك أُ فَرَنْجَمَشْك	٦	۲	فَيَّة بَرْنُونِيَّة أُنْ	
7	19	ا فرَنْجَمَشْك	۲	174	فُجْل أَسْوَد	११७

				I		
ف و ل	<u>ح</u>	مس	مدخل	3	<u>ص</u>	مدخل
	1	<u>من</u> ۵۷۶	فِلْفِل أَحْمَر	٤	<u>ص</u> ۱۶۰	مدخل فَرَنْدُل حَسَلِيّ الوَرَق
	٥	171	فِلْفِل أَسْوَد	٤	17.	فَرَّنْدَل زُوفِيِّ الوَرَقَ فَرَنْدَل صَفْصافِيٍّ فَرَنْدَل كَبِيْر فَرَنْدَل مَبْذُوْل
	١	***	فِلْفِل آڤا	١	Y7V	فَرَنْدَل صَفْصافِيّ
	٤	177	فِلْفِل جابُورَنْدِي	١	777	فَرَنْدَل كَبِيْر
	1	740	فِلْفِل رُوْمِي	١	777	فَرَنْدَل مَبْذُوْل
	٦	307	فُلْفُل السُّودان	١	777	فَرَنْدَل مَخْزَنِيّ
	٤	771	فِلْفِل شَبَكِيّ	١	***	فَرَوْلَة
	۲	177	فِلْفِل طويل	١	777	فريز
	٣	177	فِلْفِل عِرْقَ الذَّهَب	٣	189	فريز
	٥	171	فِلْفِل عَطِر	١	4.4	فَرِيْقَة
	7	307	فُلْفُل غِيْنيا	٧	١٠٩	فِساء الكَلْب
	1	777	فِلْفِل كاواكاوا	٤	171	فَسْتُق
	١	377	فِلْفِل المّاء	١	779	فُسُتُق الأرْض
	1	777	فِلْفِل مُسْكِر	١	774	فَسْتُق عَبِيْد
	٤	177	فِلْفِل مُعَرَّق	٤	171	فريز فَرِيْقَة فِساء الكَلْب فُسْتُق الأرْض فُسْتُقة فُسْتُقة فُشَاغ/ فُشاغ فُشَاغ/ فُشاغ فُشَاغ البارا
	١	۳۸۲	فَلَيَّة	٣	17.	فَشَّاعُ/ فَشَاعُ
	1	177	فلِيَّة	٧	١٨٠	فَشَ اغ
	١	۳۸۲	ُ فُلْتَة فَلْيُفِكَ فُلْيُفِلَة زِرَاعِيَّة فُلْيُفِلَة لامِيَّة	٥	17.	فُشاغ الپارا
	١	440	فَلَيْفِلَة زِرَاعِيَّة	٦	١٦٨	فُشاغ الجَمايِنْك
	٣	175	فَلَيْفِلَة لاهِبَة	١	**	فُشَّاغ سَهْمِي
	٣	175	فليفِلة لِيْفِيَّة	٧	141	فشاغ صِیْني
	۲	144	أنناة	١	***	فُشاغ قَاسٍ فُشاغ المَكسِيك
	۲	7.47	فَيْمُلْيَة مُنْبَسِطة الوَرَق	٣	171	
	٧	3.47	فوافُوتْسِي فواكَنْغا أفْرِيقيا	٤	171	فُشاغ لَمُنْدُوراس
	٧	۱۸۵	فواكَنْهَا أَفْرِيقيا	٥	71	فَصّ الحِمار
	٧	140	فُواكَنْغا ثواًرسي	٧	184	فَصّ الحِمار
	1	***	فُوّة	٧	174	فَصَ الحِمارِ الحَرْشَفيِّ
	1	***	فُوَّة الصَّبَّاغِيْن	٧	١٨٣	فَصَ الحِمارِ الخَرْشُوفيِّ
	1	۳۸۲	فُوتَنْج بَرِّي	٧	١٨٣	فَصّ الجِمار المُغايِر الشَّوْك
	7	737	فوتنج الماء	٣	177	فِصَّة مَزْرُوْعَة
	۲	100	فُوْدَنَّج	٣	177	فطفضة معروفة
	1	۳۸۲	فُوْدَنْج بَرِّي	١	1 8	فطر الدابرة
	٦	737	فُودَنْج الماء	1	777	فطر الصَّدَّا الأَبْيَض
	٧	*14	فُوْتَنْج بَرَّيَ فُوْتَنْج الماء فُوْدَنْج بَرِّي فُودَنْج الماء فُودَنْج الماء	1	777	يُصْفِصَة مَعروفة نُطر الدَّابِرَة نُطر الصَّدا الأبيّض نُطر الصَّدا الأبيّض نُطْر الصَّداِبِيَّات الأبيّض
	٣	170	افتقب حنازي	1	799	فَغُو شَائِع فَقُوس فَقُوس الحَمِيْر فِقْنِع فُلً
	١	444	فَوْقُس حُوَيْصَلِيْ	٦	179	فَقُوس ر <u>ه</u>
	٦	181	فَوْقَس خُوَيْصَلِيّ فَوْقَس طارِد للدُّود فَوْقَس مُجَعَّد	١	777	فقوس الحمير
	١	۲٠٦	فُوْقَس مُجَمَّد	١	717	فِقَيْع
£ £ V	Y	3.47	ا فُوْل	٥	777	فَلَ

<u>ح</u> ۷	<u>ص</u> ۱۹۰	مدخل فَبَرَيَّهُ جَمِيْلَة	<u>ح</u> ۷	<u>من</u> ۱۸۵	مدخل فُوْل إِيْنياس فُول بِشُورِيْم فُول تُونْكا	ف و ل
٧	191	فُئِرَّيَّة جَوْفاء	٣	3.7	فُول بَيشُورِيْم	
٦	14+	قُبُّرَيَّة صُلْبَة	٤	177	فُول تُونُكا	
٦	14.	قُبَّرَيَّة لُبْنان	١,	779	فَوْل شُوْدَانِيّ	
۲	۱۸v	تُبَّعَنه بَيْضاء	٧	781	فُوْل كالابَارُ	
٣	177	قُبُعَة مَخْزَنِيَّة	١	٧٣	غُوْم	
٥	119	قتاد	۲	٥٥	غُوْم	
7	179	بِثَاء	۲	3 • 7	فِيْتَاس فَيْجَن	
١	۲۸۳	قِثَّاء بَرِّي	٦	111	فَيْجَن	
1	747	قِثَّاء الحِمَار	٤	114	فَيْجَن عَرِيْض الوَرَق	
١	777	َ قِثَّاء الجِمَار قِثَّاء مَاسِط	١	140	فَيْجَن نَتِن	
1	114	قفاء هندي	٦	111	فَيْجَن عَرِيْضِ الوَرَق فَيْجَن نَيْن فَيْجَن نَيْن	
٦	179	قِتْم قُحْوَان قُوَّاص ثُنَانِيَ المَسْكَن قُوَّاص غِشانِيَ قُوَّاص فَصِف قُرَّاص كاذِب قُرَّاص كاذِب	۲	١٨٥	فِيْرُوْنِيْكَا قُرَّةُ الْعَيْن	
٥	١٦	قُحْ وَان ِ	١	109	فَبْقُس فِيْكَارِيا حَوْذَانِيَّة	
١	3.47	قُرَّاص ثُنَانيِّ المَسْكَن	١,	777	فِيْكَارِيا حَوْذَانِيَّة	
٧	197	قُرّاص غِشائيّ	٥	177	فِيْكُوسَ صَغِيْرِ الثَّمَرِ	
7	179	قُرَّاص قَصِف	٥	197	فيْلاو كُنْبائيَّة	
١	48.	ُ قُرَّاص كاذِب	١ ،	4.4	فِيلْزَهْرَجِ البَرْبَر	
٧	197	قرّاص کاوِ	٣	**	فِيْلَنْتُوس السَّنانِيْر	
٤	177	قُرَّاص مُحْرِق	٤	175	فيلتثوس الشنانير	
٧	197	فُرَّاص مُذَنَّب	١ ١	7.1	فيرُوْنِيْكَا ذَكَرِيَّة	
٧	197	قُرَّاص مُوِيب قَرانيا حَوِيوِيَّة	١ ،	7.1.1	فيرُوْنِيكا مَخْزَنِيَّة	
٧	198	قَرانيا جَرِيرِيَّة	۲	140	فيتلازسيا نينأؤفريّة	
٦	174	ر . قَرَانِيا فَلُورِيدا قَرانِيا لَوْلَبِيَّة	۰	175	قات	
٧	198	قَرانِيا لَوْلَبِيَّة	١ ١	3 P Y	قاتِل أَبِيْه	
۲	141	قرانيا مُدَمَّاة	١	77	قاتل البَقّ	
۲	197	قَرانِيا مَعْرُوْفَة	١ ١	717	قَاتِل البَقَرِ	
٦	171	قَرْبانِيَة مُبارَكَة	١ ١	191	قاتِل الكَلْب	
١	317	قِّرْبِیْنِیا مُبَارَکة	٦	170	قاتِل الكَلْب	
۲	١٨٧	قُرَّة العَيْن		**	قَاتِل النَّمِر	
٧	198	قَرْدَب مُحلو	١ ١	797	قار	
٧	198	قَرْدَب سيبُولدِي	٣	٤١	قارح قاطِر جَبَّار	
٦	171	قرْدَب العِيْص قَرْدَب المَنَاقِع قَرْدَب المَنَاقِع	٣	177	قاطِر جَبَّار	
١	137	قَرْدَب المَنَاقِع	٦	737	فَاقُلَّةٌ ذَكَرِيَّة فَاقُلَة عُنْقُودِيَّة	
۲	7.4	قَرْدُوْن	۰	771	قَاقَلَة عُنْقُودِيَّة	
٤	771	قِزْصَعْنَ قِرْصَعَنِّي قِرْصَعَنِّي قِرْصَعَنِّي مِنْجَلِيِّ قِرْصَعَنِّي مِنْجَلِيِّ	٦	787	قاقُلَّة مُتَوَسِّطة قانَة بُرْتُقالِيَّة	
٣	175	قِرْصَعَنِّي	V	19.		
٤	777	قِرْصَعَنِّي	V	97	قاۇون ھِنْدِيِّ 	
٥	141	قِرْصَعَنِّي مِنْجَلِيّ	۲	۲۰۳	بَ ار	£ £ A

ق ص ع	٥	<u>من</u>	مدخل	<u>E</u>	ص	مدخل
ی حق ع	1	<u>صن</u> ۱۸۵	قُسُط بَرُي	7	قن ۱۰۹	قرط
	1	189	أ قُسُط شاميّ	٦	174	قَرْطُم بَرِّي
	*	717	قَسُطَل	*	144	قُرْطُم الصَّبّاغِيْن
	7	١٨٨	قَسُطَل	٦	174	قرطم صوفي
	1	7.47	قَسُطُل الخَيْل	١	110	قُرْطَمَان
	7	144	قَسُطُل قَزَم	٥	14.	قَرْظ
	1	7.47	قَسْطَل هِنْدِي	٤	707	قَرْع
	٣	174	قَسْطُورِيُوم	٥	175	قَرْع دُومِي
	۴	144	قَسْطُوس إِقْرِيْطِشي	٦	174	قَرْع سُكْرِي
	1	PAY	قَسْوَر راجِيّ	٦	174	قرع مسنجي
	٤	177	قَسُوس	۲	44.	قَرْعَة
	٤	177	قَسُوس عريض الوَرَق	٥	170	قِرُفَة بيضاء
	1	777	فَشُوْس مُتَسَلِّق	۲	144	قِرْفَة سَرَنْدِيب
	٤	177	قَسُوس مَنقعيّ	٥	170	قِرْفَة الصِّيْن
	٦	14	القِسْيْس	٥	178	قِرْفَة مَالَابار
	۵	174	قِشْدِيَّات	٤	AF/	قرفة مَلَبَثْرُوم
	٤	148	فيشر غنبر	١	11	قَرْقَهان
	1	440	قِشْرَة مُقَدَّسَة	1	441	قَوْمَلَة
	۲	**	فِشْرة مُقَدَّسَة	٥	177	قَرْمَنْتِيْن صَدْرِيَّة
	۲	**	قشرة نَبْق پورش	٧	***	قَرْن الأَيْل
	۲	TV1	قشرة هندوراس	١	401	قَرْن الغَزال
	٦	174	قِشْطَة سكاموزا	٤	174	قَرَنْفُل الزَّهَّارِيْن
	٦	١٧٣	قِشْطَة سَهُفِيّة	٥	177	قَرَنْفُل الشَّرْتَرِيَيْن
	٥	177	قِشْطَة شائِكَة	۲	14.	قَرَنْفُول
	7	148	قشطة شبكية	۲	191	قُرْنُوْس أَنْثَى
	٧	190	قِشْطَة شَريمُوْلِيا	٧	198	قُوْنُوس حَرِيْرِيّ
	٧	190	قِشْطَة مَنْقِعِيَّة	۲	197	قُرْنُوْس ذَكَرَ
	٥	174	قِشْطِيًّات	٦	174	قُرْنُوْس فلُوريدا
	1	741	تَصَب	٧	198	قُرْنُوس مَلْفُوف
	٣	1 • •	قَصَب قَصَب بَلَدِيّ قَصَب الذَّرِيْرُه	٧	۱۸۰	قَرْنُوْنِيَة طاردَة للدُّود
	1	7 8 0	قَصَب الذَّرِيْرَه	١	• 37	قُرَّيْص أَبْيَضَ قُرَّيْص رُوْمانِي
	٣	14.	قَصَب رُومِيّ	٧	197	قُرَّيْص رُوْمانِي
	٣	171	قَصَبُ رُومِيَّ قَصَبُ الشُّكِّر	٤	177	قُرَّيص العَجُوز
	١	7 2 0	· قَصَب عِطْرِيّ	١	347	قُرَّيْص گبِيْر
	١	791	قصب المكانس	٧	79	قُرَيْطَفَة
	٣	14.	قَصَب النَّيُر	٦	141	قُرَيْناء
	٤	711	قَصْعَة الماء الآسيويَّة	٣	174	قُسْت عَرَبِيّ
	٣	۱۷۳	تَصْمِی ْن	٣	٨٢١	فُسْتُس عَرَبِي
889	٦	171	قَصْعَة الماء الآسيويَّة قَصْعِيْن قَصْعِيْن	ه	3 • 7	وريس رودي قُرَّيْص العَجُوز قُرَيْطَفَة قُرَيْناء قُسْتُ عَرَبِيّ قُسْتُوس لاَذَنِيّ قَسْتُوس لاَذَنِيّ

		į	ī			
<u>ح</u>	ص	مدخل فَلَمَنْت الجَبَل	ج	مس	مدخل	ق ض ا
<u>,</u>	ص ۲۹۷	قَلَمَنْتَ الجَبَل	ج	صن ۳۹٦	مدخل قَضَاب صَغِيْر	ت حق ا
۲	195	قَلَمَنْت صَعْثَرِيّ الوَرَق	٤	307	قضاب كيير	
۲	195	قَلَمَنْت صَنَيْنَ	٦	405	قَضَاب لُبْنانِيّ	
٥	14	قَلَمَنْت صَنَّيْنَ قَلَمَنْت قِرْمِزِيّ قَلَمَنْت مَخْزَنِيْ عَلَمَنْت مَخْزَنِيْ	٧	**1	قضاب كَيْرُ قَضَاب لُبُنانِيّ قَضَاب مُسَطِّح	
١	797	قَلَمَنْت مَخْزَنِيّ	١	441	قَضَاب مِصْرِيِّ قَضاب وَرْدِيِّ	
٥	14	فلمنت مستدير الؤرق	۲ ا	197	قَضاب وَرْدِيّ	
٤	14.	ۚ قَلَمَنْت نَبَتاوِيّ	٥	377	قَضَاب وَرْدِيّ أَمْرِيْكِيّ	
١	***	قَلُوْتَة	٥	١٦٨	قَضِيْبُ الذَّهَبِ المَبْذُوْل	
7	10	فَلُوْتَة فَلِي فُمَّام أَبْيَض قِمام أَحْمَر	١	77	قَضِيْب الرَّيِّ	
١	٧.	قُمَّام أَبْيَض	٧	١٦	قَضِيْب الرَّيِّ	
۲	197	قِمام أَحْمَر	٣	٧٢	قَطَب أَبْيَض	
١	191	قِمام أَسْوَد	1	797	قطران الخَشَب	
١	APY	قِمامُ أَسْوَدُ فِمام آسِيّ فِمام آسِيّ	٥	179	قَطْرَان صَنَوْبَر مُصَفِّى	
۲	197	قِمام آسِيّ (الثّمرة)	٤	179	قطران العَرْعَر الكادي	
V	199	قِمام تُرْبِيّ	١	797	قَطْران نَباتِيّ قَطْرَان نَبَاتِي مُصَفَّى	
٧	191	قِمام جَبَلِيّ قِمام عُثْكُولِيّ				
٦	177			179	(دستور ۱۹۳۵)	
V	179	قِمام عُنْبُوبيّ	١	Y 94	قَطْرَمُ الهِرّ	
٧	199	قِمام المَوْجِل		***	قَطْع وَصْل	
٤	48.	قَمْع البَقَر	٤	٧.	قَطْع وَصْل خَبْطِيّ	
٣	337			١٩	قطع وضل منقيي	
۲	197	فَعَعَ الْبَقِرِ الْهِنْدِيُّ قَمْعَ تَخِينَ قَمْرِيَّةٌ كَبِيْرَةَ الزَّهْرِ قَمْمِيَّةٌ أُرْجُوانِيَّة قَامِيَّةً أُرْجُوانِيَّة	١	14.	قَطَفَ أَبْيُض قَطْلَب أو قُطْلُب شائِع	
۲	197	قَمْح عَرَبِيْ	١	397	قَطْلُب أو قَطْلُب شائِع	
1	7 • 9	فَمَرِيَّة كَبِيْرَة الزَّهْر	۵	14.	قَطْلَب عُثْكُولِيّ	
1	731	قُمْعِيَّة أَرْجُوانِيَّة	٤	١٧٠	قُطْ ن م	
٤	171	ا عا بولد	'	۱۷۲	قُطُن حَثِيثِثِي	
۴	77	قناوَشَق	٣	177	قُطْن الشَّرْق	
۲	194	اقتب	٥	1 1 1	قُطُن مَنْدوف خام	
٥	171	ا قَتْب	٥	141	قُطُن مُنَفَّش خام	
٥	171	فَنْب شَائِع	٦	140	قُطْن يُودِيّ 	
٥	70.	فَتْب مانِيْلِيَة	۲	۸٩	ق غ بارُوْن رو	
7	44	فَتْب مَكْسِيكِيّ	۲	7 • 9	قُفْلوط مُ	
1	799	فَنْب نَسِيْجِيْ	1	440	فُلَّاع شانِع	
٥	171	قنب نيبجي	٦	178	قَلْبُ الثَّوْرِ	
١	799	فنّب مِنْدِيّ	۲	177	قِلْقاس رُوْمِيّ د	
٥	171	فَنْب فَنْب شَايِع فَنْب مَانِيْلِيَة فُنْب مَنْيِلِيَة فُنْب مَنْيِيَ فُنْب مَنْدِي فُنْب مِنْدِي فُنْب مِنْدِي فَنْب مِنْدِي	٦	171	قُلْقاس زِرَاعِيّ مُنْ	
٧	19.	ا قنبر جَمِيْل	٦	140	قُلْقاس القُدامَى	
٦	١٧٠	قَنْبُر قَصِيْرِ الفَص	٦	١٧٦	قُلْقَاس مَاكُول رَبَهِ	
٦	170	اً قِنْهُ مَبْذُولة	۲	194	فَلَمَنْت جِبال لُبْنان	٤٥٠

				i		
ك ار	<u>3</u>	ص	مدخل	<u>ح</u>	ص	مدخل
J	7	<u>ص</u> ۱۷۷	قُوَيْسَةً قَاسِيَة	٣	<u>صن</u> ۲۳	قِنَّةً مَهْجُونَة
	٥	171	قُوَيْتَة كَأْسِيَّة	١ ١	7.7	قُنْدَرُوس شَكَّال
	٥	171	قُوَيْسَة مُتَعَدِّدَة السُّوق	١ ١	7.7	قَنْدَرُوس مُتَقَبِّض
	*	199	قُوَيْسَة مَخْزَنِيَّة	\ Y	١٨٣	قَنْدَرِيْس بِحُرْشُوفيّ الرّأس
	۲	178	قُوَيْسَة مَخْزَنِيَّة	٧	141	قَنْدَرِيس لُبْناني
	۲	۲	قُوَيْسَة المُرُوْج	٧	114	قَنْدَريس مُغاير الشَّوْك
	٥	140	قُرِّيْتَةً مُهَيِّجَةً	1	7.7.7	قَنْدلِي هِنْدِي
	٥	۱۷٦	قُولِنَتُهُ هُرْمِينيَّة	٧	۲0٠	<u> قِنْدِیْ</u> د
	۲	174	قرايصة	۰	3 • 7	ئنسُوس
	٦	144	قُوَيْصَة قَاسِيَة	1	۳	قِنْصُوْر شائِع
	۲	199	قُويْصَة مَخْزَنِيَّة	1	4.1	قَنْطارِيُوْن صَغِيْر
	١	797	قِير	١	7.7	قَنْطَارِيُوْن فَخُيّ
	۲	V	قَيْسُون	V	7.1	قَنْطُريُوْن أَسْمَر
	٧	Y • Y	قَیْسُ ون	٥	۱۷۴	قَنْطُرْيُون أَنِيْق
	١	3.7	قَیْصُوْم قَیْصُوم اُنْثی	٥	178	قَنْطُرْيُون الشَّيلي
	٧	7.7	قَيْصُوم أَنْش	١	4.1	قَنْطُرْيُوْن صَغِيْر
	٦	٣	قَيْصُوم جَبَلتِ	٥	۱۷۳	قَنْطُرْيُون ظَرِيْف
	1	3.7	قَيْصَوم ذَكَر	•	178	قَنْطُرْيُون كَبِيْر
	٣	140	قَيْقَب ِ	1	317	قَنْطُرْيُوْن مُبَارَك
	٣	140	قَيْقَب أَبْيَض	٥	140	قَنْطُرْيُون مُزَوَّى
	۲	140	قَيْقَب أَخْمَر	١ ،	4.4	قَنْطُرْيُوْن نَجْمِيّ
	۴	140	قيقب پَنْسِلْڤانِيا	٤	171	قُنْفُخ قُنَيْطَسَة فالنَّسِيا
	۴	140	قَيْقَب جِمَّيْزِي	٧	Y 9	قُنيَّطَسَة ڤالنُسِيا
	٣	140	قَيْقَب حَرَمُون	٤	177	قُوتُو (قشرة الـ)
	٣	140	قَيْقَب حَفْلِي	٣	117	قورس
	٣	140	قَيْقَب دِلْبِيّ	٦	٣٦	غُوْطَة
	٣	171	قَيْقَب سُكُرِي	٤	191	فُوْقاع صِيْوانيّ
	٣	140	قَيْقَب سُوريّ	٣	177	قُوْقاع مُستَدير الوَرَق
	٣	140	قَيْقَب طوريد كابُوك خُماسِيّ الأشدِيّة	٣	۱۷۳	قُوْقَحان مُنْيات
	٣	۱۷۸	كابُوك خُماسِيّ الأَسْدِيَة	٣	177	فُوَيْسَة
	٧	***	كابي كاجِيْبُوت كاجِيْبُوت	٤	177	قُوَيْسَة بُوْصِيْرِيَّة الوَرَق
	٥	44	كاجِيْبُوت	٦	178	قُوِّيْسَة تُفَاحِيَّة
	7	120	کاد هندی	V	7 • 7	قُوَيْسَة الجَبَل
	٤	178	كاراپًا تُولُوكُونا	٥	140	قُوَّيْسَة خَضْرَاء
	٤	1 V &	كاراپًا تُولُوكُونا كاراپًا جَذًابَة	٥	771	قُوَّيْسَة خضراء هُرْمِينيَّة
	٤	371	كاراتا مُلِّفتَة	٤	177	قُوَيْسَة دَبِقيَّة
	١	7.7	ػ ٵڒؖٵۼؘٳۿؚؽؙڹؘ	٤	۱۷۳	قُوَيْسَة صَغِيْرَة الفَتْحَة
	١	7.7	كَارًّاغِيْن	٦	178	قُوَّيْسَة العَفْص
٤٥١	١	414	كارِي أَصْفَر	l v	7.7	قُوَيْسَة الغاب

			ı			
ح	ص	مدخل	<u>c</u>	ص	مدخل	ك 1 س
<u>C</u>	<u>صن</u> ۱۸۲	مدخل کبراشو بیروبا	1	من ۲۱۱	مدخل کاسِر الحَجَر	<i>6</i> ,
٤	144	گبْراشُو گولورادو	٤	140	كاسِيَّة الجَمايِيْك	
4	3 • 7	كِبْريبادِيوم قَبْقَابِيّ	١	٣٠٨	كاسِيَّة مُوَّة	
١	115	كَبْرِيْت نَباتِيّ	١	37	گاشَم گاشَم رُوْمِيّ	
٣	١٨٢	جَبِيْكَ جَبَعِيْ كِبْشُنُ القَرَنْفُول كَبِيْكَج كَبُوْلِمِينَ صَغِيْرَة	١	37	كَاشَم رُوْمِيّ	
7	77	ػؠؚڸ۠ػؘۼ	١	37	گاشَ ن	
٥	140	كَبُوْسِيْن صَغِيْرَة	۲	7 • 7	کافور کافُور	
١	717	كَيُّوسِيْن كَبِيْرَة	٣	144	كافور	
۲	3 • 7	كَتَّان بَرِّيّ		177	كافُور طَبِيعيّ	
١	717	كَتَّان زِراعيّ		177	كافُور اليابان	
٤	14.	كَتَّان زَهْرِيّ		177	كافُور يَمِيْن	
٤	14.	كَتَّانَ الزُّيْر		174	كافُوْرات	
١	414	كَتَّان شائِع		701	كَافُوْرِيَّة دَلْمَاسِيَا	
٤	١٨٠	كَتَّانَ كبيرِ الزُّهر		144	كافُورِيَّة مُون پوليَيْه	
٧	7.7	كَتَان مُسْهل		141	كافَيِيْن	
٤	174	كَتَّان مُعمَّر		4.4	كاكاو	
٤	14.	كَتَلْهَا شَائِعَة		179	كاكار	
٤	١٨٠	كَتْوابا		144	كاكاو (زُبْدَة الـ)	
٤	١٨٠	كَتْوابا مِيْرانْدُون		۱۳۵	كاڭخُوس	
١	707	كُنَّهُهُ	١	۳1.	كاكنج	
١	100	كثاه	۲	7.7	كامالا	
٦	17	کُش یراء	٦	707	كَانَنْغا عِطْرِيَّة	
٦	۱۸۱	كَجُنُوس كاجَن		174	كاهِنْسَة	
٦	141	كَجُنُوس هِنْديّ	7	174	كاهِنكَة	
٥	10.	كخكى	١	***	كاواكاوا	
٣	۸٠	کَذّان		171	گاو نْشُوك	
٥	149	كُرّاث الدُّبّ	٣	141	كاوَشِيْر .	
٣	148	گُڑاٹ رُؤمِي	٧	7.7	كَايَالُهُوْنِيَا كُرَوِيَّة	
۲	7 • 9	گرّاث عَسْقَلُون	٥	**	کایُلْرِدُدا کایِنْسَة گبَابَة گبَاش	
۲	7 • 9	كُرَّاتْ كُرَوِيُّ الرَّأْسِ	٦	174	کایِنْتَ هٔ	
٣	148	گرًاث مَعْرُوف	٦	179	كْبَابَة	
٤	144	كَرَّاتِ نَبَطِي	٣	14	کَبَّاش	
٣	140	گرّاغَیْنات م	٤	**.	كبديَّة اليّنابِيْع	
١	107	كُرامِيْرِيَا ثَلاثِيَّة الأَسْدِيَة	٣	114	كَبَر جِلْدِي	
٣	140	ِ گرا <u>وی</u> ا	۲	7.7	كَبَرُ شَائِكُ	
۲	71.	كرّاث رَوْمِيّ كُرّاث عَسْقَلُون كُرّاث كُرُويُّ الرَّأْس كُرَّاث نَبْطِيّ كَرَّاغَيْنات كُرامِيْرِيّا ثُلائِيَّة الأَسْدِيّة كُرامِيا كُرامِيا كُرامِيا كُرَامِيا كَرُامِيا كَرُمُة مَا يُنْضِ الوَرَقَ كَرُد	٥	١٨٢	كَبَر شَانِك أَبْيُض	
٥	٨٤	ِ گرَد	٥	141	كَبَر صَغِيْر الزَّهْر	
٦	148	ا درز بري	,	١٨٢	كَبْراشُو أَبْيُض	
١	710	ا کَرَز حامِض	£	1 🗸 ٩	كَبْراشو أَحْمَر	207

اء ماء	7	ص	مدخل	7	ص	مدخل
ك ش ك	<u>ح</u> ۲	<u>ص</u> ۱۸٦	<u>عَ</u> رِّمَةُ الصَّبَّاغِيْنِ كَرْمَةُ الصَّبَّاغِيْن	<u> </u>	من ۲۱۱	کرز حامِض گرز حامِض
	۲	AV	كَرْمَنْتِيْن صَدْرِيّة	۲	۲1.	كَرَز الطَّيْر
	٣	7 • 9	كَرْمَنْتِينَ عُنْكُولِيّ	٦	148	كَرَز الطَّيْر
	٤	120	گرنیجیا	١	410	كَرَز عادِيّ
	٦	741	گزنیجیا کرُوتُن الزَّیْت	*	711	كَرَز عادِيّ
	٤	140	كرُوتُن صِباغِيّ	٥	114	ك َرَز عُ نْقُود ِي
	٤	148	گُروتُن عَنْبَرِيٌ	١	717	كَرَز الغار
	٦	144	گَرُوتُن عَنْبَرِيّ	١	717	گرز غاري
	٦	144	كرُوتُن لَكِّيّ	١	۲1.	كَرَز القُدْس
	٤	140	كرُوزُوفُور صِباغِيّ	٤	17.	گُرْسُف کِرْسَتُهٔ
	٦	118	كرُوسْن اليابان	٣	7.47	كِرْسَنَّة
	1	177	كرُوْگُو	٦	117	كِرْش كَرَفْس كَرَفْس بَرْيّ
	٥	**	كُرُوْنِلًا مُرَقِّشَة	٤	١٨٢	گرَفْس
	٣	140	گرَوْی اء	1	414	كَرَفْس بَرْيّ
	٦	١٨٨	كرِيْزارُوبِيْن	٥	19.	كَرَفْس بَرِّيّ
	۲	7.67	كِريشَنْتِيا كُوجِيتَى	٧	7 • 9	كَرَفْس الجَبَل
	1	٤١	كَرِيْكة بَبَّايا	*	**	كَرَفْس رُوْمِيّ
	٦	70	كَرِيْكَة بَبَّايا	. ٤	**	كَرَفْس رُوْمِي
	4	717	كريمات أدَمِيَّة	٦	140	كَرَفْس لِفْتِي
	۲	717	كريمات طبية	٧	۲1.	كَرَفْس الماء
	٧	***	كُرْيَنْتِس يُؤهِمْب	٧	71.	كَرَفْس الماء الضَّيِّق الوَرَق
	١	441	كُوْبَرَة البِيْر	٦	ra/	كَرَفْس الماء العَريْض الوَرَق
	٥	191	كُزْبَرَة البِيْرِ الأَثْيُوبِيَّة	٧	71.	كَرَفْس العاء المُنتَصِب
	٥	191	كُزْبَرَة البِيْر البَيْضاء	١	414	كَرَفْس المَناقِع
	٥	191	كُزْبَرَة البِيْر الكَنَدِيّة	£	141	كَرَفْس نَبَطِيّ
	٥	197	كُزْبَرَة البِيْر المَكْسِبْكِيَّة	١	717	گرَفْس نَین
	١	٥٣	كُزْبُرَة الثَّعْلَب	٣	۱۷۳	کَرْکاش
	٣	٥٣	كُزْبَرة الحَبَشة	٤	۱۸۴	کَرْ کَدي
	٣	144	كُزْبَرَة مَزْرُوْعَة	٤	١٨٢	گُرْگَدِيّة کُرْکُم أَصْفَر
	٥	197	كَزْوَرِيْنَهَ كُنْبَائِيَّة	1	414	كُرْكُم أَصْفَر
	٦	144	كُسْتَنَة	۲	717	کُرْکُم جُوِّتِ
	٦	144	كَسْتَنَة صَغِيْرة	٧	711	كُرْكُمْ صِباغِيّ
	۲	717	كَسْتَنَة مَبْذُوْلَة	1	771	گُرْکِیْمُاس کَرْلِیْن ذَهَبِیْ
	7	149	كَسْتَنَهُ صَغِيْرَهُ كَسْتَنَهُ مَبْدُوْلَهُ كَسْتَنِيَّهُ ذَهَبِيَّهُ الوَرَق	٧	717	كَرْلِيْن ذَهَبِيّ
	١	197	كُسْفَرَة الحِمَار	٧	717	كَرْلِيْن شَائِعُ
	۲	317	كُسْفَرَة الجِمَار كَشُوْب تُختصَنَوْبَر كَشُوْب تَحْصَنَوْبَرِيّ كَشُوْب تَحْصَنَوْبَرِيّ	١	۳۲.	كَرْلِيْن عَدِيْم السَّاق
	۲	317	كَشُوْب تَحْصَنَوْبَرِي	١	۳۲.	گزلیْن نَجْمِيٌ کَرْمَة أَرْجُوَانِیَّة
	٦	114	ً كُشْبُر كِفْك الْمَاز	٦	781	
203	١	44.	كِفْك الْمَاز	٦	7.4.1	گرْمَة خَمْراء

			ı			
<u>ح</u>	<u>ص</u> ۲۰	مدخل گُنْبات أَفْرَع	<u>ج</u> ۲	<u>صن</u> ۲۱۵	مدخل	ك ش م
٤		تُخْبَات أَفْرَعِ	۲		مدخل كِشْمِش أَحْمَر	10-
٣	1٧	كُنْباث الحَقْل	٥	195	كِشْمِشُ الاسْقُمْرِي كِشْمِشُ أَسْوَد	
٣	١٩	كُنْباث الشُّتاء	١	444	كِشْمِش أَشْوَد	
٤	71	كبات المرح كُنباث الشّتاء كُنباث مُشتَنَقَعِيّ كُنباث مَنْقَعِيّ كُنباث المَوْحِل كُنبُاث المَوْحِل كُنْدُر	٥	197	كِشْمِش شائك كِشْمِش عُنْقُوديّ	
٣	19	كُنْباث مَنْقَعِيّ	۲	410	كِشْمِشْ عُنْقُوديّ	
٣	۲.	كُنْباث المَوْحِل	٣	7.87	كُشْنَى كَشُوْت أَوْدُوبِّيَ كَشُوْت الزَّعْتَر	
٥	7.7	كُنْدُر	۲	710	كَشُوْت أَوْرُويِّيْ	
١	777	كَنْدُوْرَنْغُو	١ ١	78 A	كَشُوْت الزَّعْتَر	
١	444	كُنْسُوْدَة كَبِيْرَة كُنْسُوْدَة مَخْزَنِيَّة	٤	3 • 7	كَشُوث أحادِيّ البزْرَة	
١	LAL	كُنْسُوْدَة مَخْزَنِيَّة	٣	11.	كَعُب الغَزال	
٦	184	كُنْسُوْدَة مَلَكِيَّة كَنْكَالِيَّنَا رَامْبُوْلْت	١ ١	377	كَعَبْ العران كُفّ الدُّبْ كَفّ السَّبْع كَفّ الصَّبَّاغ كَفّ الضَّبْع كَفّ الشَّبْع	
١	740			177	كَفّ الدُّبّ	
٣	144	كَنْكِيْنا	٦	77	كَفّ السَّبْع	
٧	717	كَنْكِيْنا بِيتايُو	١	190	كَفّ الصَّبَّاغ	
١	444	كَنْكِيْنَا پِيتَايُو كَنْكِيْنَا حَمْراء	٦	۲۷	كَفّ الضَّبْع	
٥	199	كَنْكِيْنَا حَمْراء	١	174	كَفّ النَّسْر	
٤	197	كَنْكِيْنا رَمادِيَّة	١	777	كَفْنَةَ مَدَّادَة	
٦	194	كَنْكِيْنَا صَفْراء مَلَكِيَّة		198	كِكْسِيَة خَرْشَاء	
٦	195	كَنْكِينَا كَالِيْزَايَا		19.	كِلَّاجَه الصَّابُون	
٧	717	كَنْكِيْنَا كِولُومْبِيا الصَّفراء		144	كَلادِيُون ثُنَائِيِّ اللَّون	
٤	197	كَنْكِينَا لُوكْسَا	٦	19.	كِلَّايا الصَّابُون	
ŧ	99	كَنْكِيْنَا مُنَحَسَة	٦	170	كِلْغ كَلْغ كَلِينُوپُودِيُوم شانع كَمْه كَمادَدِيُوس كَمارَة البرازيل كَمافِيْطُوس	
٥	7	كَنْهَان صِبَاغِي	٥	194	كلِينُوپُودِيُوم شائع	
٣	189	كَهْرَمان		717	كَمْ	
٣	115	گُوبال	٦	188	كَمادرِيُوس	
٣	14.	گُوبْتيس	٤	79	كمارة البرازيل	
٣	191	ک گوبئیس گوبئیس نِکْتا	٧	101	كَمافِيْطُوس	
٣	191	كُوْبْتِيسَ ثُلاثيِّ الوَرَق	٧	317	كَمالِيَّة البَرِّ	
۲	191	أشره ووالمون	٧	317	كَمَالِيَّةُ الْحُقُولُ	
٣	191	گوبْتِيس ماميرا	1	***	كَمالِيَّة مَبْذُوْلَة	
٢	191	گُوبْتِيس اليابان	٧	710	كَمالِيَّة مُتَوَّجَة	
٧	*1*	كَوْثَلُ الكاشُو	1	777	كَمالِيَّة المُرُوْج	
٧	97	<u> ځوړنيځ</u> ون	٧	710	كَمَالِيَّة مُكَلَّلَة	
٦	*1	كُورُونِيلًا عَقْرَبِيّة	٣	171	كَمبُوْجِيا	
٧	79	گُورُونيلًا غَبْراء	*	7	كُمَّشُراة	
٤	198	كوبئيس عروبلاند گوبئيس ماميرا گوبئيس اليابان گورئيشُون گورُونيلا عَقْرَبِية گورُونيلا غَبْراء گوري گوري گوري	١	٥	کُمَّثری	
٦	77	گُوْدي سَن	٦	377	كمكام	
٥	7 • 7	كُوْزام بُرُوْسِيَّة مُرَّة	١	417	كَمُّوْن	
٤	198	ا ئۇشۇ	١	٣٢٠	كُنُبَاث	202

				ı		
ل ب ن	ح	<u>ص</u> ۲۰۰	مدخل	ح	<u>ص</u> ۱۹۷	<u>مدخل</u>
	٤	۲	مدخل لازَرْپِیْتِیُون عَرِیْض الوَرَق لاصِف	٤	197	<u>څُوسِیْ</u> لّانا
	٧	777	لاصِف الالّة	٤	٥٩	گۇشاد
	٦	٧٦		١	v9	گۇشاد أَصْفَر
	4	771	لامِيْنارِيَة سُكِّرِيَّة	۲	٦٠	گۇشاد مَقِر
	۲	777	لامِيْنارِيَة كلُوسْتُون	7	198	كُوْشِيَة المَكَانِس
	٣	١٩٨	لامينارية مُتَصَبِّعة	۲	414	كُوْكا
	٣	194	لامينارية مُتَلَوِّيَة الشُّويْق	٧	719	كُوْكا
	1	78.	لامِيُوْن أَلِيَض	٧	***	كَوْكَبِيَّة كَبِيْرَة كُوْكَه ِ
	٤	AY	لاوَنْدَة ذَكَر	٧	719	گُوْکَه ِ
	Y	۸۰	لاوَنْدَة مَخْزَنِيَّة	٧	37	كَوُكُولُس عَرِيْض الوَرَق
	٣	٧٨	لاوَنْدَه أَصْلِيَّة	٤	119	كُوكُولُس غارِيّ الوَرَق
	٥	٧٤	لَاوَنْدَه بَحْرِيَّة	٧	37	گُوڭُولُس گُونْدُودَنْدَرُون
	٦	721	ئب ئائد	٤	119	كُوكُولُس مُختلِف الوَرَق
	٥	7.7	لُبَان	١	220	كُوْلا بَلَّايْ
	٥	۲.٧	لُبَان حِبَشِي	١	440	كُوْلا دَوَّارِيَّة
	0	7.7	لُبَان ذَكَر	1	440	كُوْلًا دِيُوْلًا
	٥	7.7	لُبَان سَعُوْدِي	1	440	كُوْلًا صَغِيْرَة
	٥	Y•V	لُبَان فِرِيْرْيَان	1	440	كُوْلًا لَامِعَة
	٥	7.7	لُبَان كارْتَر	1	440	كُوْلا مُسْتَدِقَّة الطَّرف
	٥	7.7	لُبَان هِنْدِيّ	1	PAY	ڭولۇمئۇ راجتى
	٥	Y•V	لُبانَةُ المُتَوَسِّط	٤	178	كُولُونيا
	*	171	لُبانَة مَغْرِبيّة	٤	771	كُوْمَرُوْنَة
	٣	٧١	لَبْث لَبَخ لَبَخ الجَبَل	٧	37	كُونْدُودَنْدَرون لِيْدِيّ
	٥	70	لَبَخ	٧	70.	كُونياك
	Ł	114	لَبَخ الجَبَل	1	44.1	كِيْس الرَّاعِي
	١	148	لِيْدَان	٤	144	كِيْمَافِيْل صِيْوَانِيّ
	٥	70	ا لَبُك	٣	144	كِيْنا
	١	781	لَبُلاب أَبْيَض	1	444	كيْنَا حَمْراء
	١	***	لَبُلاب أَرْضِيَ لَبُلابُ الحُفوْل لَبُلاب خُبَّيْزِي الوَرَق لَبُلاب خُبَيْزِي الوَرَق	1	١٠	لا تَنْسَنِي
	۲	377	لَبُلابُ الحُقوْل	۲	***	لادَن
	٥	Y • A	لَبْلاب خُبَّيْزِيّ الوَرَق	۲	***	لاذَن
	١	137	لَبُلابِ السِّياجات	٥	3 • 7	لاذَن إسْبانيّ
	٥	Y•A	لَبْلاب فِضِّي	٣	194	لاذَن إِكْرِيْتِي
	١	ATT1 137	لَبْلَابِ كَبِيْر	٣	197	لاذَن طُوَطِي
	1	741	لَبُلَابِ كَبِيْر لَبُلَابِ المَجُوْس	٧	777	لاذَن قُوَّيسِيِّ الوَرَق
	٤	Y • •	لَبُلاب مَشْوَكان	*	771	لاريْس أورُوبَّة
	٣	7.1	لُبُنْی لُبُنّی تُونْکان	٤	۲.,	لازربِيتِيُون بحرِيّ اللَّون
	*	770	لُبْنَى تُونُكان	٤	7	لازَرْبِيْتِيُون ثلاثَي الفُصوص
200	4	440	لَّ لُبْنَى المَيْعَة		7	لازَرْبِيْشِيُون سَرْمُنْتانيّ

٤	<u>صن</u> ۱۱٤	مدخل اِنْمَتِيْ مَا مُنْمَدِيْ	<u>ح</u> ۱	<u>من</u> ۳٤۲	مدخل لَبَيْن المُرُوْج لُبَيْنَهُ	ل ب ي
ŧ	3 • 7	لَفْلاف أحادِي المِدَثَّة	٤	۸۲	لُبَيْنَهُ	
*	710	لَفْلاف أَوْرُوبِيِّي	١	404	لِيَّةً لَبْمُؤنِيَّة	
1	TEA	لَفْلَاف الزَّعْتَرْ	۲	440	لِتَّيْن دَبِق	
1	484	لَفْلَاف صَغِيْر	٥	۲۱۰	لِتَّيْن شَائِك	
٣	17	لَقْمَة النَّعْجَة	۲	770	لِتَّيْن غِدِّيّ	
7	7	لَكَ (راتِنْج)	٥	711	لِتَّيْن قَصِيْر الزَّهْر	
٤	3 • 7	لَکُبُّ امْرِیکِیَّ لَکُیُّ طَیْسَلِیّه	٥	711	لِئِّن لَزِج لِئَیْن مَدَّاد	
٥	717	لَكُبُهُ طُئِسَالِية	١	737	لِتَّيْن مَدُّاد	
٤	4 • 8	لَكُنَّة عُشارِيَّة الأَسْدِيَة	١	191	<u>ن</u> ِخلَاح	
٣	337	لَمَّام لَمْبِسَانَه مَبْذُوْلَة	٦	170	لخلاح	
٣	۸٠	لَمْبِسَانَه مَبْذُوْلَة	٧	140	لَحْلاح دُوْكاين	
۲	140	لَّ لِمُتَّامِرُم يَنْلُوْفَرِيَّة لَنْج لُوْبِيَاء سُودانِيَّة أُوبِيَاء سُودانِيَّة	١	418	لِخْيَة النَّيْس لِخْيَة النَّيْس	
1	397	لنج	۲	371	لِحْيَة التَّيْس	
٦	141	لُوْبِيَاء سُؤدانِيَّة	١	178	لِحْبَة جُوبِيتَر	
٣	7.4	لُوبِيْلِيَة زَرْقاء	۲	177	لِحْيَة العَنْزَ	
٣	7.4	أُوْبِيْلِيَةُ السُّفْلِس	٦	198	لِحْيَة مار الياس	
١	P37	لُوْبِيْلِيَة نَافِخَة	١	717	لخية الماعز	
٤	7.7	لُوْتِيا الجِبال	١	397	لَزَّان المَكَانِس	
٦	7.7	أوتيا نافِعَة	٥	717	لِسَان النَّوْرِ الأَزْرَق	
۲	۲۱۰	لُؤْرَة	١	40	لِسَان الثَّوْرِ المَخْزَنِيّ	
1	7.9	لَوْزِ الآلِهَة	٥	717	لِسَان النَّوْرِ الهَجِيْن	
٣	144	لؤز الآلِهَة	١	787	لِسَان حَمَد	
1	70.	لَوْز مُحلُو	٤	7 • 7	لِسان الحَمَل	
4	777	لَوْز حُلو		337	لِسَان الحَمَل الأَفْرِيْقِيَّ لِسَان الحَمَل البَرْغُوْثِيِّ لِسَانُ الحَمَل البَّيْضَوِيِّ لِسَانُ الحَمَل السَّنانِيِّ	
٣	7.7	لَوْز مُرّ	1	337	لِسَان الحَمَل البَرْغُوثِيّ	
٦	77	لَوْز هِنْدِي	٥	317	لِسَانُ الحَمَلِ البَيْضَوِيّ	
1	40.	لَوْزَة مُحلُّوة	٦	197	لِسَانُ الحَمَلِ السُّنانِيِّ	
٤	Y•V	أؤسِيْماخُوْس مَعْرُوْف	٧	777	لِسان الحَمَل القَرْنِيّ	
*	777	لُوْسِيماخُوْس نَقْدِيّ		787	لِسَان الحَمَل الكبِيْر	
١	707	لُوْطُس الجِبَال		777	لِسانُ الحَمَلِ المُتَوَسَّط	
١	707	لُوْطُس قَرْنِيّ		317	لِسَانُ الحَمَلِ المُرْتَدّ	
*	***	لُوْطُس النَّيْل	١	700	لِسَان العُصْفُور	
۲	٧	ا بُؤْف مِ	*	***	لِسان الغزالِ القَمَرِيّ	
٣	3 • 7	ا لَوْف أَسْطُوانِيّ	1	787	لِسَان الكَلْب	
٧	117	لُوْف عِطْرِيَّ ﴿ لُوْفٌ مُبَقَّع	*	AYY	لِسَان الكَلْب لِسان الكَلْبِ المَخْزَنِيّ	
٣	٨	لُوْفٌ مُبَقَّعَ	1	454	لَسْبَادِيْزَا مُنتَفِخَة الرَّأْسُ	
٣	3 • 7	لُوْف مِصْريّ	1	101	لُفَان	
1	404	لُويْزَة لَيْمُوٰنِيَّة	۲	۲۳٠	لِفْت	207

ه مد دې	ے	ص	مدخل	٦	ص	مدخل
م س ت	<u>ح</u> ٤	<u>صن</u> ۲۱۲	مدخل مُدَّیْد حِرْجِل	<u>ح</u> ۴	<u>صن</u> ۲۰۶	لِنْف
	1	٣٠٢	مَوَاد	۲	Y • £	ييـــــ لِيْكُوْب فِرْجينِيَا
	1	7.7	مُوَّار	٤	101	لِيْکُوبِ ماڻتي
	1	٣٠١	مرارة الخنش	٣	١٣	لَيْلَك أَزْرَق
	1	1.7	مَرارَة الصَّحارَى	١	٤٦	لَيْمُون أضاليا
	٣	717	مُرّان زَهْرِيّ	٤	Y•A	لَيْمُوْن أَفَنْدِي
	1	700	مُرَّان شَامِخ	٣	Y . o	لَيْمُون حامِض
	٣	717	مُرّان شائع	٤	Y • A	لَيْمُوْن حامِض
	١	700	مُزَّان كَبِيْر	٥	*17	لَيْمُوْن هِنْدِي
	٤	717	مُرّان مُسْتَدِيْر الوَرَق	٥	198	ليننارية خرشاء
	٣	717	مُرّان مَنّي	٣	Y•V	لينارية صغيرة
	٦	Αŧ	مُرَّانِيَّة بَيْضاء	١	AV	لِيْنَارِيَة صِنَاجِيَّة
	۲	*1*	مراهم أدَمِيَّة	٦	7.7	لِنَارِيَة عَادِيَّة
	۲	717	مَراهِمُ طَابِيَّة	7	***	الماء / ماء
	٧	777	مِرَة النَّوْر	٧	70.	ماءُ الحَياة
	٣	717	مَرْجان البَحْر	1	17	مَاتي
	٦	1 \$ 1	مَرْجانِيَّة سَوْداء	٧	778	مانینگا مانینگو
	٤	719	مَرْجانِيَّة مَخْزَنِيَّة	٧	***	ماتینگو
	*	137	مَرْدَكوش	٤	1 🗸 1	مارْزُوان
	٣	717	مَرْ ذَكُوْ شِ	٥	17	مَارُوْت
	٤	**•	مَرْشَتْتِيَة شَكَالَة	٧	101	مَارُوم
	٧	707	مَرْعان	٥	AY	مَازَرْيُون
	٧	101	مَوْمَاخُور	٧	***	مازَرْيُوْن
	*	737	مرهم شمعي	*	۲۱	ماشو
	٣	*14	مَرُّوخ	1	777	مَاطَرْشِلْبَه
	٤	***	مَرُوخ الغليشرين	۲	Y • 9	ماناكا
	1	٣٠٣	ده. مریر ده مریرة	٣	Y • 9	ماهاليتا
	١	3 • 7	مُورَة مُريرة	٥	**	ماهُوغُون
	٤	111	مُرَّيْرَة تشاد	٤	377	ماھُڙن
	٧	١٢٥	مُرَّيْرَة الغابُون	٥	**	ماهُون
	٤	111	مُزَّيْرَة كُمْب	٥	۸Y	مَثْنَان
	٧	140	مُرَّيْرَة لَطِيفَة	٥	٤٤	مِجْزَاعَة مِجْزاعَة بَرُيَّة
	٣	١٠٨	مِريْس مِريْس	٧	177	مِجْزاعَة بَرَّيَّة
	4	199	مَرْيَمِيَّة	٤	711	مِحْجِيْن عَرِيْضُ الْوَرَق
	٣	771, 371	مُرَّيْرَة كُمْب مُرَّيْرَة كُمْب مِرْيَس مَرْيَمِيَّة مَرْيَمِيَّة مَرْيَمِيَّة مَرْيِمِيَّة مَرْيِمِيَّة	٦	7.7	مَحْلَب
	٧	1 • 9	مَزْرِيْطَة	Y	141	مَحْمُودَة
	4	787	مِزْمَار الراعِي السّنانِيّ	١	400	مِخْلَبُ الشَّيْطَان
	٥	777	مِزْمَارُ الرَّاعِي المَاثِيِّ		7.7	مُخَلَّصة
٤٥٧	۲	770	مُشتَخْلَص الْخَسَ (عَصير)		411	مِجْزَاعه بریه مِحْجِیْن عَرِیْضُ الوَرَق مَحْمُودَة مِخْلَبُ الشَّیْطَان مُخَلِّصة مُخَلِّصة مُدِرَّة مَخْزَنِیَّة

ڎ	<u>ص</u> ۳٦٠	مدخل مَغْث غَرَوِيٌ	<u>ج</u> ۱	<u>صق</u> ٦٤	مدخل مُسْتَدِرَّة شائِعة	م س ت
1	780	معت عروي مَغْث مِنْشَارِيّ		27	مستيره سايعه مُسْتَدِرَة مُرَّة	•
١	13	معت مِنشاري		0	مىنىدە مرە مَسْخُوق غُوا	
,	101	مَغْد مَغْد اشوَد	,	779	مستحوق عوا مِسْك	
٤	777	مُعَدُّ اسْوَدُ مُغَلِّسَرَةُ النَّشاء	`,	7.5	مِست مِسْك الجِنّ	
٤	772	معتشره الساء	,	77	يست الجِن مِسْك الجِنّ	
۵	**	مَنْكَة مَنْكَة	ľ	• •	يست البين مِسْكَ (مَصادِره الحيوانيَّة	
٧	Y 0 £	مَغْنُولِية بَحْريَّة اللَّون مَغْنُولِية بَحْريَّة اللَّون		771	وِسَبُّكُ رَصِّتُ وَرَدُ الْمُنْفِقِةِ) والنَّبَاتِيَّة المُنْخَتَلِفَة)	
۲	701	مَغْنُوْلِيَة كَبِيْرَة الزَّهْر		77	مُشكِر الحُوت	
٦	174	مفتر	۲	£ £	بر مُشْكِر الحوت	
٣	117	مُقْ	٣	18.	مِر مِشُواك الرّاعي	
٧	40	مُقْرِ	٥	107	مِسْیٰکَة	
١	۳۱	مِقْنَی مَقْر مَقْر حَقِیقِیّ مُقْل (صَفغ ال)	٤	7 £ £	مُشْتَرِكَة فِيرْجِبْنِيَّة	
۲	Y7.	مُقُل (صَمْع ال)	١	401	مُشْطَ الذُّنْبَ	
١	771	مُقْل الصَّيْف	۲	408	مُشْط الرَّاعِي	
٤	140	مُقْلَة القاضي		707	مُشْط الرَّاعِي البَرِّي	
٧	19.	مَكْلُورَة بُرْتُقَالِيَّة	٥	787	مُشْطُ الزَّهْرَآءِ الطَّوِيْل	
٦	١٥٠	مَكْلُوْرَة ثُلاثِيَّة التَّذَلُق	٦	737	مشكطرا	
٦	101	مَكْلُوْرَة كاليدونيا	٦	737	مشكطرا مشيرزور	
١	771	مَكْنانَة مَخْزَنِيَّة	١	701	مِثْمِش	
٦	7.7	مِكْنَسَة	١	407	مِشْمِشَة مُشْمَلَة مَبْذُولَة	
4	٤٥	مِكْنَسَة الأنْدَر	۲	700		
٤	79	مَلابار	٣	17	مِشْيُطَة	
۲	177	مَلاكِيَّة جَبَلِيَّة		T 3 T	مَصَّاصَة	
۲	771	مَلاكِيَّة خُرْجِيَّة		777	مَطَّاصَة صَغِيْرة	
٤	AFI	مَلَبَثُوُوم		141	مُصَّان	
٧	717	ملعٌ لامانيّ		377	مُصْطَقَى	
۲	771	مَلَز أُورُوبَة		377	مُصْطَكَاء	
١	717	مَلْسَج مِلْمَقِیَّة مَلْمَی مَلْمَی جَزیرة بُوربُون	١	۲۷۷	مُصَيْرِيْنَة مُضَاض أرْجُوانيّ	
١	777	مِلْعَقِيَّة	٦	770		
٤	777	مُلْعَى	٦	770	مُضَاض أَسْوَد	
٥	A37	مَلْعَى جَزيرة بُوربُون	٦	777	مُضَاض أُورُوبِّيِّ	
٥	A37	مَلْعَى زَرُقاء	٦	777	مُضَاض مَبْذُول	
١	777	مَلْعَى سَامَّة	١	١٦٨	مَضْعَف	
٥	437	مَلْعَی عَرَبِیّة	٦	107	مَضْمَضَة	
٧	707	مَلْعَی عَنَمِی مَلْعی مُنتَصِبَة مَلْفُرف مَلْفُرف أخْمَر	٥	144	مَطَّاط	
۲	777	مُلِعِي مُنتَصِبَة • • •	١	۸۴	مُغْبَلة	
Υ	Y7Y 	مَلْفُوف	٤	97	مَعْبَلَة مُعَسَّل مَغْث أَرْمَد	
۴	17.	ا مَلْفُوفُ اخْمَر	Υ	70 7	مَغَثُ ارْمَد	801

_	_		مدخل	_		مدخا
ن ب ق	<u>ج</u> ۷	<u>صن</u> ۲۵٦	<u>مَوْزِ الفَأَلِ</u> مَوْزِ الفَأَلِ	١	<u>ص</u> ۳٦٤	مدخل مَلِكَة المُرُوج
	۰	70.	مور المان مَوْز قرم	v	177	مَلُّه ل
	٥	70.	مور عرا مَوْز كاقْنْدِيش	1	۲۲۲	مَلُول مَلِيْسَّة مَلَيْطُة
	٥	Y0.	مَوْدَ لِيْفِي	•	70	مَلْنَعْقَة
	١	779	سور چيي مَوْز مَبْذُول	٧	177	مَلِيْنَةَ صَغِيْرة
	· V	707	مؤر الهند مَوْز الهند	v	177	مَلِيْنَة كَبِيْرَة
	v	Yov	مَوْز اليابان	1	777	مِعِرَّان
	٥	Y0.	مُوْزَة	۲	777	مَنَّ المُرَّان
	٤	٤١	گوشینا مُوشینا	١	77	مَثُنُور أَصْفَر
	٣	9	مُولُونُفُو	۲	PAY	مَنْدَراجُؤرا كُنْثَى
	٧	181	مُوْم	۲	PA7	مَنْدَراجُوْرا ذَكَر
	٤	744	مُونازِيا مُونازِيا	٤	Y • A	مَنْدَرين
	٥	307	و بینراجِیْنَا سَرْحَة	١	AY	چِين مَنْسُوب
	٧	١٧٦	مِيكَانيًا غواكُو	١	178	مَنْدَرِین مَنْسُوب مُنْسِیَه مَنْغا
	٥	119	ِ مِیْمُوزا	٤	70	مَنْغا
	٧	188	مِيمُوزا بَيْضاء		70	مَنْفُو
	٦	371	مِيْمُوزا العَنْبَر	۲	14	مِنْقار الكركي
	۲	* 7A	نارَجِيْل نارَجِيْل	٦	771	مَن ِي ْهُوت مَنِيْهُوت
	٣	777	نارَجِيْل بَحْرِيْ	٦	777	مَنِيْهُوت حُلو
	٣	777	نارَجِيْل سَيْشَل	٦	777	مَنِيهُوت مُرَّ
	7	۲۳۸	نَارَجِيْل مَعْرُوف	٦	771	مَنِيُوك
	١	TV1	نارِدِيْن بَرُّي	٦	771	مَنِيُوك حُلو
	١	*1	نارُّدِيْنَ بَرُّيِّ	7	***	مَنِيُوك مُرّ
	٥	707	ناردين ثلاثيَّة الأجْنحة	1	18	مِهْمَاز الجَوْدَر
	۴	744	ناردين الطّيب	٥	٧	مِهْمَاز الجَوْدَر
	١	TV1	نارِدِیْن مَخْزَنِیّ	7	٦	مِهْماز الجَوْدَر
	٣	777	ناردين هِنْدِيِّ	1	10	مِهْماز القَمْح
	٣	777	نارَئْج	٧	181	مُو
	٤	744	نارَنْج	٣	4	مُورُونُغُو
	۲	١٧٢	نارَنْج ناعِمَة	٤	744	مُؤْرِينْدا
	7	199	ناعمة مَخْزَنِيَّة	٦	777	مَوْز أَثْيُوبِيا
	١	177	نَانِخُوَاه نَانُوْخَه	٧	Y 0 V	مَوْز باشجُو
	١	177	نَانُوْخَه	1	779	مَوْز الجَنَّة
	٣	78.	نَبات (تَسَمُّم)	٦	777	مَوْز الجَنَّة
	٥	**•	نَبَات الشَّيْخ	٦	777	مَوْز الحَبَشَة
	٧	197	نَبات النار	١	414	مَوْز الرُّشْد
	١	***	نَبْق أَشْوَد		707	مَوْز السُّغْد
	۲	*78	نَبْق أَسْوَد (قِشْرة)	٧	707	مَوْز الصَّيْن
१०९	١	440	ا نَبْق پُورْش	١	414	مَوْز العُقَلاء

			ı			
<u>5</u>	ص	ملخل نَرْجِسُ الشُّعَراء نَرْجِس كَاذِب نَرْجِس المُروج نِشرِيْن نَشْفَة نَشْفَة	ج	ص	مدخل	ن ب ق
٣	<u>صن</u> ۲٤۳	نَوْجِسُ الشُّعَراء	Y	صن ۲۷۰	نَبْق پورْشِيانا اقشرة؛	O ÷ O
١	۲۸.	نَرْجِس كَاذِب	٥	1.4	نَبْق مُتَوَّادَف نَبْق مُشهِل نَبْق المَسِيْح	
١	۳۸٠	نَرْجِس المُروج	١	۲۷٦	نَبْق مُسْهِل	
١	441	نِسْرِيْن	۲	140	نَبْق المَسِيْح	
٣	٨٠	نَسْفَة	٦	111	بين المسيع نَبِّن المسيع نَبِّن نَجْم نَجْدِيَّة نَجِيْل زاجِف نَجِيْلِكَات عِطْرِيَّة نَجْلِيَّات عِطْرِيَّة نَحْلَة	
٦	137				نَيِيْد	
٥	AOA	نَشَاءُ البَطاطا		٤٩	نَيْن	
٧	377	نشاء البطاطا		***	نُجْم	
7	737	نَشَاءُ الذَّرَةِ الصَّفْراء		700	نَجْمِيَّة	
٧	377	نَشاءُ الرُّزَ		444	نجير زاجف	
٤	779	نَشاءُ القَمْح		***	نِجِيْل	
۲	***	ا نَشاءات		**1	نَجِيْلِيًّات عِطْرِيَّة	
۲	779	نَشاءات مَخْزَنيَّة	۲	777	نُخْلَة	
۲	***	ِ نَشاوات نَضَم شائِع	۲	777	نَحْلة إيطاليّة	
٤	78.	نَضَم شائِع نَضَم مِنْدِيَ نَعْنَاع الجَبَل نَعْنَاع المَنَافِع نَعْنَاع المَنَافِع نَعْنَم أَخْصَر نَعْنَم أَخْصَر	۲	777	نَحْلة عَرَبيّة	
۲	337	نَضَم هِنْدِي	۲	***	نَحْلة مِصْريّة	
۲	۲۸۰	ا نَعْناع	١	444	نُخَالَة	
1	Y 9 Y	نغناع الجبل	٣	737	نَخْلٌ كَرَنْبِينِ (جُمَّارَة)	
1	የ ለየ	نغناع المناقع	۲	***	نَخْل كَرَنْبِيّ (زيت)	
*	۲۸۰	نغنع	۲	**	نَخْل مَعْروف	
٥	709	المغنع أثيض	٧	3 7 7	نَخْلُ مَلَكِيّ	
۴	337	ا نَعْنُع أَخْضَر	۲	747	نَخِيْل	
٦	737	نَعْنَع أَطْحَلَ	۲	377	نَدَّ سُ نَبُّلِي نَدَّاف بَرُّي	
1	Y 9 V	نَعْنَع البَرّ	١	T 0V	نَدَّاف بَرُّيَ	
٤	137	نَعْنَعَ بَرُّي	٦	779	نَدْغ إِكْرِيتِي	
٦	737	نَعْنَع بَرِّي	۲	740	نَدْغ أَلبِيّ	
٣	4 5 0	نَعْنَع بُسْتانيّ	٦	• 3 7	نَدْغ بَرِّي	
٣	4 6 9	نَعْنَع جَعْدِيّ	۲	440	نَدْغ بُسْتانِيّ نَدْغُ جِبال كُبْنان	
١	474	نغنع الحقل	5	F07	نَدْغ جِبال لَبْنان	
٣	7 2 0	نغنع زراعي	7	4 \$ •	نَدْغ الْجَبَل نَدْغ صَعْتَرِيّ ندغ مِسْمارِيّ الشَّكُل	
٤	137	نَعْنَع سُنْبَلِيّ طَوِيْلِ الْوَرَق	٦	779	نَدْغ صَغْتَرِي	
٤	781	نَفْنَع صَفْتَرِيّ	٥	707	ندغ مِسْمارِي الشَّكُلُ	
٤	137	نَعْنَع طَوِيْلِ الْوَرَق	٥	707	نَدْغ مِسْمارِيّ الوَرَق	
1	474	ا نغنَع القَمْل	۲	777	نَدَى البَّحْر	
٦	737	نعنع جعدِي نَعْنَع الحَقْل نَعْنَع شِبْلِيّ طَوِيْل الوَرَق نَعْنَع صُعْتَرِيّ نَعْنَع طَوِيْل الوَرَق نَعْنَع طَوِيْل الوَرَق نَعْنَع القَمْل نَعْنَع المَاء	٣	737	نَدَى البَحْر	
٥	404	ا نعتع مشتذير الورق	1	777	نَدَى الشَّمْسِ	
	780	نَعْنَع مُفلَفل	١	۲۸۳	نَدْيَان	
٤	137	نَعْنَع مُفَلْقَلَ نَعْنَع يابانِيّ انَعْن مِنْشارِيّ	١	٣٨٠	نَرْجِس بَرِّيّ	
٥	720	ا نَغْث مِنْشارِيّ	١	* **	نَرْجِس جَبَلِيّ	٤٦٠

ه و ش	<u>ح</u>	<u>ص</u> ۲۸۳	مدخل	<u>ح</u>	<u>ص</u>	مدخ <u>ل</u> نعب
	۲		مِذْراسْتِس كَنَدِي	*	777	نقاس تَنَ امَر،
	•	177	هَدْيوم دَبَّابِيِّ	۲ -	۲۸۰	نَفَل أَبْيَضَ أَنَا الآتِ
	٧	144	َ هَرَاسَ ُ هُرْبُونَ مُقَلِّنَسَ	٦	737	نَفَل البَرْ نَفَل بَنَفْسَجِي
	٧	* 77 *	• • •	٧	979	
	٧ .	711	ا هُرْد مَامَان	`	707	نَفَل قَرْنيِّ تَنَا النَّا
	1	110	هَرْطَمَان 	\	777	نَفُل المَاءِ
	٧ .	77.	هَرْقَل بِينَامِة مِن مِن	٧,	770	نَفَلُ المُرُوجِ
	1	PA7	هِرَقْلِيَّة نافِعَة	`	777	نَفَل المَناقِع المَخْزَنيّ ::•
	۵	199	هَشَابِ	١	144	نَفِيْر نَفِير نِلْك
	۴	198	هَلْتِي مُضادَّة للزُّحار	۲ -	۸۸	بھیر اله
	0	777	َ هَلْتَى وَافِرَةُ الزَّهْرِ مَا مَا مَا مَا مُنْ مُورِ	7	1	يلك المام المام المامة
	٦.	7 E V	مَلَج مُلْمُوْش مُلْمُوْش	۲	88	نَمَّاءَة أَكِيْلاجِيَّة الوَرَق نَمْلَة كَلْفاء
	1	444	ا هلمۇش ئا ئا مە	٣	717	
	۴	198	هَلْی افریقیّۃ	٦ -	144	نَمْوَارُون أَنِيسُونِيّ رَوْرُون أَنِيسُونِيّ
	٦	787	هَلِيْج هِلْيُوتروب أوروبُّيّ	7	144	َنْمُوَارُونَ فِيُبَيَّارُد :ب
	۲	789	هِلْيُوتْرُوبُ اورُوبُقِ مُرْهُ مِنْهُ	٤	٥٨	نَنْزِي : عن اص
	1	44.	هَلْيُون مَخْزَنيَ مَانُو مَخْزَنيَ	١	799	نَوَّار أَبْيَض رَمَزَ أَمْ مَنَ
	١	44.	هَلْيُون مَغْرُوف	١	TA 0	نَوْفَر أَصْفَر
	٤	337	هَمامِلِيْس فِيْرجِيْنِيَّة	•	77.	نَوْمَان أَمْرَد
	٤	AY	هَنان 	٤	737	نَوْمان أَهْلَب
	٣	P37	مِنْ دُب	١	۳۸٦	نَیْدَمان
	٧	777	ِ مِنْدُ بِ	٦	337	نِيْفًالِيْن
	٧	AFY	هِنْدَبِ أَسْمَانِي	٣	717	نیل نئلة نیئلة صینیة
	٦	787	مِنْدَب أَسْنَانَ الْأَسَد	٣	7 2 7	نِيْلَة
	٣	40.	هِنْدُب سوريا	٦	44	نِئْلَة صِينِيَة
	٣	40.	هِنْدَب صَغير الرَّأْس	٤	737	نَيْلُوْفَرِ أَبْيَضِ
	٣	Y0.	هِنْدَبِ قَصيرِ المِنقار	١	440	يْئْنُوْفَر أَصْفَر
	٣	40.	مِنْدَب لبنان	٥	771	هال حَمَامًا
	٦	787	هِنْدَب مَخْزَنِيّ		787	هال ذُكُر
	٣	Y0.	هِنْدَب مِئْخار		787	هَال سِيْلَان
	*	3A7	هِنْدَباء بَرِّيَّة	۲	7.47	هال صَغِيْر
	٥	777	هِنْدَباء مُتَشَعَّبَة	٦	737	هال طَوِيْل
	٤	171	هِنْدَباء مُرَّة	٥	177	هَال عُنْقُودِيّ
	٧	١٧٦	هواكو	7	737	هال گبیر
	٧	77 A	هُوَائْغ نَان	7	737	هَالِ مُتَوَسّط
	*	VV	هُوْپِرْزِيَا	٣	٥٥	هالُوك كَبِيْر
	٧	779	هُوْرا البرازيل	٦	787	مَجْلِيْج
	٦	7 E 9	هُوْرا مُفَرُقِعَة		۲۸۸	هَدَال
173	٦	P 3 Y	هُوْشِيْرًا أَمْرِيكَيَّة	۴	٧٢	مَ دَبَة

_	_	رويا.	l _		te i.	
<u>ح</u> ۳	<u>صن</u> ۲۵۵	مدخل وَرْد مِنْوِيّ البَتَلات	٥	<u>من</u> ۲٦۲	مدخل هُوْلَارِيْنَا وَافِرَةُ الزَّهْر	ه و ل
,	707	ورد مِنوِي البلاث مَنْدِ النِّا	,	198	مود ریب وایره الرامر هَیْثَم المَکانِس	
£	701	وَرْد النَّيْل وَرَق النُّوزاغُو	,	198	كىيىم الىكايىن خىئىم ھرمي	
٤	707	وری امیوراعو وَذَال		337	سيىم سريي ھِيْدرُوكُونِيْل آسيويّ	
٤	707	وران وَزَالُ الشَّرْق		Yo.		
١	3.27	ورال الشّيع		797	هِيراسيُوم هِيْرَاسِيُوْم أَزْغَب	
٤	707	وران المسيخ وزال صِباغِيّ		707	يير.ييوم بركب هِيْراسِيُوم رِئوي	
٤	707	وران عب عِي وَزَال مُجَنَّح		70.	ئير ئيور ھ يٰضَمان	
٤	707	وزال مُسَهِّل وَزَّال مُسَهِّل		141	مينية البرازيل هيفية البرازيل	
١	498	وزَّال المَكَانِس	1	141	مِيْفِيَة الغُوَّيان هِيْفِيَة الغُوَّيان	
١	777	وَزُيَّةً فِضًّةً		779	مِیلُونیا صَفْراء هِیلُونیا صَفْراء	
٣	Y07	وَسْمَةُ الصَّبَّاغَيْن	٧	PTY	مِيلُونيا كارُولينا هِيلُونيا كارُولينا	
١	** 1	وَصِيْف	٦	۸۳	مِيُوفَارِيقُونَ مَخْزَنِي	
٦	77	وَصِيْف وَلْف	١	178	هَيُوْفَارِيْقُونَ مَغْرُوف	
٥	377	وِّنْكَا أَمْرِيْكِيَّة	٦	408	وَاتِ الْحَبَشَة	
١	797	وُنْكا صَغِيْرَة		499	وثا نِيَّة	
٧	**1	وِّنْكَا عُنْبِيَّةً		107	وَّ ثِيْر مَدَّاد	
٤	307	وَنْكا كَبِيْرَة		108	وَثِيرٌ مَدَّاد (زيت الــالطيَّار)	
٦	307	وَنْكَا لُبُنَانِيَة		7 8 0		
۲	FAY	وَيٰئِليَة مُنْبَسِطة الوَرَق		700	وَجُ وَدَح کسروان	
٣	٥٤	يا غزال دُور دُور		440	وَدَح مَخْزَنيّ	
٥	104	یا غَزَال دُور دُور	٤	701	وَ دَكَ	
٧	***	ياجَه	7	YY	وِدْنَة حِرِّيْقَة	
١	799	يَاسَم مَعْرُوف	٧	٨٦	وِدْنَة مِكْرارَة	
٥	**1	ياشئون	٦	17	وِدْنه	
٥	777	ياسَعِيْن	٦	307	وَرُخَة البَواسِيْر	
٥	777	ياسمين أبيض	7	307	وَرْخَة الحُقُول	
٥	777	ياسمين إشبّانيّ	*	7.77	وَرُّد أَخْمَر	
٥	777	ياسمين أضفر	٣	700	ورد باهِت	
١	777	ياسَمِيْن البَرّ	١	۲۸۱	وَرْد بَرِّيّ	
٥	Y7V	ياسمين البّر		397	وَرْد بَلَدِيّ	
٥	777	ياسَمين زَنْبَقيّ		3.27	وَرْد جُوْرِيّ	
١	777	يَاسَمِيْن عَرَاتِلِيّ		189	وَرْد الحِمار	
٥	777	ياسمين عُطْرِي		441	وَرْد السِّيَاج	
٥	777	ياسمين كبير الزَّهْر		397	وَرُد شَامِيّ	
٥	777	ياسمين مَخْزَنيّ		7A7	وَرُد الشَّمْس	
٤	197	ياسَمِيْن مِزْهار		477	وَرُد الصَّينيّ	
٥	777	ياسمين مُزَوّى الوَرَق		471	وَرُد الغَاب	
٥	777	ا يَاسَمين معروف	١	۳۸۱	وَرْد الكِلاب	773

ي و ھ	<u>ح</u> ٤	<u>ص</u> ١٣٩	مدخل	<u>ح</u>	<u>ص</u>	<u>مدخل</u>
پ د	٤	144	يَوْز	۲	73	ياسَمِيْن هِنْدِي
	1	44.	يَرْمَع	٤	T A	ياسَمِيْن هِنْدِي أَبْيَض
	۲	71	يئتر	٤	۳۸	ياسَمِيْن هِنْدِيَ أَحْمَر
	٣	**	يُشر دُهْنِيّ	٣	٤٠	ياسَمِيْن هِنْدِيّ أَصْفَر
	٤	170	يَعْقُوْبِيَّة	۲	73	ياسَمِيْن هِنْدِي مُسْتَدِقَ
	٧	1 • ٨	يغييصا	۲	***	يائشؤن
	٤	707	يَقْطِيْن	٣	71	يانْسُؤن صَغِيْر
	٦	177	يَقْطِيْن سُكَّرِي	۲	77	يانْسُوْن كَبِيْر
	4	79.	يقطينة	3	۳۸	يائشون نَجْميّ
	٦	707	يَلانْج يَلانْج	۲	***	يَبْرُوْح
	٧	٣.	يَنْبُوت نَيْن	۲	PAY	يَبْرُوْح أَنْثَى
	٦	371	يَنْك	۲	PAY	يَبْرُوْح ذَكَر
	٦	707	يُنُون عَذْب	١	{**	يَتُّوْع السُّحُور
	٦	Y 0 V	يُوپُون	1	8 - 1	يَتُوْعَ مُحَبُّحَب
	٥	*7	يُوكُّو	١	11	يَرْبَامَاتِي
	V	***	يُؤهِمْب مُعايِش	٦	77	يُربُع

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	ziz
Yellow Jasmine	4	3	Yew tree	163	2	73
Yellow Jasmine	267	5	Ylang-ylang tree	256	6	
Yellow loosestrife	207	4	Yog(h)urt	208	5	
Yellow navelwort	12	6	Zachum oil tree	247	6	
Yellow pagoda tree	40	3	Zanzibar balsam	44	5	
Yellow rhizome	319	1			•	
Yellow rocket	77	1	Zedoary	111	7	
Yellow temple tree	40	3	Zibeth	106	4	
Yellow thistle	5	6	Zizyphus	244	1	
Yellow water-lily	385	1	Zizyphus	154	6	

wil	Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page V	ol
72	Wild carrot	59	2	Wisdom hedge mustard	129	6
	Wild celery	317	1	Woad	256	3
	Wild celery	190	5	Wolf's bane	28	1
	Wild chervil	113	6	Wolf's bane	23	2
	Wild chicory	131	4	Wolf's-claw	113	1
	Wild jasmine	152	4	Wood	79	6
	Wild jujube	155	7	Wood	90	7
	Wild leek	182	4	Wood avens	85	1
	Wild leek	189	5	Wood night-shade	72	1
	Wild linden	171	1	Wood-oil	38	3
	Wild liquorice	135	6	Wood-sorrel	101	1
	Wild marjoram	155	2	Wood stachys	115	6
	Wild marsh beet	11	7	Wood tar	292	1
	Wild may apple	46	7	Wood-tar creosote	186	4
	Wild mint	242	6	Wood tree	203	l
	Wild narcissus	380	1	Woodloose	67	3
	Wild nard	21	1	Woolf's onion	191	1
	Wild olive tree	118	7	Woolly milfoil	4	6
	Wild passion flower	30	1	Woolly rockrose	197	3
	Wild purslane	12	5	Woolly safflower	172	6
	Wild rue	61	3	Worm grass	124	7
	Wild savager	79	4	Worm-killer	160	1
	Wild savager	73	5	Worm-killer of Brasil	96	6
	Wild spinach	22	1	Worm wood	1	1
	Wild strawberry	222	1	Wound-wort	48	1
	Wild tansy	237	1	Wound-wort	202	6
	Wild teasel	357	1	Yaourt	208	5
	Wilhelm's milfoil	4	6	Yarrow	7	1
	Willow thorn	5	1	Yellow bedstraw	174	2
	Willow weed	241, 267	1	Yellow bee wax	130	5
	Windhoek root	355	1	Yellow bugle	158	7
	Wine	76	5	Yellow chamomile	17	5
	Winter cherry	310	1	Yellow curcuma	319	1
	Winter cress	77	1	Yellow flowered gentian	79	1
	Winter-green	152	4	Yellow germander	67, 157	7
	Winter's bark	81	5	Yellow gilliflower	368	1
279	Winter's cinnamon	81	5	Yellow iris	138	2

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	wil
Water horehound	158	4	White iris	194	1	71
Water melon	31	4	White king's rod	27	6	
Water mint	243	6	White lily	167	1	
Water parsley	186	6	White maidenhair	191	5	
Water parsnip	186	6	White mallow	111	1	
Water pepper	274	1	White melaleuca	54	1	
Water robin	8	3	White melilot	73	2	
Water sorrel	71	3	White mint	245	3	
Wattles	119	5	White mint	259	5	
Wax flower	127	7	White mistletoe	388	1	
Wax tree	142	7	White mulberry-tree	68	1	
Waybread	346	1	White mustard	79	2	
Wayfaring tree	15	6	White myrtle	30	1	
Wayfaring tree	19	7	White nettle	340	1	
Welsh onion	52	4	White oak	131	7	
West indian gherkin	92	7	White opium poppy	119	1	
West indian sumach	295	1	White Pagoda tree	38	4	
Wheat ergot	15	1	White poplar	75	4	
Whey	241	2	White poppy	119	1	
White acacia	118	5	White ramee grass	96	5	
White acacia	133	7	White sandalwood	159	2	
White asphodel	27	6	White spiny caper	183	5	
White bindweed	341	1	White temple tree	38	4	
White birch	42	1	White thorn	161	1	
White blister of crucifers	338	1	White thorn	114	7	
White bryony	155	4	White veratrum	79	2	pt -
White capillaire	191	5	White water-lily	243	4	
White cedar	60	7	White willow	227	1	: 1
White chickweed	377	1	White worm wood	5	5	
White common caper-busch	183	5	Whorled heather	75	5	
White dittany	84	6	Whortle-berry	298	1	
White flowered jasmine	266	5	Wild angelica	261	2	
White fraxinella	84	6	Wild artichok	21	5	
White ginseng root	63	6	Wild baie tree	15	6	
White goose-foot	2	5	Wild balsam	167	7	
White henbane	44	7	Wild basil	198	5	
White horehound	261	1	Wild caper	167	6	£V •

ur	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
70	Turbeth	54	6	Violet	40	4
	Turf cotton-wool	171	3	Violet	38	6
	Turf wadding	171	3	Viper's bugloss	4	6
	Turgid wheat	197	2	Virginia snake-root	112	7
	Turkey wheat	147	1	Virginian witch hazel	244	4
	Turk's herb	260	5	Viscous rest-harrow	211	5
	Turmeric	211	7	Voa-Fotsy	184	7
	Turnesole	185	4	Wahoo	225	6
	Turnip rooted celery	185	6	Wake robin	8	3
	Turnip rooted chervil	114	6	Wall-flower	368	1
	Turpentine	50	2	Wall germander	144	6
	Tutsan	83	6	Wall goose-foot	109	7
	Twitch grass	378	1	Wall pepper	77	6
	Ukranian scabious	130	7	Wall rocket	58	2
	Upright hedge nettle	109	5	Walnut tree	81	l
	Useful nettle	96	5	Walnut tree	62	2
	Uva-ursi	248	1	Walnut tree	59	4
	Varec	279	1	Wart-grass	400	1
	Variegated aconite	16	6	Wart-wort	400	1
	Varnish-tree	16	3	Water	234	2
	Vegetable-glue plant	235	1	Water avens	58	3
	Vegetable-glue plant	190	4	Water betony	82	6
	Vegetable pitch	292	1	Water butter-cup	8	2
	Vegetable sponge	204	3	Water caltrops	146	4
	Vegetable wax	146	7	Water celery	85, 210	7
	Venerate star anis tree	31	7	Water chestnut	146	4
	Venetian sumach	135	2	Water cress	187	2
	Venomous sumach	119	6	Water dock	71	3
	Venus's comb	242	5	Water dock	74	4
	Venus's hair	321	1	Water drop-wort	145	7
	Venus's navelwort	15	2	Water figwort	82	6
	Venus's navelwort	12	6	Water forget me not	10	1
	Vermifuge albizzia	22	7	Water germander	12	4
	Vernonia vermifuge	180	7	Water germander	143	6
	Vervain	154	1	Water hemlock	218	1
::	Vesicatory hellebore	89	7	Water hemlock	145	7
1 4	Vine-tie ergot	13	1	Water hemp	112	I

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	tur
Sweet marjoram	213	3	Thorow-wax	69	5	69
Sweet maudlin	4	7	Thouarsi's voacanga	185	7	
Sweet rocket	82	1	Three foliate sumach	118	6	
Sweet scented basil	69	6	Thym scented basil	64	5	
Sweet-sop	173	6	Thyme	97	6	
Sweet-tangle	221	2	Thyme dodder	348	1	
Sweet violet	38	6	Thymelaea	83	5	
Sweet woodruff	22	1	Thymifoliate St-John's W	ort89	2	
Swiss-Ephedra	143	3	Tinctorial oak	123	6	
Sycamine	68	1	Toad flax	203	6	
Sylvan-cricket	63	7	Tomato	36	6	
Syrian organy	138	6	Tomentous germander	143	6	
Tabacco	52	6	Tonka-bean	162	4	
Tale-wort	102	1	Tooth-ache tree	87	3	
Tall nasturtium	312	1	Tooth-ache tree	156	4	
Talladonis	6	7	Toothpick	122	1	
Tamarind	55	6	Toothwort	88	1	
Tamarind tree	55	6	Torch thistle	135	4	
Tamarisk	1	6	Tormentil	145	5	
Tamarisk salt tree	l	6	Traveller's joy	362	1	
Tambayang stinking tree	58	7	Traveller's tree	103	4	
Tamepoison	157	2	Travelling eryngo	213	1	
Tanner's sumach	112	5	Trebizond tea	198	7	
Tansy	39	1	Tree of heaven	142	2	
Tapeworm plant	195	4	Trembling poplar	75	2	
Taro plant	58	7	Trilobate birth wort	112	7	
Tassel hyacinth	83	7	Trilobate worm-killer	112	7	
Tatarian buckwheat	244	3	Tripoli mullein	45	5	
Tayuya	52	6	True jalap	77	1	
Tea plant	197	1	True lavender	80	2	
Temple tree	42	2	True lavender	78	3	
Textile hemp	299	1	Truffle	217	2	
The James	122	4	Trumpet grass	161	6	
Thirsty thorn	124	6	Trumpet tree	136	4	
Thorn	99	5	Tuberous stachys	114	6	
Thorn-apple	133	I	Tulip tree	142	7	
Thorn tree	247	6	Turban	76	6	1743

spe	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
68	Speckled alder	256	2	Stinking ground-pine	178	4
7.5	Spignel	141	7	Stinking hellebore	77	3
7,	Spilanthes	81	7	Stinking mayweed	16	5
,	Spinach-dock	104	1	Stinking rue	175	1
	Spinage	10	3	Stinking wood	30	7
	Spiny burdock	141	7	Stinking worm-killer	96	6
	Spiny burrweed	141	7	Stone clover	243	6
	Spiny gooseberry	193	5	Strained basil	65	5
	Spiny rest-harrow	210	5	Strawberry tree	294	1
	Spiny sarsaparilla	270	1	Strong corydalis	170	6
	Spiny sumach	118	6	Styrax tree	225	2
	Spirit	96	3	Styrax tree	201	3
•	Spogel plantain	12	3	Succory	284	2
	Spogel plantain	214	5	Succory	131	4
	Sponge tree	124	6	Sugar-apple	173	6
	Spoon-wort	363	1	Sugar gourd	172	6
	Spurge	159	3	Sulphur weed	43	3
	Spurge flax	82	5	Sumach	112	5
v_{α}	Spurge laurel	82	5	Summer Adonis	6	7
	Spurge nettle	86	4	Summer-cypress	194	6
	Spurge olive	229	7	Summer pheasant's eye	6	7
$d_{\mathcal{F}_{\mathcal{A}}^{(i)}}(\mu)$	Squirting cucumber	283	1	Sun-flower	141	1
i dinggila	St. Ignatus bean	185	7	Sun-flower	166	2
	St. John's bread	116	1	Sun spurge	400	1
	St. John's wort	219	1	Sundew	386	1
	Stag-horn moss	113	1	Surinam wood	308	1
199	Star anis tree	38	1	Swallow tailed willow	227	1
$a_{i,j} := \frac{a_{i,j}}{a_{i,j}}$	Star of earth	223	7	Swallow wort	233	1
$p > \frac{att}{t}h$	Star thistle	303	1	Swamp-oak	192	5
	Starch	277	2	Sweet basil	65	5
	Stavesacre	141	4	Sweet-bay	251	1
	Ste Lucie cherry	207	6	Sweet chestnut	213	2
d^{α}_{p}	Steep grass	90	1	Sweet chestnut	188	6
	Stemless carlina	320	1	Sweet fennel	127	4
(-ig)	Stinging nettle	284	1	Sweet-flag	72, 245, 251	l
	Stinking celery	317	1	Sweet grass	22	1
EVY (1911)	Stinking chamomile	16	5	Sweet marjoram	241	2

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	HIBARBBBBBBB.
Shepherd's burse	336	1	Small-flowered milfoil	4	5	
Shepherd's clock	134	2	Small fruited fig tree	162	5	
Shepherd's needle	152	5	Small honey-wort	127	7	
Shepherd's rod	357	1	Small leaved basil	76	7	
Shittah tree	124	6	Small leaves linden	171	1	
Shittim wood	124	6	Small nettle	166	4	
Showy milfoil	3	6	Small sorrel	70	3	
Siberian rhododendron	145	4	Small worm-killer	99	5	
Sickle wort	295	1	Smaller ringed ipecacuanha	229	1	
Sieve	231	3	Smooth hawthorn	101	6	
Sifter	231	3	Smooth May tree	101	6	
Silk cotton tree	178	3	Smooth thapsia	94	7	
Silk vine	38	7	Snake bryony	176	2	
Silky cornel tree	194	7	Snake cucumber	169	6	
Silky dogberry	194	7	Snake flower	4	6	
Silky dogwood	194	7	Snake-weed	32	1	
Silky wormwood	6	3	Sneezewort	3	7	
Silver leaved daphne	84	5	Sneezing flower	16	1	
Silver nettle	96	5	Snow ball tree	17	2	
Silver scabious	130	7	Soaps	128	3	
Silver wattle	119	5	Soapwort	224	1	
Silver weed	237	1	Soft acacia	118	5	
Simulo	118	3	Soft haired basil	69	6	
Sinaica hawthorn	100	5	Soja bean	161	2	
Sinaica mullein	44	5	Sour-cherry	184	6	
Sinaica white thorn	100	5	Sour orange	238	3	
Single powders	222	3	Soursop	167	5	
Single powders	225	4	South american holly	61	1	
Single powders	229	5	South-sea rose	139	1	
Siris tree	25	5	Southern wood	304	1	
Skivert	139	7	Soya bean	161	2	a Spending
Skull cap	267	7	Spadic busch	219	7	The state of the s
Sky-blue bugloss	212	5	Spanish broom	253	4	
Sloe tree	131	1	Spanish oak	123	6	
Small bulrush	47	7	Spanish red thyme	113	7	
Small burnet	53	1	Sparrow-grass	390	1	And Shall
Small flowered caper-busch	184	5	Spearmint	244	3	

sal	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
66	Salomon's seal	76	2	Scenanth	7	7
	Salsify	134	2	Scordium	143	6
	Saltwort	15	6	Scorpioïd coronilla	21	6
	Samphire	208	1	Scorpion astragal	14	7
	Sand carex	180	1	Scorpion grass	10	1
	Sand sedge	180	1	Scotch pine	139	4
	Sandarach	113	3	Scotch thistle	21	5
	Sandarach tree	122	6	Scurvy-grass	363	1
	Sandbox	249	6	Sea algae	26	5
	Sand's centinode	33	3	Sea artemisia	2	1
	Sand's flea-wort	31	6	Sea buck thorn	5	1
	Sannine's herb	193	2	Sea eryngo	123	3
	Santoninum	135	2	Sea grape	170	2
. 7	Sarrasin corn	240	4	Sea lavender	11	7
."	Sarsaparilla	270	1	Sea-oak	279	1
	Sarsaparilla	160	3	Sea onion	23	1
	Sarsaparilla	180	7	Sea oinon	16	7
	Sarsaparilla of Jamaīque	168	6	Sea rose	139	1
: "i ;	Sassafras tree	120	2	Sea wormwood	2	1
	Sauce-alone	89	1	Sea wrack	279	1
4	Saudi incense tree	206	5	Seaside balsam	184	4
	Savin	1	4	See fennel	208	1
¥.	Savory of Crete	239	6	See weed	279	1
	Saw alder	245	5	Self-heal	295	1
	Saxifrage	132	2	Semen contra vermes	2	2
111	Scabious	110	3	Senna	112	3
	Scabious	116	4	Senna	114	5
	Scalefern	119	3	Septfoil	145	5
nigh Mgh	Scaly spleenwort	119	3	Serrulate sabal	173	1
	Scammony	109	3	Sesame	119	6
	Scammony of Alep	116	4	Sesban	117	3
M_{eff}	Scammony of Mexico	117	6	Setwall	111	7
- 14	Scammony of Smyrna	110	5	Shallot	209	2
	Scammony plant	132	2	Shave grass	19	3
97	Scammony plant	212	4	She-oak	192	5
	Scarlet oak	132	7	Shea butter	95	6
1111	Scarlet runner	177	2	Sheep's sorrel	70	3

			1			
Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	<u>Vol</u>	sal
Red oak	189	1	Roselle	183	4	65
Red pepper	275	1	Rosemary	276	2	
Red pimpernel	342	1	Rosemary	243	3	
Red quinin bark	338	1	Rosery pea	135	6	
Red raspberry	265	1	Rough bindweed	270	I	
Red-rot	386	1	Rough horsetail	19	3	
Red sand spurry	3	1	Rough sage	177	6	
Red sand wort	3	1	Roundfoliate mint	259	5	
Red sea aloe	27	7	Rowan	150	4	
Red sorrel	72	4	Royal fern	125	2	
Red temple tree	38	4	Royal herb	65	5	
Reed-mace	47	7	Royal laurel	316	1	
Resin	104	7	Royal wine palm	264	7	
Rest-harrow	343	1	Rue	111	6	
Rest-harrow	225	2	Running myrtle	396	1	
Rhapontic	97	5	Rupture-wort	260	5	
Rhododendron	179	2	Rustyback	119	3	
Rhodophyceae	18	6	Rye ergot	14	l	
Rhubarb	99	4	Sabin	1	4	
Rhubarb	90	6	Sacred bark	375	1	
Rhubarb	105, 108	7	Saddle tree	142	7	
Rhubarb of Palestine	98	5	Safflower	188	2	<i>t.</i>
Rib-grass	197	6	Saffron	162	1	10
Ribwort	197	6	Saffron	101	5	
Rice plant	3	3	Sage	173	3	I^{\prime}
Rocket	155	1	Sage apple	174	6	1
Rockfoil	130	2	Sage-leaved rockrose	222	7	
Roman chamomile	26	1	Sage of Bethlehem	93	1	ii.
Roman laurel	251	1	Sago	124	7	10, 300 1277 173 23 24
Roman nettle	192	7	Saint-Jacob's groundsel	125	4	
Roman wormwood	148	2	Saint Mary's thistle	324	1	
Roquette	155	1	Saint Peter's wort	165	1	
Rose-bag willow-herb	274	2	Sainte Sophie's grass	129	6	
Rose-bay	139	1	Salad burnet	53	1	'i . ; i
Rose-gall	149	5	Salad mustard	79	2	
Rose mallow	75	3	Salep	126	7	
Rosehip	140	1	Sallowthorn	5	1	· 2V7

pri	Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	Vol
64	Prickly avens	65	6	Purslane	38	2
	Prickly cedar	168	2	Pythagorean bean	233	2
	Prickly custard-apple	167	5	Quadrangular passion flower	17	6
	Prickly ivy	270	I	Quassia	308	1
	Prickly poppy	5	6	Quassia of Jamaïque	175	4
	Prickly water celery	210	7	Queen of meadows	364	1
	Priests'cap	226	6	Queen of meadows	163	7
	Prim	399	1	Quenn's gilliflower	82	1
	Privet	399	1	Quick	114	7
	Privy	399	1	Quince	115	4
	Pruinose dyer's grape	216	5	Quince tree	129	2
	Pruinose pocke	216	5	Quinin bark	189	3
	Prune tree	85	2	Quinsy-berry	322	1
	Prunus evernia	85	2	Quitch grass	378	1
	Pubescent bachelor's buttons	8	7	Racemose elder	48	7
	Pudding grass	382	1	Radicant sumac	119	6
	Pudding pipe tree	118	1	Radish	157	3
	Pulverisation mode	106	3	Raimbault combretum	235	1
	Pumice	80	3	Raimbault kinkelibah	235	1
	Pumpkin	290	2	Ramping fumitory	196	1
	Pumpkin	256	4	Ramsons	189	5
	Punk tree	39	5	Rape	230	2
	Purging buckthorn	376	1	Raspberry bush	265	1
	Purging cassia	118	1	Raspberry-bush	182	2
	Purging flax	206	7	Raspberry cane	265	1
	Purified water	238	2	Ratanhia	153	1
	Purple-apple	195	7	Rattle-root	26	1
	Purple clover	265	7	Rattlesnake milk-wort	41	6
	Purple crocus	191	1	Rea puccoon	139	3
	Purple crocus	125	6	Red cedar	145	5
	Purple ergot	14	1	Red cinchona	338	1
	Purple grape vine	186	6	Red clover	265	7
	Purple loosestrife	267	1	Red columbine	24	2
	Purple spindle tree	225	6	Red-Currant bush	215	2
	Purple spurge	12	5	Red grape vine	186	6
	Purple willow	156	2	Red Juniper	145	5
٤٧٧	Pursch tree	375	1	Red mulberry tree	59	7

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	pri
Paullinia	161	6	Pine-apple	37	1	63
Peach	92	2	Pink	167	5	
Peach tree	137	1	Pinnate leaved pilocarpus	57	2	
Peanut	269	1	Pipperidge	44	1	
Pear	6	2	Pistachio tree	161	4	
Pear tree	5	1	Plant (Intoxication)	240	3	
Pearl plant	211	1	Plantain	202	4	
Pellitory of Spain	137	3	Plantain-doronic	94	2	
Pennyroyal	382	1	Pocke	204	4	
Pennywort	13	6	Pæstum rose	394	1	
Peony	285	2	Poet's daffodil	243	3	
Peony of Kesrouane	255	3	Pointed leaved toad-flax	194	5	
Peppermint	245	3	Pointed persicaria	193	7	
Pepperwort	140	3	Poison hemlock	216	1	
Perfoliate honeysuckle	226	1	Poisonous hemlock	218	1	
Perfoliate St. John's wort	134	1	Poisonous sumach	130	7	
Perfumed cherry	207	6	Pollen	170	7	
Periwinkle	396	1	Pollitory of the wall	93	1	
Periwinkle	192	2	Polypody wall fern	25	1	
Pernod's wood	132	6	Pomegranate	104	2	
Perry's aloe	27	7	Pomegranate tree	156	1	
Persian buttercup	76	6	Pomelo tree	217	5	
Persian cyclamen	26	6	Poor man's herb	256	1	
Persian giant fennel	155 ;	4	Poor man's weather-glass	342	1	
Persley piert	214	7	_	124	-	
Peter's cress	208	1	Popinac Popinac		6	
Peyotl	50	6	Poplar charcoal	260	1	
Phaeophyceae	18	6	Possumwood	249	6	
Pichi	155	3	Pot-herb thyme	97	6	
Picktooth	122	1	Pot marigold	11	1	
Pigeon-pea	181	6	Potato	3	3	
Pigeon's-grass	154	1	Potentilla	58, 237	1	
Pilewort	236	1	Poterium	37	3	
Pill '	235	4	Poterium	34	4	
Pin-cushion flower	110	- 3	Powder	227	3	
Pin grass	54	3	Prangos of Hermon	136	6	
Pinaster	160	2	Prick-wood	225	6	٤٧٨

oft	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	<u>Vol</u>
62	Officinal erysimum	185	1	Pagoda tree	42	2
	Officinal gratiola	256	1	Paigle	165	1
्रिक्षाः १८५० । सम्बद्धाः	Officinal loosestrife	267	1	Pale flowered flax	204	2
	Officinal opium	12	4	Pale persicaria	241	1
(1) (1)	Officinal opium	14	5	Palestine scabious	117	6
	Officinal primula	165	1	Palm-marrow	68	7
	Officinal rue	175	1	Palma Christi	118	1
, i	Officinal saffron	162	1	Palma Christi	79	4
$\frac{n_i^{ij}}{n_i^{ij}}$	Officinal Simaruba	186	1	Paniculate arbute	170	5
	Officinal veronica	281	1	Pansy	59	1
	Oil lettuce	81	2	Panther strangler	94	2
	Old man	304	1	Pao-Pereira	25	6
	Old man's beard	362	1	Papaw	12	7
	Oleander	139	1	Papaw apple	41	1
	Olibanum tree	206	5	Papaw apple	25	6
	Olive tree	170	1	Papaya	41	1
	Olive tree	115	2	Papaya	32	2
	Onion	36	2	Papaya	25	6
	Onion	30	3	Paper reed	30	4
	Opiate	227	6	Papyrus	30	4
	Opiate	251	7	Para cress	81	7
	Opium	15	3	Paradise banana	232	6
	Opopanax	181	3	Paradise banana tree	369	1
	Orache	180	1	Paraguay tea	61	1
	Orange	33	2	Para's sarsaparilla	160	5
	Orange melon	148	6,	Pareira brava	34	7
	Orbicular cyclamen	130	6	Paris mushroom	252	1
	Orchis	123	2	Park-leaves	83	6
	Organy	129	3	Parsley	37	2
	Oriental hellebore	89	7	Parsley	32	4
	Oriental patience	74	6	Parsnip	140	2
	Oriental whortle-berry	198	7	Parsnip chervil	114	6
	Orpine	86	7	Pasque flower	207	1
	Orris-root plant	194	1	Pass flower	207	1
	Orthosiphon	30	5	Patchouly oil plant	28	3
	Osage orange	190	7	Patience	104	1
£ V 4	Ox-eye	9 /	/ 1	Patience	68	3

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	off
Moon hedge cactus	209	1	Мугтһ	108	3	6 1
Moschus	229	3	Myrtle sedge	245	1	
Moschus	231	4	Myrtle spurge	167	6	
Moschus eryngo	112	5	Nabk tree	111	6	
Moschus root	112	5	Naked ladies	191	1	
Moschus sumbul	112	5	Naked ladies	125	6	,
Mossberry	199	7	Nard	237	3	•
Mother wort	219	1	Navelwort	12, 13	6	
Mother's heart	336	1	Neapolitan medlar	100	6	
Mothmulleine	47	7	Nectandra perchury-mayor	24	3	
Mountain alkanet	16	1	Nept	293	1	
Mountain arnica	16	1	Nettle leaved basil	64	5	
Mountain ash	150	4	Nettle leaved goose-foot	109	7	
Mountain avens	63	4	New Zealand spinach	51	2	
Mountain hemlock	34	1	Nicker tree	41	3	
Mountain laburnum	138	7	Nicotiana	52	6	
Mountain laurel	210	2	Night scented cestrum	124	4	
Mountain lotus	352	1	Nile papyrus	30	4	
Mountain parsley	209	7	Ninzi	58	4	
Mountain savory	240	6	Noble hawthorn	161	1	
Mountain spinach	180	1	Noble laurel	251	1	
Mountain tobacco	16	1	Norway-spruce	4	2	
Mouse ear	392	1	Nose bleed	7	1	
Mouse-thorn	303	1	Noxious hemlock	218	1	
Mugget	168	1	Nut gall oak	132	7	
Mugwet	22	1	Nut-grass	128	i	
Mugwort	219	1	Nutmeg tree	61	2	'a
Mullein	63	1	Nux vomica tree	132	6	ir one di
Mullein	44, 45	2	Oats ergot	13	1	
Mullein	44	3	Odoriferous agrimony	170	7	$\frac{1}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}$
Mushrooms	183	2	Odoriferous graminaceae	271	2	
Musk - erodium	152	5	Odoriferous milfoil	5	5	
Musk mallow	67	4	Odoriferous olive tree	119	7	
Musk milfoil	7	2	Odoriferous osmanthus	119	7	
Musky bugle	158	7	Odorous wormwood	159	4	
Musky gourd	172	6	Officinal charcoal	180	2	
Myrobalan	22	3	Officinal creosote	186	4	EAT

_	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
	Marsh trefoil	383	1	Medium plantain	223	7
	Marsh wound-wort	114	4	Melaleuca	39	3
	Martagon-lily	108	2	Melaleuca	37	4
	Marum germander	158	7	Meleguetta pepper	246	6
	Maryland's spigelia	111	4	Melilot	105	1
	Masterwort	51	1	Melon	146	2
	Masterwort	220	7	Melon tree	25	6
	Mat sedge	116	6	Membranaceous nettle	192	7
	Maté	61	1	Menthol	267	2
	Matico plants	228	7	Meu	141	7
	May bush	114	7	Mexican capillaire	192	5
	May lily	168	1	Mexican sabal	173	1
	May thorn	161	1 1	Mexican sarsaparilla	161	3
	Maypop	30	1	Mexican tea	5	2
	Meadow bitter-cress	67	5	Mezereon	82	5
	Meadow bitter-cress	78	7	Mezereon	229	7
	Meadow clover	265	7	Midsummer men	86	7
	Meadow narcissus	380	1	Milfoil	7	1
	Meadow parsnip	389	1	Milfoil	3	5
	Meadow saffron	191	1	Milk thistle	324	1
	Meadow saffron	125	6 j	Milk weed	64	1
	Meadow 'saffron	133	7	Milk-wort	64	1
	Meadow-sweet	364	1	Millet	90, 91	2
	Meadow-sweet	163	7	Minor bachelor's buttons	9	5
	Medical cigarettes and cigars	121	2	Mint	280	2
	Medical cigarettes and cigars	126	7	Mixture	246	2
	Medicinal beer	46	5	Mixture	244	4
	Medicinal bread	79	6	Mixture	227	5
	Medicinal candles	148	7	Mixture	239	7
	Medicinal cream	213	2	Mock-cypress	194	6
	Medicinal hemlock	216	1	Mock privet	143	7
	Medicinal leech	148	4	Money-wort	232	2
	Medicinal squill	23	1	Monk's basil	64	5
	Medicinal squill	16	7	Monks hood	28	1
	Medicinal tea speedwell	281	1	Monogynous dodder	204	4
	Mediterranean false orpine	207	5	Monogynous hawthorn	161	1
	Mediterranean medlar	100	6	Moon-fern	227	2

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	mar
Lippi's verbena	353		Mahogany tree	234	4	59
Liquorice plant	192	1	Mahogany tree	22	5	
Liquorice plant	119	4	Maidenhair	321	1	
Little chestnut tree	189	6	Maidenhair tree	83	1	
Little indian cress	185	5	Maize	147	1	
Little leafed star anis	31	7	Major honey-wort	127	7	
Livelong	86	7	Major wax flower	127	7	
Liver anemony	206	1	Malabar cinnamon	164	5	
Liver tree	203	1	Malabar nightshade	29	4	
Liver windflower	206	1	Malabar nut tree	2	3	
Liver wort	253	1	Male fern	176	1	
Liverleaf	206	1	Male nephrodium	176	1	
Locust tree	116	ı	Male polypody	176	1	
Log wood	37	7	Mallow bindweed	208	5	
Long birthwort	99	5	Mandarin orange	208	4	
Long pepper	162	3	Mandioc plant	231	6	
Long rooted curcuma	211	7	Mandrake	288	2	
Long worm-killer	99	5	Mandrake	46	7	
Longwort	96	1	Mango tree	25	4	
Loosestrife	267	1	Manila hemp	250	5	
Lotus jujube	155	7	Manipulate flowers heath	75	5	
Lotus tree	155	7	Manna	266	2	
Lousewort	141	4	Manna-ash	212	3	
Lovage	34	1	Manna-ash	213	4	
Love apple	36	6	Maple-tree	175	3	
Lucern	162	3	March flower	38	6	
Lucky banana	256	7	Marchant's hepatic	220	4	
Lung-wort	93	1	Margosa tree	103	6	
Lustwort	386	1	Marine cineraria	126	3	
Lyre tree	142	7	Marocco gum tree	124	6	
Macassar-oil tree	256	6	Marsh betony	114	4	
Mackerel gooseberry	193	5	Marsh celery	317	1	
Mad-dog weed	226	5	Marsh crowfoot	85	7 1	
Madder	277	1	Marsh mallow	110, 111 41	6	
Madonna-lily	167		Marsch pestle		4	
•		1	Marsh rosemary	122	6	£AY
Magnolia	258	2	Marsh samphire	15	0	777

kno	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
58	Knot-weed	47	1	Lebanon barberry	34	5
	Knotted figwort	129	1	Lebanon periwinkle	254	6
	Kola-nut trees	335	1	Lebanon pipperidge	34	5
	Kombes strophanthus	111	4	Lebanon poppy	91	7
	Korean ginseng	78	1	Lebanon savory	256	5
	Kotschy's milfoil	5	5	Lebanosyrian organy	137	5
	Krameria root	153	1	Lebbek tree	25	5
	Kusso	195	4	Leek	209	2
	Laburnum	1	4	Leek	184	3
	Ladanum	220	2	Lemon-balm	366	1
	Ladanum-resin tree	204	5	Lemon grass	80	7
	Ladies' gloves	35	7	Lemon tree	205	3
	Ladie's smock	78	7	Lemon tree	208	4
	Lady fern	80	5	Lemon verbena	353	1
	Lady's fingers	202	6	Lent lily	380	1
	Lady's mantle	327	1	Lent rose	380	1
	Lake weed	274	1	Lentil	167	2
	Lamb's quarters	2	5	Lespedeza clover	347	1
	Lamb's tongue	223	7	Lesser bindweed	224	2
	Lanceolate plantain	197	6	Lesser cardamom	282	2
	Lanceolate water plantain	246	2	Lesser celandine	236	1
	Larch	221	2	Lesser dodder	348	1
	Large nettle	284	1	Lesser galangal	84	4
	Large rampion	6	1	Lesser hemlock	128	4
	Larger astrantia	220	7	Lesser ringed ipecacuanha	229	1
	Latifoliate water celery	186	6	Lesser snapdragon	128	6
	Laurel	251	1	Levant cotton plant	172	3
	Laurustine	15	6	Libanotus herb	193	2
	Lavender cotton	3	6	Lich-wort	93	1
	Lavender cotton	202	7	Lignum-vitae	149	3
	Leadwort	88	1	Lily of the valley	168	1
	Leaf-beet	184	1	Lima bean	165	6
	Lebanese chervil	108	5	Ling	187	1
	Lebanese daphne	85	5	Liniment	218	3
	Lebanese donkey fart	182	7	Lion's foot	327	1
	Lebanese organy	135	4	Lion's-leaf	81	6
273	Lebanese sorrel	70	3	Lion's-turnip	81	6

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	kno
Indian hemp	299	1	Jelly	239	2	57
Indian jujube	244	1	Jelly	210	4	
Indian jujube	154	6	Jelly	219	5	
Indian laburnum	118	1	Jelly	205	6	
Indian pink	124	7	Jelly	230	7	
Indian tobacco	349	1	Jerusalem thorn	131	6	
Indian wheat	244	3	Jew's ear	2	3	
Indicus color	247	3	Job's tears	17	3	
Inebriating Ava	272	1	Judas ear	2	3	
Inga	26	4	Jujube tree	244	1	
Inga	29	5	Jujube tree	154	6	
Inga	27	6	Jupiter's beard	124	1	
Insecticide plant	258	1	Jupiter's beard	84	2	
Intertwine fruit albizzia	17	6	Jupiter's beard	92	7	
Inula	103	2	Kamala	202	2	
Iris	115	3	Kapok	178	3	
Italian alkanet	35	1	Kât	163	5	
Italian arum	9	4	Kauri	194	4	
Italian may	143	4	Kauri's dammar	83	3	
Italian millet	91	2	Kawa-kawa pepper	272	1	
Italian poplar	108	1	Kawa-kawa schrub	272	1	
Italian stone pine	133	3	Kelp	279	1	
Ivy-leaved	87	1	Kenilworth-ivy	87	1	
Jaborandy of Pernambuco	76	1	Kermes oak	132	7	
Jack by the hedge	89	1	Khât	163	5	
Jalap plant	77	1	Kidney beans	178	2	
Jamaica dogwood	36	7	Kidney beans	156	4	
Japanese banana	257	7	Kidney-vetch	202	6	
Japanese ginseng	58	4	Kidneywort	12	6	
Japanese pagoda tree	157	2	King mithridates herb	253	1	
Japanese star anis tree	31	7	King's clover	105	1	
Jasmine	266	5	King's consound	147	6	
Jasmine boxthorn	98	1	King's rod fistulosous	28	6	
Jasmine of poetry	266	5	Kinkelibah	235	1	
Jatropha	87	4	Knee holly	182	1	
Java cudrania	151	6	Knight's-spur	147	6	
Javatea	30	5	Knot-grass	47	1	£A£

hen	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
56	Hen-bell	56	1	Hore radish tree	27	3
	Henbane	56	1	Horehound	181	2
	Henna plant	72	3	Horehound	157	4
	Heprose	381	1	Horned lotus	352	1
	Herb-bennet	85	1 .	Horse chestnut tree	286	1
	Herb Christopher	17	2 .	Horse-elder	149	1
	Herb ivy	158	7	Horse pipe	17	3
	Herb Louisa	353	1	Horse sorrel	74	4
	Herb of grace	175	1	Horse-thyme	198	5
	Herb of grace	111	6	Horsetail	330	1
	Herb of patience	104	1	Hound's berry	151	1
	Herb Paris	183	2	Hound's tongue	228	2
	Herb Robert	1	2	Huaco	176	7
	Herb Trinity	59	1	Hulwort	67	7
	Herba britannica officinalis	71	3	Huskiness plant	185	1
	Herbaceous periwinkle	271	7	Hybrid bugloss	213	5
	Herb'Alia	45	5	Hyoscyamus	56	1
	Hermon's aphrodisiac root	156	3	Hyoscyamus	40	3
	Heterospiny donkey's fart	183	7	Hypocist	92	3
	Heterospiny onopordum	183	7	Hyssopifoliate loosestrife	160	, ₄
	Hip	140	1	Iboga	25	3
	Hoary plantain	223	7	Ice plant	146	6
	Hog-berry	189	5	Iceland lichen	174	1
	Hog's fennel	43	3	Iceland moss	174	1
	Hogweed	389	1	Imperial fritillary	137	3
	Holarrhena	262	5	Incense	204	5
	Holly	60	1	Incense tree	206, 207	5
	Holly oak	123	6	Indian almond tree	23	6
	Holm	60	1	Indian banana	256	7
	Holm oak	123	6	Indian berry	118	4
	Holy basil	64	5	Indian Chestnut		
	Holy-herb	154	1		286	1
	Honduras's sarsaparilla	161	4	Indian Civet cat	106	4
	Honey lotus	105	1	Indian corn	147	1
	Honey-balm	49	3	Indian cress	312	1
	Hooded bindweed	341	1	Indian fig	134	4
140	Hooked horehound	261	1	Indian hemp	171	5

Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	Vol	<u>hen</u>
Grain of paradise	246	6	Gum-cistus	204	5	55
Granulated rockfoil	181	1	Gum-tragacanth plant	12	6	
Grapes	146	3	Gum tree	119	5	
Gravel grass	161	6	Gutta-percha	157	5	
Gravel saxifrage	181	1	Guyanese caoutchouc tree	182	5	
Great ben plant	197	6	Hachisch	299	1	
Great burnet	41	2	Hack-berry	189	5	
Great centaury	174	5	Hairy cucumber	148	6	
Great flowered sesban	140	7	Hare's ear	69	5	
Great pilewort	129	1	Hare's foot clover	243	6	
Great reed-mace	41	6	Harmal	61	3	
Great sanicle	327	1	Hart's tongue fern	179	1	
Great snapdragon	120	4	Hawkweed	392	1	
Greater ash-tree	355	1	Hawkweed	253	3	
Greater bindweed	341	1	Hawthorn	161	1	
Greater celandine	233	1	Hawthorn	99	5	
Greater plantain	346	1	Hawthorn	114	7	
Green frog	134	3	Hazel-nut tree	58	1	
Green hellebore	88	7	Hazel-nut tree	43	2	
Green mustard	140	3	Headed thyme	113	7	
Green ramee grass	96	5	Heart's ease	59	1	
Green sage	175	5	Heather	187	1	
Grindelia	151	4	Hedge-herry	184	6	
Gromwell reed	17	3	Hedge hyssop	256	1	
Ground cypress	202	7	Hedge maids	326	1	
Ground elder	126	1	Hedge mustard	185	1	
Ground ivy	326	1	Hedge pink	224	1	
Ground needle	152	5	Hedge-vine	362	1	
Ground nut	269	1	Heliotrope	249	3	
Ground oak	144	6	Helix	71	4	
Ground pine		7	Helmet flower	28	1	
Згочна рице Знасо	158	•	Helmet orchid	272	7	
Guaiacum gum tree	176	7	Hemlock	216	1	
Juanacum gum tree Juanabana	149	3	Hemorrhoids plant	236	1	
	167	5	Hemp	299	1	
Guarana Guinea	161	6	Hemp agrimony	112	1	
Buinea pepper	254	6	Hemp weed	112	1	

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
Fumigation	49	2	Germander	156	7
Fumiterre	196	1	Giant birthwort	113	7
Fumitory	196	1	Giant fennel	165	6
Gagroot	349	1	Giant reed-cane	170	3
Galangal	84	4	Gingelly	119	6
Galbanum	26	3	Gingili	119	6
Galbanum plant	26	3	Ginkgo	83	1
Galeopsis	56	3	Ginseng	78	1
Galeopsis	58	4	Gipsywot	158	4
Galingale	109	5	Glabrous strophanthus	125	7
Gall	232	7	Glacier wormwood	6	3
Gall oak	132	7	Glandular albizzia	17	6
Garden balsam	44	5	Glass-wool	197	7
Garden caprifoly	226	1	Glasswort	15	6
Garden cress	102	4	Glaucous coronilla	29	7
Garden iris	195	1	Globularia	150	5
Garden nasturtium	312	1	Glossy buckthorn	373	1
Garden pea	35	2	Glutinous alder	360	1
Garden sage	199	2	Gnidium	82	5
Garden sage	174	3	Goat blue weed	2	6
Garden sorrel	72	2	Goat's rue	361	1
Garden thyme	97	6	Goat's thorn	12	6'
Garland thorn	131	6	Gold flower	25	2
Garlic	89	1	Golden chamomile	26	3
Garlic	55, 209	2	Golden flower of Peru	141	1
Garlic mustard	89	1	Golden locks	25	1
Garlic-wort	89	1	Golden margaret	17	5
Gas plant	84	6	Golden-rod	168	5
Gean cherry	210	2	Golden shower	118	1
Gean cherry	184	6	Goldenleaves chestnut	189	6
Geneva bugle	151	6	Good king Henry	22	1
Gentian	60	2	Goose grass	237, 255	1
Gentian	59	4	Gooseberry bush	193	5
Geranium	174	2	Gooseberry currant	108	7
Geranium	152	5	Gourd	290	2
German chamomile	29	2	Gourd	256	4

Eng.	Eng. Page Vol		Eng.	Page	Vol	ful
Falcate eryngo	131	5	Fish-poison mullein	45	5	53
Falcate milfoil	5	7	Fistulous asphodel	28	6	
False acacia	105	2	Flea-bane	35	7	
False hellebore	9	1	Flea-mint	382	1	
False horsetail	17	3	Flea plantain	344	1	
False narcissus	380	1	Flea-wort	344	1	
False rhubarb	53	3	Flea-wort	29	6	
Fat-hen	2	5	Flea-wort	35	7	
Felonwort	72	1	Florentine iris	194	1	
Female oak	189	1	Florida cornelberry	173	6	
Female polypody	80	5	Florida dogberry	173	6	
Fenugreek	98	1	Florida dogwood	173	6	
Fetid dragon's wort	63	3	Florida star anis tree	22	6	
Fetish banana	256	7	Floss blue flower	2	6	
Feuberry	169	7	Flour	141	5	
Fever-few chrysanthemum	173	3	Flower of St. Macarius	204	1	
Fever-wort	301	1	Flowering-ash	212	3	
Ficary	236	I	Flowering flag	195	1	
Field agaric	252	1	Flowering flax	180	4	
Field agrimony	253	1	Foetid horehound	263	1	
Field clover	243	6	Fool's parsley	128	4	
Field elm	138	1	Foxglove	142	1	
Field eryngo	213	1	Foxtail sedge	116	6	
Field eryngo	167	4	Fragile ephedra	242	1	
Field larkspur	147	6	Fragile nettle	169	6	
Field mint	241	4	Frangipani	38	4	
Field poppy	121	1	Frankincense	206	5	
Field worm wood	151	7	Frankincense tree	206	5	
Figwort	129	1	Fraxinella	84	6	
Filbert	58	1	French lavender	74	5	
Finger flower	142	1	French mercury	100	1	
Finger flower	102	2	French plum	82	3	
Finger flower	94	4	French rose	286	2	
Finger flower	88	5	Frerean incense tree	207	5	
Finger flower	87	6	Fringe-tree	99	3	
Finger flower	101	7	Fuller's herb	224	1	
Fish mint	243	6	Fuller's teasel	254	2	٤٨٨

dwa	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	<u>Voi</u>
52	Dwarf laurel	82	5	Embelia tanterakala	55	5
Market Commence	Dwarf nasturtium	185	5	Emblic-myrobalan	163	4
	Dwarf stinger	120	4	English elm	138	1
	Dyer's Anthemis	17	5	English galingale	109	5
	Dyer's grapes	204	4	English mercury	22	1
	Dyer's litmus paper	185	4	English plantain	197	6
	Dyer's madder	277	1	Ergot	14	1
	Dyer's oak	132	7	Ergot	7	5
	Dyer's rocket	81	4	Ergot	6	6
	Dyer's vine	186	6	Erigeron of Canada	19	1
	Eagle fern	88	3	Ers	186	3
	Earth almond	116	6	Ervil	186	3
	Earth-gall	301	1	Eryngo	123	3
	Earth nut	269	1	Erythrina	9	3
	Edelweiss	97	4	Erythrophleum	10	4
	Edible cyperus	116	6	Estragon	163	2
	Edible mushroom	252	1	Ethiopian banana	233	6
	Egg	46	2	Ethiopian olibanum tree	207	5
	Egg-plant	41	1	Eucalyptol	32	5
	Egyptian acacia	120	5		32 27	2
	Egyptian arum	176	6	Eucalyptus		
	Egyptian balsam	247	6	Eucalyptus	24	3
	Egyptian chard beet	184	1	Euphorbium gum-plant	171	2
	Egyptian colocasia	176	6	Euphrasy	231	1
	Egyptian lupine	51	2	European beech	159	1
	Egyptian towel gourd	204	3	European campanula	168	2
	Ehrenberg organy	152	7	European cyclamen	133	2
	Elaterium	283	1	European field cricket	63	. 7
	Elder tree	64	1	European leadwort	88	1
	Elecampane	149	1	European spindle tree	226	6
	Elegant aloe	20	6	Evening primrose	6	1
	Elegant centaury	173	5	Evergreen clematis	256	7
	Elixir	20	2	Evergreen coronilla	29	7
	Elixir	16	6	Evergreen oak	123	6
	Elixir	22	7	Fabiana	155	3
	Elm tree	138	1	Faham	156	3
213	Embelia	29	3	Fair-haired hyacinth	83	7

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	
Damascus milfoil	5	7	Distaff thistle	172	6	
Damask rose	394	1	Distilled water	238	2	
Dame's violet	82	1	Ditch reed	291	1	
Danchi plant	117	3	Dittander	140	3	
Danchi plant	140	7	Dittany of Crete	39	2	
Dandelion	249	3	Divaricate succory	262	5	
Dandelion	247	6	Dodder	215	2	
Danewort	126	1	Dog briar	381	1	
Daphne	82	5	Dog rose	381	1	
Date	49	3	Dog's fennel	16	5	
Date palm	273	2	Dog's mouth	120	4	
Dead nettle	340	1	Dog's-tooth-grass	53	3	
Deadly nightshade	51	1	Dogwood	191	2	
Deadly nightshade	34	3	Doll	181	6	
Decaisne colchicum	135	7	Donkey cucumber	283	1	
Decaisne meadow saffron	135	7	Donkey-fart	182	7	
Delicious blackberries			Donkey fart's artichoke	183	7	
bramble	144	3	Doria groundsel	121	3	
Depilatory	221	3	Double coco-nut	237	3	
Dermic cream	212	2	Doubtful nettle	192	7	
Derris	95	7	Downy bachelor's buttons	8	7	
Devil's apple	133	1	Drab ant	247	3	
Devil's apple	88	2	Dragon-bushes	203	6	
Devil's-bit scabious	37	7	Dragon gum-tree	51	3	
Devil's claw	355	1	Dragon's-blood	97	7	
Devil's fig	5	6	Dragon's-blood tree	167	3	
Devil's milk	400	1	Drias plant	94	7	
Devil's milk	159	3	Drinking water	236	2	
Devil's trumpet	133	1	Drum head cabbage	230	3	
Devil's trumpet	88	2	Dryas	86	4	
Diadem lady's mantle	215	7	Dutch mediar	255	2	
Diamond ficoides	146	6	Dutch rush	19	3	
Dierville	81	5	Dwale	51	1	
Diet bread	77	4	Dwarf banana	250	5	
Dill	201	1	Dwarf bay	82	5	
Dill-seed	201	1	Dwarf elder	126	1	
Diss ergot	13	1	Dwarf laurel	229	7	

cos	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
50	Costmary	70		Crowned lady's mantle	215	7
	Cotton plant	170	4	Crystal-tea	122	4
	Cotton thistle	21	5	Cubeb pepper	179	6
	Cotton weed	171	4	Cuckoo bread	101	1
	Cotyledon	12	6	Cuckoo flower	67	5
	Couch grass	378	1	Cuckoo flower	78	7
	Cough wort	265	1	Cuckoo-pint	8	3
	Country almond	23	6	Cucumber	86	2
	Cow-bane	218	1	Culin chive	109	6
	Cow-berry	196	2	Cumin	328	1
	Cow parsley	113	6	Cundurango	332	1
	Cow-parsnip	389	1	Cuneate savory	256	5
	Cow weed	113	6	Cuneifoliate savory	256	5
	Cow's lungwort	63	1	Cupress tree	126	2
	Cowslip	165	1	Сигаде	274	1
	Cranberry	169, 199	7	Curare and indian poisons	191	3
	Creeping bugle	228	1	Curare and indian poisons	193	4
	Creeping Jack	77	6	Curare and indian poisons	201	5
	Creeping potentilla	58	1	Curcuma	11	5
	Creeping thyme	128	2	Curcuma	211	7
	Crenate birthwort	99	5	Curled chondrus	306	1
	Creosote	187	3	Curled mint	245	3
	Cretan astragal	11	6	Curled sorrel	73	4
	Cretan cistus	197	3	Currant fruited rhubarb	108	7
	Cretan eryngo	167	4	Curry	319	1
	Cretan germander	157, 159	7	Curving cucumber	169	6
	Cretan rockrose	197	3	Cuspidate cudrania	150	6
	Crocus	162	1	Cuspidate maclura	150	6
	Crocus	101	5	Custard-apple	173	6
	Crosswort bedstraw	150	4	Cyanophyceae	18	6
	Crotalus milk-weed	41	6	Cyclamen of Lebanon	121	4
	Croton-oil plant	187	6	Cymbalaria	87	1
	Crotte lichen	79	5	Daffodil	380	1
	Crowberry	153	2	Daisy	55	1
	Crowfoot	73	3	Dalmatian feverfew	258	1
	Crowfoot	75	4	Dalmatian pyrethrum	258	1
۹١	Crown-vetch	28	5	Daman of Cape	250	4

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	COS
Common germander	144	6	Common sanicle	117	4	49
Common ginger	109	2	Common service tree	172	7	
Common gromwell	211	1	Common silver fir tree	55	5	: I.;
Common groundsel	204	1	Common speedwell	281	1	. 19
Common heath	187	1	Common strawberry	222	1	
Common hemp	198	2	Common strawberry	149	2	4.4
Common hemp	171	5	Common sugar cane	171	3	
Common honeysuckle	137	5	Common tansy	94	1	
Common hop	91	1	Common tooth-wort	89	6	
Common horehound	263	1	Common valerian	371	1	
Common horse-radish	250	6	Common vanilla-plant	286	2	
Common house leek	124	ı	Condor plant	332	1	
Common hyssop	100	3	Condurango	332	1	
Common hyssop	106	4	Congo-pea	181	6	
Common inula	149	1	Conserve	243	5	
Common Ivy	238	1	Conserve	252	7	
Common Juniper	138	3	Copal	113	3	
Common Juniper	143	4	Coral	213	3	
Common lavender	82	4	Corallina of the shops	219	4	
Common lettuce	79	3	Cordate lime tree	171	1	
Common lilac	13	3	Coriander	187	3	
Common mallow	110	1	Cork oak	117	5	
Common meadow-rue	53	3	Cork tree	117	5	
Common medick	162	3	Cork wood	195	7	
Common mistletoe	388	1	Corn chamomile	16	5	
Common mother-wort	157	4	Corn-flower	67	1	
Common nipplewort	80	3	Corn poppy	121	1	
Common oats ergot	13	1	Corn rose	121	1	
Common orange tree	45	1	Corn salad	111	3	
Common pick-needle	54	3	Corsican alsidium	141	6	
Common pick-needle	153	5	Corsican moss	141	6	
Common polypody	25	1	Corydalis	191	7	
Common reed	291	1	Corydalis of Lebanon	170	6	
Common rue	175	1	Corymbiferous cranberry	177	6	
Common rue	111	6	Cos's cyclamen	130	6	
Common rye	126	3	Cost	39	1	
Common rye ergot	14	1	Costmary	39	1	793

clo	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page \	/ol
48	Clove	182	3	Common asparagus	390	1
	Clove pink	168	4	Common banana tree	369	1
	Clove scented broom-rape	55	3	Common beech	159	1
	Clove tree	190	2	Common beech (fruit)	108	2
	Clover	280	2	Common blue passion flower	24	5
	Clover dodder	348	1	Common borage	102	1
	Clown's all-heal	114	4	Common box tree	50	1
	Club moss	113	1	Common boxthorn	64	3
	Clustered cardamom	261	5	Common bramble	247	1
	Coca	218	2			
	Coca	219	7	Common buckthorn	376	
	Cocaine	193	3	Common bugle	228	1
	Cocculus indicus	118	4	Common calamint	297	1
	Cockle bur	253	1	Common caprifoly	226	1
	Cockles plant	118	4	Common caraway	185	3
	Cocoanut palm	238	6	Common carline	212	7
	Cocos-nut tree	268	2	Common cat's ear	34	1
	Coffee-beans	41	7	Common cat's-foot	34	1
	Coffee tree	55	1	Common centaury	174	5
	Coffee tree	41	5	Common chickweed	377	1
	Coix millet	17	3	Common clinopodium	198	5
	Cola-nut	335	1	Common columbine	36	1
	Colchicum	191	1	Common comfrey	333	1
	Colchicum	125	6	Common cornel tree	192	2
	Colic wort	214	7	Common cultivated oat	115	1
	Colocasia eatable arum	176	6		174	6
	Colocynth	106	1		72	5
	Colombo	289	1		143	4
	Colt's foot	265	1.7			
	Columba root	289	1	, ,	213	1
	Common alder	360	1		231	I
	Common alkanet	35	1		145	2
	Common almond tree	350	1	ŭ	69	1
	Common almond tree	232	2		54	2
	Common aloe	31	1	Common flax	313	1
463	Common ash-tree	355	1	Common-fleabane	103	2

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	clo
Cascara	375	1	Cherry laurel	316	1	47
Cashew-nut	177	5	Cherry tree	315	1	
Cashew-nut tree	33	6	Cherry tree	211	2	
Cassia	112	3	Chervil	113	4	
Cassia	124	6	Chestnut foliate oak	132	7	
Cassia tree	165	5	Chick-pea	67	3	•
Castor oil plant	118	1	Chicocke tree	179	6	
Castor oil plant	79	4	Chilean centaury	174	5	
Castoreum	168	3	China-grass	95	5	
Cat berries	193	5	China smilax	181	7	
Cat-mint	297	1	Chinese wormwood	5	6	
Cat thyme	67	7	Chinese banana	256	7	
Cat's milk	400	1	Chinese cinnamon tree	165	5	
Cat's-tail	41	6	Chinese root	181	7	
Cat's valerian	371	1	Chirimoyas	195	7	
Catalpa	180	4	Chirurgical lamina	196	6	
Catch-weed	255	1	Chlorophyceae	17	6	
Catechu	175	4	Chocolate	124	3	
Catechu tree	137	2	Chocolates	129	4	
Cathartic flax	206	7	Christ's thorn	125	2	
Catmint	293	1	Christ's thorn	111, 131	6	
Catnip	293	1	Christmas	60	1	
Caudate nettle	192	7	Christmas-rose	78	2	
Cautery	262	7	Cinchona	189	3	
Cavendish banana	250	5	Cinnamon	189	2	
Celandine	233	1	Circinate cornel tree	194	7	
Celery	182	4	Circinate dogberry	194	7	
Celery	185	6	Circinate dogwood	194	7	
Celery leaved crowfoot	85	7	Cistus	220	2	
Centaur herb	301	1	Clary	177	6	
Centaury	301	1	Clay	164	2	
Centinode	4 7	1	Cleavers	255	1	
Cevadilla	129	7	Clematis	262	2	
Chalepens rue	113	4	Clematis	236	4	
Chamomile	26	1	Climbing hedera	238	1	
Charcoal	260	1	Clouston's tange	223	2	
Chate of Egypte	148	6	Clouston's tangle	223	2	१५१

but	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
46	Butter-bur	167	3	Canadopotato	166	2
	Butter leaves	180	1	Canary creeper	312	1
	Butter plant	90	1	Cancerwort	194	5
	Butter wort	90	1	Candian savory	239	6
	Buttercup	74	2	Candle plant	84	6
	Buttermilk	241	2	Candy carrot	55	4
	Buttons	94	1	Cane apple	294	1
	Cabaret	21	1	Canker rose	381	1
	Cabbage	262	2	Canker-wort	247	6
	Cabbage palm	273	2	Canoe cedar	60	7
	Cabbage palm	242	3	Cantharis	91	3
	Cabbage tree	70	7	Cantharis	96	4
	Cocao tree	309	1	Cantor herb	185	1
	Cacao tree	179	3	Caoutchouc	182	5
	Cachou	175	4	Cap bean	165	6
	Cactus	135	4	Caper-spurge	167	6
	Caffeine	181	5	Caper tree	203	2
	Cafta	163	5	Capillaire	321	1
	Cajan-pea	181	6	-		_
	Cajeput oil tree	39	5	Caprifoly	226	1
	Calabar bean	186	7	Caprifoly	154	2
	Calamint	297	1	Caprifoly	137	5
	Calamint	170	4	Capsicum	275	1
	Calf's foot	8	3	Capsicum	163	3
	Calf's snout	128	6	Carapa oil-tree	174	4
	Calidonian maclura	151	6	Carbon	179	2
	Caltrops	303	1	Cardoon	68	2
	Camamel	26	1	Cardoon's shape donkey-fart	182	7
	Camel's hay	7	7	Cardoon's shape onopordor	182	7
	Campeachy wood	37	7	Carline acaulous	320	1
	Camphire	72	3	Carline thistle	212	7
	Camphor	179	3	Carnation	168	4
	Camphor tree	202	2	Carob tree	116	1
	Canadian avens	65	6	Carragaheen	306	1
	Canadian capillaire	191	5	Carrageen	306	1
	Canadian horse-mint	33	4	Carrot	54	3
	Canadian hydrastis	283	2	Carter incense tree	206	5
190	Canadian maidenhair	191	5	Carthaginian apple	156	1

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	. Skint .
Bloody finger	87	6	Bread-root	74	3	45
Bloody finger	101	7	Break stone	214	7	14 July 1 16 mag ni
Blow-ball	247	6	Brewer's yeast	127	1	
Blue acacia	133	7	Bristle-fern	107	3	
Blue-bottle	67	1	British oak	189	1	
Blue daisy	172	2	Brittle maidenhair	192	5	
Blue flower de Luce	195	1	Brittle seagrapes	242	1	
Blue money	207	1	Broad bean	184	2	
Blue weed	4	6	Broad leaved hog's fennel	51	1	
Bog-bean	383	1	Brook	82	6	
Bogberry	169	7	Brook mint	243	6	
Boldo	203	1	Brooklime	185	2	
Bonduc	41	3	Broom cytisus	394	1	
Bonduc	104	4	Broom reed	291	1	
Boon tree	64	1	Broom schrub	394	1	
Borage (flower)	103	5	Brown flower	295	1	
Borage (flowering head)	95	5	Brown rayed knapweed	201	7	
Bottle brush	17	3	Bruise-wort	55	1	
Bourbon-lily	167	1	Brunette	295	1	
Boustani's cyclamen	122	5	Brushwood persicaria	171	6	
Bow-wood tree	190	7	Buck-bean	383	1	
Bowman's root	62	4	Buck wheat	240	4	
Bowman's root	59	5	Buck's horn	68	4	
Box holly	182	1	Buck's-horn plantain	223	7	
Brack fern	88	3	Bug-bane	26	1	
Bracteolate rue	113	4	Bug-bane	18	2	
Bramble	171	2	Bugle weed	228	1	
Bran	379	1	Bugloss	35	1	
Bran mash	379	1	Bulbous corydalis	170	6	
Brandy	250	7	Bullace	131	1	14
Brandy-bottle	385	1	Bullock's heart	174	6	
Brazilian caoutchouc tree	182	5	Burdock	16	1	
Brazilian hevea	182	5	Burnet	53	1	
Brasilian sandbox	269	7	Burrweed	142	2	
Brazilian statice	10	3	Bush basil	76	7	
Brazilian tea	61	1	Butcher's broom	182	1	
Bread	75	3	Butter and eggs	203	6	193

bil	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page V	'ol
44	Bilberry	298	1	Black currant bush	322	1
	Bilberry	196	2	Black-fellows	62	3
	Bile	232	7	Black health	123	1
	Bine	91	1	Black hellebore	78	2
	Bird-berry	189	5	Black horehound	263	1
	Bird's foot	352	1	Black-horn	18	7
	Bird's foot trifoil	352	1	Black maidenhair	108	5
1,6	Bird's nest fern	179	1	Black milfoil	3	6
	Birthwort	9	2	Black mulberry	68	1
	Birthwort clematis	160	1	Black mulberry	52	2
	Birthwort of Brasil	96	6	Black-mustard	114	1
	Bishop's weed	83	2	Black nightshade	151	1
	Bishop's wort	48	1	Black oak fern	108	5
	Bistort	32	1	Black pepper plant	161	5
1	Biting clematis	362	1	Black poplar	108	1
	Biting persicaria	274	1	Black radish	179	2
	Biting stonecrop	77	6	Black salsify	89	2
$e^{-i\epsilon}$	Bitter ach	308	1	Black snake-root	26	1
* *	Bitter apple	106	1	Black spindle tree	225	6
	Bitter asch	42	4	Black spleenwort	108	5
	Bitter gourd	106	1	Black thorn	131	1
1 1 1	Bitter milk-weed	42	4	Black wort	333	1
	Bitter milk-wort	42	4	Bladder herb	310	1
	Bitter orange	238	3	Bladder-senna tree	300	1
	Bitter orange	239	4	Bladder wrack	279	1
	Bitter simaruba	186	1	Bleeding heart	368	1
	Bitter-sureet	72	1	Blessed carbenia	171	6
	Bituminous bread-root	76	4	Blessed centaury	214	1
	Black alder	373	1	Blessed thistle	214	1
	Black alder «bark»	268	2	Blessed thorn	214	1
	Black alder charcoal	260	1	Blind nettle	340	1
	Black anacardium	23	5	Blister hellebore	89	7
	Black berry	247, 298	1	Blood-root	139	3
	Black berry bush	68	1	Blood-root	145	5
	Black bryony	176	2	Blood-wort	139	3
d.	Black centaury	201	7	Bloody finger	142	1
E QV Tally	Black cumin	147	2	Bloody finger	88	5

Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	Vol	big
Azedarach	103	6	Bear's breech	19	2	43
Azerole tree	100	6	Bear's garlic	189	5	
Bachelor buttons	67	1	Bear's grape	248	1	4.
Bachelor's buttons	11	2	Beautiful corydalis	190	7	$\eta f_d = c_0$
Bael tree	42	6	Beautiful sorrel	76	6	
Balm-leaf	366	1	Bee	272	2	
Balm melittis	49	3	Bee-balm	366	1	
Balsam	40	2	Beech tree	159	1	
Balsam	34	6	Beef-wood tree	192	5	
Balsam	39	7	Beergherkin	92	7	
Balsam of Mecca	39	3	Bees plant	364	1	
Balsam tree of Peru	35	4	Beet	118	6	
Banana tree	369	1	Beet-root	210	1	
Banewort	51	1	Beggar's buttons	7	4	
Baobab	31	2	Bell heather	123	1	
Barbados aloe	31	1	Belote oak	123	6	
Barbary boxthorn	98	1	Belvedere	194	6	
Barbary fig	151	2	Ben-oil tree	31	2	
Barbary worm wood	151	7	Bent ephedra	242	1	
Barber's brushes	357	1	Benzine	42	3	
Barberry	44	I	Benzoin	42	5	
Barley	134	6	Berberry	44	1	
Barometer plant	320	1	Bergamot orange tree	46	1	
Barosma	43	2	Berry bearing glasswort	24	4	
Barren privet	103	5	Betel-nut palm	217	7	
Basil	88	1	Betony	48	1	
Basil	65	5	Bidistilled water	237	2	
Basjoo banana	257	7	Bieberstein's milfoil	4	5	al porta le di Alfania la la la la Alfania la
Bastrad balm	49	3	Big basil	65	5	
Bastard blue agrimony	2	6	Big bogberry	155	6	
Bastard nigella	73	5	Big cranberry	155	6	
Bastard pellitory	3	7	Big flowering torch thistle	209	1	
Bdellium	260	2	Big flowering worm-killer	113	7	
Bead tree	135	6	Big hemlock	216	1	
Bean-clover	30	7	Big horsetail	21	4	
Bean of Malacca	33	6	Big periwinkle	254	4	
Bear berry	248	I	Big Tayove	58	7	Harris ERA

ame	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
42	American erythrina	11	4	Areca-palm	217	7
	American ginseng	60	2	Argemone poppy	80	6
	American heuchera	249	6	Arghel	67	4
	American indian hemp	83	4	Argil	164	2
	American oak	131	7	Armstrong	47	1
	American aloe	27	3	Arn tree	64	1
	American periwinkle	264	5	Arnica	16	1
	American star anis	31	7	Arnotto	34	4
	Anemone	144	2	Arnotta tree	34	4
	Anemone	126	4	Агтоw-root	6	3
	Anet	201	1	Arsenic	97	6
	Angelica	96	1	Artichoke	10	2
	Angular centaury	175	5	Artichoke	3	3
	Angustifoliate water celery	210	7	Arum	7	3
	Aniline	22	6	Asafoetida	65	3
	Animal wax	137	6	Asarabacca	21	I
	Anise	288	2	Ash of Jerusalem	256	3
	Annato dye plant	34	4	Asiatic crowfoot	76	6
	Annual Adonis	7	2	Asiatic ginseng	78	1
	Annual mercury	100	1	Asiatic white-rot	244	4
	Annual pepper	275	1	Asp	14	5
	Annual savory	275	2	Aspargine	13	5
	Annual succory	262	5	Asphodel	30	4
	Antilles aloe	31	1	Assafoetida plant	26	2
	Aphrodisiac prangos	136	6	Asse's pepper	240	6
	Apple tree	50	4	Ass's foot	265	1
	Apricot	358	1	Asthma weed	349	1
	Apricot tree	358	1	Astragal	13	2
	Arabian tea plant	163	5	Astragal	15	7
	Arabic costus	168	3	Aubergine	41	1
	Arabic kust-root	168	3	Autumn colchicum	133	7
	Arar tree	115	5	Autumn crocus	191	1
	Arborescent basil	64	5	Autumn crocus	125	6
	Arborescent scented basil	69	6	Ava pepper	272	1
	Arbute	294	1	Avens	85	1
	Arbutus	294	1	Avocado pear	40	1
199	Archangel	96	1	Ayapana	27	4

English Index

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
Abaca plant	250	5	Alaternus	103	5
Abelmosk	67	4	Albizzia anthelminthica	41	4
Abraham's balm	119	3	Alcohol	187	5
Abrotanum	304	1	Alder buckthorn	373	1
Absinth	1	1	Alexander's foot	137	3
Absinth tree	132	6	Alexander's horse parsley	190	5
Absinthium	1	1	Alfalfa	162	3
Abyssinian aloe	20	6	Alkalies and Alkaloids	198	7
Abyssinian banana	233	6	Alkanet	200	5
Abyssinian capillaire	191	5	Alkekeng	310	I
Abyssinian maidenhair	191	5	All-heal	295, 371	1
Acetone	14	2	All-heal	181	3
Acid	64	2	All Saint's-wort	83	6
Acinos	275	2	Alleluia	101	1
Aconite	28	1	Allgood	22	1
Aconite	21	2	Alligator apple	195	7
Acrid lettuce	82	4	Alligator pear	40	1
Acuminate Pagoda tree	42	2	Almond	350	l
Adam's fig	232	6	Aloes	139	2
Adder wort	32	1	Aloes	116	3
African civet cat	99	3	Aloes	25	7
African millet grass	164	2	Alphabet plant	1	2
African pepper tree	254	6	Alpine caprifoly	138	6
African plantain	344	I	Alumroot	249	6
African voacanga	185	7	Alypo globe daisy	150	5
Ageratum milfoil	4	7	Amber	149	3
Agreeable strophanthus	125	7	Amee	83	2
Ague grass	69	4	American cress	77	1

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	<u>Vo</u>	ziz
Vernonia nigritiana	35	7	Vitis nigra	362	1	37
Veronica beccabunga	185	2	Vitis vinifera	146	3	
Veronica officinalis	281	1	Vitis vinifera (vigne)	186	6	
Viburnum gallorum	362	1	Viverra civetta	99	3	
Viburnum lantana	19	7	Viverra zibetha	106	4	
Viburnum opulus	17	2	Voacanga africana	185	7	
Viburnum prunifolium	18	7	Voacanga thouarsii	185	7	
Viburnum tinus	15	6	Winterana Canella	165	5	
Vicia faba	184	2	Xanthium spinosum	141	7	
Villarsia nymphaeoides	185	2	Xanthium strumarium	142	2	
Vinca herbacea	271	7	Ximenia ægyptiaca	247	6	
Vinca herbacea var. libanoti	ca 254	6	Xylopia æthiopica	254	6	
Vinca libanotica	254	6	Zanthoxylum (Xanthoxylum) fraxineum	87	3	
Vinca major	254	4		67 147	3 1	
Vinca minor	396	1	Zea myas Zingiber officinale	147	2	
Vinca rosea	264	5	Zizyphus jujuba	244	1	
Vincetoxicum officinale	157	2	Zizyphus jujuba	154	6	
Vinum	76	5	Zizyphus jujuba	155	7	
Viola calcarata	40	4	Zizyphus lotus	155	7	
Viola odorata	38	6	Zizyphus officinarum	244	1	
Viola tricolor ssp. arvensis	59	i	Zizyphus officinarum	154	6	
Vipera aspis	14	5	Zizyphus sativa	244	1	
Vipera berus	14	5	Zizyphus sativa	154	6	
Viscum album	388	1	Zizyphus spina-Christi	111	6	
Visnaga vera	122	1	Zizyphus vulgaris	244	1	
Vitex Agnus-castus	119	3	Zizyphus vulgaris	154	6	
-			-			

tro	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
36	Tropæolum majus	312	1	Urtica membranacea	192	7
	Tropæolum minus	185	5	Urtica pillulifera	192	7
	Tuber	217	2	Urtica urens	166	4
	Turnera aphrodisiaca	86	4	Usnea plicata	78	7
	Turnera diffusa	86	4	Vaccinium arctostaphylos	198	7
	Tussilago farfara	265	1	Vaccinium corymbosum	177	6
	Typha angustata	47	7	Vaccinium myrtillus	298	1
	Typha angustifolia	47	7	Vaccinium myrtillus	196	2
	Typha australis	47	7	Vaccinium oxycoccus	169	7
	Typha latifolia	41	6	Vaccinium uliginosum	199	7
	Ulmaria palustris	364	1	Vaccinium vitis idæa	196	2
	Ulmaria palustris	163	7	Vaillantia cruciata	150	4
	Ulmus campestris	138	1	Valeriana elatior sylvestris	371	1
	Ulmus glabra	138	1	Valeriana officinalis	371	1
	Ulmus nuda	138	1	Valeriana tripteris	256	5
	Ulmus procera	138	1	Valeriana yatamansi	237	3
	Umbilicus	12	6	Valerianella olitoria	111	3
	Umbilicus erectus	12	6	Vanilla planifolia	286	2
	Umbilicus rupestris	15	2	Variolaria amara	68	4
	Uncaria Gambieri	154	3	Variolaria discoidea	68	4
	Uncaria inermis	254	5	Veratrum album	79	2
	Unedo edulis	294	1	Verbascum	44	2
	Ungula caballina	265	1	Verbascum (Species)	63	1
	Unona æthiopica	254	6	Verbascum gileadense	47	7
	Unona odorantissima	256	6	Verbascum phomoides	41	4
	Unona piperita	254	6	Verbascum Sinaiticum	44	5
	Uragoga granatensis H. Bn.	140	3	Verbascum sinuatum	47	7
	Uragoga ipecacuanha	229	1	Verbascum Somaliens	44	5
	Urechites suberecta	23	6	Verbascum ternacha	44	5
	Urginea maritima	23	1	Verbascum thapsiformes	44	3
	Urginea maritima	16	7	Verbascum thapsus	45	2
	Urginea scilla	23	1	Verbascum tripolitanum	45	5
	Urginea scilla	16	7	Verbascum undulatum	47	7
	Urtica caudata	192	7	Verbena officinalis	154	1
	Urtica dioica	284	i	Verbena recta	154	1
	Urtica dubia	192	7	Verbena triphylla	353	1
0 • 0	Urtica fragilis	169	6	Vernonia anthelminthica	180	7

Teucrium chamædrys	Sc.	Page	<u>Vol</u>	Sc.	Page	Vol	tri
Teucrium creticum	Teucrium chamædrys	144	6	Tilia cordata	105	5	35
Teucrium flavum	Teucrium chamæpitys	158	7	Tilia europaea var.			
Teucrium iva 158	Teucrium creticum	157, 159	7	platyphyllos	119	7	
Teucrium marum	Teucrium flavum	67, 157	7	Tilia europaea var. ulmifolia	105	5	
Teucrium montanum	Teucrium iva	158	7	Tilia grandiflora	119	7	
Teucrium polium	Teucrium marum	158	7	Tilia microphylla	105	5	
Teucrium rosmarinifolium	Teucrium montanum	158	7	Tilia parvifolia	171	1	
Teucrium scordium ssp. palustre	Teucrium polium	67, 157	7	Tilia parvifolia	105	5	
Palustre	Teucrium rosmarinifolium	157, 159	7	Tilia pauciflora	119	7	
Tilia sylvestris	Teucrium scordium ssp.			Tilia platyphyllos	119	7	
palustre 143 6 Tilla ulmifolia 171 1 Thalictrum aquilegifolium 55 2 Tilla ulmifolia 105 5 Thalictrum flavum 53 3 Titla ulmifolia 105 5 Thapsia garganica 94 7 Titlymatus lathyris 167 6 Thea camellia 197 1 Tormentilla erecta 145 5 Thea sinensis 197 1 Tormentilla officinalis 145 5 Thea viridis 197 1 Tormentilla officinalis 145 5 Thea viridis 197 1 Tormentilla officinalis 145 5 Theobroma cacao 179 3 Tragopogon pratensis 190 7 Theobroma cacao 179 3 Tragopogon pratensis 134 2 They articulata nereifolia 52 2 Tragopogon pratensis 134 2 Thuya articulata 122 6 Trinella auriculae-judae 2 3 <t< td=""><td>palustre</td><td>12</td><td>4</td><td>Tilia sylvestris</td><td>171</td><td>1</td><td></td></t<>	palustre	12	4	Tilia sylvestris	171	1	
Thalictrum aquilegifolium 55 2 Tilia ulmifolia 171 1 1 1 1 1 1 1 1	-			Tilia sylvestris	105	5	
Thalictrum flavum 53 3 Thapsia garganica 94 7 Thea camellia 197 1 Thea camellia 197 1 Thea sinensis 197 1 Thea viridis 197 1 Thea viridis 197 1 Theobroma cacao 309 1 Theobroma cacao 179 3 Theobroma cacao 179 3 Theobroma cacao 179 3 Theobroma cacao 179 3 Tragopogon 134 2 Theobroma cacao 179 3 Tragopogon pratensis 134 2 Theobroma cacao 179 3 Tragopogon pratensis 134 2 Theobroma cacao 179 3 Tragopogon pratensis 134 2 Thagas paracins 146 4 Thila paracins 146 4 Thila paracins 145 5 T	•			Tilia ulmifolia	171	1	
Thapsia garganica 94 7 Tithymatus lathyris 167 6 Thea camellia 197 1 Tormentilla erecta 145 5 Thea sinensis 197 1 Tormentilla officinalis 145 5 Thea viridis 197 1 Tournefortii 81 5 Theobroma cacao 179 3 Toxylon pomifera Rafin. 190 7 Theobroma cacao 179 3 Tragopogon 134 2 Thevetia nereifolia 52 2 Tragopogon pratensis 134 2 Thlapsis bursa pastoris 336 1 Traganatas 146 4 Thridax 225 3 Tremella auriculae-judae 2 3 Thuya articulata 122 6 Trianosperma tayuya 52 6 Thuya articulata 113 7 Trifolium acetosum 101 1 Thymus capitata 113 7 Trifolium corniculatum 352 1 Thymus cap				Tilia ulmifolia	105	5	
Tormentilla erecta				Tithymatus lathyris	167	6	
Thea sinensis 197 1 Tormentilla officinalis 145 5 Thea viridis 197 1 Tournefortii 81 5 Theobroma cacao 309 1 Toxylon pomifera Rafin. 190 7 Theobroma cacao 179 3 Tragopogon 134 2 Thevetia nereifolia 52 2 Tragopogon pratensis 134 2 Thlapsis bursa pastoris 336 1 Trapa natans 146 4 Thridax 225 3 Tremella auriculae-judae 2 3 Thuya articulata 122 6 Trianosperma tayuya 52 6 Thuya occidentalis 60 7 Trifolium acetosum 101 1 Thymelæa mezereum 229 7 Trifolium corniculatum 352 1 Thymelæa præcox 229 7 Trifolium fibrinum 383 1 Thymus capitatus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Thym			· ·	Tormentilla erecta	145	5	
Thea viridis 197 1 Tournefortii 81 5 Theobroma cacao 309 1 Toxylon pomifera Rafin. 190 7 Theobroma cacao 179 3 Tragopogon 134 2 Thevetia nereifolia 52 2 Tragopogon pratensis 134 2 Thlapsis bursa pastoris 336 1 Trapa natans 146 4 Thridax 225 3 Tremella auriculae-judae 2 3 Thuya articulata 122 6 Trianosperma tayuya 52 6 Thuya cocidentalis 60 7 Trifolium acetosum 101 1 Thymbra capitata 113 7 Trifolium arvense 243 6 Thymelæa mezereum 229 7 Trifolium fibrinum 383 1 Thymelæa præcox 229 7 Trifolium fibrinum 383 1 Thymus capitatus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Thymus grav				Tormentilla officinalis	145	5	
Theobroma cacao 309 1 Toxylon pomifera Rafin. 190 7 Theobroma cacao 179 3 Tragopogon 134 2 Thevetia nereifolia 52 2 Tragopogon pratensis 134 2 Thlapsis bursa pastoris 336 1 Trapa natans 146 4 Thridax 225 3 Tremella auriculae-judae 2 3 Thuya articulata 122 6 Trianosperma tayuya 52 6 Thuya occidentalis 60 7 Trifolium acetosum 101 1 Thymbra capitata 113 7 Trifolium arvense 243 6 Thymelæa mezereum 229 7 Trifolium corniculatum 352 1 Thymelæa præcox 229 7 Trifolium fibrinum 383 1 Thymelæa tartonraira 84 5 Trifolium melilotus 105 1 Thymus creticus 113 7 Trifolium pratense 265 7				Tournefortii	81	5	
Theobroma cacao 179 3 Tragopogon 134 2 Thevetia nereifolia 52 2 Tragopogon pratensis 134 2 Thlapsis bursa pastoris 336 1 Trapa natans 146 4 Thridax 225 3 Triemella auriculae-judae 2 3 Thuya articulata 122 6 Trianosperma tayuya 52 6 Thuya occidentalis 60 7 Trifolium acetosum 101 1 Thymbra capitata 113 7 Trifolium arvense 243 6 Thymelæa mezereum 229 7 Trifolium corniculatum 352 1 Thymelæa præcox 229 7 Trifolium fibrinum 383 1 Thymelæa tartonraira 84 5 Trifolium palustre 383 1 Thymus creticus 113 7 Trifolium pratense 265 7 Thymus graveolens 13 5 Trifolium repens 280 2 <td< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td>Toxylon pomifera Rafin.</td><td>190</td><td>7</td><td></td></td<>			1	Toxylon pomifera Rafin.	190	7	
Theobroma cacao 179 3 Tragopogon pratensis 134 2 Thevetia nereifolia 52 2 Tragopogon pratensis 134 2 Thlapsis bursa pastoris 336 1 Trapa natans 146 4 Thridax 225 3 Tremella auriculae-judae 2 3 Thuya articulata 122 6 Trifolium acetosum 101 1 Thuya occidentalis 60 7 Trifolium acetosum 101 1 Thymbra capitata 113 7 Trifolium arvense 243 6 Thymelæa mezereum 229 7 Trifolium corniculatum 352 1 Thymelæa præcox 229 7 Trifolium fibrinum 383 1 Thymus capitatus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Thymus graveolens 13 5 Trifolium palustre 383 1 Thymus graveolens 13 5 Trifolium repens 280 2			_		134	2	
Thevetia nereilolia 52 2 Thiapsis bursa pastoris 336 1 Trapa natans 146 4 Thridax 225 3 Thuya articulata 122 6 Thuya occidentalis 60 7 Trifolium acetosum 101 1 Thymbra capitata 113 7 Trifolium arvense 243 6 Thymelæa mezereum 229 7 Trifolium corniculatum 352 1 Thymelæa præcox 229 7 Trifolium fibrinum 383 1 Thymelæa tartonraira 84 5 Trifolium melilotus 105 1 Thymus capitatus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Thymus creticus 113 7 Trifolium pratense 265 7 Thymus graveolens 13 5 Trifolium repens 280 2 Thymus graveolens 239 6 Trigonella fœnum-græcum 98 1 Thymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1			_				
Thidax 225 3 Tremella auriculae-judae 2 3 Thuya articulata 122 6 Trianosperma tayuya 52 6 Thuya occidentalis 60 7 Trifolium acetosum 101 1 Thymbra capitata 113 7 Trifolium arvense 243 6 Thymelæa mezereum 229 7 Trifolium corniculatum 352 1 Thymelæa præcox 229 7 Trifolium fibrinum 383 1 Thymelæa tartonraira 84 5 Trifolium melilotus 105 1 Thymus capitatus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Thymus creticus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Thymus graveolens 13 5 Trifolium repens 265 7 Thymus graveolens 239 6 Trigonella fænum-græcum 98 1 Thymus serpyllum 128 2 Triticum repens 378 1 Thymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1			2		-		
Thuya articulata 122 6 Trianosperma tayuya 52 6 Thuya occidentalis 60 7 Trifolium acetosum 101 1 Thymbra capitata 113 7 Trifolium arvense 243 6 Thymelæa mezereum 229 7 Trifolium corniculatum 352 1 Thymelæa præcox 229 7 Trifolium fibrinum 383 1 Thymelæa tartonraira 84 5 Trifolium melilotus 105 1 Thymus capitatus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Thymus creticus 113 7 Trifolium pratense 265 7 Thymus graveolens 13 5 Trifolium repens 280 2 Thymus serpyllum 128 2 Triticum repens 378 1 Thymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1	-		-	•		-	
Thuya articulata Thuya occidentalis 60 7 Trifolium acetosum 101 1 Trymbra capitata 113 7 Trifolium arvense 243 6 Trymelæa mezereum 229 7 Trifolium corniculatum 352 1 Trymelæa præcox 229 7 Trifolium fibrinum 383 1 Trymelæa tartonraira 84 5 Trifolium melilotus 105 1 Trymus capitatus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Trymus creticus 113 7 Trifolium pratense 265 7 Trymus graveolens 13 5 Trifolium repens 280 2 Trymus graveolens 239 6 Trigonella fænum-græcum 98 1 Trymus serpyllum 128 2 Triticum repens 378 1 Trymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Trymus vulgaris 7 Triticum vulgare 379 1				•	_		
Thymbra capitata 113 7 Trifolium arvense 243 6 Thymelæa mezereum 229 7 Trifolium corniculatum 352 1 Thymelæa præcox 229 7 Trifolium fibrinum 383 1 Thymelæa tartonraira 84 5 Trifolium melilotus 105 1 Thymus capitatus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Thymus creticus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Thymus graveolens 13 5 Trifolium repens 280 2 Thymus graveolens 239 6 Trigonella fænum-græcum 98 1 Thymus serpyllum 128 2 Triticum repens 378 1 Thymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1	•					_	
Thymelæa mezereum 229 7 Trifolium corniculatum 352 1 Thymelæa præcox 229 7 Trifolium fibrinum 383 1 Thymelæa tartonraira 84 5 Trifolium melilotus 105 1 Thymus capitatus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Thymus creticus 113 7 Trifolium pratense 265 7 Thymus graveolens 13 5 Trifolium repens 280 2 Thymus graveolens 239 6 Trigonella fænum-græcum 98 1 Thymus serpyllum 128 2 Triticum repens 378 1 Thymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1	•	60				_	
Thymelæa præcox 229 7 Trifolium fibrinum 383 1 Thymelæa tartonraira 84 5 Trifolium melilotus 105 1 Thymus capitatus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Thymus creticus 113 7 Trifolium pratense 265 7 Thymus graveolens 13 5 Trifolium repens 280 2 Thymus graveolens 239 6 Trigonella fænum-græcum 98 1 Thymus serpyllum 128 2 Triticum repens 378 1 Thymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1	•	113	7				
Thymelæa tartonraira 84 5 Trifolium melilotus 105 1 Thymus capitatus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Thymus creticus 113 7 Trifolium pratense 265 7 Thymus graveolens 13 5 Trifolium repens 280 2 Thymus graveolens 239 6 Trigonella fœnum-græcum 98 1 Thymus serpyllum 128 2 Triticum repens 378 1 Thymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1	Thymelæa mezereum	229				_	
Thymus capitatus 113 7 Trifolium palustre 383 1 Thymus creticus 113 7 Trifolium pratense 265 7 Thymus graveolens 13 5 Trifolium repens 280 2 Thymus graveolens 239 6 Trigonella fœnum-græcum 98 1 Thymus serpyllum 128 2 Triticum repens 378 1 Thymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1	Thymelæa præcox	229	7			l	
Thymus creticus 113 7 Trifolium pratense 265 7 Thymus graveolens 13 5 Trifolium repens 280 2 Thymus graveolens 239 6 Trigonella fœnum-græcum 98 1 Thymus serpyllum 128 2 Triticum repens 378 1 Thymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1	Thymelæa tartonraira	84	5			1	
Thymus graveolens 13 5 Trifolium repens 280 2 Thymus graveolens 239 6 Trigonella fœnum-græcum 98 1 Thymus serpyllum 128 2 Triticum repens 378 1 Thymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1	Thymus capitatus	113	7	·		1	
Thymus graveolens 239 6 Trigonella fœnum-græcum 98 1 Thymus serpyllum 128 2 Triticum repens 378 1 Thymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1	Thymus creticus	113	7	-	265	7	
Thymus serpyllum 128 2 Triticum repens 378 1 Thymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1	Thymus graveolens	13	5	Trifolium repens	280	2	
Thymus tragoriganum 239 6 Triticum turgidium 379 1 Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1	Thymus graveolens	239	6	Trigonella fænum-græcum	98	1	
Thymus vulgaris 97 6 Triticum vulgare 379 1	Thymus serpyllum	128	2	Triticum repens	378	1	
	Thymus tragoriganum	239	6	Triticum turgidium	379	1	
Tilia cordata 171 I Triticum vulgare 197 2 2.	Thymus vulgaris	97	6	Triticum vulgare	379	1	
	Tilia cordata	171	I	Triticum vulgare	197	2	7.0

spi	<u>Sc.</u>	Page	Vol	<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>
34	Spiroea trifoliata	62	4	Symphytum officinale	333	1
	Spondylium branca-ursina	389	1	Syringa vulgaris	13	3
	Stachys betonica	48	1	Syzygium aromaticum	182	3
	Stachys officinalis	48	1	Tabernanthe iboga	25	3
	Stachys palustris	114	4	Tamarindus indica	55	6
	Stachys procumbens	109	5	Tamarindus officinalis	55	6
	Stachys recta	109	5	Tamarix gallica	1	6
	Stachys sieboldii	114	6	Tamus communis	176	2
	Stachys sylvatica	127	2	Tanacetum balsamita	39	1
	Stachys sylvatica	115	6	Tanacetum balsamita	70	2
	Stachys tuberifera	114	6	Tanacetum vulgare	94	1
	Statice brasiliensis	10	3	Taraxacum	249	3
	Statice limonium	11	7	Taraxacum assemanii	268	7
	Stellaria media	377	1	Taraxacum bessarabicum	267	7
	Sterculia acuminata	335	1	Taraxacum brevirostre	250	3
	Sterculia Lychnophora	33	2	Taraxacum dens leonis	247	6
	Sterculia staphigera	58	7	Taraxacum kurdiciforme	247	6
	Sticta pulmonaria	69	2	Taraxacum laxum	247	6
	Streptopus amplexifolius	211	4	Taraxacum libanoticum	250	3
	Strophanthus gratus	125	7	Taraxacum microcephalum	250	3
	Strophanthus hispidus	120	2	Taraxacum officinale	247	6
	Strophanthus Kombe	111	4	Taraxacum officinarum	247	6
	Strychnos gaultheriana	268	7	Taraxacum serotinum	250	3
	Strychnos ignatii	185	7	Taraxacum syriacum	249	3
	Strychos nux vomica	132	6	Taraxacum vulgare	247	6
	Styrax officinal	201	3	Taxus baccata	163	2
	Styrax tonkinensis	225	2	Terminalia	22	3
	Succisa pratensis	37	7	Terminalia bellerica	22	3
	Sumbulus moschatus	232	4	Terminalia catappa	23	6
	Sumbulus moschatus	112	5	Terminalia Chebula	22	3
	Swietenia	21	5	Terminalia Citrina	22	3
	Swietenia febrifuga	23	5	Terminalia horrida	22	3
	Swietenia mahagoni	234	4	Tetraclinis articulata	122	6
	Swietenia mahagoni	22	5	Tetragonia expansa	51	2
	Swietenia Senegalensis	22	5	Teucrium	156	7
	Symphocarpus fætidus	63	3	Teucrium aureum	67, 157	7
٥٠٧	Symphytum consolida	333	I	Teucrium capitatum	157	7

Sesamum radiatum	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	spi
Sesbania grandiflora 140 7 Soja hispida 161 2 Seseli graveolens 317 1 Solanum (Sensu lato) 139 5 Settaria italica 91 2 Solanum dulcamara 72 1 Settgerum et glabrum 15 3 Solanum furiosum 51 1 Siler Montanum 200 4 Solanum lethale 51 1 Siler Montanum 200 4 Solanum lethale 51 1 Siler Montanum 200 4 Solanum lethale 51 1 Siler Griloum 200 4 Solanum lycopersicum 36 6 Silybum Marianum 324 1 Solanum mlycopersicum 36 6 Silybum Marianum 186 1 Solanum mlycopersicum 36 6 Simaruba cedron 117 3 Solanum mlycopersicum 31 3 Simaruba cedron 117 3 Solanum mlycopersicum 31 3 Simaruba ce	Sesamum radiatum	119	6	Smilax sp.	168	6	
Seetli graveolens 317 1 Solanum (Sensu lato) 139 5 Setaria italica 91 2 Solanum dulcamara 72 1 Setigerum et glabrum 15 3 Solanum furiosum 51 1 Siler trilobum 200 4 Solanum lycopersicum 36 6 Silybum Marianum 324 1 Solanum maniacum 51 1 Simaba cedron 117 3 Solanum melongena 41 1 Simaruba officinalis 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Simaruba officinalis 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Simapis alba 79 2 Solenostemma Argel 67, 212 4 Sinapis nigra 114 1 Solidago virga-aurea 168 5 Sisonammi 13 3 Sorbus domestica 157 2 Sisom andium acutum 119 4 Sophora japonica 157 2 Sisymbrium a	Sesbania	117	3	Smyrnium olusatrum	190	5	
Setaria italica 91 2 Solanum dulcamara 72 1 Setigerum et glabrum 15 3 Solanum furiosum 51 1 Siler Montanum 200 4 Solanum lethale 51 1 Siler trilobum 200 4 Solanum lycopersicum 36 6 Silybum Marianum 324 1 Solanum maniacum 51 1 Simaba cedron 117 3 Solanum melongena 41 1 Simarba amara 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Simaruba officinalis 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Simaruba officinalis 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Simaruba officinalis 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Simaris nigra 114 1 Solidago virga-aurea 168 5 Sison ammi 13 3 Sorbus aucuparia 150 4 Sisymbrium alliaria <td>Sesbania grandiflora</td> <td>140</td> <td>7</td> <td>Soja hispida</td> <td>161</td> <td>2</td> <td></td>	Sesbania grandiflora	140	7	Soja hispida	161	2	
Setigerum et glabrum 15 3 Solanum furiosum 51 1 Siler Montanum 200 4 Solanum lethale 51 1 Siler trilobum 200 4 Solanum lethale 51 1 Silybum Marianum 324 1 Solanum maniacum 51 1 Simaba cedron 117 3 Solanum melongena 41 1 Simaruba amara 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Simaruba officinalis 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Simapis alba 79 2 Solenostemma Argel 67, 212 4 Sinapis nigra 114 1 Solidago virga-aurea 168 5 Sinapis nigra 114 1 Solidago virga-aurea 168 5 Sinapis nigra 114 1 Solidago virga-aurea 168 5 Sison ammi 119 4 Sophora japonica 157 2 Sisymbrium officinale	Seseli graveolens	317	1	Solanum (Sensu lato)	139	5	
Siler Montanum 200 4 Solanum lethale 51 1 Siler trilobum 200 4 Solanum lycopersicum 36 6 Silybum Marianum 324 1 Solanum maniacum 51 1 Simaba cedron 117 3 Solanum melongena 41 1 Simaruba amara 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Simaruba officinalis 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Sinapis alba 79 2 Solenosterma Argel 67, 212 4 Sinapis nigra 114 1 Solidago virga-aurea 168 5 Sinomenium acutum 119 4 Sophora japonica 157 2 Sison ammi 13 3 Sorbus aucuparia 150 4 Sison ammi 13 3 Sorbus domestica 172 7 Sisymbrium alliaria 185 1 Soymida febrifuga 23 5 Siymbrium Sophia <t< td=""><td>Setaria italica</td><td>91</td><td>2</td><td>Solanum dulcamara</td><td>72</td><td>1</td><td></td></t<>	Setaria italica	91	2	Solanum dulcamara	72	1	
Siler trilobum 200 4 Solanum lycopersicum 36 6 Silybum Marianum 324 1 Solanum maniacum 51 1 Simaba cedron 117 3 Solanum melongena 41 1 Simaruba amara 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Simaruba officinalis 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Simaruba officinalis 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Simaruba officinalis 186 1 Soladago virga-aurea 168 5 Simarigra 114 1 Solidago virga-aurea 168 5 Simomenium acutum 119 4 Sophora japonica 157 2 Sison ammi 13 3 Sorbus domestica 172 7 Sisymbrium alliaria 89 1 Sorbus domestica 172 7 Sisymbrium Sophia 129 6 Sparattosperma lithontripticum 115 3	Setigerum et glabrum	15	3	Solanum furiosum	51	1	
Silybum Marianum 324 1 Solanum maniacum 51 1 Simaba cedron 117 3 Solanum melongena 41 1 Simaruba amara 186 1 Solanum nigrum 151 1 Simaruba officinalis 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Sinapis alba 79 2 Solenostemma Argel 67, 212 4 Sinapis nigra 114 1 Solidago virga-aurea 168 5 Sinomenium acutum 119 4 Sophora japonica 157 2 Sison ammi 13 3 Sorbus aucuparia 150 4 Sisymbrium alliaria 89 1 Sorbus domestica 172 7 Sisymbrium Sophia 129 6 Sparattosperma lithontripticum 115 3 Sium 210 7 Sperularia marina 3 1 Sium agustifolium 210 7 Spergularia rubra 3 1 Sium berula	Siler Montanum	200	4	Solanum lethale	51	1	
Simaba cedron 117 3 Solanum melongena 41 1 Simaruba amara 186 1 Solanum nigrum 151 1 Simaruba officinalis 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Sinapis alba 79 2 Solenostemma Argel 67, 212 4 Sinapis nigra 114 1 Solidago virga-aurea 168 5 Sinomenium acutum 119 4 Sophora japonica 157 2 Sison ammi 13 3 Sorbus aucuparia 150 4 Sisymbrium alliaria 89 1 Sorbus domestica 172 7 Sisymbrium officinale 185 1 Sorbus domestica 172 7 Sisymbrium Sophia 129 6 Sparattosperma lithontripticum 115 3 Sium angustifolium 210 7 Spergularia marina 3 1 Sium apium 317 1 Spergularia rubra 3 1 Sium pium	Siler trilobum	200	4	Solanum lycopersicum	36	6	
Simaruba amara 186 1 Solanum nigrum 151 1 Simaruba officinalis 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Sinapis alba 79 2 Solenostemma Argel 67, 212 4 Sinapis nigra 114 1 Solidago virga-aurea 168 5 Sinomenium acutum 119 4 Sophora japonica 157 2 Sison ammi 13 3 Sorbus aucuparia 150 4 Sison ammi 13 3 Sorbus domestica 172 7 Sisymbrium officinale 185 1 Soymida febrifuga 23 5 Sisymbrium Sophia 129 6 Sparattosperma lithontripticum 115 3 Sium angustifolium 210 7 Spergularia marina 3 1 Sium apium 317 1 Spergularia rubra 3 1 Sium berula 210 7 Sphacœlia segetum 14 1 Sium graveolens	Silybum Marianum	324	1	Solanum maniacum	51	1	
Simaruba officinalis 186 1 Solanum tuberosum 31 3 Sinapis alba 79 2 Solenostemma Argel 67, 212 4 Sinapis nigra 114 1 Solidago virga-aurea 168 5 Sinomenium acutum 119 4 Sophora japonica 157 2 Sison ammi 13 3 Sorbus aucuparia 150 4 Sisymbrium alliaria 89 1 Sorbus domestica 172 7 Sisymbrium officinale 185 1 Soymida febrifuga 23 5 Sisymbrium Sophia 129 6 Sparattosperma lithontripticum 115 3 Sium anjum 210 7 Sparattosperma lithontripticum 115 3 Sium anjum 317 1 Spergularia marina 3 1 Sium apium 317 1 Spergularia rubra 3 1 Sium berula 210 7 Sphacelia segetum 14 1 Sium pr	Simaba cedron	117	3	Solanum melongena	41	1	
Sinapis alba 79	Simaruba amara	186	1	Solanum nigrum	151	1	
Sinapis nigra 114 1 Solidago virga-aurea 168 5 Sinomenium acutum 119 4 Sophora japonica 157 2 Sison ammi 13 3 Sorbus aucuparia 150 4 Sisymbrium alliaria 89 1 Sorbus domestica 172 7 Sisymbrium officinale 185 1 Soymida febrifuga 23 5 Sisymbrium Sophia 129 6 Sparattosperma lithontripticum 115 3 Sium 210 7 Spergularia marina 3 1 Sium apjum 317 1 Spergularia rubra 3 1 Sium berula 210 7 Spermaceti 4 4 Sium erectum 210 7 Sphacœlia segetum 14 1 Sium graveolens 317 1 Sphærococcus helminthocorton l41 6 Sium latifolium 186 6 Spigelia marylandica 111 4 Sium visnaga 122	Simaruba officinalis	186	1	Solanum tuberosum	31	3	
Sinomenium acutum 119 4 Sophora japonica 157 2 Sison ammi 13 3 Sorbus aucuparia 150 4 Sisymbrium alliaria 89 1 Sorbus domestica 172 7 Sisymbrium officinale 185 1 Soymida febrifuga 23 5 Sisymbrium Sophia 129 6 Sparattosperma lithontripticum 115 3 Sium 210 7 Spartium junceum 253 4 Sium angustifolium 210 7 Spergularia marina 3 1 Sium apium 317 1 Spergularia rubra 3 1 Sium berula 210 7 Spermaceti 4 4 Sium erectum 210 7 Sphacocia segetum 14 1 Sium graveolens 317 1 Sphærococcus helminthocorton 141 6 Sium latifolium 186 6 Spigelia marylandica 111 4 Sium sisarum 139	Sinapis alba	79	2	Solenostemma Argel	67, 212	4	
Sison ammi 13 3 Sorbus aucuparia 150 4 Sisymbrium alliaria 89 1 Sorbus domestica 172 7 Sisymbrium officinale 185 1 Soymida febrifuga 23 5 Sisymbrium Sophia 129 6 Sparattosperma lithontripticum 115 3 Sium 210 7 Spartium junceum 253 4 Sium angustifolium 210 7 Spergularia marina 3 1 Sium apium 317 1 Spergularia rubra 3 1 Sium berula 210 7 Spermaceti 4 4 Sium erectum 210 7 Sphaceclia segetum 14 1 Sium graveolens 317 1 Sphærococcus helminthocorton 141 6 Sium latifolium 186 6 Spigelia anthelmia 124 7 Sium sisarum 139 7 Spilanthes oleracea 81 7 Sium visnaga 122	Sinapis nigra	114	1	Solidago virga-aurea	168	5	
Sisymbrium alliaria 89 1 Sorbus domestica 172 7 Sisymbrium officinale 185 1 Soymida febrifuga 23 5 Sisymbrium Sophia 129 6 Sparattosperma lithontripticum 115 3 Sium 210 7 Spartium junceum 253 4 Sium angustifolium 210 7 Spergularia marina 3 1 Sium apium 317 1 Spergularia rubra 3 1 Sium berula 210 7 Spermaceti 4 4 Sium berula 210 7 Sphærococcus helminthocorton 141 6 Sium graveolens 317 1 Sphærococcus helminthocorton 141 6 Sium latifolium 186 6 Spigelia anthelmia 124 7 Sium ninzi 58 4 Spigelia marylandica 111 4 Sium sisarum 139 7 Spilanthes oleracea 81 7 Sium visnaga 122	Sinomenium acutum	119	4	Sophora japonica	157	2	
Sisymbrium officinale 185 1 Soymida febrifuga 23 5 Sisymbrium Sophia 129 6 Sparattosperma lithontripticum 115 3 Sium 210 7 Spartium junceum 253 4 Sium angustifolium 210 7 Spergularia marina 3 1 Sium apium 317 1 Spergularia rubra 3 1 Sium berula 210 7 Spermaceti 4 4 Sium berula 210 7 Sphacœlia segetum 14 1 Sium graveolens 317 1 Sphacœlia segetum 14 1 Sium graveolens 317 1 Sphæcœlia segetum 14 1 Sium latifolium 186 6 Spigelia anthelmia 124 7 Sium ninzi 58 4 Spigelia marylandica 111 4 Sium visnaga 122 1 Spilanthes oleracea 81 7 Smilax 180	Sison ammi	13	3	Sorbus aucuparia	150	4	
Sisymbrium Sophia 129 6 Sparattosperma lithontripticum 115 3 Sium 210 7 Spartium junceum 253 4 Sium angustifolium 210 7 Spergularia marina 3 1 Sium apium 317 1 Spergularia rubra 3 1 Sium berula 210 7 Spermaceti 4 4 Sium berula 210 7 Spermaceti 4 4 Sium erectum 210 7 Sphacœlia segetum 14 1 Sium graveolens 317 1 Sphacœlia segetum 14 1 Sium latifolium 186 6 Spigelia anthelmia 124 7 Sium ninzi 58 4 Spigelia marylandica 111 4 Sium visnaga 122 1 Spilanthes oleracea 81 7 Sium visnaga 122 1 Spilanthes oleracea 10 3 Smilax 180 7	Sisymbrium alliaria	89	1	Sorbus domestica	172	7	
Sium 210 7 Spartium junceum 253 4 Sium angustifolium 210 7 Spergularia marina 3 1 Sium apium 317 1 Spergularia rubra 3 1 Sium berula 210 7 Spermaceti 4 4 Sium berula 210 7 Spermaceti 4 4 Sium erectum 210 7 Sphacœlia segetum 14 1 Sium graveolens 317 1 Sphœrococcus helminthocorton 141 6 Sium latifolium 186 6 Spigelia anthelmia 124 7 Sium ninzi 58 4 Spigelia marylandica 111 4 Sium sisarum 139 7 Spilanthes oleracea 81 7 Sium visnaga 122 1 Spilanthes 1 2 Smilax 160 3 Spilanthus acmella 1 2 Smilax aspera 270 1 Spiraea ulmaria	Sisymbrium officinale	185	1	Soymida sebrifuga	23	5	
Sium angustifolium 210 7 Spergularia marina 3 1 Sium apium 317 1 Spergularia rubra 3 1 Sium berula 210 7 Spermaceti 4 4 Sium berula 210 7 Sphacœlia segetum 14 1 Sium erectum 210 7 Sphacœlia segetum 14 1 Sium graveolens 317 1 Sphœrococcus helminthocorton 141 6 Sium latifolium 186 6 Spigelia anthelmia 124 7 Sium ninzi 58 4 Spigelia marylandica 111 4 Sium sisarum 139 7 Spilanthes oleracea 81 7 Sium visnaga 122 1 Spilanthes 1 2 Smilax 160 3 Spilanthus acmella 1 2 Smilax 180 7 Spinacia oleracea 10 3 Smilax aspera 270 1 Spiræa ulmaria 364 1 Smilax sp. 161 3 Spiritus a	Sisymbrium Sophia	129	6	Sparattosperma lithontripticum	115	3	
Sium apium 317 1 Spergularia rubra 3 1 Sium berula 210 7 Spermaceti 4 4 Sium erectum 210 7 Sphacœlia segetum 14 1 Sium graveolens 317 1 Sphœrococcus helminthocorton 141 6 Sium latifolium 186 6 Spigelia anthelmia 124 7 Sium ninzi 58 4 Spigelia marylandica 111 4 Sium sisarum 139 7 Spilanthes oleracea 81 7 Sium visnaga 122 1 Spilanthes 1 2 Smilax 160 3 Spilanthus acmella 1 2 Smilax 180 7 Spinacia oleracea 10 3 Smilax aspera 270 1 Spiræa filipendula 143 4 Smilax china 181 7 Spiræa ulmaria 163 7 Smilax sp. 161 3 Spiritus eruginis	Sium	210	7	Spartium junceum	253	4	
Sium berula 210 7 Spermaceti 4 4 Sium erectum 210 7 Sphacœlia segetum 14 1 Sium graveolens 317 1 Sphœrococcus helminthocorton 141 6 Sium latifolium 186 6 Spigelia anthelmia 124 7 Sium ninzi 58 4 Spigelia marylandica 111 4 Sium sisarum 139 7 Spilanthes oleracea 81 7 Sium visnaga 122 1 Spilanthes 1 2 Smilax 160 3 Spilanthus acmella 1 2 Smilax 180 7 Spinacia oleracea 10 3 Smilax aspera 270 1 Spiræa filipendula 143 4 Smilax china 181 7 Spiræa ulmaria 163 7 Smilax sp. 161 3 Spiritus aeruginis 66 2 Smilax sp. 161 4 Spiritus vini	Sium angustifolium	210	7	Spergularia marina	3	1	
Sium erectum 210 7 Sphacœlia segetum 14 1 Sium graveolens 317 1 Sphœrococcus helminthocorton 141 6 Sium latifolium 186 6 Spigelia anthelmia 124 7 Sium ninzi 58 4 Spigelia marylandica 111 4 Sium sisarum 139 7 Spilanthes oleracea 81 7 Sium visnaga 122 1 Spilanthes 1 2 Smilax 160 3 Spilanthus acmella 1 2 Smilax 180 7 Spinacia oleracea 10 3 Smilax aspera 270 1 Spiræa filipendula 143 4 Smilax china 181 7 Spiræa ulmaria 364 1 Smilax sp. 161 3 Spiritus aeruginis 66 2 Smilax sp. 161 4 Spiritus vini 250 7	Sium apium	317	1	Spergularia rubra	3	1	
Sium graveolens 317 1 Sphærococcus helminthocorton 141 6 Sium latifolium 186 6 Spigelia anthelmia 124 7 Sium ninzi 58 4 Spigelia marylandica 111 4 Sium sisarum 139 7 Spilanthes oleracea 81 7 Sium visnaga 122 1 Spilanthes 1 2 Smilax 160 3 Spilanthus acmella 1 2 Smilax 180 7 Spinacia oleracea 10 3 Smilax aspera 270 1 Spiræa filipendula 143 4 Smilax china 181 7 Spiræa ulmaria 364 1 Smilax sp. 161 3 Spiritus aeruginis 66 2 Smilax sp. 161 4 Spiritus vini 250 7	Sium berula	210	7	Spermaceti	4	4	
Sium latifolium 186 6 Spigelia anthelmia 124 7 Sium ninzi 58 4 Spigelia marylandica 111 4 Sium sisarum 139 7 Spilanthes oleracea 81 7 Sium visnaga 122 1 Spilanthes 1 2 Smilax 160 3 Spilanthus acmella 1 2 Smilax 180 7 Spinacia oleracea 10 3 Smilax aspera 270 1 Spiræa filipendula 143 4 Smilax aspera var. genuina 270 1 Spiræa ulmaria 364 1 Smilax china 181 7 Spiræa ulmaria 163 7 Smilax sp. 161 3 Spiritus aeruginis 66 2 Smilax sp. 161 4 Spiritus vini 250 7	Sium erectum	210	7	Sphacœlia segetum	14	1	
Sium ninzi 58 4 Spigelia marylandica 111 4 Sium sisarum 139 7 Spilanthes oleracea 81 7 Sium visnaga 122 1 Spilanthes 1 2 Smilax 160 3 Spilanthus acmella 1 2 Smilax 180 7 Spinacia oleracea 10 3 Smilax aspera 270 1 Spiræa filipendula 143 4 Smilax aspera var. genuina 270 1 Spiræa ulmaria 364 1 Smilax china 181 7 Spiræa ulmaria 163 7 Smilax sp. 161 3 Spiritus aeruginis 66 2 Smilax sp. 161 4 Spiritus vini 250 7	Sium graveolens	317	1	Sphærococcus helminthocorton	14l	6	
Sium sisarum 139 7 Spilanthes oleracea 81 7 Sium visnaga 122 1 Spilanthes 1 2 Smilax 160 3 Spilanthus acmella 1 2 Smilax 180 7 Spinacia oleracea 10 3 Smilax aspera 270 1 Spiræa filipendula 143 4 Smilax aspera var. genuina 270 1 Spiræa ulmaria 364 1 Smilax china 181 7 Spiræa ulmaria 163 7 Smilax sp. 161 3 Spiritus aeruginis 66 2 Smilax sp. 161 4 Spiritus vini 250 7	Sium latifolium	186	6	Spigelia anthelmia	124	7	
Sium visnaga 122 1 Spilanthes 1 2 Smilax 160 3 Spilanthus acmella 1 2 Smilax 180 7 Spinacia oleracea 10 3 Smilax aspera 270 1 Spiræa filipendula 143 4 Smilax aspera var. genuina 270 1 Spiræa ulmaria 364 1 Smilax china 181 7 Spiræa ulmaria 163 7 Smilax sp. 161 3 Spiritus aeruginis 66 2 Smilax sp. 161 4 Spiritus vini 250 7	Sium ninzi	58	4	Spigelia marylandica	111	4	
Smilax 160 3 Spilanthus acmella 1 2 Smilax 180 7 Spinacia oleracea 10 3 Smilax aspera 270 1 Spiræa filipendula 143 4 Smilax aspera var. genuina 270 1 Spiræa ulmaria 364 1 Smilax china 181 7 Spiræa ulmaria 163 7 Smilax sp. 161 3 Spiritus aeruginis 66 2 Smilax sp. 161 4 Spiritus vini 250 7	Sium sisarum	139	7	Spilanthes oleracea	81	7	
Smilax 180 7 Spinacia oleracea 10 3 Smilax aspera 270 1 Spiræa filipendula 143 4 Smilax aspera var. genuina 270 1 Spiræa ulmaria 364 1 Smilax china 181 7 Spiræa ulmaria 163 7 Smilax sp. 161 3 Spiritus aeruginis 66 2 Smilax sp. 161 4 Spiritus vini 250 7	Sium visnaga	122	1	Spilanthes	1	2	
Smilax aspera 270 1 Spiræa filipendula 143 4 Smilax aspera var. genuina 270 1 Spiræa ulmaria 364 1 Smilax china 181 7 Spiræa ulmaria 163 7 Smilax sp. 161 3 Spiritus aeruginis 66 2 Smilax sp. 161 4 Spiritus vini 250 7	Smilax	160	3	Spilanthus acmella	1	2	
Smilax aspera var. genuina2701Spiræa ulmaria3641Smilax china1817Spiræa ulmaria1637Smilax sp.1613Spiritus aeruginis662Smilax sp.1614Spiritus vini2507	Smilax	180	7	Spinacia oleracea	10	3	
Smilax china 181 7 Spiræa ulmaria 163 7 Smilax sp. 161 3 Spiritus aeruginis 66 2 Smilax sp. 161 4 Spiritus vini 250 7	Smilax aspera	270	1	Spiræa filipendula	143	4	
Smilax sp. 161 3 Spiritus aeruginis 66 2 Smilax sp. 161 4 Spiritus vini 250 7	Smilax aspera var. genuina	270	1	Spiræa ulmaria	364	1	
Smilax sp. 161 4 Spiritus vini 250 7	Smilax china	181	7	Spiræa ulmaria	163	7	
	Smilax sp.	161	3	Spiritus aeruginis	66	2	
Smilax sp. 160 5 Spiroea stipulacea 59 5 0 • A	Smilax sp.	161	4	Spiritus vini	250	7	
	Smilax sp.	160	5	Spiroea stipulacea	59	5	٥٠٨

san	<u>Sc.</u>	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
32	Santolina incana	202	7	Scyphophorus pyxidatus	69	2
	Sapon	128	3	Sebum	251	4
	Saponaria officinalis	224	1	Secale cereale	14	1
	Sarcopoterium spinosum	38	5	Secale cereale	126	3
	Sarothamnus scoparius	394	1	Secale cornutum	7	5
	Sarracenia purpurea	45	3	Secale cornutum	6	6
	Sassafras officinale	120	2	Sedum acre	77	6
	Satureia capitata	113	7	Sedum anglicum	77	6
	Satureia cuneifolia	256	5	Sedum purpureum	86	7
	Satureia hortensis	275	2	Sedum rhodiola	87	7
	Satureia montana	240	6	Sedum roseum	87	7
	Satureia thymbra	239	6	Sedum telephium	86	7
	Saxifraga callosa	131	2	Sedum tertium	77	6
	Saxifraga cordifolia	131	2	Sedum vulgare	86	7
	Saxifraga granulata	181	1	Selenicereus grandiflorus	209	1
	Saxifraga granulata	130	2	Selinum anethum	201	1
	Saxifraga rotundifolia	132	2	Selinum angelica	96	1
	Saxifraga tridactylites	108	3	Selinum palustre	109	6
s	Scabiosa argentea	130	7	Semecarpus	21	5
	Scabiosa arvensis	110	3	Semecarpus atra	23	5
	Scabiosa palaestina	117	6	Semecarpus vitiensis	23	5
	Scabiosa succisa	116	4	Sempervivum arachnoideum	92	7
	Scabiosa ucranica	130	7	Sempervivum Gaudinii	84	2
	Scandix pecten-veneris	242	5	Sempervivum tectorum	124	1
	Scaphium scaphigerum	58	7	Senebiera coronopus	68	4
	Schinopsis Lorentzii	179	4	Senecio Doria	121	3
	Schænocaulon officinalis	129	7	Senecio jacobaea	125	4
	Scilla maritima	23	I	Senecio maritima	126	3
	Scilla maritima	16	7	Senecio vulgaris	204	1
	Sclerotium clavus	14	1	Sensu lata	112	3
	Scolopendrium officinale	179	1	Sepia officinalis	72	5
	Scolopendrium officinarum	179	1	Septinerva	346	1
	Scolopendrium vulgare	179	1	Serjania curassavica	59	7
	Scorzonera hispanica	89	2	Serpentaria phylla	18	2
	Scropfularia aquatica	82	6	Serratula arvensis	254	6
	Scropfularia nodosa	129	1	Sesamum indicum	119	6
• 9	Scutellaria galericulata	267	7	Sesamum orientale	119	6

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	san
Rumex acetosella (=Rumex			Saccharum officinarum	171	3	31
acetoselloide)	70	3	Salicornia europæa	15	6	
Rumex acutus	69	3	Salicornia herbacea	15	6	
Rumex angustifoliu ssp.		_	Salisburia adiantifolia	83	1	
Libanoticus	70	3	Salix alba	227	1	
Rumex aquaticus	71	3	Salix libanotica	227	1	
Rumex bucephaloporus	69	3	Salix purpurea	156	2	
Rumex chalepensis	69	3	Salvia	173	3	
Rumex conglomeratus	71	3	Salvia acetabulosa	176	5	
Rumex crispus	73	4	Salvia glutinosa	172	4	
Rumex dentatus	74	4	Salvia horminum	176	5	
Rumex hydrolapathum	74	4	Salvia microstegia	173	4	
Rumex lacerus	70	5	Salvia multicaulis	176	5	
Rumex nepalensis	74	4	Salvia nemorosa	202	7	
Rumex obtusifolius	84	7	Salvia officinalis	199	2	
Rumex occultans	70	5	Salvia officinalis		_	
Rumex orientalis	74	6		174	3	
Rumex patientia	104	1	Salvia pomifera	174	6	
Rumex patientia ssp. orientalis	74	6	Salvia pratensis	200	2	
Rumex pulcher	76	6	Salvia sclarea	177	6	
Rumex sanguineus	72	4	Salvia sylvestris	202	7	
Rumex Syriacus	69	3	Salvia verbascifolia	173	4	
Rumphius	232	4	Salvia viridis	175, 176	5	
Ruscus aculeatus	182	1	Sambucus ebulus	126	1	
Ruta	111	6	Sambucus humilis	126	1	
Ruta bracteosa	113	4	Sambucus nigra	64	1	
Ruta chalepensis L.	86	4	Sambucus racemosa	48	7	
Ruta graveolens	175	1	Sandaracha	113	3	
Ruta graveolens	111	6	Sanguinaria canadensis	139	3	
Ruta hortensis	175	1	Sanguisorba minor	53	I	
Ruta hortensis	111	6	Sanguisorba muricata	39	5	
Ruta latifolia	113	4	Sanguisorba officinalis	41	2	
Ruta sylvestris	175	1	Sanguisorba spinosa	38	5	
Sabadilla officinarum	129	7	Sanguisuya	148	4	
Sabal Mexicana	173	1	Sanicula europaea	117	4	
Sabal serrulata	173	1	Santalum album	159	2	
Sabbatia angularis	175	5	Santalum spicatum	139	4	
Saccharomyces cerevisiae	127	1	Santolina chamæcyparissus	202	7	٥١٠

_	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	<u>Vol</u>
	Retama rætam	94	3	Rhus radicans	119	6
	Rhamnus alaternus	103	5	Rhus toxicodendron	130	7
	Rhamnus carbo ligni	260	1	Rhus tripartita	118	6
	Rhamnus cathartica	376	1	Ribes grossularia	193	5
	Rhamnus frangula	373	1	Ribes nigrum	322	1
	Rhamnus frangula	268	2	Ribes rubrum	215	2
	Rhamnus lotus	155	7	Ribes uva-crispa	193	5
	Rhamnus paliurus	125	2	Richardia	165	7
	Rhamnus paliurus	131	6	Richardsonia brasiliensis	165	7
	Rhamnus Purshiana	375	1	Ricinus communis	118	1
	Rhamnus Purshiana	270	2	Ricinus communis	79	4
	Rhamnus spina-Christi	111	6	Robinia pseudacacia	105	2
	Rhamnus tripartita	118	6	Rosa (Sensu lato)	140	1
	Rhamnus zizyphus	244	1	Rosa canina	140, 38	31 1
	Rhamnus zizyphus	154	6	Rosa centifolia	255	3
	Rhaponticum calcitrapa	303	1	Rosa damascena	394	1
	Rheum	99	4	Rosa gallica	286	2
	Rheum	90	6	Rosa glauca	381	l
	Rheum	105	7	Rosa leucochroa	381	1
	Rheum officinale	108	7	Rosella rotundifolia	386	1
	Rheum palaestinum	98	5	Rosmarin	276	2
	Rheum palmatum	92	6	Rosmarinus officinalis	276	2
	Rheum palmatum L. var.		- V	Rosmarinus officinalis	243	3
	tanguticum	92	6	Rossolis rotundifolia	386	1
	Rheum rhaharbatum	91	6	Rubia major	277	1
	Rheum rhaponticum	97	5	Rubia tinctoria	277	1
	Rheum ribes	108	7	Rubia tinctorum	277	1
	Rhodiola rosea	87	7	Rubus caninus	381	1
	Rhododendron Chrysanthum		4	Rubus fruticosus	247	1
	Rhododendron ferrugineum	169	2	Rubus fruticosus	171	2
	Rhododendron hirsutum	141	3	Rubus hedycarpus	144	3
	Rhododendron officinalis	145	4	Rubus idaeus	265	1
	Rhododendron ponticum	146	4	Rubus idaeus	182	2
	brachycarpum	140	6	Rubus plicatus	247	1
	Rhodophyceae Rhus coriaria	112	5 1	Rubus species	144	3
		112	2	Rumex	68	3
	Rhus cotinus	118	6	Rumex acetosa	72	2
	Rhus oxyacantha	110	U	Rumen acciosa	, 2	_

ret

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	res
Psychotria emetica	165	7	Quercus lusitanica	132	7	29
Psychotria ipecacuanha	229	1	Quercus lusitanica var.			
Ptarmica vulgaris	3	7	infectoria	69	7	
Pteridium aquilinum	88	3	Quercus marina (Pline)	279	1	
Pteris aquilina	88	3	Quercus pedunculata			
Pterocarpus draco	51	3	(Sensu lato)	189	i	
Pterocarpus draco	97	7	Quercus racemosa	132	7	
Pterocladia	15	2	Quercus robur	189	1	
Ptychotis fæniculifolia	13	3	Quercus suber	117	5	
Pulegium vulgare	382	1	Quercus tinctoria	123	6	
Pulicaria dysenterica	103	2	Quercus velutina	123	6	
Pulmonaria maculata	93	1	Quillaja saponaria molina	190	6	
Pulmonaria officinalis	93	1	Quillaja smegmadermos	190	6	
Pulsatilla vulgaris	207	1	Quinquina cupræa	99	4	
Pumex	80	3	Radiata (var.)	63	3	
Punica granatum	156	1	Rana esculenta	134	3	
Punica granatum	104	2	Ranunculus	73	3	
Pyrethrum balsamita	70	2	Ranunculus	75 	4	
Pyrethrum balsamita var.			Ranunculus acris	74	2	
tanacetum	39	1	Ranunculus aquatilis var. sphaerospermus	71	5	
Pyrethrum cinerariifolium	258	l	Ranunculus asiaticus	76	6	
Pyrethrum tanacetum	39	1	Ranunculus ficaria	70	U	
Pyrola rotundifolia	172	3	(Scrofularia minor)	236	1	
Pyrola umbellata	198	4	Ranunculus sceleratus	85	7	
Pyrus communis	5	1	Ranunculus sphaerospermus	71	5	
Pyrus communis	6	2	Raphanus niger	179	2	
Quassia amara	308	1	Raphanus sativus	157	3	
Quebrachia Lorentzii	179	4	Ratanhia officinale	153	1	
Quercula	144	6	Rauwolfia serpentina	107	2	
Quercus aesculus	133	7	Ravenala Madagascariensis	103	4	
Quercus alba	131	7	Remijia pedunculata Triana	99	4	
Quercus ballota	123	6	Remijia Purdieana	99	4	
Quercus castaneifolia	133	7	Reseda luteola	81	4	
Quercus coccifera	132	7	Resina	104	7	
Quercus hispanica	123	6	Resina copallina	113	3	
Quercus ilex	123	6	Resina lentisci	224	6	
Quercus infectoria	132	7	Resta bovis	210	5	017

pol	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
28	Polygonatum officinale	76	2	Potentilla tormentilla	145	5
	Polygonatum vulgare	76	2	Poterium	37	3
	Polygonum arenastrum	33	3	Poterium	34	4
	Polygonum aviculare	47	1	Poterium compactum	33	6
	Polygonum bistorta	32	1	Poterium gaillardoti	33	6
	Polygonum cuspidatum	193	7	Poterium muricatum	39	5
	Polygonum dumetorum	171	6	Poterium officinale	53	1
	Polygonum fagopyrum	240	4	Poterium polygamum	39	5
	Polygonum hydropiper	274	1	Poterium sanguisorba	53	1
	Polygonum lapathifolium	241	1	Poterium spinosum	38	5
	Polygonum nodosum	241	1	Poulo oblongatum	157	5
	Polygonum persicaria	193	7	Poulo percha	157	5
	Polygonum sieboldii	193	7	Prangos Hermonis	136	6
	Polygonum tataricum	244	3	Prangos meliocarpoides	136	6
	Polygonum tinctorium	32	6	Primula officinalis	165	1
	Polygonum tomentosum	241	1	Primula veris	165	1
	Polypodium Barometz	52	4	Primula vulgaris	165	1
	Polypodium Filix-mas	176	1	Prunella vulgaris	295	1
	Polypodium vulgare	25	1	Prunus acida	315	1
	Polyporus fomentarius	161	2	Prunus amygdalus	350	1
	Polyporus igniarius	161	2	Prunus armeniaca	358	l
	Polyporus officinalis	153	3	Prunus avium	210	2
	Polystichum Filix-mas	176	1	Prunus avium	184	6
	Populus alba	75	4	Prunus cerasus	315	1
	Populus balsamifera	77	6	Prunus cerasus	211	2
	Populus carbo ligni	260	1	Prunus communis	350	1
	Populus nigra	108	1	Prunus domestica	85	2
	Populus tremula	75	2	Prunus domestica	82	3
	Porrum Cepa	30	3	Prunus dulcis	350	1
	Porrum sativum	73	1	Prunus Laurocerasus	316	1
	Portulaca oleracea	38	2	Prunus mahaleb	207	6
	Potalia amara	43	3	Prunus padus	189	5
	Potentilla anserina	237	1	Prunus persica	137	1
	Potentilla argentea	237	I	Prunus spinosa	131	1
	Potentilla argentina	237	1	Pseudevernia furfuracea	79	5
	Potentilla erecta	145	5	Psoralea bituminosa	76	4
٥١٣	Potentilla reptans	58	1	Psoralea glandulosa	74	3

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	pol
Picramnia Antidesma	271	2	Pisum sativum	35	2	27
Picrasma excelsa	175	4	Pithecolobium anareinotemo	27	6	
Pigmentum indicum	247	3	Pix Cadi	169	4	
Pigmentum urucu	96	3	Pix liquida (sensu lato)	292	1	
Pilocarpus jaborandi	76	1	Pix liquida depurata	169	5	
Pilocarpus microphyllus	54	4	Plantae	240	3	
Pilocarpus pennatifolius	57	2	Plantago	202	4	
Pilocarpus racemosus	55	4	Plantago afra	344	1	
Pilocarpus spicatus st-Hil	55	4	Plantago afra	29	6	
Pilocarpus trachylophus			Plantago arenaria	31	6	, <i>I</i>
Holmes	55	4	Plantago coronopus	223	7	1 (1) 1 (1)
Pimpinella anisum	288	2	Plantago decumbens	12	3	ι_{i}^{*}
Pimpinella magna	27	2	Plantago decumbens	214	5	• •
Pimpinella saxifraga	21	3	Plantago ispaghula	12	3	
Pimpinella sisarum	139	7	Plantago ispaghula	214	5	1
Pinguicula vulgaris	90	1	Plantago lanceolata	197	6	
Pinus laricio	50	2	Plantago major	346	1	
Pinus maritima	50	2	Plantago media	223	7	
Pinus palustris	50	2	Plantago ovata	12	3	
Pinus pinaster	160	2	Plantago ovata	214	5	淵門
Pinus pinea	133	3	Plantago psyllium	344	1	$\frac{\eta_{i}}{\mu_{i}}$, \hat{a} , \hat{c} , \hat{c}
Pinus sylvestris	50	2	Plantago psyllium	29	6	
Pinus sylvestris	139	4	Platyopuntia ficus-indica	134	4	
Piper angustifolium	228	7	Pleomele draco	167	3	
Piper aromaticum	161	5	Plumbago europæa	88	1	
Piper camphoriferum	228	7	Plumeria	42	2	
Piper cubeba	179	6	Plumeria acuminata	42	2	
Piper elongatum	228	7	Plumeria alba	38	4	
Piper longum	162	3	Plumeria lutea	40	3	
Piper methysticum	272	1	Plumeria rubra	38	4	
Piper nigrum	161	5	Podophyllum peltatum	46	7	
Piper reticulatum	162	4	Pogostemon patchouly	28	3	
Pirus aucuparia	150	4	Polygala amara	42	4	
Piscidia erythrina	36	7	Polygala amarella	42	4	
Pistacia Palaestina	77	3	Polygala chamæbuxus	46	5	
Pistacia Terebinthus	77	3	Polygala senega	41	6	
Pistacia vera	161	4	Polygala vulgaris	64	1	DYE

рар	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
26	Papaver somniferum L.			Peruvianum	170	4
	var. album	15	3	Petasites albus	187	2
	Papaverum somniferum albu	m 119	1	Petasites hybridus	167	3
	Papaya carica	41	1	Petroselinum sativum	37	2
	Papaya carica	25	6	Petroselinum sativum	32	4
	Papyrus antiquorum	30	4	Peucedanum graveolens	201	1
	Papyrus domesticus	30	4	Peucedanum officinale	43	3
	Paraguayensis	61	1	Peucedanum ostruthium	51	1
	Paraguensis	61	1	Peucedanum palustre	109	6
	Parietaria erecta	93	1	Peumus boldus	203	1
	Parietaria officinalis	93	1	Peziza auricula	2	3
	Paris quadrifolia	183	2	Phaeophuceae	18	6
	Parmelia parietina	78	7	Phaseolus coccineus	177	2
	Parnassia palustris	34	2	Phaseolus coccineus	156	4
	Passiflora (var.)	3	2	Phaseolus lunatus	165	6
	Passiflora caerulea	24	5	Phaseolus multiflorus	177	2
	Passiflora incarnata	30	1	Phaseolus vulgaris	178	2
	Passiflora quadrangularis	17	6	Phaseolus vulgaris	156	4
	Pastinaca anethum	201	1	Phellandrium aquaticum	145	7
	Pastinaca opopanax	181	3	Phillyrea latifolia	143	7
	Pastinaca sativa	140	2	Phillyrea media	143	7
	Paullinia cupana	161	6	Phænix dactylifera	273	2
	Paullinia pinnata	59	7	Phœnix dactylifera	49	3
	Paullinia scarlatina	268	5	Phragmites communis	291	1
	Paullinia sorbilis	161	6	Phyllanthus emblica	22	3
	Pausinystalia yohimba	272	7	Phyllanthus emblica	163	4
	Pedicularia staphisagria	141	4	Phyllitis scolopendrium	179	1
	Peganum Harmala	61	3	Physalis alkekengi	310	1
	Pelargonium odorantissimum	172	2	Physalis francheti	310	1
	Pelargonium odorantissimum	151	3	Physica Islandica	174	1
	Peltigera canina	78	7	Physica nivalis	78	7
	Pereira	25	6	Physostigma venenosum	186	7
	Periploca græca	38	7	Phytolacca americana	204	4
	Persea americana	40	1	Phytolacca decandra	204	4
	Persea gratissima	40	1	Phytolacca pruinosa	216	5
	Persica vulgaris	137	1	Picea excelsa	4	2
010	Persicaria lapathifolia	241	1	Picræna excelsa	45, 175	4

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	Leafin de la company
Ononis leiosperma	210	5	Ornithogalum maritima	23	1	25
Ononis repens	343	I	Ornithopus scorpioides	21	6	
Ononis spinosa	210	5	Orobanche major	55	3	halifan da san
Ononis viscosa	211	5	Orthosiphon grandiflorus	30	5	ill processing
Ononix natrix	225	2	Orthosiphon stamineus	30	5	H_{pri}^{\prime} and \mathbb{R}^{n}
Onopordum	182	7	Oryza sativa	3	3	
Onopordum acanthium	21	5	Osmanthus fragrans	119	7	
Onopordum carduiforme	182	7	Osmunda regalis	125	2	
Onopordum cynarocephalum	183	7	Ourouparia Gambir	154	3	
Onopordum floccosum	182	7	Ovum gallinaceum	46	2	
Onopordum heteracantha	183	7	Oxalis acetosella	101	1	and the state of
Onopordum libanoticum	182	7	Oxalis anthelminthica	196	4	
Onopordum telavivense	182	7	Oxycoccus macrocarpa	155	6	C(2) = C(2)
Opopanax Chironium	181	3	Oxycoccus palustris	169	7	$p \in \mathcal{C}(\mathcal{L}, p_{pd})$
Opuntia	135	4	Oxycoccus quadripetala	169	7	<i>時期。</i> 非
Opuntia ficus-indica	134	4	Padus avium	189	5	19 cm
Opuntia monacantha	151	2	Padus laurocerasus	316	1	
Opuntia vulgaris	151	2	Paeonia Kesruanensis	255	3	They be of
Orchis	126	7	Paeonia officinalis	285	2	
Orchis mascula	123	2	Pagiantha cerifera	142	7	
Orchis morio	124	2	Palicourea densiflora	172	4	Marcheller Million (1977)
Orchis morio var. Libani	124	2	Paliurus aculeatus	131	6	
Oreodoxa oleracea	273	2	Paliurus australis	131	6	idhdini jiti toʻz Martid taddin
Oreodoxa oleracea	242	3 7	Paliurus simachristi	131	6	
Oreodoxa regia	264 129	3	Panax ginseng	78	1	
Origanum Origanum dictamnus	39	2	Panax ginseng	63	6	
Origanum Ehrenbergii	152	7	Panax quinquefolium	60	2	
Origanum Libanoticum	135	4	Panax sessiliflorum	43	7	
Origanum Libanoticum	137	5	Panicum	90	2	
Origanum majorana	241	2	Panicum miliaceum	91	2	
Origanum majorana	213	3	Panis	75	3	
Origanum maru	138	6	Papaver argemone	80	6	
Origanum Syriacum	137	5	Papaver bracteatum	82	2	
Origanum Syriacum	138	6	Papaver libanoticum	91	7	
Origanum vulgare	155	2	Papaver rhœas	121	1	
Orleana	96	3	Papaver somniferum	12	4	017

_	<u>Sc.</u>	Page	Vol	Sc.	Page	<u>Vol</u>
	Musa ensete	233	6	Nox juglans	81	1
	Musa japonica	257	7	Nuphar luteum	385	I
	Musa paradisiaca	369	1	Nymphæa alba	243	4
	Musa paradisiaca	232	6	Nymphæa lutea	385	1
	Musa religiosa	256	7	Obtusifolium	170	4
	Musa sapientum	369	1	Ocimum L.	88	1
	Musa sinensis	256	7	Ocimum basilicum	65	5
	Musa textilis	250	5	Ocimum crispum	65	5
	Muscari comosum	83	7	Ocimum filamentosum	64	5
	Muscari longissimum	83	7	Ocimum grandiflorum	30	5
	Muscus islandicus	174	1	Ocimum gratissimum	64	5
	Muscus marinus	141	6	Ocimum minimum	76	7
	Myosotis palustris	10	1	Ocimum pilosum	69	6
	Myosotis scorpioides	10	1	Ocimum suave	69	6
	Myristica fragrans	61	2	Ocimum urticifolium	64	5
	Myrrhis odorata	108	3	Ocimum viride	75	7
	Myrtus leucocarpa	20	1	Ocotea pichurim	24	3
	Naja tripudians	113	5	Ocymum Auct.	88	1
	Narcissus poeticus	243	3	Œnanthe phellandrium	145	7
	Narcissus pseudonarcissus	380	1	Œnothera biennis	6	1
	Narcissus sylvestris	380	1	Olea europæa	170	1
	Nardosachys yatamansi	237	3	Olea europæa	115	2
	Nasturtium officinale	187	2	Olea fragrans	119	7
	Nauclea africana	254	5	Olea lancifolia	170	1
	Nauclea inermis	254	5	Olea oleaster	118	7
	Nectandra Rodiei schumb.	29	4	Olea sativa	170	1
	Nelumbo nucifera	233	2	Olea sylvestris	118	7
	Nemuaron Vieillardii	132	6	Oleum gaultheriæ	154	5
	Nepeta cataria	293	1	Oleum hepatis morrhuae	109	4
	Nepeta glechoma	326	1	Oleum jecoris aselli	109	4
	Nephrodium Filix-mas	176	ı	Oleum jecoris gradui(s)	109	4
	Nerium oleander	139	1	Oleum morrhuum	109	4
	Nerium rhododendrum	139	1	Oleum ricini	102	3
	Nicotiana tabacum	52	6	Oniscus Armadilla	8	4
	Nigella arvensis	125	3	Oniscus Asellus	67	3
	Nigella damascena	131	4	Ononis antiquorum	210	5
	Nigella sativa	147	2	Ononis brevislora	211	5

111US

			1			
<u>Sc.</u>	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	mus
Mater silvana	137	5	Mentha sylvestris	241	4	23
Matricaria aurea	26	3	Mentha sylvestris	242	6	
Matricaria chamomilla	29	2	Mentha viridis	244	3	
Matricaria discoidea	29	2	Menyanthes trifoliata	383	1	
Medicago sativa	162	3	Mercurialis annua	100	1	
Melaleuca cajaputi	39	5	Mercurius terrestris	274	1	
Melaleuca leucadendron	54	1	Mesembryanthemum			
Melaleuca quinquenervia	54	1	crystallinum	146	6	
Melaleuca viridiflora	39	3	Mespilus germanica	255	2	
Melaleuca viridiflora	37	4	Mespilus oxyacantha	114	7	
Melia azedarach	103	6	Meum athamanticum	141	7	
Melilotus alba	73	2	Mezereum officinale	229	7	
Melilotus arvensis	105	1	Micromeria thymbra	239	6	
Melilotus officinalis	105	1	Milium effusum	92	2	
Melissa calamintha	297	1	Milium nigricans	164	2	
Melissa clinopodium	198	5	Milium Solis	211	1	
Melissa officinalis	366	1	Mimosa cochliocarpos	29	5	
Melittis melissophyllum	49	3	Mimosa farnesiana	124	6	
Mellite	92	4	Mimulus moschatus	231	4	
Melocactus	135	4	Mitragyna africana	245	5	
Meloe vesicatorius	91	3	Mitragyna inermis	245	5	
Menispermum palmatum	289	1	Momordica elaterium	283	1	
Mentha	280	2	Monotropa hypopitys	214	2	
Mentha aquatica	243	6	Morinda sp.	237	4	
Mentha arvensis	241	4	Moringa aptera	31	2	
Mentha calamintha	297	1	Moringa pterygosperma	27	3	
Mentha canescens	242	6	Morsus gallina	377	1	
Mentha crispata	245	3	Morus alba	68	1	
Mentha hirsuta	243	6	Morus nigra	68	1	
Mentha longifolia	241	4	Morus nigra	52	2	
Mentha microphylla	242	6	Morus rubra	59	7	
Mentha piperita	245	3	Moschus	229	3	
Mentha pulegium	382	1	Moschus	231	4	
Mentha rotundifolia	259	5	Musa	250	5	
Mentha rotundifolia	243	6	Musa basjoo	257	7	
Mentha sieberi	242	6	Musa cavendishii	250	5	
Mentha spicata var. longifolia	241	4	Musa chinensis	250	5	٥١٨
•						

lig	<u>Sc.</u>	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
22	Liquiritia officinalis	192	1	Lythrum hyssopifolia	160	4
	Liquiritia officinalis	119	4	Lythrum salicaria	267	1
	Liriodendron tulipifera	142	7	Lytta vesicatoria	91	3
	Lithospermum officinale	211	1	Lytta vesicatoria	96	4
	Lobaria pulmonaria	69	2	Maclura aboinensis	151	6
	Lobelia inflata	349	1	Maclura aurantiaca	190	7
	Lobelia syphilitica	203	3	Maclura pomifera	190	7
	Lodoicea callipyge	237	3	Maclura tricuspidata	150	6
	Lodoicea maldivica	237	3	Macropiper methysticum	272	1
	Lodoicea sechellarum	237	3	Magnolia glauca	254	7
	Lonicera	81	5	Magnolia grandiflora	258	2
	Lonicera alpigena	138	6	Magnolia Virginiana	254	7
	Lonicera caprifolium	226	1	Majorana syriaca	138	6
	Lonicera periclymenum	137	5	Majoranamaracus zernyi	137	5
	Lonicera webbiana	138	6	Mallotus philippinensis		
	Lonicera xylosteum	154	2	(= Rottlera tinctoria)	202	2
	Lophophora Williamsii	50	6	Malus communis	50	4
	Lotus alpinus	352	1	Malva alcea	88	7
	Lotus brachyodon	352	1	Malva mauritanica	76	2
	Lotus corniculatus	352	1	Malva moschata	231	4
	Loxopterygium Lorentzii	179	4	Malva moschata	72	5
	Lucifer lacea	132	3	Malva neglecta	77	4
	Luffa aegyptiaca	204	3	Malva rotundifolia	77	4
	Lupinus albus	51	2	Malva sylvestris	110	1
	Lupinus termis	51	2	Mandragora autumnalis Bertol.	289	2
	Lychnis githago	73	5	Mandragora officinarum	288, 289	2
	Lycium barbarum	98	1	Manettia ignita	165	7
	Lycium halimifolium	64	3	Mangifera indica	25	4
	Lycium vulgare	64	3	Manihot	231	6
	Lycopersicum esculentum	36	6	Manioc aipi	231	6
	Lycopodium clavatum	113	1	Manioc utilissima	232	6
	Lycopodium selago	77	2	Maranta galanga	84	4
	Lycopus europæus	158	4	Marchantia polymorpha	220	4
	Lycopus virginicus	204	3	Marrubium vulgare	261	1
	Lysimachia adœnis	342	1	Marsdenia condurango	332	1
	Lysimachia audenis Lysimachia nummularia	232	2	Marum verum	158	7
19	Lysimachia vulgaris	207	4	Maruta cotula	16	5
/ 17	Lysimacma vulgaris	207	*	iviai uta Witula	10	,

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	lip
Lapis pumicis	80		Leontopodium alpinum	97	4	21
Lappa minor	9	5	Leonurus cardiaca	157	4	
Lappa minor pubescens	8	7	Leonurus lanatus	181	2	
Lapsana communis	80	3	Lepidium	140	3	
Larix decidua	221	2	Lepidium iberis	141	3	
Larix europaea	221	2	Lepidium latifolium	140	3	
Laser trilobum	200	4	Lepidium ruderale	141	3	
Laserpitium glaucum	200	4	Lepidium sativum	102	4	
Laserpitium latifolium	200	4	Lespedeza capitata	347	1	
Laserpitium Siler	200	4	Leucadendron cajeputi	39	5	
Laserpitium trilobum	200	4	Levisticum officinale	34	1	
Lastrea Filix-mas	176	1	Lichen faginus	68	4	
Lathræa clandestina	89	6	Lichen islandicus	174	1	
Laurocerasus officinalis	316	1	Lichen pulmonarius	69	2	
Laurus cassia	165	5	Lichen pyxidatus	69	2	
Laurus nobilis	251	1	Ligusticum levisticum	34	1	
Laurus persea	40	1	Ligusticum meum	141	7	
Laurus pichurim	24	3	Ligustrum vulgare	399	1	
Lavendula latifolia	82	4	Lilium candidum	167	1	
Lavendula officinalis	80	2	Lilium convallium	168	1	
Lavendula officinalis	78	3	Lilum martagon	108	2	
Lavendula spica	82	4	Limnanthemum nymphaeoides	185	2	
Lavendula steechas	74	5	Linaria cymbalaria	87	1	
Lawsonia alba	72	3	Linaria elatine	194	5	
Lawsonia inermis	72	3	Linaria minor	207	3	
Lecanora affinis	71	6	Linaria spuria	128	6	, (
Lecanora esculenta	71	6	Linaria vulgaris	203	6	100
Ledum	122	4	Linimenta	218	3	The state of the s
Ledum Groenlandicum	122	4	Linum angustifolium	204	2	The sale
Ledum latifolium	122	4	Linum catharticum	206	7	
Ledum palustre	122	4	Linum grandiflorum	180	4	
Lens esculenta	167	2	Linum humile	313	1	
Leonina herba	55	3	Linum perenne	179	4	
Leontice leontopetalum	81	6	Linum usitatissimum	313	1	
Leontodon bulbosus	2	5	Lippia aloysia	353	I	
Leontodon officinale	247	6	Lippia citrata	353	1	
Leontodon taraxacum	247	6	Lippia citriodora	353	1	07.72

ing	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
20	Inga barbatimâo	26	4	Jatropha curcas	87	4
	Inula campana	149	1	Juglans regia	81	1
	Inula conyza	35	7	Juglans regia	62	2
	Inula helenium	149	1	Juglans regia	59	4
	Inula montana	103	2	Juniperus communis	138	3
	Inula vulgaris	35	7	Juniperus communis	143	4
	Ipomœa jalapa	77	1	Juniperus oxycedrus	168	2
	Ipomœa orizabensis	56	4	Juniperus sabina	1	4
	Ipomœa orizabensis	117	6	Juniperus Virginiana	145	5
	Ipomœa purga	77	1	Justicia paniculata	209	3
	Ipomœa simulans	62	6	Justicia pectoralis	87	3
	Ipomœa turpethum	54	6	Justicia pectoralis	166	5
	Iris	115	3	Kalmia latifolia	210	2
	Iris florentina	194	1	Khaya	21	5
	Iris fœtidissima	116	3	Khaya Senegalensis	22	5
	Iris germanica	195	1	Kichxia elatine	194	5
	Iris pallida	194	1	Kochia scoparia	194	6
	Iris pallida	116	3	Krameria argentea	98	4
	Iris pseudacorus	138	2	Krameria iscina L. var.		
	Iris versicolor	195	1	granatensis Triana	93	3
	Iris versicolor	116	3	Krameria triandra	153	1
	Isatis tinctoria	256	3	Laburnum alpinum	138	7
	Isonandra gutta	157	5	Laburnum anagyroides	1	4
	Ixora bandhuca	152	4	Lactuca sativa	79	3
	Jacaranda brasiliana	56	4	Lactuca sativa	166	7
	Jacaranda procera	56	4	Lactuca serriola	81	2
	Jacea communis	201	7	Lactuca virosa	82	4
	Jasminum	266	5	Lactuca virosa	166	7
	Jasminum angustifolium	267	5	Laminaria cloustoni	223	2
	Jasminum floribundum	196	4	Laminaria digitata	198	3
	Jasminum fruticans	267	5	Laminaria flexicaulis	198	3
	Jasminum grandiflorum	267	5	Laminaria hyperborea	223	2
	Jasminum odoratissimum	266	5	Laminaria saccharina	221	2
	Jasminum officinale	266	5	Lamiun album	340	1
	Jasminum sambac	267	5	Lantana brasiliensis	69	4
	Jasminum suaveolens	266	5	Lanugo gossypi cruda	171	5
170	Jateorrhiza columba	289	I	Lapathum aquaticum	71	3

5	_	•	1.0	_		
<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>	Sc.	Page	Vol	<u>ing</u> 19
Helleborus officinalis	89	7	Hyacinthus comosus	83	7	4.7
Helleborus orientalis	89	7	Hydrastis canadensis	283	2	
Helleborus vesicarius	89	7	Hydrocotyle asiatica	244	4	
Helleborus viridis	88	7	Hyoscyamus	40	3	, i,
Helonia dioica	269	7	Hyoscyamus albus	44	7	
Hepatica nobilis	206	1	Hyoscyamus aureus	41	5	
Hepatica triloba	206	1	Hyoscyamus Falezlez	36	6	
Heracleum sphondylium	389	1	Hyoscyamus muticus	39	4	
Herba capillorum-veneris	321	1	Hyoscyamus niger	56	1	
Herba Doria	121	3	Hypericum Androsæmum	83	6	
Herba sideritis hirsuta	109	5	Hypericum perforatum	134	1	
Herbaceum	170	4	Hypericum serpillifolium	89	2	
Herniaria glabra	260	5	Hypericum thymifolium	89	2	
Herniaria hirsuta	242	4	Hypericum vulgare	134	1	
Herniaria microcarpos	260	5	Hypochæris glabra	76	3	
Hesperis matronalis	82	1	Hypochæris maculata	76	3	
Heuchera americana	249	6	Hyptis suaveolens	157	4	
Hevea brasiliensis	182	5	Hyrax capensis	250	4	
Hevea guianensis	182	5	Hyssopus officinalis	100	3	
Hibiscus abelmoschus	67	4	Hyssopus officinalis	106	4	
Hibiscus sabdariffa	183	4	Ignatia amara	185	7	
Hieracium murorum	253	3	Ilex aquifolium	60	1	
Hieracium pilosella	392	1	Hex cassine	257	6	
Hippocastanus vulgare	286	1	Ilex paraguariensis	61	1	
Hippophae rhamnoides	5	1	Illicium anisatum	38	1	
Hirsutum	170	4	Illicium floridanum	22	6	
Hirudo	148	4	Illicium parviflorum	38	1	
Hirudo medicinalis	148	4	Illicium parviflorum	31	7	
Holarrhena africana	194	3	Illicium religiosum	38	1	
Holarrhena antidysenterica	194	3	Illicium religiosum	31	7	
Holarrhena floribunda	262	5	Illicium verum	38	1	
Hordeum vulgare	135	6	Imbricaria parietina	78	7	
Horminum (var.)	176	5	Impatiens balsamina	44	5	
Humulus lupulus	91	1	Impatiens nolitangere	167	7	
Huperzia selago	77	2	Imperatoria ostruthium	51	1	
Hura brasiliensis	269	7	Indicum	170	4	
Hura crepitans	249	6	Inga Avaremotemo	29	5	٥٢٢
v. -p	- 1/		- 1	~/	,	- 1 1

				1		
gen	<u>Sc.</u>	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
18	Gentiana Chirayta	59	4	Glycyrrhiza glabra	192	1
	Gentiana lutea	79	1	Glycyrrhiza glabra	119	4
	Gentiana lutea	64	6	Glycyrrhiza glabra	120	5
	Gentiana pulchella	173	5	Glycyrrhiza glabra var.		
	Gentiana punctata	59	4	glandulifera	126	6
	Gentiana purpurea	59	4	Glycyrrhiza glandulifera	126	6
	Gentiana ramosissima	173	5	Glycyrrhiza lœvis	192	1
	Geoffræa	70	7	Glycyrrhiza violacea	120	5
	Geoffræa inermis	70	7	Gnaphalium dioicum	34	1
	Geoffræa surinamensis	70	7	Gonolobus condurango	332	1
	Geoffræa vermifuga	71	7	Gonus amarissimus Gossypium	202 170	5 4
	Geranium	152	5	Gossypium herbaceum	170	3
	Geranium cicutarium	153	5	Gossypium iodatum	172	6
	Geranium maculatum	153	5	Gramen caninum vulgatius	378	1
	Geranium moschatum	152	5	Gramen parnassium	34	2
	Geranium pratense	152	5	Gratiola officinalis	256	1
	Geranium Robertianum	1	2	Grindelia robusta	151	4
	Geranium rotundifolium	153	5	Gryllus campestris	63	7
	Geranium sanguineum	174	2	Guaiacum officinale	149	3
	Geum canadense	65	6	Guarea trichilioides	197	4
	Geum montanum	63	4	Gummi laccae	200	6
	Geum rivale	58	3	Gummii elasticum	182	5
	Geum strictum	65	6	Gymnogramme officinarum	119	3
	Geum urbanum	85	1	Hæmatoxylon campechianum	37	7
	Gigartina	185	3	Halzebia æthiopica	254	6
	Gigartina helminthocorton	141	6	Hamamelis Virginiana	244	4
	Gillenia stipulacea	59	5	Harpagophytum procumbens	355	1
	Gillenia trifoliata	62	4	Hedeoma pulegioides Pers.	261	5
	Ginkgo adiantoides	83	1	Hedera helix	238	1
	Ginkgo biloba	83	1	Helianthus annuus	141	1
	Githago segetum	73	5	Helianthus annuus	166	2
	Glandulae Rottlerae	202	2	Helianthus tuberosus	166	2
	Glechoma hederacea	326	1	Helichrysum stoechas	25	2
	Globularia alypum	150	5	Heliotropium europæum	249	3
	Globularia vulgaris	172	2	Helix pomatia	71	4
	Glyceritum amyli	233	4	Helleborus fœtidus	77	3
٥٢٣	Glycyrrhiza echinata	138	7	Helleborus niger	77 78	2
0 11	Giyeyirinza ecinnata	130	,	Henegorus mger	70	2

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	gen
Fabiana imbriquata	155	3	Fraxinus ornus	213	4	17
Fagara octandra	156	4	Fraxinus rotundifolia	213	4	
Fagopyrum esculentum	240	4	Fritillaria imperialis	137	3	
Fagopyrum tataricum	244	3	Fucus crispus	306	1	
Fagus sylvatica	159	1	Fucus lichenoides	135	3	
Fagus sylvatica	108	2	Fucus vesiculosus	279	1	
Farina	141	5	Fuga doemonium	134	1	
Farina tritici	141	5	Fumaria bullosa var. solida	170	6	
Fecula	241	6	Fumaria officinalis	196	1	
Fecula avow-root	6	3	Furcræa gigantea	39	6	
Fellis bovis	232	7	Galanthus	244	6	
Ferula assa-foetida	26	2	Galega officinalis	361	1	
Ferula communis	165	6	Galeopsis dubia	56	3	
Ferula galbaniflua	26	3	Galeopsis ochroleuca	58	4	
Ferula hermonis	156	3	Galium agreste	255	1	
Ferula persica	155	4	Galium aparine	255	1	
Ficaria ranunculoides	236	1	Galium cruciata	150	4	
Ficus carica	69	1	Galium verum	174	2	
Ficus carica	54	2	Galla quercina	69	7	
Ficus microcarpa	162	5	Galla tinctoria	69	7	
Filipendula hexapetala	143	4	Galla turcica	69	7	
Filipendula ulmaria	364	1	Garcinia sp.	131	3	
Filipendula ulmaria	163	7	Gaultheria procumbens	152	4	
Fæniculum dulce	127	4	Geissospermum vellozii	25	6	
Fæniculum vulgare	145	2	Gelatina	57	3	
Fæniculum vulgare piperitum	121	3	Gelidium corneum	15	2	
Fœnum graecum officinalis	98	I	Gelsemium elegans Benth	6	4	
Formica rufa	247	3	Gelsemium sempervirens	4	3	
Fragaria vesca	222	1	Geranium cicutarium	54	3	
Fragaria vesca	149	2	Genista	253	4	
Fragaria vulgaris	222	1	Genista purgans	253	4	
Franciscea uniflora	209	3	Genista rætam	94	3	
Frangula alnus	373	1	Genista sagittalis	253	4	
Fraxinus bumelia	355	1	Genista tinctoria	253	4	
Fraxinus excelsior	355	1	Gentiana	59	4	
Fraxinus ornus	266	2	Gentiana acaulis	60	2	
Fraxinus ornus	212	3	Gentiana centaurium	301	I	370

eri .	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	<u>Vol</u>
16	Erica manipuliflora	75	5	Eucalyptus globulus	27	2
	Erica verticillata	75	5	Eucalyptus globulus	24	3
	Erica vulgaris	187	1	Eugenia caryophyllata	190	2
	Erigeron Canadense	19	1	Eugenia caryophyllata	182	3
	Eriodendron anfractuosum	178	3	Euonymus atropurpureus	225	6
	Erodium cicutarium	54	3	Eupatorium aya-pana	27	4
	Erodium cicutarium	153	5	Eupatorium cannabinum	112	1
	Erodium moschatum	152	5	Eupatorium perfoliatum	175	7
	Eruca sativa	155	1	Eupatorium purpureum	161	6
	Eruca vesicaria	155	1	Eupatorium satureiæfolium	176	7
	Ervum Ervilia	186	3	Eupatorium triplinerve	27	4
	Ervum lens	167	2	Euphorbia	159	3
	Eryngium	123	3	Euphorbia cyparissias L.	159	3
	Eryngium campestre	213	1	Euphorbia esula	159	3
	Eryngium creticum	167	4	Euphorbia helioscopia	400	1
E	Eryngium falcatum	131	5	Euphorbia helioscopia L.	159	3
	Eryngium maritimum	123	3	Euphorbia hirta	401	1
	Eryngium sumbul	112	5	Euphorbia ipecacuanha L.	159	3
	Erysimum alliaria	89	1	Euphorbia Lathyris	167	6
	Erysimum officinale	185	1	Euphorbia Lathyris L. =		
	Erythraea centaurium	301	1	Tithymatus Lathyris Lank.	159	3
	Erythraea Chilensis	174	5	Euphorbia lathyrus	167	6
	Erythraea pulchella	173	5	Euphorbia palustris	159	3
	Erythraea ramosissima	173	5	Euphorbia peplus L.	159	3
	Erythrina americana	11	4	Euphorbia pilulifera	401	1
	Erythrina corallodendron	9	3	Euphorbia resinifera	171	2
	Erythrophleum	10	4	Euphorbia spongiosa	167	6
	Erythroxylon coca	218	2	Euphorbia sylvatica Jacq.	159	3
	Erythroxylum coca var.			Euphrasia officinalis	231	1
	bolivianum	219	7	Euphrasia stricta	231	1
	Erythroxylum coca var.	210	7	Evernia	71	6
	novo-granatense	219	,	Evernia prunastri	85	2
	Erythroxylum coca var. spruceanum	219	7	Evonymus atropurpurea	225	6
	Esula	12	5	Evonymus europæus	226	6
	Esula cyparissias L.	12	5	Evonymus vulgaris	226	6
	Esula palustris	12	5	Excidias auricula-Judae	2	3
۲٥	Esula peplus	12	5	Exogonium purga	- 77	1
	Sour Pobias		-			•

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	eri
Dianthus caryophyllus	168	4	Dulcis (var.)	45	1	15
Dichopsis Gutta	157	5	Dypterix odorata	162	4	
Dichroa febrifuga	94	4	Ebulum humile	126	l	
Dictamus albus	84	6	Ecballium elaterium	283	1	
Dictamus fraxinella	84	6	Echinocactus	135	4	
Diervilla Canadensis	81	5	Echinocactus Lewinii	50	6	
Diervilla trifoliata	81	5	Echinocactus Williamsii	50	6	
Digitalinum cristallisatum	89	5	Echium vulgare	4	6	
Digitalis grandiflora	102	2	Elaterium agreste	283	1	
Digitalis lanata	94	4	Elaterium cordifolium	283	1	
Digitalis purpurea	142	1 7	Elaterium officinale	283	1	
Digitalis purpurea	88	5	Elettaria cardamomum	282	2	
Digitalis purpurea	87	6	Elettaria major	246	6	
Digitalis purpurea	101	7	Eleutherococcus Henryi	43	7	
Diotis maritima	171	4	Eleutherococcus senticosus	43	7	
Diplotaxis tenuifolia	58	2	Elytrigia repens	378	1	
Dipsacus fullonum	254	2	Embelia Barbeyana	54	5	
Dipsacus sylvestris	357	1	Embelia ribes	29	3	
Discoidea	17	5	Embelia robusta	29	3	
Doronicum arnica	16	1	Emblica officinalis	22	3	
Doronicum oppositifolium	16	1	Empetrum nigrum	153	2	
Doronicum pardalianches	94	2	Ephedra campylopoda	242	1	
Doronicum plantagineum	94	2	Ephedra distachya	170	2	
Dorstenia brasiliensis	49	4	Ephedra fragilis campylopoda	242	1	
Dorstenia contrayerva	49	4	Ephedra helvetica	143	3	
Dracæna draco	167	3	Epilobium angustifolium	274	2	
Dracæna draco	97	7	Equisetum	330	1	
Dracontia minoris	7	3	Equisetum arvense	17	3	
Dracontium fætidum	63	3	Equisetum hyemale	19	3	
Drosera rotundifolia	386	1	Equisetum limosum	20	3	
Dryas octopetala	86	4	Equisetum maximum	21	4	
Drymis winteri	81	5	Equisetum palustre	19	3	
Dryopteris Filix-mas	176	1	Equisetum ramosissimum	20	4	
Duboisia hoopwoodii	45	3	Equisetum ramosum	20	4	
Duboisia myoporoides	86	3	Equisetum telmateia	21	4	
Duboisia myoporoides	93	4	Erica carnea	83	2	
Dulce (var.)	182	4	Erica cinerea	123	I	770

				I		
<u>cur</u>	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	<u>Vol</u>
14	Curcas purgans	87	4	Cyperus longus	109	5
	Curcuma	11	5	Cyperus odoratus	109	• 5
	Curcuma domestica	212	2	Cyperus papyrus	30	4
	Curcuma longa	211	7	Cyperus rotundus	128	7
	Curcuma xanthorrhiza	319	1	Cypripedilum calceolus	204	2
	Curcuma zedoaria rosc.	111	7	Cypripedium calceolus	204	2
	Cuscuta epithymum	348	1	Cystopus candidus	338	1
	Cuscuta europaea	215	2	Cytinus Hypocistis	92	3
	Cuscuta minor	348	1	Cytisus cajan	181	6
	Cuscuta monogyna	204	4	Cytisus scoparius	394	1
	Cyanea	94	4	Dactylorhiza maculata	110	6
	Cyanophyceae	18	6	Dammara Lamb.	194	4
	Cyclamen boustanii	122	5	Daphne	82	5
	Cyclamen coum	130	6	Daphne gnidium	82	5
	Cyclamen europæum	133	2	Daphne laureola	82	5
	Cyclamen hederæfolium	26	6	Daphne libanotica Mout.	85	5
	Cyclamen latifolium	26	6	Daphne mezereum	82	5
	Cyclamen Libanoticum	121	4	Daphne mezereum	229	7
	Cyclamen macrophyllum	26	6	Daphne oleifolia lam.	85	5
	Cyclamen punicum	26	6	Daphne oleoides schreb.	85	5
	Cyclamen purpurascens	133	2	Daphne thymelaea	83	5
	Cyclamen pyrolæfolium	26	6	Datura spinosa	133	1
	Cyclamen vernum	130	6	Datura spinosa	88	2
	Cydonia oblonga	129	2	Datura stramonium	133	1
	Cydonia vulgaris	129	2	Datura stramonium	88	2
	Cydonia vulgaris	115	4	Daucus carota	59	2
	Cymbalaria muralis	87	1	Daucus sativus	54	3
	Cymbopogon	271	2	Daucus visnaga	122	1
	Cymbopogon citratus	80	7	Deguelia	95	7
	Cynanchum arghel	212	4	Delphinium consolida	147	6
	Cynara cardunculus	68	2	Delphinium staphisagria	141	4
	Cynara scolymus	10	2	Dentaria pinnata	98	7
	Cynara scolymus	3	3	Derris Derris	95	7
	Cynodon dactylon	53	3	Descurainia Sophia	129	6
	Cynoglossum officinale	228	2	Dianthera pectoralis	87	3
	-			_		
	Cyperus alopecuroides	116	6	Dianthera pectoralis	166	5
٥٢٧	Cyperus esculentus	116	6	Dianthus carthusianorum	167	5

Cornus sanguinea	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	cup
Corona regia 105 1 Crithmum maritimum 208 1 Coronilla glauca 29 7 Crocus officinalis 162 1 Coronilla sempervirens 29 7 Crocus officinalis 101 5 Coronilla sempervirens 29 7 Crocus sativus 162 1 Coronilla varia 28 5 Crocus sativus 101 5 Cortex pseudo-angusturae 30 7 Croton cascarilla 184 4 Cortex pseudo-angusturae 30 7 Croton clacciferus 188 6 Coryalais financia 170 6 Croton dictimum 187 4 Corydalis formosa 190 7 Crocumis anduri 188 6	Cornus sanguinea	191	2	Crepis bulbosa	2	5	13
Coronilla glauca 29	Cornus sericea	194	7	Crescentia cujete	186	3	
Coronilla scorpioides 21	Corona regia	105	1	Crithmum maritimum	208	1	mr_{i}/d
Coronilla sempervirens 29	Coronilla glauca	29	7	Crocus officinalis	162	1	adijara Mba
Coronilla sempervirens	Coronilla scorpioides	21	6	Crocus officinalis	101	5	
Coronina varia 28	Coronilla sempervirens	29	7	Crocus sativus	162	I	
Crotex pseudo-angusturae 29 5 7 Croton cascarilla 184 4 4 4 Croton cascarilla 184 4 Crot	Coronilla varia	28	5	Crocus sativus	101	5	
Corvisartia helenium	Cortex pseudo-angusturae	29	5	Croton cascarilla	187	6	
Corystartia helenium	Cortex pseudo-angusturae	30	7	Croton cascarilla	184	4	•
Corydalis bulbosa 170 6 Corydalis cava 191 7 Corydalis formosa 190 7 Corydalis libanotica 170 6 Corydalis solida var. brachyloba 170 6 Corylus avellana 58 1 Corylus avellana 43 2 Corynanthe yohimbe 272 7 Costus arabicus 168 3 Cotinus coggygria 135 2 Cotula aurea 26 3 Cotyledon 12 6 Cotyledon lustanica 12 6 Cotyledon lutea 12 6 Cotyledon umbilicus 13 6 Cotyledon umbilicus on umbilicus o	Corvisartia helenium	149	1	Croton elutheria	184	4	
Corydalis cava 191	Corydalis bulbosa	170	6	Croton lacciferus	188	6	
Corydalis formosa 190	•	191	7			6	
Corydalis libanotica	•	190	7	Croton tinctorium	185	4	
Corydalis solida var. brachyloba 170 6 Cucumis anguria 92 7 7	•	170	6			6	
Cucumis anguria 92 7	•				179	6	
Corylus avellana	=	170	6	_	92	7	
Corylus avellana 43 2 Cucumis colocynthis 106 1 Corynanthe yohimbe 272 7 Cucumis flexuosus 169 6 Costus arabicus 168 3 Cucumis flexuosus 169 6 Cotinus coggygria 135 2 Cucumis melo 146 2 Cotula aurea 26 3 Cucumis melo var. Chate 148 6 Cotyledon 12 6 Cucumis sativus 86 2 Cotyledon lusitanica 12 6 Cucumis sativus var. flexuosus 169 6 Cotyledon lutea 12 6 Cucumis sativus var. flexuosus 169 6 Cotyledon lutea 12 6 Cucumis sylvestris 283 1 Cotyledon umbilicus 13 6 Cucurbita citrullus 31 4 Cotyledon umbilicus-veneris 12 6 Cucurbita moschata 172 6 Coumarouna odorata 162 4 Cucurbita pepo 256 4	Corylus avellana	58	1			-	
Corynanthe yohimbe 272 7 Cucumis flexuosus 169 6 Costus arabicus 168 3 Cucumis melo 146 2 Cotinus coggygria 135 2 Cucumis melo var. Chate 148 6 Cotula aurea 26 3 Cucumis melo var. flexuosus 169 6 Cotyledon 12 6 Cucumis sativus var. flexuosus 169 6 Cotyledon lusitanica 12 6 Cucumis sativus var. flexuosus 169 6 Cotyledon lutea 12 6 Cucumis sylvestris 283 1 Cotyledon umbilicus 13 6 Cucurbita citrullus 31 4 Cotyledon umbilicus-veneris 12 6 Cucurbita moschata 172 6 Coumarouna odorata 162 4 Cucurbita pepo 290 2 Crassula minor 77 6 Cucurbita pepo 163 5 Cratægus azarolus 100 6 Cucurbita pepo 172 6 <	Corylus avellana	43	2			•	٠.,
Costus arabicus 168 3 Cotinus coggygria 135 2 Cotula aurea 26 3 Cotyledon 12 6 Cotyledon lusitanica 12 6 Cotyledon lutea 12 6 Cotyledon umbilicus 13 6 Cotyledon umbilicus-veneris 12 6 Coumarouna odorata 162 4 Coucurbita pepo 290 2 Crassula minor 77 6 Cucurbita pepo 256 4 Cratægus azarolus 100 6 Cucurbita pepo 163 5 Cratægus lævigita 101 6 Cudrania Javanensis 151 6 Cratægus soxyacantha 114 7 Cuminum cyminum 328 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Corynanthe yohimbe	272	7			_	
Cotinus coggygria 135 2 Cucumis melo var. Chate 148 6 Cotula aurea 26 3 Cucumis melo var. flexuosus 169 6 Cotyledon 12 6 Cucumis sativus 86 2 Cotyledon lutea 12 6 Cucumis sativus var. flexuosus 169 6 Cotyledon lutea 12 6 Cucumis sylvestris 283 1 Cotyledon umbilicus 13 6 Cucurbita citrullus 31 4 Cotyledon umbilicus-veneris 12 6 Cucurbita oschata 172 6 Coumarouna odorata 162 4 Cucurbita pepo 290 2 Crassula minor 77 6 Cucurbita pepo 256 4 Cratægus 99 5 Cucurbita pepo 163 5 Cratægus lævigita 101 6 Cudrania Javanensis 151 6 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum cyminum 328 1 C	Costus arabicus	168	3			_	,
Cotyledon 12 6 Cotyledon 12 6 Cotyledon lusitanica 12 6 Cotyledon lutea 12 6 Cotyledon lutea 12 6 Cotyledon umbilicus 13 6 Cotyledon umbilicus-veneris 12 6 Coucurbita citrullus 31 4 Cotyledon umbilicus-veneris 12 6 Coucurbita pepo 290 2 Crassula minor 77 6 Cucurbita pepo 256 4 Cratægus azarolus 100 6 Cucurbita pepo 172 6 Cratægus lævigita 101 6 Cratægus monogyna 161 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cucurbium melo var. flexuosus 169 6 Cucurmis sativus var. flexuosus 169 6 Cucurbita pepo 290 2 Crassula monor 172 6 Cucurbita pepo 172 6 Cucurbita pepo 163 5 Cucurbita pe	Cotinus coggygria	135	2				
Cotyledon lusitanica 12 6 Cucumis sativus var. flexuosus 169 6 Cotyledon lutea 12 6 Cucumis sylvestris 283 1 Cotyledon umbilicus 13 6 Cucumis sylvestris 283 1 Cotyledon umbilicus-veneris 12 6 Cucurbita citrullus 31 4 Cotyledon umbilicus-veneris 12 6 Cucurbita moschata 172 6 Coumarouna odorata 162 4 Cucurbita pepo 290 2 Crassula minor 77 6 Cucurbita pepo 256 4 Cratægus 99 5 Cucurbita pepo 163 5 Cratægus azarolus 100 6 Cucurbita pepo 172 6 Cratægus lævigita 101 6 Cudrania Javanensis 151 6 Cratægus monogyna 161 1 Cudrania tricuspidata 150 6 Cratægus oxyacantha 114 7 Cuminum cyminum 328 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Cotula aurea	26	3			_	
Cotyledon lusitanica 12 6 Cucumis sativus var. flexuosus 169 6 Cotyledon lutea 12 6 Cucumis sylvestris 283 1 Cotyledon umbilicus 13 6 Cucurbita citrullus 31 4 Cotyledon umbilicus-veneris 12 6 Cucurbita moschata 172 6 Coumarouna odorata 162 4 Cucurbita pepo 290 2 Crassula minor 77 6 Cucurbita pepo 256 4 Cratægus 99 5 Cucurbita pepo 163 5 Cratægus azarolus 100 6 Cucurbita pepo 172 6 Cratægus lævigita 101 6 Cudrania Javanensis 151 6 Cratægus monogyna 161 1 Cudrania tricuspidata 150 6 Cratægus oxyacantha 114 7 Cuminum cyminum 328 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Cotyledon	12	6			•	
Cotyledon lutea 12 6 Cucumis sylvestris 283 1 Cotyledon umbilicus 13 6 Cucurbita citrullus 31 4 Cotyledon umbilicus-veneris 12 6 Cucurbita moschata 172 6 Coumarouna odorata 162 4 Cucurbita pepo 290 2 Crassula minor 77 6 Cucurbita pepo 256 4 Cratægus 99 5 Cucurbita pepo 163 5 Cratægus azarolus 100 6 Cucurbita pepo 172 6 Cratægus lævigita 101 6 Cudrania Javanensis 151 6 Cratægus monogyna 161 1 Cudrania tricuspidata 150 6 Cratægus oxyacantha 114 7 Cuminum cyminum 328 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Cotyledon lusitanica	12	6			_	
Cotyledon umbilicus 13 6 Cucurbita citrullus 31 4 Cotyledon umbilicus-veneris 12 6 Cucurbita moschata 172 6 Coumarouna odorata 162 4 Cucurbita pepo 290 2 Crassula minor 77 6 Cucurbita pepo 256 4 Cratægus 99 5 Cucurbita pepo 163 5 Cratægus azarolus 100 6 Cucurbita pepo 172 6 Cratægus lævigita 101 6 Cudrania Javanensis 151 6 Cratægus monogyna 161 1 Cudrania tricuspidata 150 6 Cratægus oxyacantha 114 7 Cuminum cyminum 328 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Cotyledon lutea	12	6				
Cotyledon umbilicus-veneris 12 6 Cucurbita moschata 172 6 Coumarouna odorata 162 4 Cucurbita pepo 290 2 Crassula minor 77 6 Cucurbita pepo 256 4 Cratægus 99 5 Cucurbita pepo 163 5 Cratægus azarolus 100 6 Cucurbita pepo 172 6 Cratægus lævigita 101 6 Cudrania Javanensis 151 6 Cratægus monogyna 161 1 Cudrania tricuspidata 150 6 Cratægus oxyacantha 114 7 Cuminum cyminum 328 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Cotyledon umbilicus	13	6	_		_	
Coumarouna odorata 162 4 Cucurbita pepo 290 2 Crassula minor 77 6 Cucurbita pepo 256 4 Cratægus 99 5 Cucurbita pepo 163 5 Cratægus azarolus 100 6 Cucurbita pepo 172 6 Cratægus lævigita 101 6 Cudrania Javanensis 151 6 Cratægus monogyna 161 1 Cudrania tricuspidata 150 6 Cratægus oxyacantha 114 7 Cuminum cyminum 328 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Cotyledon umbilicus-veneris	12	6			-	
Crassula minor 77 6 Cucurbita pepo 256 4 Cratægus 99 5 Cucurbita pepo 163 5 Cratægus azarolus 100 6 Cucurbita pepo 172 6 Cratægus lævigita 101 6 Cudrania Javanensis 151 6 Cratægus monogyna 161 1 Cudrania tricuspidata 150 6 Cratægus oxyacantha 114 7 Cuminum cyminum 328 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Coumarouna odorata	162	4			_	
Cratægus 99 5 Cucurbita pepo 163 5 Cratægus azarolus 100 6 Cucurbita pepo 172 6 Cratægus lævigita 101 6 Cudrania Javanensis 151 6 Cratægus monogyna 161 1 Cudrania tricuspidata 150 6 Cratægus oxyacantha 114 7 Cuminum cyminum 328 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Crassula minor	77	6				
Cratægus azarolus 100 6 Cucurbita pepo 172 6 Cratægus lævigita 101 6 Cudrania Javanensis 151 6 Cratægus monogyna 161 1 Cudrania tricuspidata 150 6 Cratægus oxyacantha 114 7 Cuminum cyminum 328 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Cratægus	99	5			·	
Cratægus lævigita 101 6 Cudrania Javanensis 151 6 Cratægus monogyna 161 1 Cudrania tricuspidata 150 6 Cratægus oxyacantha 114 7 Cuminum cyminum 328 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Cratægus azarolus	100	6			-	
Cratægus monogyna 161 l Cudrania tricuspidata 150 6 Cratægus oxyacantha 114 7 Cuminum cyminum 328 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Cratægus lævigita	101	6	1		_	
Cratægus oxyacantha 114 7 Cuminum cyminum 328 1 Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Cratægus monogyna	161	1			6	
Cratægus Sinaica 100 5 Cuminum odorum 328 1	Cratægus oxyacantha	114	7	•		1	
Cremae 212, 213 2 Cupressus sempervirens 126 2 OYA	Cratægus Sinaica	100	5			1	
	_	212, 213	2	Cupressus sempervirens	126	2	٨٢٥

cle	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
12	Clematis recta	262		Combretum altum	235	1
	Clematis vitalba	362	1	Combretum micranthum	190	4
	Clematis viticella	245	5	Combretum Raimbaultii	235	1
	Clinopodium origanifolium	193	2	Combretum sundaicum	166	7
	Clinopodium vulgare	198	5	Commiphora agallocha	260	2
	Cnicus arvensis	254	6	Commiphora mukul	260	2
	Cnicus benedictus	214	1	Commiphora opobalsamum	39	3
	Cnicus benedictus	171	6	Conium maculatum	216	1
	Cocculus chondodendron	34	7	Consolida major	333	1
	Cocculus diversifolius	119	4	Consolida media	228	1
	Cocculus laurifolius	119	4	Consolida regalis	147	6
	Cocculus loæba	118	4	Convallaria maialis	168	1
	Cocculus plathyphylla	34	7	Convolvulus	109	3
	Cochlearia armoracia	250	6	Convolvulus althæoides	208	5
	Cochlearia officinalis	363	1	Convolvulus arvensis	224	2
	Cocos nucifera	268	2	Convolvulus Mechoacana	200	4
	Cocos nucifera	238	6	Convolvulus scammonia	132	2
	Coffea	41	5	Convolvulus sepium	341	1
	Coffea	41	7		54	6
	Coffea arabica	55	1	Convolvulus turpethum	•	7
	Coffeinum	181	5	Conyza anthelminthica	180 35	
	Coix lacryma-jobi	17	3	Conyza squarrosa		7
	Cola acuminata	335	1	Coptis	190	3
	Cola Ballayi	335	1	Coptis groenlandica	191	3
	Cola nitida	335	1	Coptis japonica	191	3
	Cola verticillata	335	1	Coptis mahmira	191	3
	Colchicum autumnale	191	1	Coptis tecta	191	3
	Colchicum autumnale	125	6	Coptis trifoliata	191	3
	Colchicum autumnale	133	7	Corallina officinalis	219	4
	Colchicum decaisnei	135	7	Corallium	213	3
	Collinsonia canadensis	33	4	Cordia	232	4
	Collutoria	157	6	Coriandrum maculatum	216	1
	Colocasia antiquorum	175, 176	6	Coriandrum sativum	187	3
	Colocasia esculenta	176	6	Coridothymus capitatus	113	7
	Colocasia odora	58	7	Cornus circinatus	194	7
	Colutea arborescens	300	1	Cornus florida	173	6
979	Combretum album	190	4	Cornus mascula	192	2

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	cle
Chlorophyceae	17	6	Cinnamomum Malabathrum	168	4	11
Chondodendron tomentosum	34	7	Cinnamomum obtusifolium	165	5	
Chondrus	185	3	Cinnamomum zeylanicum	189	2	
Chondrus crispus	306	1	Cirsium arvense	254	6	
Chondrus polymorphus	306	1	Cistus	220	2	
Chrozophora tinctoria	185	4	Cistus Creticus	197	3	
Chrozophora tinctoria	188	6	Cistus incanus	197	3	
Chrysanthemum balsamita	39	1	Cistus ladaniferus	204	5	
Chrysanthemum balsamita	70	2	Cistus salviifolius	222	7	
Chrysanthemum cinerariaef-			Cistus villosus	197	3	
olium	258	1	Citrago	366	1	
Chrysanthemum parthenium	173	3	Citrullus colocynthis	106	1	
Chrysanthemum vulgare	94	1	Citrullus vulgaris	31	4	
Chrysophyllum Buranhem	237	4	Citrus aurantium	45	1	
Chrysophyllum glycyphlæum	237	4	Citrus aurantium dulcis	33	2	
Cibotium Barometz	52	4	Citrus aurantium var. amara	238	3	
Cibotium glaucum	52	4	Citrus aurantium var. amara	239	4	
Cicer arietinum	67	3	Citrus aurantium var.			
Cichorium intybus	284	2	bergamia	46	1	
Cichorium intybus	131	4	Citrus aurantium var. sinensis	45	1	
Cichorium pumilum	262	5	Citrus bergamia	46	1	
Cicuta aquatica	218	1	Citrus decumana	217	5	
Cicuta major	216	1	Citrus limonum	208	4	
Cicuta major vulgaris	216	1	Citrus limonum	205	3	
Cicuta virosa	218	1	= Citrus medica Citrus mandarina	205 208	4	
Cimicifuga racemosa	26	1	Citrus mandarina Citrus medica	208	4	
Cimicifuga racemosa	18	2	Citrus medica Citrus nobilis	208	4	
Cinchona	189	3	Citrus sinensis	45	1	
Cinchona calisaya	194	6	Citrus vulgaris	238	3	
Cinchona condaminea	192	4	Cladonia pyxidata	69	2	
Cinchona pitayensis	216	7	Cladonia rangiferina	78	7	
Cinchona succirubra	338	1	Claviceps purpurea	14, 15	1	
Cinchona succirubra	199	5	Clematis	236	4	
Cinnamomum aromaticum	165	5	Clematis cirrhosa	256	7	
Cinnamomum camphora	202	2	Clematis daphnoides	396	1	
Cinnamomum cassia	164, 165		Clematis daphnoides Clematis latifolia dentata	362	1	
Cinnamomum citriodorum	164	, 5	Clematis mauritiana	248	5	۰۳۰
Camamomam Citilogorum	.07	,	Ocimans maurinalia	240	5	51 ·

cec	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
10	Cecropia hololeuca	152	7	Cerinthe aspera	127	7
	Cecropia peltata	136	4	Cerinthe major	127	7
	Ceiba pentandra	178	3	Cerinthe minor	127	7
	Celastrus edulis	163	5	Cestrum nocturnum	124	4
	Celosia adoensis	196	4	Ceterach officinarum	119	3
	Centaurea benedicta	214	1	Cetraria islandica	174	1
	Centaurea calcitrapa	303	1	Chænorrhinum minus	207	3
	Centaurea centaurium	174	5	Chærophyllum bulbosum	114	6
	Centaurea cyanus	67	1	Chærophyllum Libanoticum	108	5
	Centaurea hippophæstum	303	1	Chamæcissus	326	1
	Centaurea jacea	201	7	Chamædrys	144	6
	Centaurea stellata	303	1	Chamælirium carolinianum	269	7
	Centaurium erythræa	301	1	Chamaemelum arvensis	16	5
	Centaurium minus	301	1	Chamaemelum discoideum	17	5
	Centaurium pulchellum	173	5	Chamaemelum nobile	26	l
	Centaurium ramosissimum	173	5	Chamomilla suaveolens	29	2
	Centaurium umbellatum	301	1	Charta japonica	251	4
	Centella asiatica	244	4	Chasmanthera palmata	289	1
	Cephaelis acuminata Karsten	140	3	Chavica officinarum	162	3
	Cephaelis ipecacuanha	229	1	Cheiranthus cheiri	368	1
	Cephaelis ipecacuanha	25	2	Chelidonium majus	233	1
	Cephalanthus africanus	245	5	Chenopodium album	2	5
	Cerasus acida	315	1	Chenopodium ambrosioides	5	2
	Cerasus avium	184	6	Chenopodium ambrosioides	5	4
	Cerasus caproniana	315	1	Chenopodium Bonus-Henricus	22	1
	Cerasus laurocerasus	316	1	Chenopodium botrys	5	2
	Cerasus mahaleb	207	6	Chenopodium murale	109	7
	Cerasus padus	189	5	Chenopodium scoparium	194	6
	Cerasus vulgaris	315	1	Chicocca anguifuga	179	6
	Cerasus vulgaris	211	2	Chicocca brachiata	179	6
	Cerata	243	2	Chimaphila corymbosa	198	4
	Ceratonia siliqua	116	1	Chimaphila umbellata	198	4
	Cercopia obtusa	138	5	Chinensis	94	4
	Cereus	135	4	Chionanthus virginiana	99	3
	Cereus grandiflorus	209	1	Chironia angularis	175	5
	Cereus grandiflorus	139	7	Chironia centaurium	301	1
١٣٥	Cerevisia	46	5	Chironia chilensis	174	5

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	<u> cec</u>
Canna Indica	171	4	Cardamomum medium	246	6	9
Cannabis indica	171	5	Cardamomum racemosum	261	5	
Cannabis sativa	198	2	Cardamomum zeylanicum	246	6	
Cannabis sativa	171	5	Carduus benedictus	214	1	
Cannabis sativa indica	299	1	Carduus Marianus	324	1	
Cannabis sativa vulgaris	299	1	Carex arenaria	180	1	
Cantharis vesicatoria	91	3	Carica papaya	41	1	
Capparis coriacea	118	3	Carica papaya	32	2	
Capparis parviflora	184	5	Carica papaya	25	6	
Capparis retusofolio	184	5	Carlina acaulis	320	1	
Capparis sativa	203	2	Carlina caulescens	320	1	
Capparis sativa	184	5	Carlina chamaeleon	320	1	
Capparis sicula	183	5	Carlina vulgaris	212	7	
Capparis spinosa	203	2	Carnegiea Carthamus lanatus	135	4	
Capparis spinosa canescens	183	5		172 188	6	
			Carthamus tinctorius Carum carvi	185	3	
Capparis spinosa parviflora	184	5	Carum carvi	13	3	
Capsella bursa pastoris	336	1	Cascara amara	271	2	
Capsicum annuum	275	1	Cassia	112	3	
Capsicum fastigiatum	275	1	Cassia	114	5	
Capsicum fastigiatum	163	3	Cassia fistulosa	118	ı	
Capsicum frutescens	275	1	Cassuvium pomiferum	33	6	
Capsicum frutescens	163	3	Castanea pumila	189	6	
Capsicum longum	275	1	Castanea sativa	188	6	
Capsicum longum	163	3	Castanea vulgaris	213	2	
Capsicum minium	275	1	Castanea vulgaris	188	6	
Capsicum minium	163	3	Castanopsis chrysophylla	189	6	
Carapa proceras or Carapa			Castor fiber	168	3	
touloucouna	174	4	Casuarina equisetifolia	192	5	
Carbenia benedicta	214	1	Catalpa bignonioides	180	4	
Carbenia benedicta	171	6	Catapucia major	73	5	
Carbo ligni	260	1	Catha edulis	163	5	
Cardamine pinnata	98	7	Catharanthus roseus	192	2	
Cardamine pratensis	67	5	Cayaponia globosa	206	7	
Cardamine pratensis	78	7	Сесторіа	136	4	
Cardamomum longum	246	6	Cecropia adenopus	152	7	۲۳٥

bra	Sc.	Page	Vol	<u>Sc.</u>	Page	Vol
8	Brassica oleracea capitata	230	3	Calamintha officinalis	297	1
	Brassica vesicaria	155	1	Calamintha origanifolia	193	2
	Brayera anthelminthica	195	4	Calamintha purpurascens	13	5
	Bromelia ananas	37	1	Calamintha rotundifolia	13	5
	Brucea amarissima	202	5	Calamintha vulgaris	198	5
	Brucea antidysenterica	31	4	Calamus draco	97	7
	Brucea ferruginea	31	4	Calcitrapa lanuginosa	214	1
	Brucea gracilis	202	5	Calendula officinalis	11	1
	Brucea sumatrana	202	5	Callitris	115	5
	Brunella vulgaris	295	1	Callitris arenosa	115	5
	Brunfelsia Hopeana	209	3	Callitris calcarata	116	5
	Bryonia alba	155	4	Callitris cupressiformis	116	5
	Bryonia dioica	176	2	Callitris drumnondii	116	5
	Bryonia tayuyia	52	6	Callitris glauca	116	5
	Buphthalmum	16	5	Callitris gracilis	116	5
	Bupleurum perfoliatum	69	5	Callitris intratropica	116	8
	Bupleurum rotundifolium	69	5	Callitris macleayan	116	5
	Butyrospermum Parkii	95	6	· ·	116	5
	Butyrum theobroma cacao	178	4	Callitris oblonga		
	Buxus sempervirens	50	1	Callitris propinqua	116	5
	β -violacea (var.)	120	5	Callitris quadrivalvis	122	6
	Cachrys maritimum	208	1	Callitris rhomboidea	116	5
	Cactus	135	4	Callitris robusta	116	5
	Cactus ficus-indica	134	4	Callitris tasmanica	116	5
	Cactus grandiflorus	209	1	Callitris verucose	116	5
	Cactus grandiflorus	139	7	Calluna ciliaris	187	1
	Cactus opuntia	151	2	Calluna erica	187	1
	Caesalpinia bonducella	41	3	Calluna vulgaris	187	1
	Caesalpinia bonducella	104	4	Caltha palustris	8	2
	Cajan inodorum	181	6	Calystegia sepium	341	1
	Cajanus cajan	181	6	Camellia chinensis	197	1
	Cajanus indicus	181	6	Camellia thea	197	1
	Caladium bicolor	189	6	Campanula rapunculus	168	2
	Caladium esculentum	176	6	Camphora	179	3
	Caladium odorum	58	7	Camphora naturalis	177	4
	Calamintha clinopodium	198	5	Camphorosma monspelliaca L.	178	4
	Calamintha graveolens	13	5	Cananga odorata	256	6
	2	-	-	G	-	-

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	bra
Ballota vulgaris	263	1	Beta vulgaris rapa	210	1	7
Balsamina hortensis	44	5	Beta vulgaris rapacea	210	1	
Balsamita suaveolens	39	1	Betonica officinalis	48	1	
Balsamodendron africanum	260	2	Betula alba	42	1	
Balsamodendron gileadense	39	3	Betula alnus	360	1	Lander C
Balsamodendron Roxburghii	260	2	Betula glutinosa	360	1	
Balsamodendrum			Bidens	62	3	
opobalsamum	39	3	Bidens cernua	63	3	
Balsamum benivivum	42	5	Bidens frondosa	63	3	
Balsamum gurjunae	38	3	Bidens pilosa	63	3	
Balsamum peruvianum	35	4	Bidens tripartita	63	3	
Banisteria caapi	272	7	Bignonia Leucantha	115	3	
Baptisia	247	3	Bittera febrifuga	42	4	
Barbadense	170	4	Bixa orellana	34	4	
Barbarea vulgaris	77	1	Blumea balsamifera	40	5	
Barosma betulina	43	2	Blumea lacera	41	5	
Basella alba	29	4	Bæhmeria Jacq.	95	5	
Bassia longifolia	95	6	Bæhmeria tenacissima	96	5	
Bdella	148	4	Bæhmeria (urtica) Nivea	96	5	
Bellis perennis	55	1	Bæhmeria utilis	96	5	
Benedicta officinalis	214	1	Boldoa fragrans	203	1	
Benthamia florida	173	6	Bolus orientalis	135	3	
Benzoe	42	5	Borago officinalis	102	1	
Berberis cretica	34	5	Borogo officinalis	95, 103	5	
Berberis Libanotica	34	5	Boswellia	206	5	
Berberis vulgaris	44	1	Boswellia carterii	206	5	
Bergenia cordifolia	131	2	Boswellia floribunda	207	5	
Berula angustifolia	210	7	Boswellia frereana	207	5	
Berula erecta	210	7	Boswellia papyrifera	207	5	
Beta bourgæi	118	6	Boswellia serrata	206	5	
Beta cicla	184	1	Botrychium lunaria	227	2	
Beta macrocarpa	118	6	Bowdichia virgilioides	16	3	
Beta rapa	210	1	Brassica alba	79	2	
Beta rubra	210	1	Brassica eruca	155	1	
Beta vulgaris	210	i	Brassica napus	230	2	
Beta vulgaris cicla	184	1	Brassica nigra	114	1	
Beta vulgaris folliosa	184	1	Brassica oleracea	262	2	370

				ı		
art	_ <u>Sc.</u>	Page	Vol	<u>Sc.</u>	Page	Vol
6	Artemisia aragonensis	151	7	Aspidium rhæticum	191	5
	Artemisia campestris	151	7	Aspidosperma Peroba	182	3
	Artemisia chinensis	5	6	Aspidosperma		
	Artemisia Cina	151	7	Quebracho-blanco	182	3
	Artemisia dracunculus	163	2	Asplenium Adiamtum-nigrum	108	5
	Artemisia glacialis	6	3	Asplenium ceterach	119	3
	Artemisia herba-alba	5	5	Asplenium scolopendrium	179	1
	Artemisia maritima	2	1	Asplenium trichomanes	107	3
	Artemisia maritima	3	2	Aster argophyllus	232	4
	Artemisia mutellina vill	7	4	Aster helenium	149	1
	Artemisia pontica	148	2	Aster officinalis	149	1
	Artemisia species	120	6	Astragalus creticus	11	6
	Artemisia spicata	7	7	Astragalus exscapus	15	7
	Artemisia verlotorum	159	4	Astragalus gummifera	13	2
	Artemisia vulgaris	219	1	Astragalus mareoticus	14	7
	Arum dracunculus	7	3	Astragalus massiliensis	12	6
	Arum esculenta	8	3	Astragalus species	159	2
	Arum italicum	9	4	Astragalus tragacantha	12	6
	Arum maculatum	7, 8	3	Astrantia major	220	7
	Arum seguinum	8	3	Athamanta cretensis	55	4
	Arum vulgare	7	3	Athamanta oreoselinum	209	7
	Arundo Donax	170	3	Athyrium or Asplenium or Polypodium filix-femina	80	•
	Arundo phragmites	291	1	Atriplex hortensis		5
	Arundo vulgaris	291	1	Atropa belladonna	180	
	Asa dulcis	42	5	-	51	1
	Asa fœtida	65	3	Atropa beliadonna	34	3
	Asarum europæum	21	1	Atropa mandragora Auricula judae	288	2
	Asimina triloba	12	7	Auricularia sambucina	2	3
	Asparagus altilis	390	1	Auricularia samoucina Avena orientalis	2	3
	Asparagus officinalis	390	1	Avena sativa	115	1
	Asperula odorata	22	1	Avena sativa var. contracta	13, 115	1
	Asperula (Rubia) cynanchica	11	4	Baccharoides ascaricida	115	1
	Asphodelus albus	27	6		180	7
	Asphodelus fistulosus	28	6	Balanites ægyptiaca Ballota foetida	247	6
	Asphodelus microcarpus	30	4	Ballota lanata	263	1
	Asphodelus ramosus	30	4		181	2
70	Aspidium Filix-mas			Ballota nigra	263	1
. , -	repidium 1 mx-mas	176	1	Ballota suaveolens	157	4

5.	P	97-1	. 5-	Deer	57-1	
Sc. Anona triloba	Page 12	<u>Vol</u>	Sc.	Page 60	Vol 2	<u>art</u> 5
	168	7	Aralia quinquefolia		_	
Anonaceae Antennaria dioica		5	Arboreum	170	4	
	34	1	Arbutus andrachne	170	5	
Anthelminticum (var.) Anthemis arvensis	5 16	4	Arbutus unedo	294	1	
Anthemis arvensis Anthemis cotula	16	5	Arbutus uva-ursi	248	1	
Anthemis discoidea	17	5 5	Archangelica officinalis	96	1	
Anthemis discoidea Anthemis nobilis	26		Arctium (species)	16	1	
Anthemis pyrethrum	137	1	Arctium major	11	2	
Anthemis tinctoria	17	5	Arctium minus	9	5	
Anthriscus cerefolium	113	4	Arctium minus pubescens	8	7	
Anthriscus sylvestris	113	6	Arctium tomentosum	7	4	
Anthyllis montana	206	4	Arctostaphylos officinalis	248	1	
•	200	6	Arctostaphylos uva-ursi	248	1	
Anthyllis prior Anthyllis vulneraria	202	6	Areca catechu	217	7	
•	202 87	_	Areca faufel	217	7	
Antirrhinum cymbalaria Antirrhinum elatine		1	Arenaria rubra var. marina	3	1	
	194	5	Arenaria salina	3	1	
Antirrhinum majus Antirrhinum minus	120	4	Argemone Mexicana	5	6	
Antirrhinum minus Antirrhinum orontium	207	3	Argentina vulgaris	237	1	
	128	6	Aristolochia clematitis	160	I	
Aparine hispida	255	I 7	Aristolochia cymbifera	96	6	
Aphanes arvensis	214	7	Aristolochia fætida	96	6	
Aphloia sp.	184	7	Aristolochia gigas	113	7	
Apiastrum	366	1	Aristolochia grandiflora	113	7	
Apis arabica	272	2	Aristolochia longa	99	5	
Apis fasciata	272	2	Aristolochia pistolochia	99	5	
Apis ligustica	272	2	Aristolochia rotunda	9	2	
Apis mellifica	272	2	Aristolochia serpentaria	112	7	
Apium graveolens	317	1	Aristolochia trilobata	112	7	
Apium graveolens	182	4	Armeniaca vulgaris	358	1	
Apium graveolens var. rapaceum	185	6	Arnica montana	16	1	
Apocynum cannabinum	82	4	Arnoglossa	346	1	
Aqua	234	2	Arsenicum	97	6	
Aquilegia akata	24	2	Artabotrys odoratissimus	256	6	
Aquilegia vulgaris	36	1	Artemisia abrotanum	304	1	
Arachis hypogæa	269	1	Artemisia absinthium	1	1	770
Aracins hypogata	207	1	Artemsia ausminium	1	1	91 1

amp	<u>Sc.</u>	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
4	Ampelodesma tenax	13	1	Anchusa italica	212	5
	Ampelodesmos tenaæ	9	5	Anchusa officinalis	35	1
	Amygdalus amara	203	3	Anchusa paniculata	35	1
	Amygdalus communis	350	1	Anchusa tinctoria	200	5
	Amygdalus communis	232	2	Andira	70	7
	Amygdalus dulcis	350	1	Andira araroba	5	4
	Amygdalus persica	137	1	Andira araroba	188	6
	Amygdalus persica	92	2	Andira inermis	70	7
	Amyla	277, 2	79 2	Andira surinamensis	70	7
	Amylum marantae	9	4	Andira vermifuga	71	7
	Amylum maydis	242	6	Andrachne rotundifolia	207	5
	Amylum oryzae	264	7	Andrachne telephioides	207	5
	Amylum solani	258	5	Andrographis paniculata	209	3
	Amylum solani	264	7	Andropogon citratus	80	7
	Amylum tritici	239	4	Andropogon hirtus	21	6
	Amyris gileadensis	39	3	Andropogon schænanthus	7	7
	Anabasis aphylla	24	4	Androsæmum officinale	83	6
	Anacardium	21	5	Anemone	126	4
	Anacardium occidentale	33	6	Anemone hepatica	206	1
	Anacyclus pyrethrum	137	3	Anemone nemorosa	144	2
	Anacyclus velentinus	29	7	Anemone pratensis	146	7
	Anagallis arvensis	342	ì	Anemone pulsatilla	207	1
	Anagallis caerula	342	1	Anemopægma mirandum	180	4
	Anagallis latifolia	342	1	Anethum graveolens	201	1
	Anagallis phoenicea	342	1	Angelica archangelica	96	1
	Anagallis repens	342	1	Angelica officinalis	96	1
	Anagyris fætida	30	7	Angelica sativa	96	1
	Anamirta cocculus	46	3	Angelica Sylvestris	261	2
	Anamirta paniculata	46	3	Angræcum fragrans	156	3
	Anamirta paniculata	118	4	Anhalonium Lewinii	50	6
	Ananas comosus	37	1	Anhalonium Williamsii	50	6
	Ananas sativus	37	1	Anona asiatica	195	7
	Ananassa sativa	37	1	Anona cherimolia	195	7
	Anchusa azurea	35	1	Anona muricata	167	5
	Anchusa azurea	212	5	Anona palustris	195	7
	Anchusa hybrida	213	5	Anona reticulata	174	6
۳۷	Anchusa italica	35	1	Anona squamosa	173	6

Sc.	Page	Vol	<u>Sc.</u>	Page	Vol	amo
Albizzia anthelminthica	41, 197	4	Alnus glutinosa	360	1	3
Albizzia anthelminthica	22	7	Alnus incana	256	2	
Albizzia glandulosa	17	6	Alnus serrulata	245	5	
Albizzia lebbek	25	5	Alnus vulgaris	360	1	
Albizzia streptocarpa	17	6	Alocasia macrorrhiza	58	7	
Albugo candida	338	1	Aloe	116	3	
Alcea rosea	75	3	Aloe	25	7	
Alchemilla arvensis	214	7	Aloe barbadens	31	1	
Alchemilla diademata	215	7	Aloe Berryi	120	4	
Alchemilla vulgaris	327	1	Aloe linguaeformis	127	6	
Alchemilla xanthochlora			Aloe succotrina	120	4	
(Sensu lato)	327	1	Aloe vera	31	1	
Aletris farinosa	69	4	Aloe vulgaris	31	1	
Aleurites	16	3	Aloë abyssinca	20	6	
Aleurites cordata	16	3	Aloē camperi	20	6	
Aleurites Japonica	16	3	Aloë candelabrum	140	2	
Aleurites moluccana	16	3	Aloë elegans	20	6	
Algues	185	3	Aloë ferox	139	2	
Alisma lanceolatum	246	2	Aloë peacockii	20	6	
Alisma plantago-aquatica	226	5	Aloē perryi	27	7	
Alkanna tinctoria	200	5	Aloysia citriodora	353	1	
Alkekengi halicacabum	310	1	Alpinia officinarum	84	4	
Alkekengi officinarum	310	1	Alsidium helminthocorton	141	6	
Alliaria officinalis	89	1	Alsine media	377	1	
Allium ampeloprassum	182	4	Althaea officinalis	111	1	
Allium ascalonicum	209	2	Althaea rosea	75	3	
Allium Cepa	36	2	Amaracus dictamnus	39	2	
Allium Cepa	30	3	Amaracus libanoticus	135	4	
Allium fistulosum	52	4	Ambra cinerea	149	3	
Allium porrum	184	3	Ammi dilatatum	122	1	
Allium sativum	73		Ammi majus	83	2	
Allium sativum		1	Ammi visnaga	122	1	
	55	2	Amomum cardamomum	261	5	
Allium schænoprasum	109	6	Amomum cardamon	261	5	
Allium sphaerocephalon	209	2	Amomum curcuma	211	7	
Allium ursinum	189	5	Amomum granum paradisi	246	6	_#:
Allium victorialis	116	3	Amomum melegueta	246	6	٥٣٨

2 Achillea odorata Subsp. Kotschyi Achillea odorata var. grata 5 5 Adamia versicolor 94 Achillea odorata var. grata 5 5 Adansonia digitata 31 Achillea ptarmica 3 7 Adantoda vasica 2 Achillea santolina 4 6 Adiantum boreale 191 Achillea sulphurea 5 7 Adiantum boreale 191 Achillea viscosa 4 7 Adiantum capillus-veneris 321 Achillea viscosa 4 7 Adiantum pedatum 191 Achillea viscosa 4 7 Adiantum pedatum 191 Achillea viscosa 4 7 Adiantum pedatum 191 Achillea viscosa 4 7 Adiantum pedatum 192 Achillea viscosa 4 7 Adiantum bedatum 191 Achillea viscosa 4 7 Adiantum bedatum bedalinum 192 Acinum helerorhydricum 65 4 Adonis versalis 6 Acinos r	ıch	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	
Achillea odorata var. grata 5 5 Adansonia digitata 31 Achillea ptarmica 3 7 Achillea santolina 4 6 Achillea santolina 4 6 Achillea sulphurea 5 7 Achillea teretifolia 4 6 Achillea uromoffii 5 5 5 Adiantum boreale 191 Adiantum boreale 191 Achillea viscosa 4 7 Adiantum ligrum 108 Achillea Wilhelmsii 4 6 Adiantum pedatum 191 Achillea Wilhelmsii 4 6 Adiantum tenerum 192 Acidum Acidum 64 2 Adonis aestivalis 6 Adonis annua 7 Adonis aprinus 275 2 Adonis pyrenaica 6 Adonis rotundifolius 13 5 Aconitum 21 2 Aconitum anthora 21 2 Aconitum balfourii 22 2 Acschrion excelsa 175 Aconitum deinorrhizum 22 2 Aconitum deinorrhizum 22 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aconitum napellus 28 1 Agaricus campestris 252 Aconitum paniculatum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave foetida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga enevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga enevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga enevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus odoratus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus odoratus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus odoratus 245 1 Ajuga enevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga enevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga enevensis 151		Achillea odorata Subsp.			Actaea racemosa	26	
Achillea ptarmica 3 7 Adhatoda vasica 2 Achillea santolina 4 6 Adiantum aethiopicum 191 Achillea sulphurea 5 7 Adiantum boreale 191 Achillea teretifolia 4 6 Adiantum capillus-veneris 321 Achillea viscosa 4 7 Adiantum nigrum 108 Achillea viscosa 4 7 Adiantum pedatum 191 Achillea Wilhelmsii 4 6 Adiantum tenerum 192 Acidum chlorhydricum 65 4 Adonis astivalis 6 Adionis astivalis 6 Adionis annua 7 Acinos alpinus 275 2 Adonis pyrenaica 6 Adonis vernalis 9 Aconitum anthora 21 2 Adonis vernalis 9 Aconitum balfourii 22 2 Acschrion excelsa 175 Aconitum deinorrhizum 22 2 Acenitum deinorrhizum 22 2 Acthoratyza bulbosa 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Acthoratyza bulbosa 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum pyramidale 28 1 Agaritus campestris 252 Aconitum pyramidale 28 1 Agaritus edulis 23 Aconitum pyramidale 28 1 Agaritus campestris 253 Aconitum pyramidale 28 1 Agaritus edulis 253 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variabile 28 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga enevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga enevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Kotschyi	5	5	Adamia versicolor	94	
Achillea santolina 4 6 Adiantum aethiopicum 191 Achillea sulphurea 5 7 Adiantum boreale 191 Achillea teretifolia 4 6 Adiantum capillus-veneris 321 Achillea uromoffii 5 5 5 Adiantum nigrum 108 Achillea viscosa 4 7 Adiantum pedatum 191 Achillea Wilhelmsii 4 6 Adiantum pedatum 191 Acidum 64 2 Adonis astivalis 6 Adiantum tenerum 192 Acidum chlorhydricum 65 4 Adonis annua 7 Adianos alpinus 275 2 Adonis pyrenaica 6 Adonis vernalis 9 Adonis vernalis 9 Adonis vernalis 9 Adonis vernalis 21 2 Adonis vernalis 9 Adonis marthora 21 2 Aegle marmelos 42 Aconitum balfourii 22 2 Aeschrion excelsa 175 Aconitum deinorrhizum 22 2 Aeschrion excelsa 175 Aconitum ferox 22 2 Aetherolea 96 Aconitum heterophyllum 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave fetida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Agartis salisb. 194 Aconitum pyramidale 28 1 Agertum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agroyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus calamus 245 1 Ajuga enevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Achillea odorata var. grata	5	5	Adansonia digitata	31	
Achillea sulphurea 5 7 Adiantum boreale 191 Achillea teretifolia 4 6 Adiantum capillus-veneris 321 Achillea uromoffii 5 5 5 Achillea viscosa 4 7 Adiantum nigrum 108 Achillea viscosa 4 7 Adiantum pedatum 191 Achillea Wilhelmsii 4 6 Adiantum tenerum 192 Acidum 64 2 Adonis æstivalis 6 Adionis æstivalis 6 Adiantum tenerum 192 Acidum chlorhydricum 65 4 Adonis annua 7 Adionis apinus 275 2 Adonis pyrenaica 6 Acinos rotundifolius 13 5 Adonis vernalis 9 Aconitum 21 2 Adegle marmelos 42 Aconitum anthora 21 2 Aegle marmelos 42 Aconitum balfourii 22 2 Aeschrion excelsa 175 Aconitum deinorrhizum 22 2 Aetherolea 96 Aconitum ferox 22 2 Aetherolea 96 Aconitum heterophyllum 22 2 Aethusa cynapium 128 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave fætida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Agertum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variabile 28 1 Ajuga chamæpitys 138 Acorus calamus 245 1 Ajuga iva 138		Achillea ptarmica	3	7	Adhatoda vasica	2	
Achillea teretifolia 4 6 6 Achillea uromoffii 5 5 5 Achillea viscosa 4 7 Achillea viscosa 4 8 Achillea viscosa 4 9 Achillea viscosa 4 9 Achillea viscosa 4 9 Achillea viscosa 4		Achillea santolina	4	6	Adiantum aethiopicum	191	
Achillea uromoffii 5 5 5 Adiantum nigrum 108 Achillea viscosa 4 7 Adiantum pedatum 191 Achillea Wilhelmsii 4 6 Acidum 64 2 Adonis æstivalis 6 Acidum chlorhydricum 65 4 Adonis æstivalis 6 Adonis annua 7 Acinos alpinus 275 2 Adonis pyrenaica 6 Adonis vernalis 9 Aconitum 191 Aconi		Achillea sulphurea	5	7	Adiantum boreale	191	
Achillea viscosa 4 7 Adiantum pedatum 191 Achillea Wilhelmsii 4 6 Acidum 64 2 Adonis æstivalis 6 Acidum chlorhydricum 65 4 Adonis æstivalis 6 Adonis æstivalis 6 Adonis annua 7 Acinos alpinus 275 2 Adonis pyrenaica 6 Adonis vernalis 9 Aconitum 21 2 Aconitum anthora 21 2 Aconitum balfourii 22 2 Aconitum deinorrhizum 21 2 Aconitum deinorrhizum 22 2 Aconitum heterophyllum 23 Aconitum heterophyllum 24 Agaricus campestris 252 Aconitum napellus 28 1 Agaricus edulis 252 Aconitum napellus 28 1 Agaricus edulis 252 Aconitum pyramidale 28 1 Agaricus edulis 252 Aconitum portanidale 28 1 Agare fætida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Agare fætida 39 Aconitum stoerkianum 21 2 Agare fætida 39 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 23 2 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 Agrostemma githago 73 Aconitum variegatum 16 Agrostemma githago 73 Aconitum variegatum 16 Agrostemma githago 73 Aconitum variegatum 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Achillea teretifolia	4	6	Adiantum capillus-veneris	321	
Achillea Wilhelmsii 4 6 Acidum 64 2 Acidum 65 4 Adonis æstivalis 6 Acidum chlorhydricum 65 4 Acinos alpinus 275 2 Acinos rotundifolius 13 5 Aconitum 21 2 Aconitum anthora 21 2 Aconitum balfourii 22 2 Aconitum deinorrhizum 21 2 Aconitum deinorrhizum 22 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aconitum karakolicum 22 2 Aconitum lucidusculum 22 2 Aconitum napellus 28 1 Aconitum napellus 28 1 Aconitum paniculatum 21 2 Aconitum paniculatum 21 2 Aconitum neomontanum 21 2 Aconitum neomontanum 21 2 Aconitum paniculatum 21 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum variabile 28 1 Aconitum variab		Achillea uromoffii	5	5	Adiantum nigrum	108	
Acidum 64 2 Acidum chlorhydricum 65 4 Acidum chlorhydricum 65 4 Acinos alpinus 275 2 Acinos rotundifolius 13 5 Aconitum 21 2 Aconitum anthora 21 2 Aconitum balfourii 22 2 Aconitum deinorrhizum 21 2 Aconitum ferox 22 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aconitum harakolicum 22 2 Aconitum harakolicum 22 2 Aconitum napellus 28 1 Aconitum napellus 28 1 Aconitum neomontanum 21 2 Aconitum pyramidale 28 1 Aconitum pyramidale 28 1 Aconitum pyramidale 28 1 Aconitum stoerkianum 21 2 Aconitum stoerkianum 21 2 Aconitum talassicum 22 2 Aconitum harakolicum 21 2 Aconitum pyramidale 28 1 Aconitum pyramidale 28 1 Aconitum stoerkianum 21 2 Aconitum stoerkianum 21 2 Aconitum harakolicum 22 3 Aconitum stoerkianum 21 3 Aconitum stoerkianum 21 4 Aconitum stoerkianum 21 2 Aconitum harakolicum 22 3 Aconitum stoerkianum 37 Aconitum stoerkianum 38 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum variegatum 142 Acorus adratus 245 1 Ajuga denamæpitys 158		Achillea viscosa	4	7	Adiantum pedatum	191	
Acidum chlorhydricum 65		Achillea Wilhelmsii	4	6	Adiantum tenerum	192	
Acinos alpinus 275 2 Adonis pyrenaica 6 Acinos rotundifolius 13 5 Adonis vernalis 9 Aconitum 21 2 Adonis vernalis 9 Aconitum anthora 21 2 Aegle marmelos 42 Aconitum balfourii 22 2 Aeschrion excelsa 175 Aconitum cammarum 21 2 Aesculus hippocastanum 286 Aconitum ferox 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum karakolicum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum napellus 28 1 Agathis salisb. 194 Aconitum paniculatum 21 2 Agave americana 27 Aconitum pyramidale 28 1 Agaratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 73 Aconitum variabile 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga denæpitys 158 Acorus coloratus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Acidum	64	2	Adonis æstivalis	6	
Acinos rotundifolius 13 5 Adonis vernalis 9 Aconitum 21 2 Adoxa moschatellina 231 Aconitum anthora 21 2 Aegle marmelos 42 Aconitum balfourii 22 2 Aeschrion excelsa 175 Aconitum cammarum 21 2 Aesculus hippocastanum 286 Aconitum deinorrhizum 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum karakolicum 22 2 Aethusa cynapium 128 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum napellus 28 1 Agaricus edulis 252 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave feetida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Ageratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia edorata 170 Aconitum variabile 28 1 Agroyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agroyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus calamus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Acidum chlorhydricum	65	4	Adonis annua	7	
Aconitum anthora 21 2 Adoxa moschatellina 231 Aconitum anthora 21 2 Aegle marmelos 42 Aconitum balfourii 22 2 Aeschrion excelsa 175 Aconitum cammarum 21 2 Aesculus hippocastanum 286 Aconitum deinorrhizum 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum karakolicum 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum karakolicum 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus edulis 252 Aconitum napellus 28 1 Agathis salisb. 194 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave fetida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Ageratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia odorata 170 Aconitum variabile 28 1 Agroyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Acinos alpinus	275	2	Adonis pyrenaica	6	
Aconitum anthora 21 2 Aegle marmelos 42 Aconitum balfourii 22 2 Aeschrion excelsa 175 Aconitum cammarum 21 2 Aesculus hippocastanum 286 Aconitum ferox 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum karakolicum 22 2 Aethusa cynapium 128 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus edulis 252 Aconitum napellus 28 1 Agathis salisb. 194 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave fœtida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Ageratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 73 Aconitum variabile 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Acinos rotundifolius	13	5	Adonis vernalis	9	
Aconitum balfourii 22 2 Aeschrion excelsa 175 Aconitum cammarum 21 2 Aesculus hippocastanum 286 Aconitum deinorrhizum 22 2 Aetherolea 96 Aconitum ferox 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aethusa cynapium 128 Aconitum karakolicum 22 2 Aethusa cynapium 128 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus edulis 252 Aconitum napellus 28 1 Agathis salisb. 194 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave fætida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Ageratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia odorata 170 Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum	21	2	Adoxa moschatellina	231	
Aconitum cammarum 21 2 Aesculus hippocastanum 286 Aconitum deinorrhizum 22 2 Aetherolea 96 Aconitum ferox 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aethusa cynapium 128 Aconitum karakolicum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus edulis 252 Aconitum napellus 28 1 Agathis salisb. 194 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave fœtida 39 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum anthora	21	2	Aegle marmelos	42	
Aconitum deinorrhizum 22 2 Aetherolea 96 Aconitum ferox 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aethusa cynapium 128 Aconitum karakolicum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus edulis 252 Aconitum napellus 28 1 Agathis salisb. 194 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave fœtida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Ageratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia odorata 170 Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum variegatum 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum balfourii	22	2	Aeschrion excelsa	175	
Aconitum ferox 22 2 Aethorrhyza bulbosa 2 Aconitum heterophyllum 22 2 Aethusa cynapium 128 Aconitum karakolicum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus edulis 252 Aconitum napellus 28 1 Agathis salisb. 194 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave fœtida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Ageratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia odorata 170 Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus calamus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga genevensis 151		Aconitum cammarum	21	2	Aesculus hippocastanum	286	
Aconitum heterophyllum 22 2 Acthusa cynapium 128 Aconitum karakolicum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus edulis 252 Aconitum napellus 28 1 Agathis salisb. 194 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave fœtida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Ageratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia odorata 170 Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus calamus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum deinorrhizum	22	2	Aetherolea	96	
Aconitum karakolicum 22 2 Agaricus campestris 252 Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus edulis 252 Aconitum napellus 28 1 Agathis salisb. 194 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave fœtida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Ageratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia odorata 170 Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum ferox	22	2	Aethorrhyza bulbosa	2	
Aconitum lucidusculum 22 2 Agaricus edulis 252 Aconitum napellus 28 1 Agathis salisb. 194 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave fœtida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Ageratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia odorata 170 Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum heterophyllum	22	2	Aethusa cynapium	128	
Aconitum napellus 28 l Agathis salisb. 194 Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave fœtida 39 Aconitum pyramidale 28 l Ageratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia odorata 170 Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum karakolicum	22	2	Agaricus campestris	252	
Aconitum neomontanum 21 2 Agave americana 27 Aconitum paniculatum 21 2 Agave fœtida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Ageratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia odorata 170 Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum lucidusculum	22	2	Agaricus edulis	252	
Aconitum paniculatum 21 2 Agave fœtida 39 Aconitum pyramidale 28 1 Ageratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia odorata 170 Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum napellus	28	1	Agathis salisb.	194	
Aconitum pyramidale 28 1 Ageratum conyzoides 2 Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia odorata 170 Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum neomontanum	21	2	Agave americana	27	
Aconitum sachalinensis 22 2 Agrimonia eupatoria 253 Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia odorata 170 Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum paniculatum	21	2	Agave fœtida	39	
Aconitum stoerkianum 21 2 Agrimonia odorata 170 Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum pyramidale	28	1	Ageratum conyzoides	2	
Aconitum talassicum 23 2 Agropyron repens 378 Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum sachalinensis	22	2	Agrimonia eupatoria	253	
Aconitum variabile 28 1 Agrostemma githago 79 Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum stoerkianum	21	2	Agrimonia odorata	170	
Aconitum variegatum 16 6 Agrostemma githago 73 Aconitum vulparia 23 2 Ailanthus altissima 142 Acorus aromaticus 245 1 Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 1 Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Aconitum talassicum	23	2	Agropyron repens	378	
Acorus aromaticus 245 l Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 l Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 l Ajuga iva 158		Aconitum variabile	28	1	Agrostemma githago	79	
Acorus aromaticus 245 l Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 l Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 l Ajuga iva 158		Aconitum variegatum	16	6	Agrostemma githago	73	
Acorus aromaticus 245 l Ajuga chamæpitys 158 Acorus calamus 245 l Ajuga genevensis 151 Acorus odoratus 245 l Ajuga iva 158			23	2	Ailanthus altissima	142	
Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158			245	1	Ajuga chamæpitys	158	
Acorus odoratus 245 1 Ajuga iva 158		Acorus calamus	245	1	Ajuga genevensis	151	
		Acorus odoratus	245	1	Ajuga iva	158	
Actaca spicata 1/ 2 Ajuga reptans 220	1	Actaea spicata	17	2	Ajuga reptans	228	

Scientific Index

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
Abies alba	50	2	Acer	175	3
Abies alba	55	5	Acer campestris	175	3
Abies pectinata	50	2	Acer hermoneum	175	3
Abrus precatorius	2	2	Acer pensylvanicum	175	3
Abrus precatorius	135	6	Acer platanoides	175	3
Acacia albida	133	7	Acer pseudo-platanus	175	3
Acacia arabica	120	5	Acer rubrum	175	3
Acacia astringens	26	4	Acer saccharinum	175	3
Acacia catechu	137	2	Acer saccharum	176	3
Acacia cyanophylla	133	7	Acer syriacum	175	3
Acacia dealbata	118	5	Acer tauricolum	175	3
Acacia decurrens	119	5	Achillea	3	5
Acacia decurrens. var.			Achillea ageratum	4	7
dealbata	118	5	Achillea atrata	3	6
Acacia decurrens var. mollis	118	5	Achillea biebersteinii	4	5
Acacia farnesiana	124	6	Achillea damascena	5	7
Acacia gummifera	124	6	Achillea eriocarpa	4	6
Acacia lebbek	25	5	Achillea falcata	5	7
Acacia mellifera	124	6	Achillea fragrantissima	3	6
Acacia mollissima	118	5	Achillea herba-rotas	4	7
Acacia Senegal	119	5	Achillea Kotschyi	5	5
Acacia seyal	124	6	Achillea krascheninnikovii	4	6
Acacia vera	120	5	Achillea macrocephala	3	7
Acanthopanax	43	7	Achillea micrantha	4	5
Acanthopanax Henryi	43	7	Achillea millefolium	7	1
Acanthopanax senticosus	43	7	Achillea moschata	7	2
Acanthopanax sessiliflorum	43	7	Achillea nana	4	7
Acanthus mollis	19	2	Achillea nobilis	3	6

02.

MICHEL HAYEK

ENCYCLOPEDIA OF MEDICINAL PLANTS

ARABIC - ENGLISH - FRENCH - GERMAN - LATIN

7

313 plants - 44 coloured illustrations 3 appendices - 8 glossaries

